

# بررسی امکان توسعه گیاهان مرتعی در منطقه ورامین

از: ذبیح الله کفash\*



## خلاصه:

گیاهان مرتعی را انتخاب و سازگاری آنها را در منطقه ورامین تامین احتیاجات دامی، مخصوصاً "درمنطقه ورامین و بادر مورد مطالعه قرار دادیم، و پس از سه سال<sup>۱</sup> مطالعه نتایجی بدست آمد. گیاهان مورد بررسی عبارتند از:

- 1- *Atriplex canescens* Janes
- 2- *Atriplex spinosa* D.Dietr.
- 3- *Atriplex verruciferum* M.B.
- 4- *Agropyron elongatum* (Host) Beouv.

با توجه به ضعیف بودن مراتع و کمبود علوفه جهت تامین احتیاجات دامی، مشکلات زیادی روی رو هستند و از طرفی نظر گرفتن این نکته که دامداران منطقه همه ساله جهت تامین علوفه دام خود، با مشکلات زیادی روی رو هستند و از طرفی کمبود آب، شوری زمین و حرارت زیاد تابستان در این منطقه، که منطقه‌ای است نیمه کویری و عامل محدود کننده رشد گیاهان مرتعی می‌باشد، پس از مطالعات لازم ده گونه مختلف از

\* استادیار گروه تکنولوژی کشاورزی و دامپروری دانشگاه ابوریحان بیرونی.

۱- سال‌های ۵۷-۵۶-۱۳۵۵.

اقدامات جدی جهت احیاء مراتع و توسعه گیاهان مرتعی در نقاط مختلف مملکت بعمل آیدوگرنه درآینده از یک طرف دچار کمبود شدید گوشت و دیگر محصولات دامی خواهیم بود و از طرف دیگر بعلت بی توجیهی به پوشش گیاهی و احیاء مراتع، اغلب زمین‌ها بصورت بی مصرف و بایر درخواهد آمد.

با در نظر گرفتن این نکته که دامداران منطقه ورامین و گرمسار نیز همه ساله با کمبود مواد غذائی دام روبرو بوده و برای استفاده از مراتع فیروز کوه مجبورند دامهای خود را فاصله زیادی راه برده تا بمراتع مذکور برسند، امکان توسعه مراتع و همچنین احیاء مراتع با کشت گیاهان سازگار میتواند تا اندازه‌ای این مشگل را برطرف نماید.

کمبودآب و نزولات جوی از طرفی و شور بودن زمین از طرف دیگر در این منطقه عامل محدود کننده زراعت علوفه میباشد و همین عوامل، بعلاوه حرارت زیاد منطقه مخصوصاً "در تابستان امکان رشد گیاهان مرتعی را کاهش میدهد." (متوجه نزولات جوی سالانه منطقه در سه سال گذشته ۱۸۹ میلیمتر بوده است که در لیست ضمیمه منحنی آمبرووترمیک منطقه رسم شده است).

بطور کلی هدف از اجرای طرح، انتخاب سازگارترین و پرمحصول ترین گیاهان مرتعی است که با شرایط آب و هوایی منطقه سازش داشته باشند تا بتوان در مراحل بعدی نسبت به کشت آنها در سطح وسیع اقدام نموده و از این راه موجبات افزایش تعداد دام و بالا بردن فرآورده‌های دامی خصوصاً "در استان مرکزی را فراهم نمود. البته باید در نظر داشت مطالعاتی که در منطقه انجام گرفته است اغلب بر روی زراعت آبی این گیاهان بوده و تاکنون کمتر به مسائله مطالعه سازگاری این

- 5- *Digitaria smittii*
- 6- *Aeluropus littoralis* Parl.
- 7- *Elymus canadensis* Linn.
- 8- *Cynodon dactylon*(L.) Pers
- 9- *Ephedra nevadensis* S.Wats
- 10-*Kochia* Sp.<sup>2</sup>

این گیاهان بدوصورت مورد آزمایش و بررسی قرار گرفته‌اند: یکسری در کیسه‌های پلاستیکی کاشته شده، و بعد بزمیں اصلی منتقل شده‌اند و سری دوم مستقیماً "در زمین اصلی کاشته شده و پس از کشت فقط یک یا دوبار آبیاری شده‌اند و مطالعه بر روی درجه سازگاری این گیاهان با منطقه سه سال متوالی ادامه داشت. نتایج بدست آمده در عرض این سه سال نشان داد که در شرایط خاص آب و هوایی ورامین از بین ده گیاه انتخاب شده، در درجه اول *Atriplex canescens* میتواند با این منطقه بدون آبیاری سازگاری پیدا نموده، و بخوبی رشد نماید و پس از سه سال که از کشت آن میگذرد سازگاری خود را تقریباً "با ثبات رسانیده و همه ساله مقدار زیادی بذر تولید نموده است. از گیاهان دیگر که تا اندازه‌ای نسبت به این منطقه سازگاری داشته‌اند میتوان *Elymus canadensis* و *Agropyron elongatum* را نام برد.

#### مقدمه:

با توجه باهمیت دامداری و دامپروری و از دیاد مصرف روزافزون گوشت و فرآورده‌های دامی در سالهای اخیر و کمبود مراتع کشور جهت تامین احتیاجات دامی، لازم است که

۱- با احتمال زیاد گونه فوق *K. Prostrata*(L.) Schr بوده است.

گیاهان در شرایط دیم توجه شده است.

گیاهان توانسته اند در طول سه سال آزمایش برشد خود ادامه دهند.

ب - کشت در کیسه های پلاستیکی : چون احتمال میرفت که تمام بذور با توجه به سیستم عدم آبیاری مستقیماً در زمین اهلی سبز نشوند و از طرفی همانطوریکه در سایر موسسات تحقیقاتی نیز مرسوم است جهت کمک به جوانه زدن و سرشاری گیاهان مقداری از این بذور در کیسه های پلاستیکی سیاه رنگ، کاشته شدند . این کیسه ها معمولاً "از پلاستیک سیاه رنگ با باد ۲۰×۲۰ سانتیمتر تهییه، و از عوامل مساعد بیشتری برخوردار بودند، یعنی خاک آنها از نوع خاک گلدان بوده و هفته ای یکبار هم آبیاری میشدند و در هر سال برای هرگونه گیاهی حدود ۸۰ گلدان در نظر گرفته میشد . این گیاهان پس از سبز شدن بدو قسمت تقسیم میشدند یکسری پس از سبز شدن جهت بررسی درجه سازگاری بزمین اصلی منتقل میشدند و یکسری با آخر سال جهت مقایسه و بعنوان شاهد در همین گلدانها باقی مانده و هفته ای یکبار آبیاری میشدند . از نظر پیشبرد کار، در سال اول بموازات بذرگاری اقدام به تهییه ۲۵۰ نهال دو ماهه .

#### Atriplex canescens

شد که «لافاصله پس از دریافت، آنها را در زمینی که قبل از بهمنین نظور تهییه شده بود کاشته، و این گیاهان همانطوریکه در نتایج خواهیم دید در طول سه سال آزمایش رشد بسیار خوبی داشته و همه ساله مقدار زیادی بذر تولید نموده اند . کلیه مشاهدات از نظر جوانه زدن، میزان رشد و سایر عوارض هفته ای دوبار یادداشت و سپس نتایج تجزیه و تحلیل میگردید .

#### وسائل و روش بررسی :

برای بررسی درجه سازگاری گیاهان مرتعی در منطقه ورامین، پس از مطالعات لازم و مشاوره با همکاران، و اظهار نظر موئسسه تحقیقات جنگلها و مراعع کشور اقدام به تهییه ده نمونه بذر گیاه از موئسسه تحقیقات جنگلها و مراعع کشور گردید

این گیاهان عبارتند از :

- 1- *Atriplex canescens* Janes
- 2- *Atriplex spinosa* D.Dietr.
- 3- *Atriplex verruciferum* M.B.
- 4- *Agropyron elongatum* (Host) Beauv.
- 5- *Digitaria smittii*
- 6- *Aeluropus littoralis* Parl.
- 7- *Elymus canadensis* Linn.
- 8- *Cynodon dactylon* (L.) Pers
- 9- *Ephedra nevadensis* S.Wats
- 10-*Kochia* Sp.

کشت این گیاهان معمولاً "در اوایل فروردین ماه هر سال شروع، و از نظر سهولت کار آزمایش و همچنین سادگی عمل آماربرداری، کشت این گیاهان بدوصورت کشت در زمین اصلی، و کشت در کیسه های پلاستیکی انجام گردید .

الف - کشت در زمین اصلی در مساحتی در حدود ۱۵۰۰ متر مربع بصورت یک طرح تکرار (سه تکرار) انجام گرفته، و این گیاهان در شروع کشت بعلت گرمی هوا حداقل یک تا دوبار آبیاری شده و بعد از آن هیچگونه آبیاری روی آنها صورت نگرفته و فقط با استفاده از نزولات جوی بعضی از

بود ادامه داشت . با وجودیکه تقریبا " در تمام مدت سه سال هیچگونه آبیاری روی آنها صورت نگرفته و فقط از رطوبت نزولات جوی استفاده میکردند ، این گیاه دارای رشد بسیار خوبی بوده و بدین ترتیب سازگاری خود را با محیط کاملاندازی کشیده است . جدول شماره انشانده نهاده رشد این گیاه در مدت ۷ ماه آمار برداری در سال اول کشت میباشد .

با توجه به جدول شماره ۱ در می‌بایم که متوسط ارتفاع این گیاه از تاریخ ۵۶/۴/۵ لغایت ۵۶/۱۱/۱۹ یعنی در عرض حدود هفت ماه از ۲۵۰ میلیمتر به ۸۷۰ میلیمتر رسیده است و در سالهای بعد هم این گیاه بخوبی برشد خود ادامه داده و همه ساله نیز مقدار زیادی بذر تولید کرده که این بذور جمع آوری شده است .

#### هزینه طرح :

کل هزینه طرح ۹۸۹۰۰ ریال شده که مبلغ ۷۴۰۰ ریال جهت مواد مصرفی و ۹۱۵۰۰ ریال صرف هزینه پرسنلی شده است . ضمنا " در بیشتر موارد از امکانات دانشگاه استفاده گردیده است .

#### نتیجه گیری و بحث :

با توجه به بررسی های انجام شده و مشاهدات و آمار برداری هفتگی میتوان نتایج بدست آمده را بصورت زیرخلاصه نمود :

۱- با توجه به کمی نزولات جوی منطقه و همچنین گرمای بیش از حد آن در تابستان ، بجزءی از گیاه *Agropyron elongatum* و *Atriplex canescens* که تقریبا " در تمام مدت تابستان در برابر بی آبی مقاومت مرکز هماهنگی مطالعات محیط زیست

#### نتایج بدست آمده :

با توجه به دو روش کشت یعنی کشت در زمین اصلی و کشت در کیسه های پلاستیکی معمولا " بذور کاشته شده در کیسه های پلاستیکی پس از دو هفته شروع به جوانسیده زدن - می نمودند در صورتیکه در زمین اصلی گیاهان بعلت سفت بودن زمین حداقل یک هفته دیرتر جوانه میزدند . ازین ده نمونه بذر کاشته شده اولیه جوانه های گیاهی مربوط به *Agropyron elongatum* بوده است .

در کشت گلدانی از بین بذور موجود گیاهان

*Atriplex canescens* *Agropyron elongatum* *Kochia* , *Elymus canadensis* *Cynodon dactylon* (L.) Pers

رشد خوبی داشته که از بین آنها نیز دو گیاه

*Agropyron elongatum* و *Atriplex canescens* دارای رشد بهتری نسبت به بقیه گونه های کشت شده داشته اند .

در زمین اصلی نیز بواسطه عدم آبیاری و کمبود بارندگی منطقه (متوسط بارندگی سالانه سه سال اخیر منطقه حدود ۱۸۹ میلیمتر بوده است ) و همچنین خشکی و گرمای هوا ، اغلب گیاهان پس از سبز شدن نتوانسته برشد خود ادامه دهند *Atriplex canescens* و فقط در درجه اول گیاه *Atriplex canescens* توانست پس از سبز شدن برشد عادی خود ادامه دهد و بعد از آن میتوان گیاه *Agropyron elongatum* را نام برد که تا اندازه ای سبز شده ولی رشد قابل ملاحظه ای نداشته است .

همانطوریکه قبل از ذکر شد بموازات آزمایشات در روی کشت بذور ، مطالعه ای نیز بر روی تعدادی نهال دو ماهه *Atriplex canescens* که در سال اول در زمین کشت شده

نمودار رشد گیاه *Atriplex canescens* در سال اول کشت

جدول شماره (۱)

تاریخ اندازه گیری	میانگین ارتفاع گیاه mm	تاریخ اندازه گیری	میانگین ارتفاع گیاه mm
۵۶/۴/۵	۲۵۰	۵۶/۷/۲۹	۷۹۵
۵۶/۴/۱۰	۲۸۸	۵۶/۸/۶	۷۹۵
۵۶/۴/۱۵	۳۱۵	۵۶/۸/۱۳	۷۹۵
۵۶/۴/۲۰	۳۳۹	۵۶/۸/۲۰	۷۹۵
۵۶/۴/۲۵	۳۷۵	۵۶/۸/۲۷	۷۹۵
۵۶/۵/۱	۴۰۸	۵۶/۹/۴	۷۹۵
۵۶/۵/۶	۴۶۲	۵۶/۹/۱۱	۷۹۵
۵۶/۵/۱۱	۵۱۴	۵۶/۹/۱۸	۸۰۳
۵۶/۵/۱۶	۵۵۸	۵۶/۹/۲۵	۸۱۷
۵۶/۵/۲۱	۶۱۵	۵۶/۱۰/۲	۸۳۲
۵۶/۵/۲۶	۶۶۴	۵۶/۱۰/۹	۸۴۹
۵۶/۵/۳۱	۶۸۷	۵۶/۱۰/۱۶	۸۵۱
۵۶/۶/۵	۷۴۸	۵۶/۱۰/۲۵	۸۶۰
۵۶/۷/۷	۷۸۳	۵۶/۱۱/۲	۸۶۵
۵۶/۷/۱۵	۷۹۳	۵۶/۱۱/۹	۸۷۰
۵۶/۷/۲۲	۷۹۵	۵۶/۱۱/۱۹	۸۷۲

کردند بقیه گیاهان کشت شده رشد چندانی نداشته بعلت کم آبی یا ازبین رفته اند و یا خیلی ضعیف باقی مانده اند.


۲- رشد *Atriplex canescens* در تمام مدت حتی تابستان هم خیلی خوب بوده و این نشانه سازگاری کامل این گیاه با آب و هوای منطقه ورامین میباشد که پساز گذشت سه سال که از کشت آن میگذرد بدون آبیاری برشد خود ادامه میدهد.



شکل (۱) - چگونگی کشت گیاهان مختلف در گلدانهای پلاستیکی (شاهد)

" منحنی آمپرورمیک منطقه مورد مطالعه با استفاده از آمار

هواشناسی موجود



متوجه نزولات جوی سالانه

متوجه حرارت مگزینیم گرمترین ماه

متوجه حرارت می‌نییم سردترین ماه

ضریب گزروترمیک

$$P = 189 \text{ mm}$$

$$M = 38.5 \text{ °C}$$

$$m = -3$$

$$x = 211$$

۱- ثابتی، ح: بررسی اقالیم حیاتی ایران.

محیط‌شناسی

### مشخصات بافت خاک

عمق $25 - 50^{\text{Cm}}$	عمق $0 - 25^{\text{Cm}}$	
۳۵	۲۶	(Clay) درصد رس
۴۱	۵۱	(Silt) درصد لای
۲۴	۲۳	(Sand) درصد شن

در عمق  $25^{\text{Cm}}$  بافت خاک لای - لوم (Silt - Loam)

نتیجه بافت خاک

در عمق  $25 - 50^{\text{Cm}}$  بافت خاک رس - لوم (Clay - Loam)

درصد اشباع خاک (S.P) = ۴۵

pH خاک تا عمق  $50^{\text{Cm}} = ۷/۸$


پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

پرستال جامع علوم انسانی




شکل (۲) کشت گیاه *Agropyron elongatum* در گلدانهای پلاستیکی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  
برگال جامع علوم انسانی



شکل (۳)- رشد گیاه *Agropyron elongatum* در گلدانهای پلاستیک

( گیاه سه ماهه )  
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  
برگال جامع علوم انسانی




شکل (۴) - رشد گیاه سه ماهه *Agropyron elongatum* در زمین.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  
برگال جامع علوم انسانی



شکل (۵) - وضعیت و رشد گیاه *Atriplex canescens* در سال اول کشت.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  
برگال جامع علوم انسانی




شکل (۶) - وضعیت و رشد گیاه *Atriplex canescens* در سال سوم کشت.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  
برگال جامع علوم انسانی


### "منابع مورد استفاده"

- ۱-بابا خانلو، پ. (۱۳۴۶) - بهترین گیاهان علوفه‌ای سازگار با آب و هوا ایران، چاپ دفتر فنی مرتع.
- ۲-بردبار، م. (۱۳۵۱) - ارزیابی منابع و قابلیت اراضی استان مرکز، منطقه تهران - گرمسار. نشریه شماره ۳۳۱ مؤسسه‌خاکشناسی و حاصلخیزی خاک.
- ۳-بنوان، مصدقی، ملک، (۱۳۵۲) - فنلوزی نباتات مرتعی داخلی و بیگانه - نشریه شماره ۱۳ - انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مرتع کشور - ۴۸ صفحه.
- ۴-پابو. ه. ترجمه شیدائی (۱۳۴۸) - توسعه و اصلاح مرتع ایران از طریق مطالعات بتانیکی و اکولوزیکی - انتشارات وزارت کشاورزی.
- ۵-پیمانی، حریقی. (۱۳۵۴) - افزایش تولید مرتع فرسوده از طریق ایجاد بانک و کاشت نباتات مرتعی - نشریه شماره ۱۷. انتشارات جنگل‌ها و مرتع
- ۶-شیدائی (۱۳۵۰) - بررسی مرتع و گیاهان علوفه‌ای ایران - انتشارات دفتر فنی مرتع.
- ۷-ثابتی، ح. (۱۳۴۸) - بررسی اقالیم حیاتی ایران - چاپ دانشگاه تهران - شماره ۱۲۳۱ - ۲۲۶ صفحه.
- ۸-نیکنام، نعمتی. (۱۳۵۲) - کشت گیاهان مهم مرتعی و علوفه‌ای - نشریه شماره ۱۵ دفتر فنی مرتع - ۵۲ صفحه.




مرکز هماهنگی مطالعات محیط‌زیست

L'ensemble des resultats obtenus après trois ans d'étude montrent que parmi toutes les plantes cultivées en condition dry farming, l'Atriplex canescens s'adapte bien avec la situation climatique de la région; Agropyron elongatum résiste moins que Atriplex elongatum; mais, les autres plantes cultivées n'ont pas pu avoir une bonne croissance due à la température très élevée d'été et manque d'eau.



ومن اثاني وطالعات فرنجى  
جامعة علوم انانى



"Etude de la possibilite de la distribution  
de vegetaux naturels dans la region Varamin"

Par:

Z.KAFFACHE

Maitre assistant a la Faculte de developpement rural.

Resume:

En prenant conscience des limites de l'eau, dans la regin de Varamin,nous avons tente d'etudier la possibilite d'- adaptation et de connaitre la resistance de quelques plantes fourrageres dans cette region.

Le climaty est semi-aride a aride avec une precipitation annuelle de 189 mm et la temperature tres elevee en ete. La presence des sols salins est un facteur limitant de la croissance des vegetaux dans cette region.

Ce travail a ete entrepris en vue d'- une contribution a l'etude de l'adapta-

tion et de la tolerance de dix especes contre la condition climatique de cette region.Les plantes choisies pour cette experience sont:

- 1- Atriplex canescens James
- 2- Atriplex spinosa D.Dietr.
- 3- Atriplex verruciferum M.B.
- 4- Agropyron elongatum (Host) P.Beauv.
- 5- Digitaria smittii
- 6- Aeluropus littoralis Parl
- 7- Elymus canadensis Linn
- 8- Cynodon dactylon(L.) Pers
- 9- Ephedra nevadensis S.Wats
- 10-Kochia Sp(CB K. Prostrata.)