

روند تغییرات و توزیع گازهای نادر در جو*
ترجمه و تلخیص از: دکتر منصور غیاث الدین

در سالهای اخیر این نگرانی در بین علمای محیط‌شناسی بوجود آمده است که تراکم گازهای کمیاب در جوکه عمدتاً ساخته دست بشراند، ممکن است از طریق شرکت در اثر گلخانه‌ای باعث افزایش گرمای کره زمین شوند که این افزایش اثرات پردامنهای بر تغییرات جوکره زمین داشته باشد. بعضی از این گازهای کمیاب در فضا میتوانند باعث خرابی لایه اوزون استراتوسفر شوند که این کاهش اوزون به افزایش اشعه ماده بنش که اثرات بیولژیکی وسیعی دارد بیانجامد. با آنکه اثر دی اکسید کربن در افزایش دمای کره زمین شناخته شده است و این افزایش طی قرون آینده محسوس خواهد شد، از دیاد مدام مجموعه موادی مانند گازهای متان، منوفلوروروتیکلرومتان (F-11)، دی کلوفلورورومتان (F-12) و اکسید نیتروس هم در بالابردن دمای متوسط زمین به همان اندازه دی اکسید کربن میتوانند موثر باشند. بعلاوه گازهای F-11، F-12 و اکسید نیتروس در از بین بردن اوزون استراتوسفر نیز موثرند. سایر گازهای کمیاب مانند تری کلرو اتان و کربن تتراکلراید ممکن است کمتر از بقیه در دو پدیده مذکور شرکت نمایند. هرچند اثر هریک از این گازها ناچیزاست ولی افزایش روافズون آنها وجود هر شش گاز تواما میتواند باعث نبیرات بالقوه‌ای در محیط کره‌خاکی بشود با توجه به آنچه گفته شد انتظار میروند که گاز، ای کمیاب نقش بارزی را در تغییر محیط کره زمین داشته باشد زیرا غلظت آنها به حد نسبتاً "بالایی رسیده است و پایداری آنها هم زیاد است. گازهای دی اکسید کربن، کربن تتراکلراید و اکسید نیتروس با تولید مواد غذایی و انرژی رابطه نزدیک دارند و سایر

گازها در فرایندهای صنایع جدید مصرف میشوند . بنابراین روند افزایش این گازها با ازدیاد جمعیت و نیازهای انسان ادامه خواهد یافت .

شش گازیکه در اینجا ذکر شدند مهمترین اثر را بر محیط کره زمین خواهند داشت و بهمین علت در دهه ۱۹۷۵ تا ۱۹۸۵ در دو نقطه اندازه گیری آنها انجام شده است . یکی از اندازه گیریها در قطب جنوب و دیگری در عرض ۴۵ درجه شمال غربی اقیانوس آرام صورت گرفته است . ضمناً باید اضافه کرد که این یکی از طولانی ترین دوره‌اندازه گیری های گازهای نادر را در برمی‌گیرد .

طی دهه مذکور غلظت کلیه گازهای مورد بحث هم در قطب جنوب و هم در شمال غربی اقیانوس آرام افزایش داشته است . مثلاً "غلظت متان از ۱۴۰۰ قسمت در بیلیون حجمی به ۱۵۷۵ قسمت و غلظت F-11 از ۸۶ قسمت در تریلیون حجمی به ۲۵۵ قسمت رسیده است و بقیه گازها نیز بهمین ترتیب افزایش داشته‌اند . ضمناً "ارقام نشان میدهند که روند افزایش در نیمه اول دهه سریعتر از نیمه دوم بوده است . کاهش افزایش غلظت گازها در نیمه دوم دهه بعلت جلوگیری از مصارف غیر ضروری گازهای F-11 و F-12 در اوایل دهه میباشد . بهمین ترتیب تولید و مصرف کربن تراکلراید و تری کلوراتان هم مانند سالهای اولیه افزایش نداشته است . بنابراین تصور میشود که روند افزایش این مواد در هوا از این هم کندر شود . ضمناً "جريان هوای گرمی که در سالهای ۱۹۸۲ و ۱۹۸۳ از سواحل پرویه طرف جنوب حرکت میکرد مقدار زیادی گازمتان را کاهش داد . بهرحال با آنکه پیش بینی آینده این گازها احتیاج به اطلاعات وسیعتری در مورد منابع و روش‌های کنترل آنها دارد ، این بررسی میتواند هشداری به آلوده کنندگان محیط زیست و مقامات حفاظت محیط زیست باشد .