

مطالعه تغییرات پوشش گیاهی در امتداد شیب رطوبتی منطقه گدوك فیروزکوه^(۱)

* دکتر بهمن اسلامی
** دکتر احمد قهرمان
*** دکتر مصطفی اسدی
**** دکتر عباس شاهسواری
***** دکتر فریده عطار
***** مهندس بهنام حمزه

چکیده

منطقه گدوك در حدفاصل دو شهر ورسک و فیروزکوه در البرز مرکزی قراردارد. مساحت این منطقه ۳۱۱۳ هکتار و دارای دو زیرحوزه آبریز در جهات شمال شرقی و جنوب غربی است. پوشش گیاهی این منطقه شامل ۴۰۶ گونه و تقسیمات تحت گونه‌ای از ۶۲ خانواده و ۲۶۲ جنس است که در سه ریختار اصلی بوته‌زار^(۲)، ریختار درختچه‌زار آمیخته با درختان پراکنده^(۳) و ریختار درختان-درختچه‌های پهنه برگ^(۴) و درخت زار^(۵) انتشار دارند. مطالعه شکل زیستی گیاهان در ریختارها نشان داد که در ریختار بوته‌زار همی کریپتوفت‌ها با ۵۵/۵۵ درصد و کامفیت‌ها و تروفیت‌ها هر یک با ۱۶/۱۶ و ۱۶/۱۶ درصد، فراوانی داشته‌اند. در ریختار درختچه‌زار آمیخته با درختان پراکنده، همی کریپتوفت‌ها و تروفیت‌ها، به ترتیب دارای ۶۲ و ۱۳/۱۸ درصد فراوانی بودند و در ریختار درختان-درختچه‌های پهنه برگ و درخت زار، همی کریپتوفت‌ها و فانروفیت‌ها، به ترتیب با ۶۱/۱ و ۱۵/۵۵ درصد، اشکال زیستی را تشکیل می‌دهند. از نظر جغرافیای گیاهی، ریختار بوته‌زار با ۶۸/۸ درصد عناصر ایرانی - تورانی و ریختار درختچه‌زار آمیخته با درختان پراکنده با ۵۵ درصد عناصر ایرانی - تورانی و ریختار درختان - درختچه‌های پهنه برگ و درخت زار با ۴۸ درصد عناصر اروپایی - سیبری بیشترین حضور را دارند. در بین عناصر گیاهی شناسایی شده، ۳۷ گونه و زیرگونه از بومزاده‌های ایران است که از این تعداد ۲۹ گونه بومزاد منطقه البرز و ۲ گونه نیز بومزاد محلی در این منطقه‌اند.

کلید واژه

شكل زیستی، جغرافیای گیاهی، ریختار گیاهی، اکولوژی، بومزاد، ایران، همی کریپتوفت‌ها، تروفیت‌ها، فانروفیت‌ها.

تاریخ پذیرش: ۱۳۸۲/۱۱/۵


تاریخ دریافت: ۱۳۸۲/۱/۲۰

* دانش آموخته دوره دکتری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.
** استاد گروه زیست‌شناسی دانشگاه تهران.
*** استاد مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور.
**** استادیار گروه زیست‌شناسی دانشگاه همدان.
***** استادیار گروه زیست‌شناسی دانشگاه تهران.
***** عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور.

چنین مناطقی می‌تواند، اطلاعات ارزنده‌ای را در مدیریت، حفظ زیستگاه و تنوع زیستی به دست دهد. به همین منظور مطالعه منطقه گدوك فیروزکوه که جزء نواحی نیمه کوهستانی^(۱۲) (نیمه آپی)* و کوهستانی^(۱۳) (آپی)* با دامنه ارتفاعی ۱۸۰۰ تا ۲۹۳۰ در البرز مرکزی است انتخاب شد. موضوع اصلی این پژوهش را ویژگی‌های رویشی این منطقه که متأثر از اقلیم مرتبط خزری باریختار درختان- درختچه‌های پهنه برگ و درختزار و درختچه زار آمیخته با درختان پراکنده، در دامنه‌های شمال شرقی و ریختار بوته زار، متأثر از اقلیم نیمه خشک و سرد در دامنه‌های جنوب غربی است. از نظر ویژگی‌های بوم شناختی، تنوع گونه‌ای، گستره جغرافیایی گیاهی و اشکال زیستی مورد بررسی قرار گیرد.

مشخصات منطقه مورد مطالعه

منطقه پژوهش در ۱۷ کیلومتری شمال شرقی شهرستان فیروزکوه و با مختصات جغرافیایی "۴۰° ۵۴' ۵۲° ۵۰ تا ۵۰° ۵۹' ۵۰° طول شرقی و "۵۰° ۴۸' ۳۵° تا ۵۰° ۵۲' ۳۵° عرض شمالی در محدوده دو دامنه جنوب غربی و شمال شرقی رشته کوههای البرز مرکزی واقع است. مساحت این منطقه حدود ۳۱۱۳ هکتار و متأثر از دو زیرحوزه آبریز کاملاً مشخص است. زیرحوزه آبریز در دامنه‌های جنوب غربی (A) و زیرحوزه دامنه‌های شمالی البرز (B) واقع است. حداقل ارتفاع منطقه ۱۸۰۰ متر و حداقل ارتفاع حدود ۲۹۳۰ متر (شکل شماره ۱) و متوسط شیب آن نیز بیش از ۳۵ درصد است.



شکل شماره (۱): نقشه توپوگرافی منطقه مورد مطالعه

با دو زیرحوزه A و B

بررسی پیرامون وضعیت خاک‌شناسی منطقه مورد مطالعه با در نظر گرفتن عوامل مهم، نشانگر تغییر بافت از بافت سنگین و رسی در ریختار بوته زار و رسی- لای در ریختار درختان- درختچه‌های پهنه برگ

سرآغاز

پژوهش‌های بوم شناختی به طور عمده روی نواحی نسبتاً همگن^(۶)، یا نواحی با سیمای پیچیده^(۷) متمرکز است. اما نواحی ای با ویژگی‌های متغیر و ناهمگن^(۸) که اجزای زیستی و غیرزیستی، بویژه در مرزها جایه جا می‌شوند و این جایه جایی تأثیر کنترلی مهمی در چنین نظام‌های مکانی پویا دارد، در گذشته کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است. با وجود این امروزه تعداد محققانی که روی زون گذار^(۹) و یا اکوتون^(۱۰) مطالعه می‌کنند، به نسبت کم نیست (Person and Moldenke, 1975; Risser, 1985; Holand, 1988; Naiman et al., 1988; Reif and Hetzel, 1994; Cabido et al., Clements 1993). مفهوم نواحی گذار یا اکوتون که اولین بار توسط در سال ۱۹۰۵ مطرح شد به معنای منطقه‌ای بین دو اجتماع^(۱۱) است که در آن فرایند تبادلات یا رقابت بین ریختارهای مجاور مشاهده می‌شود. Odum در سال ۱۹۷۱ اکوتون را ناحیه حدواسط درخت زار و علفزار و یا دو اکوسیستم* معرفی می‌کند که تعداد زیادی از موجودات هر دو ریختار مزبور و نیز موجوداتی که صرفاً به همان ناحیه اکوتونی منحصر می‌شوند، در آن می‌زیند. وی محل برخورد جوامع را با عنوان تأثیر حاشیه‌ای^(۱۲) مطرح کرد.

Holand در سال ۱۹۸۸ اکوتون را پناهگاهی غنی از اجتماعات گیاهی و جانوری می‌داند که نقش تنظیم آب و مواد را در سرتاسر آن چشم‌انداز به عهده دارد و سرانجام یازده نفر از دانشمندان جامعه شناس گیاهی، ناحیه اکوتونی را منطقه گذار بین نظام‌های بوم شناختی مجاور هم با ویژگی‌های منحصر که مقیاس زمانی و مکانی دارند و می‌توانند بر هم تأثیر داشته باشند، معرفی کردند. این تعریف کاربردی نسبت به تعریف Odum کاربری بیشتر دارد و تأکید، دقیق و توجه آنها به مقیاس زمان و مکان و توان کنش‌های نظام‌های بوم شناختی مجاور بر هم، زمینه‌ای برای پیشرفت آینده بحث‌های نظری تفہیم اکوتون بوده است.

از ویژگی‌های آشکار نواحی اکوتون، تغییرات پوشش گیاهی، نظری تغییرات فرم رویشی^(۱۳) (Walter, 1973; Shmida and Burgess, 1988) و تنوع گونه‌ای^(۱۴) (Whittaker, 1977) است که در مناطق گذرها مختلف مورد مطالعه قرار گرفته اند.

در ایران مطالعه و بررسی روی مناطق مختلف با سیماهای متغیر و ناهمگن در زمینه‌های زیستی و غیرزیستی کم بوده و یا در واقع مطالعه‌ای انجام نگرفته است. مطالعه ویژگی‌های بوم شناختی*

* سردبیر.

زیرگونه بوده و در هر باریوم مرکزی دانشگاه تهران، دانشکده علوم (TUH) محفوظ است.


تشریح واحدهای گیاهی بر اساس ریختارهای اصلی انجام گرفت و بررسی شکل زیستی بر مبنای تعریف Raunkiaer (1934) در کتاب Clements (1905) و وضعیت جغرافیائی منطقه بر مبنای کار Hedge and Wendelbo (1973) و بومزادی بر اساس کار Zohary (1977) و Rechinger (1978) صورت گرفت.

یافته ها

تعیین طیف شکل زیستی گونه های گیاهی منطقه گدوك که از ویژگی های متغیر و ناهمگنی برخوردار است، به طور یکجا اطلاعات روشنی مشابه مناطقی که از ویژگی های همگنی، نظیر نواحی بیابانی یا معتدل ... برخوردارند، به دست نداد. بنابراین طیف شکل زیستی گونه های موجود در هر یک از ریختارهای بوته زار، درختچه زار آمیخته با درختچه های پراکنده و درختان - درختچه های پهن برگ و درخت زار به دلیل همگن تر بودن شرایط محیطی به طور جداگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

طیف شکل زیستی ریختار بوته زار

این ریختار با تنوع گونه ای زیاد از اشکال زیستی متغیری نیز برخوردار است. طبق بررسی های صورت گرفته از کل ۱۹۸ گونه ای که در این ریختار انتشار دارند، بیشترین شکل زیستی را همی کریپتووفیت ها با ۱۱۰ گونه (۵۵/۵۵ درصد) دارا هستند. سایر اشکال زیستی را کامفیت ها با ۳۲ گونه (۱۶/۱۶ درصد)، تروفیت ها با ۳۲ گونه (۱۶/۱۶ درصد)، ژئوفیت ها با ۱۹ گونه (۹/۵۹ درصد) و کمترین شکل زیستی را فانزووفیت ها با ۵ گونه (۲/۵۲ درصد) به خود اختصاص داده اند (شکل شماره ۲).



شکل شماره (۲): فراوانی و درصد اشکال زیستی گیاهان ریختار بوته زار

و درخت زار است. میزان آهک در منطقه به دلیل وجود تشکیلات آهکی قابل توجه بوده و بین حداقل ۵ تا ۳۴/۵ درصد متغیر است.

از آنجا که ایستگاه کلیماتولوژی در منطقه وجود ندارد، به منظور شناخت آب و هوا و شرایط اقلیمی منطقه، مبنای تجزیه و تحلیل های اقلیمی معادلات رگرسیون بارندگی با ارتفاع و دما با ارتفاع قرار گرفت. با توجه به وضعیت خاص منطقه مورد مطالعه که قسمتی از آن در دامنه های جنوبی البرز (زیرحوزه A) و بخشی در دامنه شمالی البرز (زیرحوزه B) قرار دارد، از اطلاعات آماری ایستگاه های واقع در دو دامنه شمالی و جنوبی البرز و معادلات رگرسیون بین شاخص باران و ارتفاع و دما و ارتفاع (خلیلی، ۱۳۷۰) استفاده گردید. مقدار متوسط بارندگی در زیر حوزه A در حداقل ارتفاع (۲۱۲۸ متر)، برابر ۳۲۷/۷ میلیمتر و در حداکثر ارتفاع (۲۸۹۰ متر)، برابر ۴۸۸/۹ میلیمتر و همچنین مقدار متوسط درجه حرارت در حداقل ارتفاع برابر ۷/۵ درجه سانتیگراد و در حداکثر ارتفاع، ۱/۲ درجه سانتیگراد است. در زیر حوزه B میزان متوسط بارندگی در حداقل ارتفاع (۱۷۶۰ متر)، برابر ۵۷۰/۷ میلیمتر و متوسط میزان بارندگی در حداکثر ارتفاع (۲۹۰۰ متر)، برابر ۷۸۶/۲ میلیمتر و متوسط درجه حرارت در حداقل ارتفاع زیر حوزه B، برابر ۸/۹ درجه سانتیگراد و متوسط درجه حرارت در حداکثر ارتفاع زیر حوزه B، برابر ۲/۹ درجه سانتیگراد است. برحسب این اطلاعات و بر مبنای تقسیم بندی دو مارتن (خلیلی، ۱۳۷۲) اقلیم منطقه از نیمه خشک (در زیر حوزه A) تا مرطوب (در زیر حوزه B) متغیر است.

روش تحقیق


پژوهش در سه مرحله زیر صورت گرفت: اول مشاهدات نقشه های توپوگرافی و عکس های هوایی مربوط به منطقه و مشخص کردن محدوده موردمطالعه، دوم مرحله عملیات صحراوی که شامل جمع آوری گیاهان و ثبت مشخصات فیزیونومیک و فلوریستیک مرتبط به آنها بود؛ عمل جمع آوری به روش پیمایش صحراوی و به مدت سه سال ۱۳۷۸-۱۳۸۱ به طول انجامید. سوم مرحله شناسایی گیاهان با استفاده از کلیدهای راهنمای فلور ایرانیکا، (Rechinger, 1963-1998)، اروپا (Davis, 1965-1985)، ترکیه (Tutin and Heywood, 1980)، شوروی (Komarov, 1934-1960)، فلور ایران (اسدی، ۱۳۶۳-۱۳۸۰)، فلور رنگی ایران (قهمان، ۱۳۵۷-۱۳۸۱) و گون های ایران (معصومی ۱۳۶۴-۱۳۷۸) بود. همچنین در شناسایی برخی از نمونه ها از هر باریوم دانشگاه تهران و موسسه تحقیقات جنگلهای مراعع استفاده گردید. نمونه های شناسایی شده در مجموع ۴۰۶ گونه و

فانروفیت‌ها (ماکروفیت‌ها و نانوفانروفیت‌ها)

- Fagus orientalis* Lipky
Quercus macranthera Fisch. ex Mey.
Q. castaneifolia C. A. Mey.
Q. petraea L. ex Ehrh. subsp. *iberica* (Stev.) Krassiln.
Carpinus betulus L.
Mespilus germanica L.
Prunus spinosa L.
Juniperus sabina L.
Spiraea hypericifolia L.
Berberis vulgaris L.
Joniprus excelsa M. A.
Crataegus pentagyna Waldst & Kit. ex Willd.
Lonicera iberica M.B.

طیف شکل زیستی ریختار درختچه زار آمیخته با درختان پراکنده

در این ریختار، نتایج بررسی شکل‌های زیستی نشان داد که از کل ۱۸۲ گونه گیاهی که در این ریختار انتشار دارند، بیشترین شکل زیستی را همی کریپتووفیت‌ها با ۱۱۳ گونه (۶۲ درصد)، تروفیت‌ها با ۲۴ گونه (۱۳/۱۸ درصد)، ژئوفیت‌ها با ۱۶ گونه (۸/۷۹ درصد)، فانروفیت‌ها با ۱۵ گونه (۸/۲۴ درصد) و کامفیت‌ها با ۱۴ گونه (۷/۷۵ درصد) به خود اختصاص داده‌اند (شکل شماره ۳).



کامفیت‌ها

- Astragalus aureus* Willd.
Astragalus denudatus Stev.
Acantholimon brachystachyum Boiss.
Acanthophyllum glandulosum Bunge ex Boiss.
Dianthus orientalis Adams subsp. *stenoclayx* (Boiss.) Rech.f.
Onobrychis cornuta (L.) subsp. *cornuta*
Noaea mucronata (Forssk.) Asch. subsp. *mucronata*
Thymus kotschyanus (Boiss.) Hohen
Ziziphora clinopodioides Lam. subsp. *elbursensis* (Rech. f.) Rech. f.

شکل شماره (۳): فراوانی و درصد اشکال زیستی گیاهان ریختار درختچه زار آمیخته با درختان پراکنده


طیف شکل زیستی ریختار درختان - درختچه‌های پهنه برگ و درخت زار

در این ریختار، نتایج بررسی شکل‌های زیستی نشان داد که از کل ۱۵۳ گونه گیاهی که در این ریختار انتشار دارد، بیشترین شکل زیستی را همی کریپتووفیت‌ها با ۹۲ گونه (۶۰/۱)، فانروفیت‌ها که سیمای اصلی این ریختار را تشکیل می‌دهد با ۲۵ گونه (۱۵/۳۴ درصد)، ژئوفیت‌ها با ۱۵ گونه (۹/۸ درصد) و تروفیت‌ها با ۱۳ گونه (۸/۵ درصد) به خود اختصاص داده‌اند. کمترین درصد مربوط به

همی کریپتووفیت‌ها

- Astragalus vereskensis* Maassomi & Podl.
Cousinia chamaepeuce Boiss.
C. pterocaulis Ledeb.
Cephalaria sublanata (Bomm.) Szabo & Magyar
Inula montbretiana DC.
Isatis gaubae Bornm.
Cervaria cervarifolia (C. A. Mey.) M. Pimen.
Lathyrus rotundifolius Willd.

کامفیت‌ها با ۸ گونه (۵/۲۲ درصد) است (شکل شماره ۴).




شکل شماره (۴): فراوانی و درصد اشکال زیستی گیاهان ریختار درختان - درختچه‌های پهنه برگ و درخت زار

همچنین به طور خلاصه می‌توان گیاهان غالب هر شکل زیستی را در منطقه به شرح زیر بیان کرد:

موقعیت جغرافیایی گیاهی منطقه

با توجه به اینکه منطقه مورد مطالعه از دو زیرحوزه آبریز واقع در دو دامنه اصلی شمالی و جنوبی سلسله جبال البرز مرکزی واقع شده و از شرایط بوم شناختی ناپایدار و متغیری برخوردار است، پوشش گیاهی



شکل شماره (۵): فراوانی و درصد گونه های گیاهی موجود در ریختار بوته زار

درصد (۳ گونه) مربوط به ناحیه ایرانی - تورانی، اروپایی - سیبری و مدیترانه‌ای است. شاخص ترین گیاهانی که در این ریختار انتشار دارند، عبارتند از:

Juniperus sabina L.

Berberis vulgaris L.

Crataegus pentagyna Waldst. & Kit. ex Willd.

Cotoneaster nummularioides Pojark.


Lonicera iberica L.

Astragalus aureus Willd.

Astragalus demudatus Stev.

Koeleria cristata (L.) Pers.

Festuca ovina L.



شکل شماره (۶): فراوانی و درصد گونه های گیاهی موجود در ریختار درختچه زار آمیخته با درختان پراکنده

- ریختار درختان - درختچه های پهن برگ و درخت زار

از مجموع ۴۰۶ گونه موجود در منطقه، ۷۶ گونه (۱۸/۷) درصد کل گیاهان شناخته شده) صرفاً در ریختار درختچه های پهن برگ یا درخت زار انتشار دارند. با توجه به اینکه این بخش از منطقه مورد مطالعه از نظر جغرافیای گیاهی در ناحیه ایرانی - تورانی و اروسیبری در این ریختار مؤید وضعیت گذار در این بخش از منطقه است. همان طور که در شکل شماره ۶ ملاحظه می شود، ۲۲ گونه (۲۲/۷) متعلق به ناحیه ایران و تورانی و ۱۵/۹ درصد (۷ گونه) متعلق به ناحیه اروپایی - سیبری اند. همچنین ۱۵/۰ درصد (۷ گونه) متعلق به ناحیه اروپایی - سیبری و ایرانی - تورانی و ۶/۹

نیز ویژگی های ناهمگنی را در هر دو حوزه نشان می دهد. به نحوی که شناخت و تعیین منطقه رویشی نظیر آنچه در نواحی همگن صورت می پذیرد، نمی تواند روشنگر وضعیت جغرافیایی گیاهی کل منطقه باشد. به این ترتیب برای تجزیه و تحلیل خصوصیات جغرافیایی منطقه از عناصر گیاهی که منحصراً در هر یک از ریختارهای بوته زارها، درختچه زار آمیخته با درختان پراکنده و درختان - درختچه های پهن برگ و درخت زار منطقه انتشار داشته اند، استفاده گردید.

- ریختار بوته زار

از مجموع ۴۰۶ گونه موجود در منطقه، ۱۰۶ گونه (۲۶ درصد کل گونه ها) فقط در این ریختار انتشار دارند. با توجه به اینکه این بخش از منطقه مورد مطالعه از نظر جغرافیایی گیاهی در ناحیه ایرانی - تورانی واقع شده است، بنابراین پیش بینی می شد بیشتر گیاهان، عنصر این ناحیه باشند. نتایج به دست آمده مؤید این موضوع بود و همان طور که در شکل شماره (۵) ملاحظه می شود، ۶۸/۸ درصد (۷۳ گونه) گونه ها، عنصر این ناحیه است و عناصر اروپایی - سیبری تنها ۲/۸۳ درصد (۳ گونه) را تشکیل داده است. شاخص ترین عناصر این ناحیه که در این ریختار انتشار دارند، عبارتند از:

Stipa holosericea Trin & Rup.

Bromus tomentellus Boiss.

Cousinia chamaepeuce Boiss.

Acanthophyllum glandulosum Bunge & Boiss.

Astragalus (Campylanthus) tricholobus DC.

Psathyrostachys fragilis (Boiss.) Neveski

Noaea mucronata (Forssk.) Asch. subsp. *stenocalyx*

Astragalus (Hymenostegis) rubriflorus Bunge

Zizphora clinopodioides Lam. subsp. *elbursensis* (Rech. f.) Rech. f.

Cirsium turkestanicum (Regel) Petrak var. *pseudolapaceum*

- ریختار درختچه زار آمیخته با درختان پراکنده

از مجموع ۴۰۶ گونه موجود در منطقه، ۴۰ گونه (۹/۸۵) درصد کل گونه ها) در این ریختار انتشار دارند. در هم آمیختگی عناصر ایرانی - تورانی و اروسیبری در این ریختار مؤید وضعیت گذار در این بخش از منطقه است. همان طور که در شکل شماره ۶ ملاحظه می شود، ۵۵ درصد (۲۲ گونه) متعلق به ناحیه ایران و تورانی و ۱۵/۹ درصد (۷ گونه) متعلق به ناحیه اروپایی - سیبری اند. همچنین ۱۵/۰ درصد (۷ گونه) متعلق به ناحیه اروپایی - سیبری و ایرانی - تورانی و ۶/۹

پراکندگی کم و بیش گستردگر، دارای زیرگونه‌ها یا واریته‌هایی اند که در البرز غربی، مرکزی و شرقی، انتشار وسیع‌تری را نشان می‌دهند. از این تعداد، ۲۲ عنصر متعلق به ناحیه ایران – تورانی و ۱۳ عنصر متعلق به ناحیه اروپایی – سیبری است که به بیان صحیح‌تر متعلق به حوزه اگزین – هیرکانی (Klein, 1991) می‌باشد.

گونه‌های بومزاد منطقه البرز (۲۹ گونه یا ۷/۱ درصد):

Astragalus (Caprini) vereskensis Maassomi & Podl.

Astragalus (Glycyphllum) glycyphllum L.

Rubus hyrcanus Juz.

Stachys inflata Benth.

Allium bodeanum Regel

Cirsium gadukense Petrak

Onobrychis gaubae Bornm.

O. mazanderanica (L.) Desv.

Nepeta crassifolia Boiss.

Arabis rimarum Rech. f.

Delphinium elbursense Rech. f. var. *elbursense*

Asyneuma mazanderanicum Rech. f.

Campanula lourica Boiss.

Ballota platyloma Boiss.

Saponaria bodeana Bornm.

Iranecio elbursensis (Boiss.) B. Nord.

Agropyron long - aristatum (Boiss.) Boiss.

Alyssopsis molis (Jacq.) O. E. Schultz

Orchis simian – steveni = golestanica Renz.

Ajuga chamaecistus Ging. subsp. *tomentella* (Boiss.)

Rech. f.

Rhamnus cathartica L. var. *caucasica*

Veronica gaubae Bornm.

Sempervivum iranicum Bornm. & Gauba

Senecio paulsenii O. Hoffm. subsp. *chorasanicus*

Corydalis verticilaris DC. subsp. *verticilaris*

Leontodon hispidus L. var. *mazanderanicus* Rech. f.

Silene latifolia Poir. subsp. *alba* (Miller) Greuter. & Burdet

Chalcanthus renifolius (Boiss. & Hohen.) Boiss.

گونه‌های زیر علاوه بر منطقه البرز در سایر مناطق ایران نیز انتشار دارند (بومزاد ایران):

Alyssum inflatum Nyarady

Scorzonera mucida Rech. f.

پیش‌بینی می‌شد گونه‌هایی با عرصه انتشار محدود به این ناحیه که مرکز انتشار آنها محسوب می‌شود، بیشترین فراوانی را نشان دهد. نتایج به دست آمده مؤید این موضوع بوده و همان‌طور که در شکل شماره (۷) ملاحظه می‌شود، ۴۸ درصد (۳۶ گونه) گونه‌ها متعلق به ناحیه اروپایی – سیبری و تنها ۶/۶ درصد (۵ گونه) متعلق به ناحیه ایرانی – تورانی در این ریختار دیده می‌شود. ۱۴/۶ درصد (۱۱ گونه) گونه‌ها نیز مربوط به دو ناحیه اروپایی – سیبری و ایرانی – تورانی اند.

شاخص‌ترین گیاهانی که در این ریختار انتشار دارند، عبارتند از:

Fagus orientalis Lipsky

Lonicera caucasica L.

Quercus petraea L. ex Liebl.

Q. castaneifolia C. A. Mey.

Evonymus velutina (C. A. Mey.) Fisch

Mespilus germanica L.

Acer cappadocicum Gled.


A. monspessulanum L. subsp. *ibericum* (M. B.) Yaltirik.

Carpinus betulus L.

Laser trilobum (L.) Borkh.

C. orientalis Miller

Crataegus pentagyna Waldst. & Kit. ex Willd.



شکل شماره (۷): فراوانی و درصد گونه‌های گیاهی موجود در ریختار درختان – درختچه‌های پعن برگ و درخت زار

وضعیت عناصر بومزاد (۱۵) منطقه

منطقه گدوک با ویژگی‌های توپوگرافیکی و اقلیمی متغیر، تعداد زیادی از عناصر بومزاد ایران و منطقه البرز (الگوی البرز) را در خود جای داده است (۳۷ گونه و ۹/۱ درصد گونه‌های شناخته شده). برخی از این گونه‌ها، نظیر *Cirsium gadukens* از ناحیه ایران – تورانی و *Astragalus vereskensis* از ناحیه اروپایی – سیبری در منطقه گدوک انتشار محدودی را نشان می‌دهند. سایر گونه‌های اندمیک با

جنوب غربی دامنه های البرز، شیب رطوبتی و شرایط اکولوژیکی ویژه ای را در کل منطقه مورد مطالعه حاکم ساخته است. در این شرایط منطقه با وجود مساحت محدود (۳۱۱۳ هکتار) از تنوع و تراکم گونه های گیاهی بالای [حدود ۵/۶ درصد گونه های ایران (جدول شماره ۲)] برخوردار است. البته فلور منطقه به دنبال کاهش شیب رطوبتی، کاهش کلی را در غنای گونه ای و جانشینی تاکزوون ها نشان می دهد. این ویژگی با نتایج تحقیقات به دنبال شیب رطوبتی در نواحی مختلف جهان، همسوی نشان Dargie and Demerdash, 1991; Sarmineto, 1972;

Barbour et al., 1977; Westman, 1988; Shmida and (Whittaker, 1979; Shmida and Burgess, 1988;

Hymenocrater calycinus (Boiss.) Benth.

Colutea persica Boiss.

Cousinia chamaepeuca Boiss.

Helichrisum oligocephalum DC.

شایان ذکر است که دو گونه زیر نیز برای دومین بار از منطقه جمع آوری شده است:

Linaria genistifolia (L.) Miller. subsp. *genistifolia*

Aethionema cordatum (Desf.) Boiss.

بحث و نتیجه گیری

ویژگی های فلوریستیکی و اکولوژیکی

استقرار منطقه مورد مطالعه در دو حوزه آبریز شمال شرقی و

جدول شماره (۱): فهرست گیاهان منطقه مورد مطالعه همراه با ریختارها، اشکال زیستی، پراکنش جغرافیایی آنها

شکل زیستی (Biological type) = Ch: کامفیت، Ge: ژئوفیت، Ge.b: ژئوفیت پیازدار، Ge.t: ژئوفیت بنده دار، Ge.r: ژئوفیت ریزوم دار، He: همی کرپیتوفیت، Ph: فانروفیت، Th: تروفیت.

پراکنش جغرافیایی (Phytogeography) و منطقه رویشی (Chorotype) = جهان وطن، ES: اروپایی - سیبری، IT: ایران - تورانی، M: مدیترانه ای، Plur: چندناحیه ای.

I = بوته زار، II = درختچه زار آمیخته با درختان پراکنده، III = جنگل - درخت زار. (Formation) ریختارها

Species	Bt	Phy	For
<i>Aceraceae</i>			
<i>Acer campester</i> L.	Ph	ES-M	III
<i>A. capadocium</i> Gled.	Ph	ES	III
<i>A. monspessulanum</i> L. subsp. <i>ibericum</i> (M. B.) Yalt.	Ph	ES	II-III
<i>Amaryllidaceae</i>			
<i>Ixiolirion tataricum</i> (Pall.) Herb.	Ge.b	IT	I
<i>Araceae</i>			
<i>Arum kotschi</i> Boiss.	Ge.t	IT-ES	II-III
<i>Asclepiadaceae</i>			
<i>Vincetoxicum scandens</i> Sommier & Levier - Shar.	He	ES	---
<i>Aspleniaceae</i>			
<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L.	Ge.r	Cosm	III
<i>A. trichomanes</i> L.	Ge.r	Plur	III
<i>Athiriaceae</i>			
<i>Cystopteris fragilis</i> (L.) Bernh	Ge.r	Plur	II - III
<i>Berberidaceae</i>			
<i>Berberis vulgaris</i> L.	Ph	ES	II - III
<i>Brassicaceae</i>			

<i>Aethionema cordatum</i> (Desf.) Boiss.	He	IT	I
<i>Alliaria petiolata</i> (M. B.) Cavara & Grande	He	ES-IT-M	---
<i>Alyssopsis molis</i> (Jacq.) O. E. Schulz	He	ES	II
<i>Alyssum desertorum</i> Stapf	Th	IT	I
<i>A. inflatum</i> Nyarady	He	IT[End.]	II
<i>A. sterigosum</i> Banks & Soland	Th	IT- M	I-II
<i>A. szowitsianum</i> Fisch. & C. A. Mey.	Th	IT	II
<i>Arabis caucasica</i> Willd. subsp. <i>Caucasica</i>	He	ES-IT	III
<i>A. rimarum</i> Rech. f.	He	IT[End.]	I-II
<i>A. sagitata</i> (Bertol.) DC.	He	ES-IT- M	II
<i>Barbarea plantaginoides</i> DC.	He	IT	---
<i>Capsella bursa - pastoris</i> (L.) Medicus.	He	Cosm	I
<i>Cardaria deraba</i> (L.) Desv. subsp. <i>Chaleensis</i>	He	Cosm	II-III
<i>Chalcanthus renifolius</i> (Boiss. & Hohen.) Boiss.	Ge.r	IT[End.]	I
<i>Chorispora tenella</i> (Paul.) Di.	Th	ES-IT	I
<i>Conringia perfoliata</i> (C. A. Mey.) Busch.	Th	IT	I-II
<i>C. orientalis</i> (L.) Andrž	He	IT-M	I-II
<i>Crambe kokshiana</i> Boiss.	He	IT	III
<i>Descurainia sophia</i> (L.) Webb & Berth.	Th	ES-IT-M	I
<i>Draba nemorosa</i> L.	Th	ES-IT	II
<i>Erysimum caespitosum</i> DC.	Th	IT	I
<i>E. subulatum</i> J. Gay.	He	IT	II
<i>E. uncinatifolium</i> Boiss.	He	IT	I
<i>Erysimum</i> sp.	He	---	III
<i>Hesperis hyrcana</i> Bornm. & Gauba	He	IT	III
<i>H. persica</i> Boiss.	He	IT[ES]	II
<i>Isatis gaudiae</i> Bornm.	He	ES-IT	II-III
<i>Sisymbrium irio</i> L.	Th	IT	I
<i>Sterigmastellum ramosissimum</i> (D. E. Schulz) Rech. f.	Th	ES-IT	I
<i>Thlaspi perfoliatum</i> L.	Th	ES-IT-M	I-II
<i>T. stenocarpum</i> L.	Th	IT	I-II
<u>Boraginaceae</u>			I
<i>Anchusa strigosa</i> Labill.	He	IT	I
<i>Asperugo procumbens</i> (Griseb) R.	Th	ES-IT-M	III
<i>Echium amoenum</i> Fisch. & C. A. Mey.	He	ES	I-II
<i>Lappula microcarpa</i> (Ledeb.) M. Pop.	Th	IT	I
<i>Lithuspermum sibthorpioides</i> Griseb.	Th	Plur	II
<i>Molktia coerulea</i> (Willd.) Lehm.	He	IT	I-II
<i>Nonnea caspica</i> (Willd.) G. Don.	Th	ES	I
<i>Onosma bulbosum</i> DC.	He	IT	I-II
<i>O. dichroanthum</i> Boiss.	He	IT	I
<i>Rochelia persica</i> Bge. ex Boiss.	Th	IT	I
<i>Solenanthus stamineus</i> (Desf.) Wettst.	He	IT-M	
<u>Campanulaceae</u>			
<i>Asyneuma amplexicaule</i> (Willd.) Hand. subsp. <i>aucherii</i> (DC.) Bornm.	He	IT[End.]	II
<i>A. mazandrense</i> Rech. f.	He	IT[End.]	II
<i>Campanula glomerata</i> L.	He	ES-IT	I-II
<i>C. involucrata</i> Auch.	He	IT	II
<i>C. lourica</i> Boiss.	He	IT[End.]	I
<i>C. stevenii</i> M. B. subsp. <i>stevenii</i>	He	IT	I-II

<i>Campanula</i> sp.	He	---	II
<u>Caprifoliaceae</u>			
<i>Lonicera caucasica</i> Pall.	Ph	ES	III
<i>L. iberica</i> M. B.	Ph	ES	II-III
<i>Sambucus ebulus</i> L.	He	ES	III
<u>Caryophyllaceae</u>			
<i>Acanthophyllum glandulosum</i> Bunge ex Boiss.	Ch	IT	I
<i>Cerastium dichotomum</i> L.	Th	IT-M	I-II
<i>Dianthus orientalis</i> Adams subsp. <i>stenoalyx</i> (Boiss.) Rech. f.	Ch	IT	I-II
<i>Gypsophyla aretioides</i> Boiss.	Ch	IT	II
<i>Herniaria incana</i> Lam.	He	ES-IT-M	I-II
<i>holosteum glutinosum</i> (M. B.) Fisch. & C. A. Mey.	Th	IT	I-II
<i>Lepyrodielis stellaroides</i> (Schrenke) Fisch. & C. A. Mey.	Th	IT	II-III
<i>Minuartia lineata</i> Bornm.	He	IT	I-II
<i>Saponaria bodeana</i> Bornm.	He	ES	II-III
<i>Scleranthus orientalis</i> Rossler	Th	IT-M	I
<i>Silene chlorifolia</i> Sm.	Ch	IT	---
<i>S. italica</i> (L.) Pers.	He	ES-IT	I-II
<i>S. latifolia</i> Poir. subsp. <i>persica</i> (Boiss. & Buche) Melze	He	ES-IT	I-II
<i>S. latifolia</i> Poir. subsp. <i>alba</i> (Miller) Greuter. & Burdet	He	ES[End.]	I
<i>S. montbrethiana</i> Boiss.	He	IT	I
<i>S. macrowiezii</i> Schischk.	He	IT	I
<i>S. odontopetala</i> Fenzl.	He	IT	I-II
<i>S. spergulifolia</i> (Willd.) M. B.	He	IT	I-II
<i>Spergularia marina</i> (L.) Griseb.	Th	IT	---
<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	Th	Cosm	II-III
<u>Celasteraceae</u>			
<i>Evonymus velutina</i> (C. A. Mey.) Fisch.	Ph	ES	III
<u>Chenopodiaceae</u>			
<i>Camphorosma monspeliaca</i> L.	Ch	ES-IT-M	I
<i>Ceratocarpus arenarius</i> L.	Th	IT	I
<i>Chenopodium foliusum</i> Aschers. subsp. <i>montanum</i> Uotila	Th	IT	---
<i>Kochia prostrata</i> (L.) Schrad.	Ch	IT-M	I
<i>Noaea mucronata</i> (Forssk.) Asch. subsp. <i>mucronata</i>	Ch	IT	I
<u>Cistaceae</u>			
<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Miller.	He	ES	III
<u>Compositae</u>			
<i>Achillea biebersteinii</i> Afen.	He	IT	I-II
<i>Anthemis triumfetti</i> (L.) Allen. subsp. <i>khorasanica</i> (Rech. f.) Iranshahar	He	ES-IT	III
<i>Arctium lapa</i> L.	He	Plur	---
<i>Artemisia absinthium</i> L.	Ch	ES	III
<i>A. chamaemelifolia</i> Vill.	Ch	ES-IT	II
<i>Carduus transcaspicus</i> Gand. subsp. <i>macrocephalus</i> (Arenes) Kazmi	He	ES-IT	II
<i>Centaurea cyanus</i> L.	He	Plur	I
<i>C. hyrcanica</i> Bomm.	He	ES	I-II

<i>C. iberica</i> Bornm. Trev. ex spereng.	He	IT-M	I
<i>C. leuzeoides</i> (Jaub. & Spach.) Walp.	Ch	IT	I
<i>C. rhizantha</i> C. A. Mey.	He	IT	I
<i>C. virgata</i> Lam. subsp. <i>deinacantha</i> (Boiss. & Hausskn.) Wagenitz	Ch	IT	I
<i>C. zuvandica</i> (Sosn.) Sosn.	He	ES-IT	I-II-III
<i>Chrysanthemum coronarium</i> L.	He	ES-M	II-II
<i>Cichorium intybus</i> L.	He	Plur	---
<i>C. ciliatum</i> (Murray) Moench. subsp. <i>ciliatum</i>	He	IT	II
<i>C. gadukense</i> Petrik	He	IT[End.]	---
<i>C. turkestanicum</i> (Regel) Petrik var. <i>pseudolapaceum</i>	He	IT	I
<i>Cousina chamaepeuce</i> Boiss.	He	IT	I
<i>C. eryngioides</i> Boiss.	He	IT[End.]	I
<i>C. pterocaulos</i> (C. A. Mey.) Rech. f.	He	ES-IT	I-II-III
<i>Crepis multicaulis</i> Ledeb. subsp. <i>multicaulis</i>	He	IT	II-III
<i>Echinops koelzii</i> Rech. f.	He	ES	II-III
<i>Helichrysum cf. araxinum</i> Takt. ex Kirp.	Ch	IT	I
<i>H. oligocephalum</i> DC.	Ch	IT[End.]	I
<i>H. plicatum</i> DC.	He	IT	I
<i>H. pseudoplicatum</i> Nab.	He	IT	I
<i>H. psychrophilum</i> Boiss.	Ch	IT	I
<i>Hireacium prenanthoides</i> Vill.	He	IT-M	III
<i>H. procerum</i> Fens.	He	Es	III
<i>Inula montbretiana</i> DC.	He	IT[End.]	III
<i>Iranecio elbursensis</i> (Boiss.) B. Nord.	He	IT[End.]	I
<i>Iranecio othonae</i> (M. B.) B. Nord.	Th	ES	II
<i>Iactuca serriola</i> L.	Th	ES-IT-M	II
<i>Leontodon asperimus</i> (Willd.) Boiss. ex Ball.	He	ES	III
<i>L. hispidus</i> L. var. <i>mazanderanicus</i> Rech. f.	He	IT[End.]	I
<i>Onopordon achanthim</i> L. subsp. <i>araeoso - tomentosum</i> Rech. f.	He	Plur	I-II
<i>Psychrogeton</i> sp.	He	---	I
<i>Scariola orientalis</i> (Boiss.) Sojak.	Ch	IT	I
<i>Scorzonera laciniata</i> L.	He	ES-IT-M	I-II
<i>S. mucida</i> Rech. f.	He	IT[End.]	II-III
<i>Scorzonera</i> sp.	He	---	I
<i>Senecio paulsenii</i> O. Hoffm. subsp. <i>chorasanicus</i> (Rech. f. & Aell.) B. Nord.	He	IT[End.]	I
<i>S. vernalis</i> Waldst. & Kit.	Th	ES-IT	I
<i>Seratula haussknechtii</i> Boiss.	He	IT	I
<i>S. latifolia</i> Boiss.	He	IT	I
<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill.	He	IT-M	---
<i>S. palusteris</i> L.	He	ES	III
<i>Tanacetum parthenium</i> (L.) Sch.	He	Plur	II-III
<i>T. polyccephalum</i> Sch. Bip. subsp. <i>duderanum</i> (Boiss.) Podl.	He	IT	II-III
<i>Taraxacum serotinum</i> (Waldst. & Kit.) Poir.	He	ES	III
<i>Taraxacum</i> sp.	He	---	I-II
<i>Ttagopogon graminifolius</i> DC.	He	IT	I-II
<i>Tripleruspermum disciforme</i> (C. A. Mey.) Schultz Bip.	He	IT	I-II
<i>Tussilago farfarea</i> L.	He	IT	II
<u>Convolvulaceae</u>			
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	He	ES	II-III

Corylaceae				
<i>Carpinus betulus</i> L. var. <i>betulus</i>	Ph	ES	III	
<i>C. orientalis</i> Miller subsp. <i>orientalis</i>	Ph	ES-M	III	
Crassulaceae				
<i>Sedum gracile</i> C. A. Mey.	Ge.r	ES	III	
<i>S. hispanicum</i> L.	Th	ES-IT	I	
<i>S. stoloniferum</i> S. G. Gmel.	Ge	ES	III	
<i>Sempervivum iranicum</i> Bornm. & Gauba	He	IT[End.]	III	
Cupressaceae				
<i>Juniperus exelsa</i> L.	Ph	IT	I-II	
<i>J. sabina</i> L.	Ph	ES	I-III	
Cyperaceae				
<i>Carex aff. distance</i> L.	He	ES-IT-M	III	
<i>C. deppressa</i> Link subsp. <i>transsilvatica</i> (Schur) Egor.	He	ES	III	
<i>C. divulsa</i> Stockes subsp. <i>divulsa</i>	He	ES-M	II-III	
<i>C. halleriana</i> Asso.	He	IT-ES-M	II	
<i>C. melanostachya</i> M. Bieb. ex Willd.	He	ES-M	I-II	
<i>C. sanguinea</i> Booth.	He	IT	I	
Dipsacaceae				
<i>Cephalaria sublanata</i> (Bornm.) Szabo & Magyar.	He	IT	I	
<i>Dipsacus strigosus</i> Willd. ex Roemer & Schultes	He	ES[IT]	II	
<i>Pterocephalus canus</i> Coult. ex DC.	He	IT-M	II-III	
<i>Scabiosa columbaria</i> L. subsp. <i>caespitosa</i> Jamzad	He	ES-IT	II	
Ephedraceae				
<i>Ephedra major</i> Host.	Ch.	IT	I	
Euphorbiaceae				
<i>Euphorbia boissieriana</i> (Woron.) Rokh.	He	IT	I	
<i>E. bungei</i> W. K.	He	IT	I	
<i>E. variegata</i> Heyne ex Roth.	He	ES-IT-M	I	
<i>Euphorbia</i> sp.	He	---	---	
<i>Euphorbia</i> sp.	He	---	---	
Fabaceae				
<i>Astragalus (Adiaspatus) aureos</i> Willd.	Ch	IT	I-II	
<i>A. (Carprini) citrinus</i> Bung. subsp. <i>citrinus</i>	He	IT	I	
<i>A. (Carprini)</i> sp.	He	IT	I	
<i>A. (Carprini) vereskensis</i> Maassomi & Podl.	He	ES[IT][End.]	II-III	
<i>A. (Glycyphylloides) glycyphyllos</i> L.	He	ES[End.]	III	
<i>A. (Grammocalyx) grammocalyx</i> Boiss. & Hohen.	He	ES[IT.]	I-II	
<i>A. (Hymenostegis) capax</i> Maassomi	Ch	IT	I	
<i>A. (Hymenostegis) rubriflorus</i> Bunge	Ch	IT	I	
<i>A. (Incani) curvirustris</i> Boiss. subsp. <i>curvirustris</i>	He	IT[ES]	III	
<i>A. (Incani) demavendicus</i> Boiss. & Hohen.	He	IT	II-III	

<i>A. (Onobrychiodes) brevidens DC.</i>	Ch	IT	I-II
<i>A. (Rachophorus) denudatus Stev.</i>	Ch	IT	I-II
<i>A. (Campylantus) tricholobus DC.</i>	Ch	IT	I
<i>Colutea persica</i> Boiss.	Ph	ES[End.]	III
<i>Coronilla varia</i> L. subsp. <i>varia</i> Rech. f.	He	ES-IT	I-II-III
<i>Lathyrus aphaca</i> L.	Th	IT-M	III
<i>L. laxiflorus</i> (Desf.) Kuntze	He	ES	III
<i>L. pratensis</i> L.	He	ES-IT-M	II-III
<i>L. roseus</i> Stev.	He	ES	III
<i>L. rotundifolius</i> Willd. subsp. <i>miniatus</i> (M. B. ex Stev.) P. H. Davis.	He	ES-IT	II-III
<i>Lotus corniculatus</i> L. subsp. <i>corniculatus</i> var. <i>corniculatus</i>	He	Plur	I
<i>Medicago lupulina</i> L.	He	ES-IT-M	II-III
<i>Melilotus officinalis</i> (L.) Pall.	He	ES-IT-M	II-III
<i>Onobrychis altissima</i> Grossh.	He	IT	I-II
<i>O. cornuta</i> (L.) Desv. subsp. <i>cornuta</i>	Ch	IT	I-II
<i>O. gaubae</i> Bornm.	Ch	IT[End.]	I
<i>O. mazanderanica</i> Rech. f.	He	ES	II-III
<i>Oxytropis</i> sp.	He	---	I
<i>Sophora alopecuroides</i> L. subsp. <i>alopecuroides</i>	He	IT	I
<i>Trifolium pratense</i> L. var. <i>pratense</i>	He	ES-IT-M	I-II
<i>T. repens</i> L. var. <i>repens</i>	He	ES-IT-M	II-III
<i>Vicia balansae</i> Boiss.	He	ES[End.]	II
<i>V. cracca</i> L.	He	ES	II-III
Fagaceae			
<i>Fagus orientalis</i> Lipsky	Ph	ES	III
<i>Quercus castaneifolia</i> C. A. Mey.	Ph	ES	II-III
<i>Quercus macranthera</i> Fish. & C.A. Mey.	Ph	ES-M	II-III
<i>Q. petraea</i> L. ex Ehrh.	Ph	ES	III
<i>Ph</i>	ES-M	III	
Fumariaceae			
<i>Corydalis verticillaris</i> DC. subsp. <i>verticillaris</i>	Ge.r	IT[End.]	III
<i>Fumaria parviflora</i> Lam.	Th	ES-IT-M	I-II
Gentianaceae			
<i>Swertia longifolia</i> Boiss.	He	IT[ES]	III
Geraniaceae			
<i>Biebersteinia multifida</i> DC.	Ge.r	IT	I
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) Her. ex Ailton.	Th	ES-IT-M	II-III
<i>Geranium persicum</i> Schon. - Temesy.	Ge.r	IT	I
<i>G. pyrenaicum</i> Schon. - Temesy	He	ES-M	II-III
<i>G. tuberosum</i> L. subsp. <i>micranthum</i> Schon. - Temesy	Ge.r	ES-IT-M	III
Gramineae(poaceae)			
<i>Aegilops</i> sp.	He	----	II-III
<i>Agropyron long-aristatum</i> (Boiss.) Boiss.	He	IT[ES][End.]	II-III
<i>A. pectiniforme</i> Roemer & Schultes	He	ES-IT-M	I-II
<i>Alopecurus aripiatus</i> Ovcz.	He	IT	I
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P. Beau.	He	ES[IT-M]	III
<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Hud.) P. Beau. & Ess.	He	ES-M	II-III

<i>Bromus briziformis</i> Fish. & C. A. Mey.	Th	ES	III
<i>B. danthoniae</i> Trin. var. <i>danthoniae</i>	Th	IT	I
<i>B. cf. stenostachys</i> Boiss.	He	IT	II
<i>B. sterilis</i> L.	Th	ES-IT-M	II-III
<i>B. tomentellus</i> Trin.	He	IT	II-III
<i>Calamagrostis pseudophragmites</i> (Hall. f.) Koel.	He	ES	---
<i>Celistogenes serotina</i> keng subsp. <i>serotina</i>	He	Plur	III
<i>Dactylis glomerata</i> L. subsp. <i>glomerata</i>	He	ES-IT-M	II-III
<i>Elymus elongatiformis</i> (Drob.) Assadi	Ge.r	IT	I-II
<i>E. hispidus</i> (Opiz) Meldris var. <i>vilosus</i> (Hacke) Assadi	Ge.r	ES-IT-M	I-II
<i>E. long-aristatus</i> (Neveski) Tzvelve	He	ES	II-III
<i>E. transhyrcanus</i> (Neveski) Tzvelve & Novost	He	IT	I
<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	Ge.r	ES	---
<i>F. ovina</i> L.	He	Cosm	I-II
<i>F. pratensis</i> Hudson	He	IT[ES]	II-III
<i>Glyceria plicata</i> Fries	He	ES-IT-M	III
<i>Hordeum bulbosum</i> L.	Ge.b	IT-M	I-II
<i>H. violaceum</i> Boiss.	He	IT	I
<i>Koeleria cristata</i> (L.) Pers.	He	ES-IT-M	I-II
<i>Melica jacheumontii</i> Decne. ex Jacq. subsp. <i>jachuemontii</i>	He	IT	II
<i>M. persica</i> Kunth. subsp. <i>persica</i>	He	IT	I
<i>Phleum paniculatum</i> Hudson var. <i>ciliatum</i> (Boiss.) Bor.	He	ES-IT	I
<i>Poa bulbosa</i> L. var. <i>vivipara</i> Roel.	Ge.b	IT-M	II-III
<i>P. nemoralis</i> L.	He	Plur	II-III
<i>P. pratensis</i> L.	He	Plur	II-III
<i>P. cf. supina</i> Schrad.	He	ES[IT]	I-II
<i>Polypogon fugax</i> Nees. ex Steud.	He	IT[ES]	III
<i>Psathyrostachys fragilis</i> (Boiss.) Neveski	He	IT	I
<i>Puccinella distans</i> (L.) Parl.	He	Plur	III
<i>Stipa caucasica</i> Schm.	He	IT[ES]	I
<i>S. lessingiana</i> Trin. & Ruper.	He	IT	I
<i>S. holosericea</i> Trin. & Ruper.	He	ES-IT	I
<i>Trisetum flavescens</i> (L.) Pers.	He	ES-IT	II-III
 <u>Grossulariaceae</u>			
<i>Ribes uva-crispa</i> L.	Ch	ES	II-III
 <u>Gutiferae(Hypericaceae)</u>			
<i>Hypericum perforatum</i> L.	He	---	II-III
 <u>Iridaceae</u>			
<i>Iris kopetdagensis</i> (Vved.) Mathew & Wendelbo	He	IT	I
 <u>Juncaceae</u>			
<i>Juncus maritimus</i> Lam.	He	ES-IT-M	---
 <u>Lamiaceae</u>			
<i>Ajuga chamaecistus</i> Ging. subsp. <i>tomentella</i> (Boiss.) Rech. f.	Ch	IT[End.]	I
<i>A. comata</i> Stape	He	ES-IT	III
<i>Ballota platyloma</i> Rech. f.	Ch	ES[End.]	III
<i>Calamintha grandiflora</i> (L.) Moench & Meth.	He	ES	III

<i>Clinopodium vulgare</i> L. subsp. <i>vulgare</i> Rech. f.	He	Plur	II-III
<i>Dracocephalum thymiflorum</i> L.	Th	ES-IT	I
<i>Hymenocrater calycinus</i> (Boiss.) Benth.	Ch	IT[End.]	I
<i>Hyssopus angustifolius</i> M.B.	He	ES	III
<i>Lamium album</i> L. subsp. <i>crinitum</i> (Monthbr. & Auch. ex Benth.) Men.	He	Plur	II-III
<i>Marrubium astracanicum</i> Jacq.	He	IT	II
<i>M. vulgare</i> L.	He	Plur	I
<i>Mentha longifolia</i> (L.) Huds.	Ge.r	Plur	---
<i>Nepeta crassifolia</i> Boiss. & Buhse	He	IT[End.]	II
<i>N. sintenisii</i> Bormm.	He	IT	II
<i>Origanum vulgare</i> L. subsp. <i>viride</i> (Boiss.) Hayek.	He	Plur	II-III
<i>Phlomis herba - venti</i> L. subsp. <i>lenkoranicum</i>	He	IT-M	I-II
<i>Salvia nemorosa</i> L.	He	ES-IT	I
<i>S. sclarea</i> L.	He	IT-M	III
<i>S. staminea</i> Montbr. Auch. ex Benth.	He	IT-M	---
<i>S. verticillata</i> L. subsp. <i>verticillata</i>	He	IT-M	---
<i>S. xathochela</i> Boiss. ex Benth.	He	IT	I
<i>Scutellaria pinnatifida</i> A. Hamilt. subsp. <i>pinnatifida</i>	He	IT	I-II
<i>S. tournefortii</i> Benth.	Ch	ES	III
<i>Stachys byzantina</i> C. Koch.	He	IT	I-II
<i>S. inflata</i> Benth.	He	IT[End.]	I
<i>S. lavandulifolia</i> Vahl.	He	IT-M	I-II
<i>S. laxa</i> Boiss. & Buhse	He	ES[End.]	I
<i>S. pubescens</i> Ten.	Ch	IT	I-II
<i>S. sylvatica</i> L.	Ch	IT	III
<i>Teucrium chamaedrys</i> L. subsp. <i>sispirens</i> (C. Koch.) Rech. f.	Ch	IT	I-II-III
<i>T. polium</i> L. var. <i>gnaphalodes</i> Benth.	Ch	IT	I-II-III
<i>Thymus kotschyanus</i> Boiss. & Hohen.	Ch	IT	I-II
<i>T. pubescens</i> Boiss. & Kotschy ex Celak.	Ch	IT	I-II
<i>Ziziphora clinopodioides</i> Lam. subsp. <i>elbursensis</i> (Rech. f.) Rech. f.	Ch	IT	I
<i>تشریفات علمی و مطالعات فنی پال جامع علوم انسانی</i>			
Liliaceae			
<i>Allium atroviolaceum</i> Boiss.	Ge.b	ES-IT	I-II-III
<i>A. bodeanum</i> Regel	Ge.b	IT[End.]	II-III
<i>A. paradoxum</i> (M. B.) G. Don.	Ge.b	ES-IT	II
<i>A. scabriuscum</i> Boiss.	Ge.b	IT	I
<i>Eremurus inderiensis</i> (Ste.) Boiss.	Ge.b	IT	I
<i>Gagea gageoides</i> (Zucc.) Vved.	Ge.b	IT	I
<i>Muscaria</i> sp.	Ge.b	---	I-II
<i>Ornithogalum bungei</i> Boiss.	Ge.b	ES-IT	II
<i>O. oligophyllum</i> E. D. Clarke	Ge.b	IT	I-II-III
<i>Polygonatum orientale</i> Desf.	Ge.b	ES	I-II
<i>Tulipa biebersteiniana</i> Schultes & Schults ex Fil.	Ge.b	IT	I-II
<i>T. montana</i> Lindl. var. <i>montana</i>	Ge.b	IT	I
Malvaceae			
<i>Alcea lenkoranica</i> Ljin & Zam. var. <i>lenkoranica</i>	He	ES-IT	III
<i>Malva neglecta</i> Waller.	Ph	ES-IT-M	---
Oleaceae			
<i>Fraxinus excelsior</i> L. subsp. <i>coriariifolia</i> (Sch.) E. M.	Ge.r	ES	III

<u>Onagraceae</u> <i>Epilobium paluster</i> L.	He	ES	---
<u>Orchidaceae</u> <i>Cephalanthera longifolia</i> (L.) Fritsch <i>C. rubra</i> (L.) C. Rich. <i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz <i>Orchis simia + stevenii = x golestanica</i> Renz.	He He He He	ES-IT-M ES-M Cosm ES[End.]	III III III III
<u>Orobanchaceae</u> <i>Orobanche</i> sp.	Ge.r	---	I
<u>Paeoniaceae</u> <i>Paeonia wittmanniana</i> Har. ex Lindl.	Ge.r	ES	III
<u>Papaveraceae</u> <i>Chelidonium majus</i> L. <i>Glaucium oxylobum</i> Boiss. & Buhse <i>Hypecum pendulum</i> L. var. <i>pendulum</i> <i>Papaver dubium</i> L. <i>Roemeria refracta</i> DC.	He He Th Th Th	Plur IT IT-M IT IT	III II I II II
<u>Plantaginaceae</u> <i>Plantago lanceolata</i> L.	He	Cosm	I-II
<u>Plumbaginaceae</u> <i>Achantholimon brachystachyum</i> Boiss.	He	IT	I
<u>Podophyllaceae</u> <i>Bongardia chrysogonum</i> (L.) Spoch	Ge.r	IT-M	I-II
<u>Polygalaceae</u> <i>Polygala anatolica</i> Boiss. & Helder	He	ES[M]	I
<u>Polygonaceae</u> <i>Polygonum hyrcanicum</i> Rech. f. <i>Rumex pulcher</i> L.	He He	ES ES-IT-M	--- ---
<u>Ranunculaceae</u> <i>Adonis aestivalis</i> L. subsp. <i>provincialis</i> <i>Anemone caucasica</i> Willd. ex Ruper. <i>Ceratocephalus falcata</i> (L.) Pers. <i>Consolida orientalis</i> (Gay.) Schrod. <i>Delphinium binternatum</i> Huth. <i>D. elbursense</i> Rech. f. var. <i>elbursense</i> <i>Ficaria kochi</i> (Ledeb.) Iranshahr & Rech. f. <i>Ranuculus</i> sp. <i>Thalictrum minus</i> L.	Th Ge.r Th Th He He He He He He He	ES-IT-M ES IT-M ES-IT-M IT ES[End.] IT ---	I-II III I I II-III II-III II I III
<u>Resedaceae</u>			

Reseda lutea L.

He ES-IT-M I

Rhamnaceae*Rhamnus cathartica* L. var. *caucasica*

Ph ES[End.] III

R. pallasii Fisch & C. A. Mey. subsp. *pallasii* (Rech. f.) B. & Zei.

Ph IT I-II

R. pallasii Fisch & C. A. Mey. subsp. *sintenissi* (Rech. f.)

Ph ES-IT III

Browich & Zielinski

Rosaceae*Cerasus pseudoprostrata* Pojark.

Ch IT I-II-III

C. microcarpa (C. A. Mey.) Boiss. subsp. *microcarpa*

Ph ES-IT I-II

Cotoneaster nummularioides Pojark.

Ph IT II

Crataegus pentagyna Waldst. & Kit. ex Willd.

Ph ES II-III

Fragaria vesca L.

He Plur I-II

Geum urbanum L.

He ES III

Malus orientalis Ugl.

Ph ES III

Mespilus germanica L.

Ph ES II-III

Potentilla bungei Boiss.

He ES II

P. reptans L.

He ES III

Prunus spinosa L.

Ph ES II-III

Pyrus boissieriana Buhse

Ph ES II-III

Rosa iberica Ster.

Ph ES-IT II-III

R. canina L.

Ph IT II

R. persica Michx.

Ch IT I

Rubus hyrcanus Juz.

Ph ES[End.] III

Sanguisorba minor L. subsp. *muricata* (Spack.) Briq.

He ES-IT-M III

Spireae aff. hypericifolia L.

Ph ES I

Rubiaceae*Asperula arvensis* L.

Th ES-IT-M I

Crucianella gilanica Trin. subsp. *transcaspica* (Ehrend.) T. N. Pod.

He IT I

Cruciata taurica (Pall. ex Wild.) Ehrend.

He IT I-II

Galium ghilanicum Staph.

Th IT I

G. humifusum Bieb.

Th IT[ES] III

G. kotzingii Boiss. et Buhse

He IT-M I

G. oduratum (L.) Scop.

He ES III

G. spurium L. subsp. *ibicinum* (Boiss.) Ehrend.

Th IT I-II

G. verum L. subsp. *glabrescens*

He Plur I-II

Rubia florida Boiss.

Ch IT I

Santalaceae*Thesium kotschyani* Boiss.

Ge.r IT-M I-II

Scrophulariaceae*Linaria genistifolia* (L.) Miller. Grand. subsp. *genistifolia*

He ES II-III

Linaria sp.

He --- I

Linaria sp.

He --- I

Pedicularis sibthorpii Boiss.

He IT I

Scrophularia striata Boiss.

He IT I

S. viregata subsp. *rupestris* (M. B.) Grau.


He IT I

Veronica anagallis-aquatica L. subsp. *oxycarpa* (Boiss.) A. Jelen

Ge IT-M ---

<i>V. gaubae</i> Bornm.	Th	IT[End.]	I
<i>V. kurdica</i> Benth. subsp. <i>kurdica</i>	He	IT-ES[End.]	I
<i>V. orientalis</i> Miller	He	IT	---
<i>Verbascum gossypinum</i> M. B.	He	ES	II
<i>V. cheiranthifolium</i> Boiss. var. <i>transcaspicum</i> M.	He	IT	I-II-III
 <u>Solanaceae</u>			
<i>Atropa belladonna</i> L.	He	ES	III
<i>Hyoscyamus squarrosus</i> Griff.	He	IT	I
<i>Solanum persicum</i> subsp. <i>persicum</i> Willd. ex Ro. & Sc.	Ch	IT[ES]	---
 <u>Tamaricaceae</u>			
<i>Tamarix ramosissima</i> Ledeb.	Ph	Plur	I
 <u>Urticaceae</u>			
<i>Parietaria judaica</i> Strand	Ch	ES-IT-M	I
<i>Urtica dioica</i> L. subsp. <i>kurdistanicum</i> Ch.	He	IT[End.]	III
 <u>Umbelliferae (Apiaceae)</u>			
<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm.	Th	Plur	III
<i>A. cerefolium</i> (L.) Hoffm.	Th	ES-IT-M	III
<i>Astrodaucus orientalis</i> (L.) Drude var. <i>eriocarpus</i> (Boiss.) Woron.	He	IT	II
<i>Bunium cylindricum</i> (Boiss. & Hohen.) Drude	He	IT	I-II
<i>Bupleurum exaltatum</i> M. B.	He	IT	II-III
<i>Caucalis platycarpos</i> L.	Th	IT-M	II-III
<i>Cervaria cervarifolia</i> (C. A. Mey.) M. Pimen.	He	Es	II-III
<i>Eryngium billardieri</i> F. Delaroche	He	IT	I
<i>Falcaria vulgaris</i> Benth.	He	ES-IT-M	I
<i>Ferula gumosa</i> Boiss.	He	IT	II-III
<i>Hipomaratherum microcarpum</i> (B. M.) B. Fedtsch.	He	Es-IT	III
<i>Heracleum persicum</i> Desf.	He	IT	---
<i>Laser trilobum</i> (L.) Borkh.	He	ES-IT-M	III
<i>Physospermum cornubiense</i> (L.) Dc.	He	Es	II
<i>Pimpinella affinis</i> Ledeb.	He	Es-IT	II-III
<i>Scandix pecten - veneris</i> L.	Th	ES-IT-M	III
<i>Trinia leiogona</i> (C. A. Mey.) B. Fedtsch.	He	IT	I-II
<i>Zozimia absinthifolia</i> (Vent.) Link & Enum	He	IT	I-II
 <u>Valerianaceae</u>			
<i>Valerianella sisymbriifolia</i> Fisch.	He	IT	I-II
 <u>Violaceae</u>			
<i>Viola occulta</i> Lehm.	He	IT	I-II
<i>V. odorata</i> L.	Th	ES-IT-M	II-III
<i>V. suavis</i> M. B.	He	ES-IT-M	II-III
 <u>Zygophyllaceae</u>			
<i>Peganum harmala</i> L.	He	IT-M	I

Juniperus sabina, *Rosa canina*, *Berberis vulgaris*, و *Pronus spinosa*, *Lonicera iberica* و *Astragalus denudatus*, *Cerasus microcarpa*, *Onobrychis cornuta*, *Bromus tomentellus*, *Festuca ovina*, *Koeleria cristata* به ارتفاع ۵/۰ متر مشاهده می‌شود (شکل شماره ۸). ریختار بوته‌زار نیز صرفاً از یک لایه بوته‌ای - علفی، شامل: *Onobrychis cornuta*, *Astragalus spp.*, *Acantholimon brachystachyum*, *Elymus hispidus*, *Bromus tomentellus*, *Stipa spp.*, *Psathyrostachys fragilis*, *Koeleria cristata* به ارتفاع کمتر از ۵/۰ متر تشکیل یافته است. البته در ارتفاعات شمال تا خط یال درختچه‌های *Juniperus exelsa* به طور پراکنده نیز حضور دارند.



شکل شماره (۸): چشم اندازی از ریختارهای بوته‌زار و درختچه‌زار آمیخته با درختان پراکنده منطقه مطالعه

از نظر شکل زیستی همی کریپتوفت‌ها بیشترین درصد را در ریختارها و کل منطقه نشان می‌دهند. بنابراین طبق رده‌بندی رونکیه فراوانی گیاهان همی کریپتوفت، به دنبال افزایش میزان رطوبت در هر سه ریختار (اشکال ۲، ۳ و ۴)، دلیل بر وجود اقلیم سرد با ریزش عمدتاً برف در کل منطقه است. از سوی دیگر افزایش فانروفت‌ها و کاهش همی کریپتوفت‌ها و کامفیت‌ها بر خلاف جهت شیب رطوبتی مؤید اقلیم مرطوب‌تر و اعتدال بیشتر در دامنه‌های شمال شرقی است.

از نظر جغرافیای گیاهی، اغلب گونه‌های گیاهی به دلیل عدم پایداری شرایط بوم‌شناختی منطقه اختصاص به یک محدوده خاص جغرافیای گیاهی نداشته و بر مبنای نتایج به دست آمده (اشکال ۵، ۶ و ۷) به دنبال کاهش میزان رطوبت، درصد عناصر اروپایی - سیبری کاهش و عناصر ایرانی - تورانی افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد. همچنین در منطقه گذار یا اکتون، ریختار درختچه‌زار آمیخته با

به طور کلی تاکزون‌ها به دنبال شیب رطوبتی، ۲ تیپ رفتاری را از خود نشان می‌دهند:

۱- تاکزون‌هایی که صرفاً به ریختار بوته‌زار، ریختار درختچه‌زار آمیخته با درختان پراکنده و ریختار درختان - درختچه‌های پهن برگ و درخت‌زار (woodland) محدود می‌شوند.

۲- تاکزون‌هایی که علاوه بر انتشار در ریختارهای درختان - درختچه‌های پهن برگ و درخت‌زار و بوته‌زار در ریختار درختچه‌زار آمیخته با درختان پراکنده، در شرایط اکوتونی یا گذار (منطقه‌ای که شرایط بوم‌شناختی ناپایداری داشته و بویژه در مرزها متأثر از تأثیر حاشیه‌ای است) نیز انتشار یافته‌اند. در زیر تاج پوشش گسترده و متراکم گونه‌های *Juniperus sabina*, *Lonicera iberica* شرایط اکولوژیکی (رطوبت حاصل از مه بارش و نورکم) بسیار مناسبی را برای سازگاری و انتشار گونه‌های علفی و علفی‌های پهن برگ به وجود آورده است. از جمله این گونه‌ها *Vicia balansa*, *Poa pratens*, *Poa nemoralis*, *Trifolium reptense*, *Geranium pyrenaicum*, *Polygonatum orientale*, *Tanasetum parthenium*, *Moltkia coerula* است.

ویژگی‌های ساختاری، شکل زیستی و جغرافیای گیاهی

ساختار پوشش گیاهی منطقه به دنبال شیب رطوبتی، کاهش نشان می‌دهد. تعداد اشکوب‌ها در ریختار درختان - درختچه‌های پهن برگ و درخت‌زار از سه لایه درختی و درختچه‌ای و علفی تا یک لایه بوته‌ای و علفی در ریختار بوته‌زار کاهش می‌یابد. متوسط ارتفاع تاج پوشش در ریختار درختان - درختچه‌های پهن برگ و درخت‌زار *Carpinus orientalis*, حدود ۵/۵ متر، شامل گونه‌های *Fagus orientalis*, *Carpinus betulus*, *Acer monspessulanum*, *Quercus castaneifolia*, *Quercus petraea* و یک لایه درختچه‌ای به ارتفاع حدود ۲/۵ متر *Crataegus pentagyna*, *Mespilus germanica*, *Lonicera caucasica*, *Berberis vulgaris*, *Pronus spinosa* و *Laser trilobum* (forbs)، شامل: *Thalictrum minus*, *Poa pratensis*, *Poa nemoralis*, *Asragalus vereskensis*, *Origanum vulgare* ۵/۰ متر است، در حالی که در ریختار درختچه-زار آمیخته با درختان پراکنده یک لایه درختچه‌ای به ارتفاع کمتر از ۲ متر، شامل

- خلیلی، علی. ۱۳۷۰. طرح جامع آب کشور. شناخت اقلیمی ایران - بارندگی، شرکت مهندسان مشاور جاماب، وزارت نیرو.
- خلیلی، علی. ۱۳۷۲. طرح جامع آب کشور. شناخت اقلیمی ایران - درجه حرارت، شرکت مهندسین مشاور جاماب، وزارت نیرو.
- قهمان، احمد. ۱۳۸۱-۱۳۵۷. فلور رنگی ایران، انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مرتع کشور.
- معصومی، علی اصغر. ۱۳۶۴-۱۳۷۸. گون‌های ایران، انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مرتع کشور.

درختان پراکنده نیز به دلیل شرایط خاص بوم‌شناختی هر دو عنصر ایرانی - تورانی و اروپایی - سیبری و عناصری که متعلق به هر دو ناحیه رویشی‌اند، در صد چشمگیری را نشان می‌دهند.

به طور کلی نتایج حاصل از بررسی ویژگی‌های تنوع گونه‌ای، فیزیونومیکی، شکل زیستی، جغرافیای گیاهی و بومزادی کل منطقه که عمدتاً سه ریختار بوته‌زار، درختچه‌زار آمیخته با درختان پراکنده و درختان و درختچه‌های پهن برگ و درخت - زار در آنها انتشار دارند، مؤید آن است که این منطقه به دنبال شیب رطوبتی از ویژگی‌های اکولوژیکی و زیستی ناهمگن برخوردار بوده و عناصر زیستی آن ضمن تنوع زیاد، تغییر، تحول و جانشینی را نشان می‌دهند.

سپاسگزاری

از آقایان دکتر علی اصغر معصومی، ولی الله مظفریان، شاهین زارع، یونس عصری و مهندس علیرضا نقی نژاد که در هر چه پریارتر شدن این مقاله به اینجانب یاری رسانده اند کمال تشکر را دارم.

یادداشت‌ها

- ۱- این مقاله بخشی از پایان نامه دکتری نویسنده اول مقاله می‌باشد.
- 2- Dwarf scrub and thorn cushion
- 3- Mixed shrubland and scattered trees
- 4- Broad leaved shrub and trees
- 5- Woodland
- 6- Homogenous
- 7- Composite landscape
- 8- Heterogenous
- 9- Transition zone
- 10- Ecoton
- 11- Community
- 12- Edge effect
- 13- Sub-alpine
- 14- Alpine
- 15- Endemic

منابع مورد استفاده

- Komarov, V. L. (ed.). 1934-1960. Flora of USSR. Vols: 1-30. Izdat. Stevo Akademi Nauk SSSR Leningrad (English translation from Russian, Israel program for Scientific Journals, 1968-1972 Translation).

اسدی، مصطفی. ۱۳۸۰-۱۳۶۳. فلور ایران (۱-۳۶). انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مرتع کشور.

- Naiman, R. J. et al., 1988. The potential importance of boundaries to fluvial ecosystems. *Journal of the North American Benthological Society* 7: 289-306.
- Odum, E.P. 1971. Fundamentals of ecology, third edition, W.B. Sounders Company Philadelphia, Pennsylvania, USA.
- Person, J. D. and Moldenke, R. A. 1975. Convergence in vegetation structure along analogous climatic gradiantes in California and Chile. *Ecology* 56:943-950 Nebraska, USA.
- Rechinger, K. H. 1977. Plants of the Touran Protected Area. Iran. *The Iranian Journal of Botany*.1(2): 155-180.
- Rechinger, K. H. (ed.). 1963-1998. *Flora Iranica*, nos. 1-173. Akademische Druke-u. verlusanstalt, Graz.
- Reif, A. and Hetzel, G. 1994. Die vegetation der waldaussenrander des gross kappel tales Freiburg, Sudschwirzwald. - Mitt. Bad. Landesver. Naturkunde u. Naturschut 16: 1-34.
- Risser, P. G. 1985. Spatial and temporal variability of biospheric and geospheric processes research needed to determine interactions with global environmental change. Report of workshop sponsored by SCOP/INTECOL, and ICSU. 18 October-1November 1985. St. Petersburg. Florida, USA.
- Shmida, A. and Burgess, T. L. 1988. Plants growth-forms strategies and vegetation types in arid environments. In: Weger, M. J. A.(ed) International Symposium of Vegetational Structure, the Hague 1-31.
- Shmida, A. and Whittaker, R. H. 1979. Convergent evolution of arid regions in the new and old world In: chaften Tuxen, R. (ed) Werden und vergehen von planzengesellschaften, vaduz. 437-450.
- Tutin, T. G. and Heywood, V. H. 1980. *Flora Europaea* vol. 2,3,4,(1968-1976).
- Walter, H. 1973. Vegetation of the earth in relation to climate and ecophysiological condition. Springer-Verlag, New York. 348pp.
- Westman, W. E. 1981. Factors influencing the distribution of species of Californian coastal sage scrub. *Ecology*, 62: 439-455.
- Whittaker, R. H. 1977. Evolution of species diversity in land communities. *Evol. Biol.* 10-1-67.
- Zohary, M. 1973. Geobotanical Foundamental of middle East. -2vols. Stuttgart. 739p.

پژوهشکاران علم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علم انسانی