

* بهروز ساری صراف

تحقیق برروی پاره‌ای از مسائل رئومورفولوژیک دشت چالدران (منطقه ماکو)

مقدمه :

دشت چالدران واقع در منتهی الیه شمال غربی ایران از جمله مکان‌های ناشناخته و دور افتاده‌ای است که تنها در مطالعات تاریخی نامی از آن به میان می‌آید و تا حال اشاره‌ای هرچند مختصر به سیمای جغرافیائی این منطقه نشده‌است. علل ذیل انگیزه این تحقیق را فراهم آورده است :

- ۱- از قدیمترین اهداف علم جغرافیا، شناختن و شناساندن محیط‌هایی است که چندان مورد توجه قرار نگرفته‌اند و مردم اطلاع بسیار مختصری از آنها دارند. شناسایی نقاطی مانند دشت چالدران - که با وجود شایستگی و نقش ارزنده، خود در تاریخ کشور، به واسطه محرومیت و دورافتادن از مرکز، درگوش ازدواج به حیات خود ادامه می‌دهند - از وظایف اصلی جغرافیاست .
- ۲- مشخص کردن پتانسیل‌ها و امکانات توسعه، مناطق و نشان دادن

* عضویت علمی گروه آموزشی جغرافیای طبیعی دانشگاه تبریز.

توان اقتصادی سرزمین با توجه به سیمای طبیعی و اشکالی که چهاره زمین را به وجود آورده‌اند، از اهداف دیگری است که در مطالعات جغرافیائی دنبال می‌شود.

توجه به حاصل خیزبودن خاک این منطقه و تیازکشور به استفاده از تمامی توان خود جهت بالابردن سطح زیرکشت و ایجاد اشتغال و نهایتاً "برداشتن گامی در راه توسعه اقتصادی، ایجاد می‌نماید که مناطق مستعد کشورشناخته شده و مطالعات اولیه در این راستا به عمل آید.

موقعیت مکانی دشت چالدران (منطقه ماکو) و بررسی وضعیت ناهمواری‌های آن :

قلمره مورد مطالعه در منتهی الیه شمال غربی استان آذربایجان غربی قرارگرفته است که از طرف غرب و شمال با کشورهای ترکیه - آذربایجان و ارمنستان و از طرف جنوب با محدوده شهرستان خوی و از طرف غرب به جاده ترانزیتی تهران - بازرگان ختم می‌شود. دشت چالدران با وسعت بیش از ۴۰ کیلومتر مربع توسط مراتعات ۲۴۰۰ متری و ۲۷۵۰ متری و دیگرناهمواری‌های منطقه احاطه شده‌است. مکانی که مورد مطالعه قرارگرفته است، منحصر به دشت چالدران و مراتعات بلافصل آن نبوده‌است، بلکه به سبب ارتباط زمین شناسی و جغرافیائی آن با مناطق مجاور، محدوده بزرگتری که آنرا منطقه ماکو می‌نامیم. قلمرو مطالعاتی محظوظ می‌شود.

(نقشه شماره یک) .

اگر نواحی مسطح مدخل شهر ماکو و دشت های موجود در داخل نواحی کوهستانی آن را از کل منطقه مورد مطالعه مستثنی کنیم، شاید بتوان گفت که منطقه مورد نظر، محلی کاملاً "کوهستانی با قلل مرتفع و دامنه هایی شیب دار می باشد. بطوریکه گاه به نظر می رسد وجود دیواره های صعب العبور و پرتگاه های متعدد، مانع هرگونه ارتباط ساکنین روستاها و شهرهای مختلف این منطقه با یکدیگر شده و هیچ گونه تجمع گشته، انسانی نمی تواند در این مکان ها، استقرار یابد. ولی با گذر از تنگه ها و گردنه ها، ناگهان سطوحی وسیع و پهن داشت هایی مشاهده می شود که حتی تصور آن هم محال می نمود. بطور مثال شهر ماکو خود در پای یک دامنه کوهستانی و در جوار مسیر دره رودخانه واقع شده است، بعد از عبور از مسیر گلزارگاهی ماکو و درجهت شمال غربی، دشت وسیع و کم عارضه ای به چشم می خورد که شهر بازارگان در انتهای آن قرار گرفته است. شیب این دشت کمتر از ۴ درصد بوده و به طرف جنوب تمایل دارد.

به همین ترتیب بعد ازگذر از دشت بازرگان و درجهت غربی، باز دیوارهای پرشیب و تنگه‌های گلوگاهی و صخره‌هایی بادامنه‌های سرگیجه آور ظاهرمی‌شوند. ارتفاعات ۲۱۵۷ متری ذوالفارداگ و ۲۰۸۴ متری کل مورس که به علت ستیغ قلل و شبیب تنند دامنه‌ها، از نظر توپوگرافی مشخصات "کرت" را دارند، از ارتفاعات مشرف به دشت بازرگان می‌باشند. بعد ازگذراز منطقه کوهستانی مزبور، دشت آواجیق و بعداز آن نیز سلسه مرفعاتی که منطبق بر خط تقسیم آب می‌باشد، هویـدا می‌گردد که توسط این گردنه کوهستانی دشت آواجیق از دشت چالدران جدا می‌شود. در مجموع می‌توان گفت که تناوبی از دشت‌های بسته (از جمله دشت چالدران و دشت آواجیق در ارتفاع ۱۸۰۰ متری از سطح دریا) و ارتفاعات کوهستانی (از حمله ارتفاع ۱۹۶۳ متری شمال ماکو

و ۲۳۵۳ متری داش کلن در غرب چادران (توبوگرافی موجود منطقه را تشکیل می دهد .

اصلی ترین شبکه زهکش منطقه زنگمار چای است که دو شاخه عمدیه تغذیه کننده آن از ارتفاعات ۲۲۰۰ متری شمال و ۲۶۰۰ متری جنوب دشت چالدران سرچشم می گیرد که در قسمت شمال شرقی دشت مزبور به یکدیگر برخورد می کنند . رودخانه جنوبی ، رودخانه شهیدارخه می باشد که بعد از اتمال به رودخانه شمالی رودخانه قزل چای نام می گیرد . رودخانه قزل چای با جهت جنوب غربی - شمال شرقی از تنگه گلواهی عبور کرده و در حوالی روستای بارون به رودخانه زنگمار می پیوندد و با جهت جنوبی - شمالی به طرف ماکو جریان می یابد . قره سو و ساری سو از دیگر اجزای شبکه هیدرولوگرافی منطقه ماکو می باشند که قره سو یکی دیگر از شاخه های تأمین کننده زنگمار چای است و ساری سو نیز که از مرتفعات قره حسن و دیگر مرتفعات شمال شرق بازگان سرچشم می گیرد ، از پشت کوهستان ماکو به موازات رودخانه زنگمار به طرف شرق جریان می یابد و سرانجام به مرداب ها و شوره زارهای شرق ماکو تخلیه می شود . (نقشه توبوگرافی - هیپسومتریک - منطقه ماکو شماره ۲) .

بافت لیتولوژیک و واحدهای زمین شناسی :

عمده تربین تشکیلات زمین شناسی که در محدوده مورد مطالعه گسترده شده به ترتیب وسعت عبارتند از :

۱- تشکیلات کالردملانز :

این تشکیلات متشکل از سنگ آهک های ائوسن ، اولترا بازیک ها ، رادیولاریت ها ، ماسه سنگ و سنگ های بازیک آتشفشاری می باشد که به کرتاسه فوقانی تا ائوسن میانی تعلق دارند.

۲- تشکیلات قم :

مشتمل بر کنکلومرا ، سنگ آهک ، مارن و ماسه سنگ های دوران سوم (اولیگو - میوسن) می باشد که از مقاومت و سختی قابل ملاحظه ای برخوردار است. بر اثر عوامل مختلف از جمله وقوع گسل و فرسایش شدید رودخانه ای ، در بعضی مناطق ، سنگهای زیر چینه مربوط به پرمین و حتی پره کامبرین ظاهر می شوند. با این رخدمنون مشخص می گردد که در غالب نواحی " نبود چینه شناسی " بارزی وجود دارد.

۳- گدازه های بازالتی :

گدازه های بازالتی عمده موجود در منطقه ماکو به دوره کواترنر مربوط می شود و به نظر می رسد که سنی همزمان با گدازه های آتشفشار دماوند داشته باشد. سنگهای فوق محدوده وسیعی رادر غرب - شمال و - خصوصاً " شمال شرقی ماکو ، اشغال کرده است. (منبع شماره یک)

۴- نهشته های آبرفتی که جدیدترین پوشش زمین شناسی را شامل می گردد ، از گدازه های بازالتی جوانتر بوده و در بعضی نواحی روی آنها را نیز پوشانده است که با فرسایش این مواد ، گدازه های بازالتی ظاهر می شود . (منبع شماره دو)

عوامل مورفوژنز و نقش آن در شکل گیری نهایی زمین :

تکتونیک به عنوان یک عامل مورفوژنز با چهره‌های متنوع خود، نقش قاطعی در مورفولوژی منطقه داشته است. یکی از موارد اعمال تکتونیک، نقش آن در پیدایش فضائی نسبتاً " مناسب برای اسکان جمعیت انسانی از انسانها وبالمال جایگزینی شهرماکومی باشد. در این مکان تکتونیک با ایجاد گسیختگی و شکاف عمیق در کوهستان ماکو خود را نمایانده است (گسل ماکو) . ارتفاع مناطق کوهستانی که ماکو را از طرف شمال و جنوب احاطه کرده‌اند، تقریباً یکسان است که نشانگر یکی بودن این ارتفاعات در زمانهای گذشته، زمین‌شناسی است. (ارتفاع کوهستان شمالی ۱۹۶۳ متر و ارتفاع کوهستان جنوبی ۱۹۹۲ متر) . گسل ماکو که در امتداد شمال غربی - جنوب شرقی کوهستان را شکافته ، موجب پیدایش دره تکتونیکی وسیع به پهنای ۵۰۰ الی ۱۰۰۰ متر و به طول ۱۱ کیلومتر شده است. جالب این است که توسعه شهرنیز بطور کامل از جهت خط گسل تبعیت می‌نماید. رودخانه زنگمارچای براین شکاف تکتونیکی منطبق گردیده و توسط این مجرأ آبهای مازاد منطقه رازه‌کشی می‌نماید. جریان آب رودخانه موجب تعمیق و تعریض شکاف تکتونیکی فوق گشته است، دیواره‌های گسل که تقریباً با زاویه قائمه بر شهر مسلط گردیده است ، حدود ۵۰۰ متر اختلاف ارتفاع را با پای دیواره نشان می‌دهد. در موقع نزول باران ، از رأس مرفعتات شمالی که به صورت سطوح نسبتاً " مسطحی درآمده است، بارش‌های جویی ، به صورت آبشر بر فراز شهر جاری می‌شود که صرف نظر از ایجاد منظره‌ای چشم نواز، خسارات و لطماتی به منازل مسکونی ، خصوصاً " به حاشیه نشینان شهرماکو وارد می‌آورد.

دیگر چشم انداز طبیعی که در حال حاضر توسط انسانها اشغال و مورد بهره برداری زراعی قرار گرفته است و تکتونیک عامل و خالق

آن به شمار می رود، وجود حوضه های بسته و فوشهای^۱ تکتونیکی می باشد. فوشه یا گرابن ها^۲ به فرونشست های تکتونیکی اطلاق می شود که اطراف آهار امرتفعات کوهستانی یا هورست^۳ احاطه می کند. هورست ها و گرابن ها که زمان شکل گیری آنها به دوران سوم زمین شناسی بر می گردد، در آغاز دوران چهارم خصوصاً "در عصر ویلا فرانشین تو سط سیلابه ها و رودخانه های محلی شدیداً" تغییر شکل یافته اند (منبع شماره سه) بدین ترتیب که از ارتفاع هوت ها کاسته شده و بانباشته شدن نهشته ها و واریزه های تخریبی حاصل از دامنه ها سطح گرابن ها بالا آمده و دشت های یکنواخت و کم عارضه ای به وجود آمده است. عمدت ترین چاله تکتونیکی منطقه، دشت چالدران به ارتفاع متوسط ۱۸۰۰ متر می باشد. دو حوضه بسته در شمال شهر ماکو به چشم می خورد که به نحو متفاوتی از نیروهای تکتونیک متأثر شده اند، به همین دلیل به آنها حوضه های بسته اطلاق می کنیم .

نحوه تشکیل آنها بدین ترتیب تصوّر شده است که در منطقه کوهستانی شمال ماکو که منحصراً "دارای یک مجرای خروج آبها بوده است، با فعال ترشدن نیروهای داخلی زمین و ظهور فعالیت آتششانی، روانه های سیال درجهت شب توبوگرافی و به ویژه در دره رودخانه زنگمار جریان یافته اند. این امر به بالا آمدن سطح بستر و نهایتاً "به انسداد دره رودخانه زنگمار منجر شده و درنتیجه حوضه های بسته شکل گرفته اند. شهر سیه چشم و بالغ برقیصد روستا در این چاله های تکتونیکی و حوضه های بسته مستقر شده اند. (نقشه شماره ۲)

عبور رودخانه زنگمار از ناهمواری کوهستانی واقع در ۵ کیلومتری جنوب ماکو، از دیگر اثرات نیروهای تکتونیکی در سورفوز نز منطقه می باشد. رودخانه زنگمار رأس طاقدیس را - که حدوداً ۲۷۰۰ متر

ارتفاع داشته - بربرد و به صورت "کلوز" از طاقدیس عبور کرده است . این نحوه عبور رودخانه از ناهمواری رسوبی حالت عدم تطبیق را پیش می آورد که در توجیه آن دو دلیل را می توان ذکر نمود :

۱- احتمال وجود یک پیشینه رود (آنته سه دانس) قبل از مرحله چین خوردگی رسوبات اولیگومیوسن و پرمین . بدین ترتیب که رودخانه زنگمار در روی یک سطح هموار جریان داشته است . در طی دوره های زمین شناسی که ناهمواری کوهستانی به تدریج ارتفاع یافته ، رودخانه نیز بدون توجه به بالآمدگی تدریجی ، به حفر بستر مشغول گشته و نهایتاً " شکل فعلی ساخته و پرداخته شده است .

۲- یا اینکه رودخانه زنگمار از گسل عمود بر محور چین خوردگی استفاده کرده و در امتداد مسیر گسل جریان یافته است . با توجه به امتداد طولی رودخانه که بدون پیچ و خم قابل ملاحظه ای جریان داشته است و همچنین با ملاحظه شب بسیار تندریواره های رودخانه (آینه گسل) ، دلیل دوم محکم و متقن به نظر می رسد . (نقشه شماره ۴)

وجود گسل و جریان رودخانه از مجرای حاصل از آن ، باعث شده که آب رودخانه های اصلی و فرعی از هر طرف بدین سو سرازیر شود و در نتیجه محیط بسیار مناسبی جهت احداث سد در اراضی هموار و مسطح مجرای رکو هستان پیدید آید و به همین دلیل وزارت نیرو " سد بارون " را در حوالی روستای بارون احداث نموده است . از عمدۀ ترین تشکیلات لیتو لوزیک منطقه ماکو ، جریان روانه های بازالتی می باشد که با تأثیر پذیری از فعالیت نیروهای تکتونیکی - موقعیت توپوگرافی سابق و نحوه عمل نیروهای فرسایش به اشکال مختلفی درآمده و پدیده های سورفولوزیک متتنوعی را به وجود آورده است .

در ابتدای مطالعه ، با توجه به نقشه زمین شناسی ، چنین برمی آمد که روانه های بازالتی موجود در منطقه ، از آتشفسان های آرارات بزرگ

و کوچک و تندورک که تقریباً در فاصله ۴۰ - ۳۵ کیلومتری شمال غرب شهر بازرگان در داخل مرزهای کشور ترکیه قرار دارند، منشاء گرفته‌اند. (منبع شماره ۲) حال آنکه روانه‌های بازالتی هرقدر هم سیال باشند، با طی مسافتی حدود ۳۵ کیلومتر و تماس با آتمسفر قدرت جریان خود را ازدست داده و سرد و مقاوم می‌گردد. با ملاحظه نقشه شماره ۵، مشخص می‌گردد که روانه‌های بازالتی از مجاورت مرز ایران و ترکیه در شمال شرقی مرز بازرگان شروع و تا ۴۰ کیلومتری مشرق ماکو، گستردگی شده است. با احتساب فاصله آتشفسان آرارات با حد نهایی گسترش بازالت، وسعت روانه‌های بازالتی در امتداد خطی بالغ بر ۹۰ کیلومتری گردد. بنابراین برخلاف گزارش سازمان زمین شناسی به نظر نمی‌رسد که گدازه‌های بازالتی منطقه ماکو، ناشی از جریان گدازه‌های آتشفسان آرارات یا تندورک در غرب بازرگان باشد. عامل اصلی ظهور گدازه‌های بازالتی، وجود گسل‌ها و شکاف‌های عمیقی بوده است که از مرز پوسته گذشته و مواد درونی را در سطح زمین ظاهر ساخته است. به این گدازه‌های "گدازه‌های شکافی" اطلاق می‌گردد.

باتوجه به فرم استقرار و شکل بندی گدازه‌های آتشفسانی ۴ شکل مورفولوژی را می‌توان تشخیص داد :

۱- دریاچه آتشفسانی :

در شرق بازرگان، محدوده‌ای به شکل چاله وجود داشته است که توسط کوههای اطراف دربرگرفته شده و به نظر نمی‌رسد که در اثر فرآیندهای تکتونیکی شدید و همزمان با فعالیت آتشفسانی آرارات و تندورک مواد درونی زمین از این چاله سوبسیدانس، به سطح زمین راه یافته است .

۲- جریان روانه از مسیر گسل :

بر اثر ریفت‌ها و گسل‌های شدید درناحیه کوهستانی، شکاف عظیمی به وجود آمده که ضمن ایجاد فاصله بین دو بخش کوهستانی، گدازه‌های


بازالتی سرتاسر امتداد دره کوهستانی را دربرگرفته و رودخانه زنگمارچای در امتداد شکاف حاصله، گدازه‌های بازالتی را نیز حفر کرده است.

۳- پدیده‌مزا :

ظهور روانه از شکاف گسل و جریان آن در سطح دشت و نهایتاً "حفر آنها" توسط رودخانه زنگمارو ساری سو، پدیده مورفولوژیک "مزا" را به وجود آورده است، ارتفاع دره رودخانه از سطح مزا حداقل به ۱۵ متر در جوار روستای هندوار می‌رسد.

۴- منشورهای بازالتی :

از پدیده‌های جالبی که روانه‌ای بازالتی در شمال غربی ماکو و در حوالی روستای کلیسا کنده به وجود آورده است، منشورهای بازالتی یا ساخت منشوری^۱ گدازه‌ها می‌باشد، صرف نظر از خصوصیت شیمیائی گدازه‌ها، برخورد بلا فاصله با آتمسفر و هوای آزاد، سبب انجماد سریع گدازه‌ها گشته و اعمال فرسایش مکانیکی خاص این نوع لیتلولوژی، مورفولوگی مذکور را در دره اوجیق، سبب شده است.



نتیجه :
=====

منطقه ماکوبه سبب وجود امکانات گستردۀ‌ای که طبیعت ارزان‌تری داشته است، محل مناسبی جهت اجرای طرح‌های توسعه کشاورزی و صنعتی می‌باشد که مطمئناً علاوه بر رفع نیازهای منطقه درجهت رفع نیازهای استان آذربایجان غربی نیز نقش قابل ملاحظه‌ای را ایفا خواهد نمود. با قبول این نکته که ایران عموماً "منطقه‌ای خشک و کم آب بوده و همواره از مشکل کم آبی و باشوری آبهای زیرزمینی رنج می‌برد، منطقه" ماکوبا داشتن حدود ۴۰۵ - ۳۵۰ میلی متر بارش سالیانه و با بهره‌گیری از چشمۀ‌های طبیعی، از این نظرنسبت به دیگر مناطق ایران، "تقریباً" با مشکل کمتری روبرو است. علاوه بر این، با توجه به اقلیم سردکوهستانی حاکم بر منطقه، استقرار اراضی کشاورزی در بین مرفوعات و مدت نسبتاً کمتر تابش اسراری خورشیدی هوای آن غالباً "ابرآلود" می‌باشد که این امر باعث کاهش تبخیر و درنتیجه کاهش نیازگی‌ها به آب می‌گردد.



وجود اراضی مسطح و قابل کشت در دشت‌های باز رگان، اوایلیق، بهبهه - جیک و خصوصاً "دشت چالدران" - که وسیع ترین دشت منطقه‌ماکواست - از دیگر عوامل مساعد برای رشد کشاورزی و بالمال رشد اقتصادی منطقه می‌باشد.



اگر تاحال بازده محصولات زراعی منطقه چشمگیر و قابل ملاحظه نبوده است، نه به دلیل عدم استعداد اراضی، بلکه بیشتر به خاطر فقدان ماشین آلات کشاورزی و عدم سرمایه‌گذاری لازم، در این بخش می‌باشد. ذکر این نکته جالب است که وزیر کشاورزی نیوزیلند که چندی پیش بـه همراهی معاونین وزارت کشاورزی برای ارزیابی امکانات کشاورزی منطقه ماکوبه این محل عزیمت کرده بود اطهار داشته است که اگر این اراضی در اختیار مأبود، هر دو استان آذربایجان شرقی و غربی از واردات مواد غذایی بـی نیاز می‌شند.

منابع :

- ۱- دیباچه‌ای بر زمین‌شناسی ایران
تألیف محمد حسن نبوی ، انتشارات سازمان زمین‌شناسی کشور، ۱۳۵۵
- ۲- نقشه زمین‌شناسی و گزارش نقشه زمین‌شناسی چهارگوش ماکو
مقیاس ۱:۲۵۰۰۰۰ ، انتشارات سازمان زمین‌شناسی کشور
- ۳- پژوهش‌های جغرافیائی
انتشارات دانشگاه تهران ، موسسه جغرافیا ، شماره ۲۳ ،
مقاله تحول ناهمواریهای ایران در کواترنر تألیف دکتر فرج... محمودپور
- ۴- نقشه توپوگرافی ۱:۲۵۰۰۰۰ : اقدیر سازمان جغرافیائی کشور ۱۳۵۱
(ترسیم نقشه‌ها توسط دانشجویان جغرافیای طبیعی :
خانم بیات خطیبی و خانم فریبا کرمی)

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پortal جامع علوم انسانی






مسیر رودخانه زنگمار (۵ کیلومتری جنوب‌پیشی ماکو)

نیمهای پرین	تغیلات قم
نیمهای ریز	(ست اهد و تکلیفها)

ش: ۴




پروشکا و علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

پرستال جامع علوم انسانی

منابع :

- ۱- دیباچه‌ای بر زمین‌شناسی ایران . تألیف محمد حسن نبی‌سوی ، انتشارات سازمان زمین‌شناسی کشور ۱۳۵۵ .
- ۲- نقشه زمین‌شناسی و گزارش نقشه، زمین‌شناسی چهارگوش ماکسو. مقیاس ۲۵۰۰۰۰ : ۱ ، انتشارات سازمان زمین‌شناسی کشور .
- ۳- پژوهش‌های جغرافیائی . انتشارات دانشگاه تهران ، مؤسسه جغرافیا ، شماره ۲۲ ، مقاله تحول ناهمواریهای ایران در کواتر نر تألیف دکتر فرج ... محمود پور .
- ۴- نقشه، توبوگرافی ۲۵۰۰۰۰ : ۱ اقدیر . سازمان جغرافیاشی کشور ۱۳۵۱ ، (ترسیم نقشه‌ها توسط دانشجویان جغرافیای طبیعی : خانم بیات خطیبی و خانم فریبا کرمی) .



پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی