



میزان استرس و شیوه‌های مقابله در مراقبین بیماران اسکیزوفرنیک مزمن و بیماران دیالیزی مزمن

اسحق شاه محمدی^{*}، دکتر سید اکبر بیان زاده^{**}، دکتر جمشید احمدی^{***}

چکیده

این پژوهش از نوع پس رویدادی است که به منظور بررسی میزان استرس و سبک مقابله با آن در مراقبین پوگروه از بیماران اسکیزوفرنیک مزمن و دیالیزی مزمن آنجام گرفت. آزمودنیهای پژوهش را ۲۰ نفر (۹ مرد و ۱۱ زن) از مراقبین بیماران اسکیزوفرنیک و ۲۰ نفر (۱۳ زن و ۷ مرد) از مراقبین بیماران دیالیزی تشکیل داده‌اند. هر گروه شامل: مادران، زنان، شوهران و فرزندان بودند که به روش چند مرحله‌ای از میان پرونده‌های بیماران موجود در مرکز درمانی شهر شیراز انتخاب و از نظر میزان درآمد خانواده، تعداد اعضاء، میزان تحصیلات و سن همتاسازی شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه QRS-SF، چک لیست CS-R و MMPI گردآوری و با استفاده از آزمون ⁴ و تحلیل واریانس یک و دو عاملی تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد: بین میانگین استرس، شیوه‌های مقابله و اختلالات روانی در دو گروه مورد بررسی تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. جنسیت بیماران در میزان استرس آزمودنیها تأثیر معنی‌داری نداشت. گروههای مراقب در میزان استرس و سبک مقابله تفاوت معنی‌داری نداشتند. اما زنان مراقب در مقیاسهای PI, Hy, D از مقیاسهای MMPI بطور معنی‌داری نسبت به مراقبین مرد نمره بیشتری را بدست آورده‌اند. همچنین مراقبین بیماران اسکیزوفرنیک با علایم منفی بطور معنی‌داری نسبت به مراقبین بیماران با علایم مشبت استرس بیشتری را گزارش نموده‌اند.

کلید واژه: استرس، مراقبین، مقابله، اسکیزوفرنیای مزمن، بیماران دیالیزی

<p>فرهنگها فراگرفته‌اند و یا خود ابداع نموده‌اند، در این زمینه کوشیده‌اند (اسداللهی و عباسعلی زاده، ۱۳۷۲).</p> <p>توانبخشی (۳) بیماری‌های روانی و جسمی از اهمیت بسیاری برخوردار است و از دیر باز خانواده و اجتماع با شیوه‌هایی که از پدران و نیاکان خود آموخته‌اند، از سایر</p>	<p>نقش خانواده، در پیشگیری (۱)، درمان (۲) و</p> <p>بیماری اسکیزوفرنیا (۴) از پیچیده‌ترین و ناتوان کننده‌ترین روان‌پریشی‌ها به شمار می‌آید که هنوز ماهیت</p>
---	---

* کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، شیراز، خیابان خلیلی، کلینیک اعصاب و روان شهید دکتر رهنمون.

** دکترای توانبخشی روانی، عضو هیئت علمی انتستیتو روانپزشکی تهران، تهران، خیابان طالقانی، بین بهار و شریعتی، کوچه جهان، پلاک ۱.

*** روانپزشک، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز، شیراز بیمارستان حافظ.

اسکیزوفرینیا دچار بیماریهای خفیف روانی شده‌اند.
همچنین گویندات^(۷) و چاتورودی^(۸) (۱۹۹۲) رفتارهای مربوط به فعالیت مانند کندی و ناتوانی در انجام امور مربوط به بهداشت شخصی و ارزواهی اجتماعی را مشکل ساز ترین رفتارها از دید خانواده‌ها گزارش نمودند. صالح (۱۹۹۴) در گزارش خود علت پریشانی خانواده‌ها را علایم فعال اسکیزوفرینیا دانست.

شخص بیمار که نیاز به پرستاری دارد، بخشی از نظام خانواده است و بنابراین هر گونه تغییری در وظایف شخص بیمار در الگوهای خانواده هم تأثیر می‌گذارد و این تغییرات در الگوها بر تحمل و طاقت بیمار اثر می‌گذارند (برنشتاين^(۹) و همکاران، ۱۹۸۷).

وجود فرضیه‌های درباره ارتباط بین استرس و بیماریهای جسمی سابقه‌ای طولانی دارد. این فرضیه‌ها معمولاً روی واقعیت شروع یک سیکل معیوب که در آن استرس و علایم جسمی بطور دو جانبه تشدید می‌شود و همچنین بر جستجوی ماهیت آن تأکید دارند. بررسیها نشان داده‌اند که استرس هم علت بیماری و هم برآمد و پیامد آن است. روش‌های سازگاری به کار گرفته شده می‌تواند چگونگی بهبود بیماری را پیش بینی کند. همچنین عوامل مؤثر در سرور بیماریها را به شرح زیر معرفی نموده‌اند: تجربه خانواده در مورد استرس، رفتار آنهای، واقعیت حادثی که سبب استرس می‌شوند، برداشت خانواده از آنچه رخ داده است و منابع موجود برای خانواده جهت سازگاری با آن (همانجا).

هدف کلی این پژوهش بررسی میزان استرس، شیوه‌های مقابله و تعیین میزان اختلالات روانی در مراقبین دارای بیماران اسکیزوفرنیک مزمن و دیالیز مزمن می‌باشد.

1-Castello	2-Brichwood
3-deinstitutionalization	4-Strachan
5-Gibbon	6-Salleh
7-Gopinath	8-Chaturvedi
9-Bernstein	

آن بطور کامل مشخص نشده است. یک درصد از جمعیت دنیا گرفتار آن هستند و تیجه درمانی آن از دیدگاه متخصصان رضایت‌بخش نیست (کاستلو و کاستلو^(۱۰)، ۱۳۷۳).

بررسیهای همه‌گیرشناسی در اروپا و ایالات متحده نشان می‌دهند که بیماران مبتلا به اسکیزوفرینیا بیوژه مردان تمایل به ازدواج ندارند، $\frac{2}{3}$ آنها پس از نخستین حمله در کنار خانواده می‌مانند و بار عظیم مشکلات خود را بر خانواده تحمیل می‌کنند (بریچوود^(۱۱)، ۱۹۸۸).

از سوی دیگر در سالهای اخیر رویکرد مؤسسه‌زدایی^(۱۲) در روانپزشکی و تأکید بر بازگشت بیماران از مؤسسات و مراکز نگهداری به محیط خانواده سبب افزایش این فشار بر روی اعضاء خانواده گردیده است (همان‌جا). از آنجاکه بیماری اسکیزوفرینیا و بیماری کلیه منجر به دیالیز هر دو از بیماریهای مزمن شونده بوده و عضو مبتلا را برای سالهای بسیار طولانی (شاید بتوان گفت تا پایان عمر) به درجات مختلف از نظر کارکردهای فردی، خانوادگی و اجتماعی دچار محدودیت می‌کند، می‌تواند تأثیر استرس زای شدیدی بر مراقبین به ویژه سایر اعضای خانواده بگذارد.

امروزه در حالیکه راهبردهای مؤثر بر کاهش عوارض روانی ناشی از نگهداری عضو بیمار در خانواده گسترش می‌یابد، امور مربوط به دوران نقاوت و درمان بیماران مبتلا به اسکیزوفرینیا در جهت تأکید بیشتر بر فراهم آوردن حمایت و امکان درمان در خانواده‌های دارای عضو مبتلا به اسکیزوفرینیا تغییر یافته‌اند (استراکن^(۱۳)، ۱۹۸۶).

آمار روشنی از شمار خانواده‌هایی که درگیر مراقبت از افراد مبتلا به این بیماری هستند در دست نمی‌باشد. اما مراقبت خانواده‌ها هنوز امری اساسی است. گیبون^(۱۴) و همکاران (۱۹۸۴) گزارش نمودند که ۵۰ درصد از بیماران مبتلا به اسکیزوفرینیا به جمع خانواده‌ها بر می‌گردند.

بررسیها نشان داده‌اند که فشار سنگینی بر روی این خانواده‌ها وجود دارد. صالح (۱۹۹۴) نشان داد که ۲۳ درصد از مراقبین در ارتباط با مراقبت از بیماران مبتلا به

روشن پژوهش

ابزار مورد استفاده در این پژوهش به شرح زیر بوده است:

- ۱- پرسشنامه منابع و استرس^(۱): فرم ۵۲ سؤالی آن توسط فردریک^(۲) و همکاران (۱۹۸۳) به منظور بررسی استرس خانواده‌های دارای فرزند عقب مانده ذهنی یا سایر معلولیتها و بیمار مزمن تهیه و به چهار مقیاس کوچک تقسیم گردید. نخستین مقیاس شامل مشکلات خانواده و مراقبین، مقیاس دوم، نگرانی و بدینهی مراقبین نسبت به آینده بیمار، مقیاس سوم، ارزیابی ویژگیهای رفتاری بیمار به عنوان یک منبع استرس و مقیاس چهارم ناتوانیهای جسمی بیمار را به عنوان یکی دیگر از منابع استرس مورد ارزیابی قرار می‌دهد. این پرسشنامه پس از ترجمه توسط بیان زاده و همکاران با

پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های پس رویدادی است. آزمودنیهای پژوهش را ۲۰ نفر از مراقبین بیماران اسکیزوفرنیک مزمن (۲۰-۵۴ ساله) شامل گروههای: مادران (۸ نفر)، زنان (۵ نفر)، شوهران (۵ نفر) فرزندان (۲۲-۵۵ ساله) شامل گروههای: مادران (۶ نفر)، زنان (۶ نفر)، شوهران (۶ نفر)، فرزندان (۲ نفر) تشکیل داده‌اند که از میان پروتنهای موجود در مراکز درمانی شهر شیراز به روش چند مرحله‌ای انتخاب و در زمینه متغیرهای اصلی همچون میزان درآمد خانواده، تعداد اعضاء، سطح تحصیلات و سن همتاسازی شدند (جدول ۱).

جدول ۱- مقایسه خانواده‌ها و مراقبین دو گروه مورد بررسی بر حسب میزان درآمد

گروههای مورد بررسی	خانواده‌های دارای بیمار دیالیزی		خانواده‌های دارای بیمار		مبتلا به اسکیزوفرنیا	میانگین	سطح تحصیلات
	آزمون آ	انحراف معیار	آزمون آ	انحراف معیار			
سن	N.S.	۱/۳۴	۲/۹	۱/۲۸	۲/۹۵		
تعداد اعضای خانواده	N.S.	۹/۲۶	۲۹/۱۵	۱۰/۶۴	۳۸/۸۵		
درآمد بیاریا	۰/۱۸۱	۱/۷۷	۵/۱۵	۱/۶۴	۵/۲۵	۳۲۲۵۰۰	
	N.S.	۱۰۲۶۲۷	۳۱۱۷۵۰	۷۶۹۹۷/۹			

رفتاری تهیه و اعتبار و پایایی آن در سه پژوهش جداگانه بررسی شد. این آزمون پس از ترجمه و تجدید نظر توسط ابراهیمی (۱۳۷۱) از نظر اعتبار و پایایی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج بدست آمده نشانده‌نده اعتبار و پایایی مقیاسها بود.

۳- پرسشنامه شخصیتی چند وجهی مینه سوتا^(۸): این پرسشنامه برای ارزیابی عینی برخی از ویژگیهای

اصلاحات لازم، پایایی و اعتبار آن با ارزیابیهای مختلف به اثبات رسیده است. (ریحانی، ۱۳۷۴). به دلیل پایین بودن سطح تحصیلات آزمودنیها پرسشنامه توسط پژوهشگر تکمیل گردیده است.

۲- چک لیست مهارتهای مقابله‌ای CS-R^(۹): این پرسشنامه دارای ۷۲ پرسش و ۱۸ مقیاس فرعی مقابله می‌باشد که شامل: ۵ مقیاس مفهومی دارای جنبه‌های مقابله متمرکز بر حل مسئله، ۵ مقیاس جنبه‌های مقابله متمرکز بر عاطفه، ۳ مقیاس مقابله‌های کمتر مفید و ۵ مقیاس نیز، مقابله‌های غیر مؤثر است. این فهرست علیم توسط کارور^(۴)، شیر^(۵) و ویتروب^(۶) (۱۹۸۹) بر اساس الگوی لازاروس^(۷) از استرس و الگوی خود نظم بخشی

- 1-Questionnaire on Resources and Stress - Short Form
- 2-Friedrich
- 3-Coping Strategies-Revised
- 4-Carver
- 5-Scheier
- 6-Weintraub
- 7-Lazarus
- 8-Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI)

آمار روشنی از شمار خانواده‌هایی که درگیر مراقبت از افراد مبتلا به این بیماری هستند در دست نمی‌باشد. اما مراقبت خانواده‌ها هنوز امری اساسی است.

آزمون در مورد تمامی آزمودنیها تکمیل شد و نتایج به دست آمده با استفاده از آزمون α و تحلیل واریانس یک و دو عاملی بررسی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته‌های پژوهش

نتایج بررسی روش‌نگر سطح فشار و مشکلات خانواده‌ها در ارتباط با مراقبت از اعضاء بیمار خانواده می‌باشد. اما همانطور که در جدول ۲ می‌توان ملاحظه نمود آزمون α تفاوت معنی‌داری بین دو گروه مورد بررسی از نظر میزان استرس نشان نداد.

توضیح اینکه تنها در خرده مقیاس ویژگیهای رفتاری بیمار، مراقبین اسکیزوفرنیک مزمن نسبت به مراقبین بیماران دیالیز مزمن بطور معنی‌داری در سطح $P < 0.05$ میزان استرس بیشتری داشتند.

این بررسی همچنین آشکار نمود که مراقبین بیماران با نقشهای مختلف نظیر مادران، زنان، شوهران و فرزندان در میزان استرس تفاوت معنی‌داری را تجربه نکردند اند این یافته در میان هر دو گروههای مراقب بیماران یعنی اسکیزوفرنیک و دیالیز مزمن یکسان بود.

اصلی شخصیت که در سازگاری فردی و اجتماعی مؤثر می‌باشد، ساخته شده است. فرم کوتاه شامل ۷۱ سؤال است که دارای ۳ میزان روانی و ۸ مقیاس بالینی است که توسط اخوت (۱۳۵۲) در دو مطالعه مورد بررسی قرار گرفته و نتایج نشانده‌نده ارزش تشخیصی قابل ملاحظه این پرسشنامه بوده است.

برای اجرای پژوهش نخست با مراجعه به سه مرکز روانپزشکی مستقر در شهر شیراز و بررسی پرونده‌های این بیماران در چند سال اخیر تعداد ۱۰۰ پرونده از پرونده‌های بیماران اسکیزوفرنیک مزمن انتخاب و از میان این تعداد ۲۰ پرونده که دارای معیارهای مورد نظر در پژوهش بودند انتخاب و با مشخص نمودن افراد مراقب آنها، با مراجعه یا تماس تلفنی از آنها خواسته شد که در محل کار پژوهشگر یا محل بستره بیمارشان حضور یابند و به پرسشنامه‌ها پاسخ دهند. در مورد بیماران دیالیزی نیز با مراجعه به دو مرکز درمانی این بیماران در شهر شیراز تعداد ۲۰ نفر از مراقبین بیماران انتخاب و با متغیرهای اصلی گروه آزمایشی مانند: سطح درآمد خانواده، تعداد اعضاء، سن و تحصیلات مراقبین همتا سازی شدند. سپس هر سه

Andeeshet
Va
Raftar
اندیشه رفتار
۷۰

جدول ۲- نتایج آزمون α در مورد میزان استرس در دو گروه مورد بررسی

گروهها	میزان استرس	
	(n=۲۰)	(n=۲۰)
مشکلات خانواده و مراقبین بیمار	میانگین انحراف معیار	میانگین انحراف معیار
نگرانی و بدینی نسبت به آینده بیمار	۱۱/۲	۲/۷۷
ویژگیهای رفتاری بیمار	۱۱/۱	۲/۲۸
ناتوانیهای جسمی بیمار	۹/۵۵	۲/۸۹
کل	۹/۲۹	۲/۴۱
	۹/۲۹	۳/۵۵
	۱۰/۱۹	۳/۶۸
	۵/۳۵	۱/۷۱
	۱۱/۷	۲/۴۳
	۱۲/۲	۲/۷
	۱۱/۵	۲/۵۲
	۱۱/۲	۰/۳۴۸

۷۰/۰۹/۱۰/۲۸/Summer & Fall ۱۹۸۷
سال/ فصل / شماره / سال

مشاهده نشد (جدول ۴).

همینطور با انجام آزمون t بین مقیاسهای روایی و بالینی MMPI در دو گروه مورد بررسی بجز در مقیاس Hy (گرایشهای هیستریک) تفاوت معنی داری وجود نداشت. در این مقیاس مراقبین بیماران دیالیزی تفاوت معنی داری در سطح $P < 0.05$ نسبت به مراقبین بیماران اسکیزوفرنیک داشته‌اند (جدول ۵). همچنین نتایج این بزرگی اسکیزوفرنیک با این زنان مراقب بیماران اسکیزوفرنیک و شوهران مراقب بیماران اسکیزوفرنیک مزمن در مقیاسهای بالینی Hy (گرایشهای هیستریک)، Pt (خستگی روانی) و D (افسردگی)، نمرات زنان بیش از نمرات مردان بوده است.

به منظور تعیین اثر جنسیت بیماران بر استرس مراقبین در دو گروه مورد بررسی نتایج تحلیل واریانس دو عاملی تفاوت معنی داری در بین گروههای مورد بررسی از نظر تأثیر جنسیت بیماران بر استرس مراقبین نشان نداد. نکته حائز اهمیت در یافته‌های این بررسی این است که مراقبین بیماران اسکیزوفرنیک مزمن با علایم منفی بطور معنی داری استرس بیشتری را نسبت به مراقبین بیماران با علایم مثبت تجربه نموده‌اند (جدول ۳).

همچنین با انجام آزمون t بین شیوه‌های مقابله دو گروه مورد بررسی در هیچ یک از ۴ مقیاس مهارت‌های مقابله‌ای (مقابله متمرکز بر حل مسئله، مقابله متمرکز بر عاطفه، مقابله کمتر مفید و مقابله غیر مؤثر) تفاوت معنی داری مشتمل در میزان استرس

جدول ۳- نتایج آزمون t در دو گروه مراقبین بیماران اسکیزوفرنیک با علایم مثبت در میزان استرس

نمره t	نمودار انحراف معیار میانگین	مراقبین بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیک		مراقبین بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیک با علایم منفی ($n=11$)		نمره t	نمودار انحراف معیار میانگین	مراقبین بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیک		نمره t	نمودار انحراف معیار میانگین	نام شیوه
		با علایم مثبت ($n=9$)	با علایم منفی ($n=9$)	با علایم مثبت ($n=11$)	با علایم منفی ($n=11$)			با علایم مثبت ($n=9$)	با علایم منفی ($n=9$)			
۱/۵۲۲	۲/۷۷	۱۰/۷۳	۱/۷۷	۱۲/۴۴	مشکلات خانواده و مراقبین بیمار							
۱/۵۱۷	۳/۱۷	۱۱/۳۶	۱/۶۲	۱۳/۲۲	نگرانی و بدینه نسبت به آینده بیمار							
۲/۰۸۳	۲/۰۵	۱۰/۷۳	۲/۲۳	۱۲/۸۹	ویژگیهای رفتاری بیمار							
۳/۰۰۷	۰/۹۶	۴/۳۶	۱/۶۲	۶/۰۵	ناتوانیهای جسمی بیمار							
۲/۴۵۳	۳/۷۳	۹/۳۰	۳/۳۱	۱۱/۲۸	کل							

جدول ۴- نتایج آزمون t در زمینه تفاوت بین سبک مقابله دو گروه مورد بررسی

نمره t	نمودار انحراف معیار میانگین	مراقبین بیماران دیالیزی		مراقبین بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیک		نمره t	نمودار انحراف معیار میانگین	مراقبین بیماران دیالیزی		مراقبین بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیک		نام شیوه
		($n=20$)	($n=20$)	($n=20$)	($n=20$)			($n=20$)	($n=20$)	($n=20$)	($n=20$)	
۰	۲/۹۱	۱۱/۰	۲/۹۷	۱۱/۵	مقابله متمرکز بر حل مسئله							
۰/۴۰۵	۱/۹۶	۱۳/۶۵	۲/۵۶	۱۲/۹۵	مقابله متمرکز بر عاطفه							
۰/۹۰۷	۱/۳۶	۵/۴	۱/۵۳	۵/۸۵	مقابله کمتر مفید							
۰/۰۳۸	۳/۷۲	۱۰/۴	۴/۲۸	۱۱/۱	مقابله غیر مؤثر							

جدول ۵- میانگین و انحراف معیار نمرات دو گروه مورد بررسی بر حسب میزان مشکلات روانی و شخصیتی مراقبین

نمره t	نمره t سطح معنی‌داری	مراهقین بیماران اسکیزوفرنیک (n=۲۰)		مراهقین بیماران اسکیزوفرنیک (n=۲۰)		گروهها مقیاسهای MMPI
		انحراف معیار میانگین	انحراف معیار میانگین	انحراف معیار میانگین	انحراف معیار میانگین	
-1.36	N.S.	-0.51	1/10	-0.8	1/4	L
-1.90	N.S.	1/75	2/95	2/68	2/6	F
2/8	N.S.	2/59	8/8	8/9	0/113	K
2/16	N.S.	2/17	6/8	6/3	0/714	Hs
2/69	N.S.	2/88	12/45	10/65	1/166	D
2/37	P<%.5	2/56	12/10	12/4	2/187	Hy
2/04	N.S.	2/46	10/0	9/65	1/164	Pd
2/28	N.S.	1/91	5/1	2/95	0/220	Pa
2/52	N.S.	2/77	9/1	8/25	1/490	Pt
2/06	N.S.	2/44	10/1	8/45	1/506	Sc
1/29	N.S.	1/87	5/3	5/1	0/363	Ma

بحث در تاریخ

این پژوهش با هدف بررسی میزان استرس، شیوه‌های مقابله و اختلالات روانی در مراقبین بیماران اسکیزوفرنیک مزمن و مقایسه آن با مراقبین بیماران دیالیزی مزمن صورت گرفت. تایج بدست آمده نشان می‌دهد که به طور کلی دو گروه از نظر میزان استرس با هم تفاوت معنی داری ندارند، اما تنها در خرده مقیاس ویژگیهای رفتاری بیمار، مراقبین بیماران اسکیزوفرنیک مزمن نسبت به مراقبین بیماران دیالیزی مزمن، استرس بیشتری نشان دادند ($P < 0.05$). این یافته بر لزوم آموزش‌های ویژه در جهت بهداشت روانی این مراقبین تأکید دارد. همانطور که بیان شد بررسیهای انجام شده در سایر کشورها نشان داده‌اند که مراقبت از بیماران مزمن از جمله بیماران اسکیزوفرنیک و بیماران دیالیزی فشار روانی زیادی را بر خانواده تحمیل می‌کنند (نوری قاسم آبادی، ملکوتی و اثنی عشری، ۱۳۷۴؛ یارو و همکاران، ۱۹۵۵؛ فریمن و سیمون، ۱۹۵۸؛ مندلبروت و فولکارد،

۱۹۶۲؛ فادن و همکاران ۱۹۸۷ به نقل از ولترو^(۱) و همکاران، ۱۹۹۴؛ گیبون و همکاران، ۱۹۸۴) تفاوت در یافته‌های پژوهش حاضر و پژوهش‌های یاد شده را شاید بتوان به دلیل تفاوت‌های فرهنگی در کشور ما و دیگر کشورها دانست. عبارت دیگر در کشور ما، خانواده‌ها نگهداری و مراقبت از یک عضو بیمار را وظیفه خود تلقی می‌کنند و کمتر آنرا یک بار اضافی و تحییل شده می‌دانند از این رو کمتر دچار آسیبهای روانشناختی می‌شوند. اما در سایر کشورها به ویژه کشورهای پیشرفته صنعتی، به دلیل محدودیت سطح روابط عاطفی بین اعضای خانواده از یک سو وجود مؤسساتی که وظیفه نگهداری ایستگونه بیماران را به عهده دارند، اضافی خانواده کمتر خود را مسئول نگهداری عضو بیمار خانواده می‌دانند و اگر در شرایطی قرار گیرند که مجبور به نگهداری

جسمانی، گروه عادی نیز جهت مقایسه انتخاب گردد.

منابع

ابراهیمی، امرالله (۱۳۷۱). مطالعه جنبه‌های روانشناسی سازگاری پس از ضایعه مغزی، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی انتیتو روانپزشکی تهران.

اخوت، ولی الله (۱۳۵۲). پژوهشی در ارزش تشخیصی پرشناسه شخصیت چند جنبه‌ای مینه سوتا. مجله تازه‌های روانپزشکی، سال سوم.

اسداللهی، قربانعلی و عباسعلی زاده، علی (۱۳۷۲). کتاب راهنمای برای خانواده‌های بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی، اصفهان. معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

ریحانی، رضا (۱۳۷۴). بررسی استرس و شیوه‌های مقابله خانواده‌های دارای کودک عقب مانده ذهنی. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی: انتیتو روانپزشکی تهران.

کاستلو، تیمونی و کاستلو، جوزف (۱۳۷۲). روانشناسی نابهنجاری، ترجمه پورافکاری، نصرت ا... تهران: انتشارات آزاده.

نوری قاسم آبادی، ربابه؛ ملکوتی، کاظم؛ اثنه عشری، ربابه (۱۳۷۴). بررسی فشار در خانواده مراقبان اسکیزوفرنیک مزمون ایرانی، ارائه شده در سومین سمپوزیوم سراسری استرس. تهران: دانشگاه علوم پزشکی ایران.

Bernstein, H., Grico, J., & Dete, K. (1987). The family as the context for patient care. In Patricia Minuchin, Salvador Minuchin. (Eds.) *Primary care in the home*.

Brichwood, M. J., Hallett, S. E., & Prestom, M. C. (1988).

Schizophrenia an integrated approach to research and treatment. London: Longman.

Carver, S., Scheier, F., & Weintraub, K. (1989). Assessing coping strategies: A theoretically based approach.

عضو بیمار خانواده شوند دچار آسیب روانشناسی بیشتری خواهند شد. تحلیل واریانس تمرات گروههای مختلف مراقب (مادران، زنان، شوهران و فرزندان) در زمینه میزان استرس موجود تفاوت معنی داری را نشان نداد.

یافته دیگر پژوهش نشان داد که جنسیت بیماران در دو گروه مورد بررسی تأثیر معنی داری بر میزان استرس مراقبین ندارد. اما این بررسی نشان داد که بیماران اسکیزوفرنیک با عالیم منفی بطور معنی داری استرس بیشتری را بر مراقبین وارد می‌سازند تا بیماران با عالیم مشبت. گویندات^(۱) و چاتورودی^(۲) (۱۹۹۲) در یک پژوهش گزارش کردند که رفتارهای همراه با خشونت و عصبانیت برای مراقبین، خیلی آزار دهنده تلقی نمی‌گردند، اما شرکت نکردن بیماران در کارهای منزل و ضعف بهداشت فردی آنان بیشتر آزار دهنده بوده است. ولترو و همکاران (۱۹۹۴) در بررسی خانواده‌های بیماران اسکیزوفرنیک و نوروتیک نتیجه گیری می‌کنند که عالیم منفی اسکیزوفرنیا از مهمترین ویژگیهای این بیماری است که خانواده‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد. پژوهش حاضر در ارتباط با شیوه‌های مقابله در دو گروه مورد بررسی تفاوت معنی داری را نشان نداد، همچنین در زمینه اختلالات روانی بین دو گروه مورد بررسی بجز در مقیاس Hy در سایر مقیاسهای MMPI تفاوت معنی داری مشاهده نگردید. در مقیاس Hy مراقبین بیماران دیالیز مزمون نسبت به مراقبین بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا بطور معنی داری اختلال بیشتری را نشان دادند.

محدودیتها و پیشنهادها

از محدودیتهای مهم این پژوهش حجم کم نمونه در دو گروه مورد بررسی و همچنین در گروههای مراقب و نیز نبود گروه عادی جهت مقایسه بود. از این رو پیشنهاد می‌گردد در پژوهش‌های آینده این پژوهش با نمونه‌های بزرگتر اجرا شده و در کنار مقایسه بیماری روانی و

Journal of Personality and Social Psychology, 56,
267-83.

Friedrich, W. N., Greenberg, M. T., & Crnic, K. (1983). A Short-Form of the Questionnaire on Resources and Stress. *American Journal on Mental Deficiency*, 88, 41-8.

Gibbon, S. J., Horn, S. H., Powel, J. M., & Gibbon, J. L. (1984). Schizophrenic patients and thier families. A survey in psychiatric service based on a DGH unit. *British Journal of Psychiatry*, 144, 70-7.


Gopinath, P. S., Chaturvedi, S. K. (1992). Distressing behaviour of schizophrenic patient at home. *Acta*

Psychiatrica Scandinavica, 86, 185-8.

Salleh, M. R. (1994). The burden of care of schizophrenia in Malay families. *Acta Psychiatrica Scandinavica*, 84, 180-5.

Strachan, M. (1986). Family intervention for the rehabilitation of schizophrenia: Toward Protection and coping. *Schizophrenia Bulletin*, 12, 678-98.

Veltro, F., Magliano, L., Lobrake, S. L., Morosini, P. L., & Maj, M. (1994). Burden on key relatives of patients with schizophrenia vs neurotic disorders: A pilot study. *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*, 29, 66-70.



Andeesheh
Va
Raftar
اندیشه و رفتار
۷۴

نکاتی در مورد مصرف فلوکستین (SSRIs)

مهار آنزیمهای اکسید کننده کبدی (انواع P450) توسط SSRIs و اثر آن بر تداخل دارویی رعایت نکات زیر را ضروری می سازد:

۱- فلوکستین سطح TCA را تا ۴ برابر افزایش می دهد. بنابراین در صورت امکان با یکدیگر مصرف نشوند و یا با دوز ۲۵-۳۰ میلی گرم از TCA شروع گردد و در صورت امکان سطح پلاسمایی TCA اندازه گیری شود.

۲- فلوکستین می تواند سطح کلوزاپین را تا ۸۰٪ افزایش دهد که در این صورت خطر تشننج افزایش می یابد.

۳- فلوکستین سطح پلاسمایی نورولپتیک ها را افزایش می دهد.

۴- فلوکستین با بلوک P450-3A3/4 سطح آپرازولام را تا ۳۰٪ افزایش می دهد و ممکن است باعث خواب آلودگی و کندی روانی - حرکتی شود.

Robert E. Litman & et al.

British Journal of Psychiatry/1996/may/Vol: 168