

## حرکت

شماره ۱۱ - ص ص : ۱۰۵ - ۸۹

تاریخ دریافت : ۸/۱۱/۸۰

تاریخ تصویب : ۶/۱۲/۸۰

# مقایسه اثر دو نوع برنامه ویژه تمرینی روی شاخص‌های اسپریومتری و تحمل فعالیت در مصدومین ریوی گازهای شیمیایی جنگی استان خوزستان

دکتر اسماعیل ایدنی<sup>۱</sup> - محسن قنبرزاده

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اهواز - عضو هیأت علمی دانشگاه  
شهید چمران اهواز

## چکیده

در این پژوهش که از نوع نیمه تجربی است، تعداد ۴۵ نفر از بیماران شیمیایی گازهای جنگی استان خوزستان همکاری داشتند. در این تحقیق با استفاده از شاخص‌های اسپریومتری حجم اجباری ثانیه اول ( $FEV_1$ )<sup>۲</sup>، ظرفیت حیاتی اجباری ( $FVC$ )<sup>۳</sup> و قدرت تحمل بدن از طریق آزمون شش دقیقه پیاده‌روی<sup>۴</sup> اندازه‌گیری و ثبت شد. نمونه‌های تحقیق را سه گروه: (الف) گروه تجربی شنا (۱۴ آزمودنی)، (ب) گروه تجربی دو (۱۲ آزمودنی) و (ج) گروه کنترل (۱۴ آزمودنی) تشکیل می‌دادند. روش‌های تمرینی به صورت شنا و دو در گروه‌های مستقل به کار گرفته شد. روش‌های آماری شامل تحلیل داده‌ها، آمار توصیفی، آزمون  $T$  و تحلیل واریانس چند متغیری بود. در جلسات تمرین با استفاده از اصل اضالله بار، شدت تمرینات در گروه‌های تجربی شنا و دو اعمال شد. نتایج پژوهش با احتساب  $P < 0.001$  نشان می‌دهد: بین حجم اجباری ثانیه اول در گروه‌های تجربی و کنترل تفاوت معناداری وجود ندارد. بین ظرفیت حیاتی اجباری در گروه تجربی شنا نسبت به گروه تجربی دو تفاوت معنی داری وجود دارد. بین قدرت تحمل بدن نسبت به تمرین در گروه‌های تجربی شنا و دو نسبت به گروه کنترل تفاوت معنی دار مشاهده شد.

1- Email : idani\_2004@yahoo.co.in

2- Force Expiratory Volum first second

3- Forced Vital Capacity

4- 6 Minute Walking test

## واژه‌های کلیدی

گازهای شیمیایی، بیماری ریوی و اسپیرومتری.

### مقدمه و پیشینه تحقیق

در تقسیم‌بندی بیماران ریوی، بیماران گازهای شیمیایی جنگی در گروه برونشیت<sup>۱</sup> مزمن قرار گرفتند. این بیماری عبارت است از تولید بیش از حد موکوس در درخت تراشه‌ای برونشی، به طوری که بیمار به مدت حداقل سه ماه در سال و بیش از دو سال متواتی دچار سرفه و خروج خلط باشد (هاریسون، ۱۹۹۸) گازهای جنگی با آثار تخریبی متفاوت در انواع مختلف تولید شده‌اند. بیماران ریوی که در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفتند، شامل مصدومین ریوی گازهای شیمیایی جنگی از نوع گاز خردل<sup>۲</sup> هستند.

آثار کشنده این گاز می‌تواند بر روی انسان، حیوان، گیاه یا مواد دیگر مؤثر باشد (جالی، ۱۹۹۲) عوامل تخریب‌کننده گاز خردل شامل: عوامل کشنده آسیب رساننده، ناتوان کننده، ضد گیاه، آتش‌زا، شعله‌آور و دودزا هستند (فرایناگ<sup>۳</sup>، ۱۹۹۰). (۱۷).

### مروری بر تحقیقات گذشته

عموماً گازهای شیمیایی وارد شده در سطح ریه، منجر به تخریب الوئول‌ها<sup>۴</sup> می‌شود، از این‌رو براساس مطالعات انجام شده امکان برگشت‌پذیری آنها میسر نیست (موری<sup>۵</sup>، ۱۹۸۲) عموماً روش‌های ورزشی ارائه شده برای بیماران ریوی یا به صورت شنا یا دو یا روش‌های آزمایشگاهی با استفاده از دوچرخه ثابت<sup>۶</sup> و نوارگردان<sup>۷</sup> بوده است (ریچاردسون<sup>۸</sup>، ۱۹۹۸).

در تحقیق به عمل آمده در کشور آلمان تحت عنوان اثر فعالیت‌های بدنی بر روی نمونه‌های بیماری ریوی، مشاهده شده که پس از انجام یک فعالیت هوایی ۶ دقیقه‌ای به مدت

1- Bronchitis

2- Mustard

3- Frainag

4- Alveolar

5- Murray

6- Ergometer

## مقایسه اثر دونوع برنامه ویژه تمرینی روی شاخص‌های ...

چهار هفته و هفته‌ای سه جلسه، حجم اجباری ریه (*FVC*) به میزان ۲۳ درصد بهبود یافته است (هانیک<sup>۱</sup>، ۱۹۹۸). در یک تحقیق مطالعه‌ای که در دانشگاه پزشکی جورجیا تحت عنوان اثر تمرینات ورزشی بر روی شاخص‌های عملکرد ریوی صورت گرفت، نشان داده شد که حجم اجباری ریه (*FVC*) به میزان ۲۱ درصد بهبود یافته است. مشکلات عمدۀ ظاهری بیماران ریوی شیمیایی گازهای جنگی شامل تنگی نفس، سرفه و محدودیت فعالیت بدن می‌باشد (هاریسون، ۱۹۹۸). در متون پزشکی به علت نادر بودن مصدومین شیمیایی گازهای جنگی (به علت ممنوعیت استفاده از این گازها بعد از جنگ جهانی اول)، با این مقوله به ندرت کار شده است (فرایناگ، ۱۹۹۲). داروهای تجویزی برای این بیماران شامل دو دسته‌بندی کلی است: گروه آنتی‌بیوتیک‌ها<sup>۲</sup> و گشادکننده‌های برونش (وست جانبی<sup>۳</sup>، ۱۹۸۶).

عموماً نتایج تحقیقات ورزشی به عمل آمده بر روی بیماران ریوی، نتایج ضد و نقیضی را نشان می‌دهد. این امر ناشی از نوع استفاده از روش‌های تمرینی است که موجب به دست آمدن نتایج مختلف می‌شود. به طوری که مشخص گردیده آن دسته از فعالیت‌های شدید که برای بیماران ریوی تجویز می‌شود، سبب تنگ شدن مجرای تنفسی، بویژه برونش‌ها می‌شود بر عکس با تعديل برنامه‌های تمرینی، می‌توان بهبودی نسبی را در حجم‌های ریوی مشاهده کرد (خانم ام. ج. بری، ۱۹۹۸)<sup>۴</sup>.

## پژوهشکاران علم انسانی و مطالعات فریبنجی رتبه علمی علم انسانی

### روش تحقیق

زمینه تحقیق تجربی و از نوع نیمه تحریبی است. در این پژوهش بالینی سه گروه بیمار ریوی شیمیایی گازهای جنگی از نوع خردل شرکت داشتند. ابتدا جهت انجام این تحقیق، مجوز لازم از معاونت درمان بنیاد جانbazan انقلاب اسلامی مرکز دریافت شد. سپس براساس مطالعه بروندۀ کلینیکی جانbazan شیمیایی موجود در معاونت درمان بنیاد جانbazan استان خوزستان، تعداد دویست نمونه واجد شرایط جهت انجام تحقیق فراخوان شدند. پس از توجیه روش انجام کار برای نمونه‌های مدعو، تعداد ۱۰۰ نفر نمونه واجد شرایط علاقه‌مندی خود را به صورت

کتبی جهت شرکت داوطلبانه در انجام این پژوهش اعلام کردند. پس از انجام معاینات بالینی توسط پزشک فوق متخصص، نمونه‌های شرکت‌کننده در این پژوهش براساس شرایط ذیل انتخاب شدند:

۱- وجود برونشیت مزمن با درجه انسداد متوسط تا شدید که ناشی از آسیب‌دیدگی گاز خردل باشد

۲- عدم وجود بیماری دیگر ریوی

۳- عدم مصرف سیگار

۴- کنترل وضعیت سلامتی جهت شرکت در برنامه‌های ورزشی

۵- مصرف داروهای رایج به تشخیص پزشک فوق متخصص

(به سبب مصالح اخلاقی پزشکی مقرر شد که کلیه نمونه‌های تجربی الف و ب و کنترل در طول اجرای برنامه داروی تجویزی را مصرف کنند). از این‌رو شرایط مصرف دارو برای کلیه نمونه‌های شرکت‌کننده در اجرای طرح، یکسان بوده است. با توجه به تأثیر داروی گشادکننده برونش بر نتایج اسپیرومتری و به منظور کنترل داروی مذکور، مقرر شد نمونه‌های تحقیق شش ساعت قبل از انجام آزمون اسپیرومتری (در صورت عدم بروز هیجان یا حمله تنفسی) از مصرف و استعمال داروی مذکور خودداری کنند.

پس از انجام این مراحل، نمونه‌های منتخب به صورت تصادفی در یکی از گروه‌های ذیل قرار گرفتند. هر سه گروه در مراحل پیش آزمون و پس آزمون پژوهش شرکت کردند. گروه‌های تحقیق شامل طبقات ذیل بودند:

۱- گروه تجربی الف: شامل ۱۴ نفر داوطلب شرکت در تمرینات شنا

۲- گروه تجربی ب: شامل ۱۲ نفر داوطلب شرکت در تمرینات دو

۳- گروه کنترل ج: شامل ۱۴ نفر داوطلب که واجد شرایط عمومی گروه‌های تجربی الف و ب بودند (جدول ۱).

**فرضیهای و روش انجام کار**

در این پژوهش شش فرض به کار گرفته شد که عبارتند از:

## مقایسه اثر دو نوع برنامه ویژه تمرینی روی شاخص‌های ...

- ۱- تمرینات شنا موجب افزایش شاخص‌های اسپیرومتری<sup>۱</sup> بیماران گازهای شیمیایی جنگی در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل می‌شود.
- ۲- تمرینات دویدن به افزایش شاخص‌های اسپیرومتری بیماران گازهای شیمیایی جنگی در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل منجر می‌شود.
- ۳- بین نتایج تمرینات شنا و دویدن بر روی شاخص‌های اسپیرومتری شیمیایی گازهای چنگی گروه ۱ و ۲ تفاوت معنی داری وجود ندارد.
- ۴- قدرت تحمل بدن در گروه تجربی الف (دویدن) نسبت به گروه کنترل افزایش می‌یابد.
- ۵- قدرت تحمل بدن در گروه تجربی ب (شنا) نسبت به گروه کنترل افزایش می‌یابد.
- ۶- تفاوت معنی داری بین نتایج تحمل بدن در مقابل تمرینات شنا و دویدن نسبت به گروه کنترل وجود دارد.

پس از اعلام آمادگی و شرکت داوطلبانه نمونه‌ها، به صورت تصادفی در گروه‌های الف، ب و ج تحقیق قرار گرفتند. سپس متغیرهای تحقیق طی دو مرحله در گروه‌های تجربی و دو مرحله در گروه کنترل اندازه‌گیری و ثبت شد.

مراحل اندازه‌گیری در گروه‌های تجربی و کنترل شامل قبل از شروع تمرینات و بعد از انجام تمرینات بود (جدول ۱).

### پژوهشکاران علوم انسانی و مطالعات فرنگی

الف - متغیرهای ریوی اندازه گیری شده

۱- ظرفیت حیاتی اجباری ریه ( $FVC$ )

۲- حجم اجباری ثانیه اول ( $FEV_1$ )

ب - اندازه گیری قدرت تحمل بدن

براساس آزمون پیاده‌روی شش دقیقه انجام گرفت (موری، ۱۹۹۶)<sup>۴</sup>

1- Sperometeric

2- Forced Vital Capacity FVC

3- Force Expiratory Volum first secent.  $FEV_1$

4- Walking mints 5 test

### جدول ۱- روش انجام کار در گروه های تجربی و کنترل

متغیرها	مراحل آزمایش پیش آزمون و پس آزمون گروه های تجربی و کنترل	مراحل دو گانه ثبت نتایج
مراحل دوم پایان چهار هفته چهارم (شرایط استراحت)	مراحله اول ابتدای چهار هفته اول (قبل از شروع تمرینات)	پیش آزمون و پس آزمون متغیرها در گروه های تجربی (الف و ب)
اندازه گیری متغیرهای اسپیرومتری، قدرت تحمل بدن	اندازه گیری متغیرهای اسپیرومتری، قدرت تحمل بدن	متغیرهای اندازه گیری شده در گروه های تجربی (الف و ب)
اندازه گیری متغیرهای اسپیرومتری، قدرت تحمل بدن	اندازه گیری متغیرهای اسپیرومتری، قدرت تحمل بدن	متغیرهای اندازه گیری شده در گروه کنترل

برای کنترل شدت ایمنی تمرین، نمونه های تحقیق با نظارت پژوهش عمومی در آزمون بالک شرکت داده شدند. براساس نتایج این آزمون و نشانه علامت بالینی (سرمه، تنگی نفس و خستگی مفرط)، شدت ایمنی تمرین تعیین شد. سپس براساس نتایج آزمون مذکور جهت تمرینات حداکثر ضربان قلب در گروه های تجربی (الف) و (ب) ۱۲۵ ضربه در دقیقه برآورد و ثبت شد. تمرینات ورزشی به کار گرفته شده در دو گروه مستقل شامل تجربی (الف) و (ب) شامل تمرینات ویژه ای بوده که به مدت دوازده هفته و هفتاهی سه جلسه صورت گرفت. بنابراین اصل اضافه بار میزان فعالیت در طول انجام جلسات تمرین از بیست دقیقه آغاز و تا پایان جلسات تمرین به پنجاه دقیقه افزایش یافت. نتایج مربوط به متغیرهای اسپیرومتری ( $FVC$ ) و ( $FEV_1$ ) و قدرت تحمل بدن در گروه های تجربی طی پنج مرحله از انجام تمرینات اندازه گیری و ثبت شد. متغیرها در گروه کنترل که واجد شرایط عمومی گروه های تجربی بودند. طی دو مرحله اول و دوم شامل قبل از شروع تمرینات و پایان تمرینات اندازه گیری و ثبت شد. مرحله ثبت متغیرها در جدول ۱ نشان داده شده است.

## نتایج و یافته‌های تحقیق

یافته‌های تحقیق در دو بخش یافته‌های توصیفی و تحلیلی ارائه می‌شود.

### الف - یافته‌های توصیفی

در جدول ۲ مقادیر مربوط به سن، وزن و قدگروه‌های تجربی شنا و دو و کنترل ثبت شده است.

جدول ۲- میانگین تعداد و انحراف، استاندارد مربوط به سن، وزن و قدگروه‌های تجربی و کنترل

گروه‌های تحقیق	مقادیر	سن	وزن	قد
گروه تجربی (الف) شنا	میانگین	۳۷/۷۱	۶۷/۴۲	۱۷۰/۴۲
	تعداد	۱۴	۱۴	۱۴
	انحراف استاندارد	۸/۱۱	۱۳/۱۵	۷/۴۷
گروه تجربی (ب) دو	میانگین	۳۷/۵۸	۶۲/۳۳	۱۷۱/۶۶
	تعداد	۱۲	۱۲	۱۲
	انحراف استاندارد	۶/۵۷	۹/۳۷	۷/۶۱
گروه کنترل	میانگین	۳۶	۶۵/۸۰	۱۷۸/۹۲
	تعداد	۱۴	۱۴	۱۴
	انحراف استاندارد	۴/۱۱	۱۰/۷۸	۳/۹۸

آنچه در این جدول حائز اهمیت است، نزدیک بودن میانگین سن، وزن و همچنین قد در هر سه گروه تحقیق است. بیشترین شاخص پراکندگی مربوط به وزن شناگران با احتساب انحراف استاندارد ۱۳/۱۵ و کمترین شاخص پراکندگی مربوط به قد گروه کنترل است که با احتساب انحراف استاندارد ۳/۹۸ تعیین شده است.

جدول ۳- معرف میانگین، تعداد و انحراف استاندارد مربوط به آزمون اسپیرومتری  $FEV_1$  گروه‌های تجربی و کنترل

پس آزمون	پیش آزمون	مقادیر	گروه‌های تحقیق
۵۱/۸۵ ۱۴ ۱۹/۸۱	۵۲/۷۱ ۱۴ ۱۹/۹۴	میانگین تعداد انحراف استاندارد	گروه تجربی (الف) شنا
۳۸/۱۶ ۱۲ ۱۹/۱۹	۴۰/۵۸ ۱۲ ۲۱/۹۷	میانگین تعداد انحراف استاندارد	گروه تجربی (ب) دو
۵۳/۷۸ ۱۴ ۲۱/۵۸	۵۳/۵۰ ۱۴ ۲۱/۹۲	میانگین تعداد انحراف استاندارد	گروه کنترل

براساس نتایج جدول ۳، مشاهده می‌شود که بیشترین شاخص پراکندگی در میانگین حجم  $FEV_1$  به مرحله اول اندازه‌گیری گروه شنا و با رقم ۵۲/۷۱ و کمترین شاخص پراکندگی در میانگین حجم مذکور به مرحله دوم اندازه‌گیری گروه دو با رقم ۳۸/۱۶ و بیشترین شاخص انحراف استاندارد به مرحله اول گروه تجربی دو با رقم ۲۱/۹۷ و کمترین شاخص انحراف استاندارد مربوط به مرحله دوم گروه تجربی دو با رقم ۹/۱۹ مربوط است (جدول ۳).

جدول ۴- معرف میانگین، تعداد و انحراف استاندارد مربوط به حجم آزمون  
اسپریومتری  $FVC$  در گروه‌های تجربی و کنترل

گروه‌های تحقیق	مقادیر	پیش‌آزمون	پس‌آزمون
گروه تجربی (الف) شنا	میانگین	۵۸/۲۱	۵۶/۵۷
	تعداد	۱۴	۱۴
	انحراف استاندارد	۱۹/۶۴	۱۹/۵۷
گروه تجربی (ب) دو	میانگین	۴/۷۰۸	۵۱/۶۶
	تعداد	۱۲	۱۲
	انحراف استاندارد	۱۵/۱۶	۲۰/۰۹
گروه کنترل	میانگین	۵۶۸/۸	۵۶/۵۰
	تعداد	۱۴	۱۴
	انحراف استاندارد	۱۷/۰۹	۱۸/۱۰

جدول ۴ معرف آمار توصیفی مربوط به  $FVC$  در گروه‌های تجربی شنا، دو و کنترل است. ثبت شده در دو مرحله در گروه‌های تجربی نشان داده شده است. براین اساس، مشاهده می‌شود که بیشتری شاخص پراکندگی در میانگین حجم  $FVC$  به مرحله پس‌آزمون اندازه‌گیری گروه شنا با رقم ۵۸/۲۱ و کمترین شاخص پراکندگی در میانگین حجم مذکور به مرحله پس‌آزمون اندازه‌گیری گروه دو با رقم ۴۸/۰۸ مربوط است. همچنین بیشترین شاخص انحراف استاندارد به مرحله پیش‌آزمون گروه تجربی دو با رقم ۲۰/۰۹ کمترین شاخص انحراف استاندارد  $FVC$  به مرحله دوم اندازه‌گیری در گروه کنترل با رقم ۱۷/۹۰ مربوط است (جدول ۴).

جدول ۵- مسافت طی شده در دو مرحله اندازه گیری در گروه های تجربی شنا و دو و همچنین دو مرحله اندازه گیری در گروه کنترل مربوط به آزمون پیاده روی شش دقیقه ای

گروه های تحقیق	مقادیر	پیش آزمون	پس آزمون	
گروه تجربی (الف) شنا	میانگین	۶۰۳/۵۷	۵۵۹/۲۸	
	تعداد	۱۴	۱۴	
	انحراف استاندارد	۱۱۸/۸۸	۱۰۳/۶۳	
گروه تجربی (ب) دو	میانگین	۵۶۷/۱۶	۵۰۰/۱۶	
	تعداد	۱۲	۱۲	
	انحراف استاندارد	۱۴۲/۵۸	۱۱۱/۴۰	
گروه کنترل	میانگین	۵۶۸/۷۸	۵۷۰/۳۵	
	تعداد	۱۴	۱۴	
	انحراف استاندارد	۵۷/۴۳	۵۹/۳۹	

دومین متغیر اندازه گیری در گروه های تحقیق، مربوط است به انجام آزمون شش دقیقه پیاده روی که طی دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون در گروه های تجربی (الف) و (ب) و دو مرحله در گروه کنترل اندازه گیری و ثبت شده است. نتایج به دست آمده، نشان می دهد که مقدار مسافت طی شده در گروه های تجربی نسبت به گروه کنترل اختلاف معنی داری است. بیشترین میزان مسافت طی شده در گروه های تجربی به مرحله دوم آزمایش در گروه تجربی (الف) با ۶۰۳/۵۷ و کمترین میزان میانگین مسافت طی شده به مرحله اول آزمایش در گروه تجربی (ب) با ۵۰۰/۱۶ مربوط است. نتایج این آزمون نشان دهنده افزایش مسافت طی شده در مراحل دو گانه آزمایش پیش آزمون و پس آزمون در گروه های تجربی (الف) شنا و (ب) دو است. همچنین عدم تغییر در میزان میانگین مسافت طی شده در دو مرحله انجام آزمایش در گروه کنترل نشان داده شده است (جدول ۵).

### یافته های تحلیلی

در این قسمت نتایج فرضیه ها و مقایسه آنها با نتایج تحقیقات گذشته نشان داده شده است.

فرضیه ۱، تمرینات شنا سبب افزایش شاخص‌های اسپیرومتری بیماران ریوی جنگی می‌شود براساس نتایج حاصل از آزمون  $T$  و جدول فوق مشاهده می‌شود که حجم  $FVC$  اندازه‌گیری شده با احتساب  $P < 0.01$  طی دو مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون در سطح آلفا ۵ درصد به میزان  $0.052$  تفاوت معنی دار وجود دارد، حال آنکه حجم  $FEV_1$  اندازه‌گیری شده در مراحل مذکور به میزان  $P < 0.076$  تفاوت معنی داری هرآن شان نمی‌دهد (جدول ۵).

فرضیه ۲، تمرینات دویدن به افزایش شاخص‌های اسپیرومتری بیماران شیمیایی گازهای جنگی منجر می‌شود. نتایج حاصل از آزمون این فرضیه نشان می‌دهد که براساس نتایج آزمون  $T$  حجم  $FVC$  در گروه تجربی دو با احتساب  $P < 0.01$  طی دو مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون در سطح آلفا ۵ درصد تفاوت معنی دار را نشان می‌دهد، همچنین حجم  $FEV_1$  اندازه‌گیری شده در مقایسه نتایج مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه تجربی دو در سطح آلفا ۵ درصد اندازه‌گیری شده نشان می‌دهد که تفاوت معنی داری بین متغیر مذکور، وجود ندارد.

فرضیه ۳، بین نتایج تمرینات شنا و دویدن بر روی شاخص‌های اسپیرومتری بیماران گازهای شیمیایی جنگی تفاوت معنی داری وجود ندارد. در بررسی به عمل آمده، مشاهده می‌شود که فقط نتایج آزمون  $T$  در خصوص حجم  $FVC$  در گروه شنا تفاوت معنی دار را نشان می‌دهد.

جدول ع. نتایج آزمون  $T$  در گروه‌های همسان مربوط به مقایسه پیش‌آزمون و پس‌آزمون در گروه‌های تجربی و کنترل

اعتبار	df	متغیرها
$0.076$	۱۳	مقایسه $FEV_1$ با $FEV_1-2$ در گروه شنا
$* 0.052$	۱۳	مقایسه $FVC-1$ با $FVC-2$ در گروه شنا
$** 0.008$	۱۳	مقایسه آزمون شش دقیقه پیاده‌روی مرحله اول و دوم در گروه شنا
$0.412$	۱۱	مقایسه $FEV_1$ با $FEV_1-2$ در گروه دو
$0.298$	۱۱	مقایسه $FVC1$ با $FVC2$ در گروه دو
$** 0.002$	۱۱	مقایسه آزمون شش دقیقه پیاده‌روی مرحله اول و دوم در گروه دو
$0.729$	۱۳	مقایسه $FEV_1$ با $FEV_1-2$ در گروه کنترل
$0.435$	۱۳	مقایسه $FVC1$ با $FVC2$ در گروه کنترل
$0.696$	۱۳	مقایسه آزمون شش دقیقه پیاده‌روی مرحله اول و دوم در گروه کنترل

$$P < 0.001 \quad ** \quad P < 0.01 \quad *$$

این حجم در گروه دو و همچنین گروه کنترل تغییر معنی دار را نشان نمی دهد (جدول ۶). حجم  $FEV_1$  و  $FVC$  اندازه گیری شده در سه گروه شنا، دو و کنترل تغییر نکرده است. این عدم تغییر با احتساب  $P < 0.001$  و براساس تحلیل واریانس یک عاملی بین گروه های شنا، دو و کنترل مربوط به اسپر و متری نشان داده شده است (جدول ۷).

جدول ۷. تحلیل واریانس یک عاملی بین گروه های شنا، دو و کنترل مربوط به متغیرهای مرحله یک با دو  $FEV_1$  و  $FVC$  و آزمون شش دقیقه پیاده روی

اعتبار	F	F	متغیرها	محاسبه آزمون	امتیازات	متغیرها
				یک یا آزمون دو		
۰/۴۳۶	۰/۸۴۸	۴۵/۵۰		بین گروه ها	۹۱/۰۰	$FVC$
		۵۳/۶۴		درون گروه ها	۱۹۸۴/۱۹	
		۳۹		مجموع	۲۰۷۵/۹۰	
۰/۱۲۲	۲/۲۲	۹۳/۳۰		بین گروه ها	۱۸۶/۶۱	$FEV_1$
		۴۱/۸۶		درون گروه ها	۱۵۴۸/۹۸	
		۳۹		مجموع	۱۷۳۵/۶۰	
** ۰/۰۰۱	۸/۰۵۶	۱۶۱۹/۸		بین گروه ها	۳۳۲۱۹/۶۱	تسنی عدقیقه پیاده روی
		۱۹۹۹/۶۲		دروز گروه ها	۷۳۹۸۶/۲۸	
		۳۹		مجموع	۱۰۶۰۵/۹۰	

$P < 0.001$ \*

پس از محاسبه آزمون واریانس یک عاملی بین گروه های تجربی شنا، دو و گروه کنترل، مشاهده می شود که در سطح آلفا ۵٪ آزمون شش دقیقه پیاده روی گروه های شنا و دو نسبت به گروه کنترل با درجه اعتبار  $0/001 < P < 0/0001$  و با رقم  $0/001$  تفاوت معنی دار وجود دارد، ولی در سایر متغیرها تغییر معنی داری وجود ندارد (جدول ۷). همچنین مشاهده می شود که بین  $FEV_1$  و پس آزمون مذکور در گروه شنا با سطح آلفا ۵٪ تفاوت معنی داری وجود ندارد. پس آزمون  $FVC$  و پس آزمون  $FVC$  در گروه شنا با سطح آلفا ۵٪ و درجه اعتبار ۰/۹۵ ندارد. بین پیش آزمون  $FVC$  و پس آزمون  $FVC$  در گروه شنا با سطح آلفا ۵٪ و درجه اعتبار ۰/۹۵

مقدار  $0.001 < P$  محاسبه شده با رقم  $0.052 / 0$  درجه معنی‌داری را نشان می‌دهد. مقادیر پیش‌آزمون و پس‌آزمون  $FVC$  و  $FEV_1$  در گروه تجربی دو تفاوت معنی‌داری را نشان نداده است. همچنین در مقایسه پیش‌آزمون شش دقیقه پیاده‌روی با پس‌آزمون مذکور در گروه شنا با سطح آلفا $.5\%$  و درجه اعتبار  $95\% / 0.001$  مقدار  $0.008 < P$  محاسبه شده است و با رقم  $0.001$  درجه معنی‌دار را نشان می‌دهد. پیش‌آزمون شش دقیقه پیاده‌روی با پس‌آزمون مذکور در گروه تجربی دو با سطح آلفا $.5\%$  و درجه اعتبار  $95\% / 0.001$  مقدار  $0.002 < P$  محاسبه شده با رقم  $0.001$  درجه معنی‌داری را نشان می‌دهد. این در حالی است که هیچ‌کدام از متغیرهای مذکور در گروه کنترل تفاوت معنی‌دار را نشان نمی‌دهد (جدول‌های ۶ و ۷). فرضیه‌های  $4$  و  $5$  و  $6$  در خصوص قدرت تحمل بدن در مقابل تمرینات شنا و دو و مقایسه دو نوع تمرینات بیان شده است.

نتایج به دست آمده، نشان می‌دهد که قدرت تحمل بدن براساس آزمون  $T$  گروه‌های همسان در متغیر آزمون شش دقیقه پیاده‌روی در دو مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون اندازه‌گیری شده در گروه‌های تجربی بهبود یافته، از این‌رو تفاوت معنی‌دار است. نتایج متغیرهای مذکور نشان می‌دهد که در هر دو گروه تجربی شنا و دو در سطح آلفا $.5\%$  تفاوت معنی‌داری وجود دارد. این مقدار تفاوت تقریباً در هر دو گروه شنا و دو یکسان گزارش شده است، حال آنکه در گروه کنترل تفاوت معنی‌داری در زمینه قدرت تحمل بدن در مقایسه با نتایج پیش‌آزمون و پس‌آزمون وجود ندارد. همچنین براساس نتایج حاصل از تحلیل واریانس یک عاملی بین گروه‌های شنا، دو و کنترل مشاهده می‌شود که مقدار تفاوت در آزمون شش دقیقه پیاده‌روی در گروه‌های تجربی شنا و دو نسبت به گروه کنترل با درجه اعتبار  $1 / 0.001 < P$  و با رقم  $0.001$  درجه معنی‌دار است و بهبودی را نشان می‌دهد (جدول ۷).

## بحث و نتیجه‌گیری

با مطالعه به عمل آمده بر روی بیماران برونشیت مزمن که تحت برنامه‌های ورزشی قرار گرفته‌اند، مشاهده می‌شود که بسیاری از متخصصان ریه تمایل دارند که روش‌های تمرینی و ورزشی را به عنوان یک روش مناسب برای درمان ناراحتی‌های ریوی به کار گیرند (خانم ام ج بری و همکاران، ۱۹۹۸).

برخی از پژوهشگران در مقالات تحقیقی خود که آثار تمرینات ورزشی را بر روی

بیماران برونشیت مزمن مورد ارزیابی قرار داده‌اند، گزارش کرده‌اند که فعالیت‌های هوایی موجب بهبودی نرون‌های عضلات تنفسی و سینه‌ای در شرایط تمرینات سبک می‌شود. این بهبودی بیشتر در وضعیت بالینی بیمار مؤثر است تا ظرفیت‌های ریوی وی (ج اج مارکس و همکاران، ۱۹۹۸)<sup>۱</sup>. نتایج این مطالعه با برخی از نتایج تحقیق حاضر همسوست، به‌طوری که در نتایج بدست آمده مشاهده می‌شود که مقدار  $FEV_1$  پیش‌آزمون و پس‌آزمون در هر سه گروه تحقیق بدون تغییر معنی دار ثبت شده است. تنها مقدار  $FVC$  ثبت شده در گروه تجربی شنا نسبت به گروه کنترل و گروه تجربی دو، تغییر معنی داری کرده است (جدول ۶ و ۷). نتایج حاضر با تحقیقات آقای هانیک<sup>۲</sup> (۱۹۹۸)، الیسن<sup>۳</sup> (۱۹۹۸) و خانم بری (۱۹۹۶) همسوست.

عدم افزایش میزان  $FVC$  در گروه‌های تجربی دو با نتایج تحقیق آقای بنداستروپ و همکاران (۱۹۹۷) همسویی دارد.

عدم افزایش حجم  $FEV_1$  در گروه‌های سه‌گانه تحقیق با نتایج آقای بارندز و همکاران (۱۹۹۷) همسوست. آقای بارندز معتقد است که عدم بهبودی در ظرفیت  $FEV_1$  ممکن است ناشی از التهابی باشد که در برونشرها ایجاد شده است. در تحقیق به عمل آمده در کشور هلند تحت عنوان اثر تمرینات سبک ورزشی بر روی حجم  $FVC$  نشان داده که فعالیت‌های سبک و مستمر شنا به مدت ۸ هفته قادر است به طور معنی داری حجم مذکور را افزایش دهد (هاسن و همکاران، ۱۹۸۰). این نتایج با نتایج مربوط به تحقیق حاضر همسویی دارد. از نتایج دیگر این تحقیق افزایش قدرت تحمل بدن نسبت به تمرین است. نتایج مربوط به جداول ۶ و ۷ نشان می‌دهد که میزان تحمل بدن به فعالیت در گروه‌های تجربی شنا و دو به طور چشمگیری با درجه  $P<0.001$  بهبود یافته است. نتایج تحقیق با یافته‌های خانم بری (۱۹۸۰)، آقای الیسن (۱۹۹۸) و آقای بنداستروپ<sup>۴</sup> (۱۹۹۸) همسوست.

علت بهبودی در قدرت تحمل بدن نسبت به تمرین ممکن است ناشی از بهبودی و متابولیسم سلول‌های عضلانی باشد (هانیک و همکاران، ۱۹۹۸). تقریباً نتایج پیش‌آزمون و

۱- Marks. J.H

2- Honnick

3- Alison

4- Bendstrup

پس آزمون مربوط به قدرت تحمل بدن در گروه‌های تجربی شنا و دو نشان می‌دهد که بدون توجه به نوع رشته ورزشی، بهبودی در متغیر مذکور حاصل شده است. نتایج نشان می‌دهد که دو نوع رشته ورزشی آبی و غیرآبی (دو و شنا) در بهبود قدرت تحمل بدن نسبت به تمرین مؤثر است. به نظر می‌رسد که علت بهبود حجم  $FVC$  ناشی از بهبود عملکرد عضلات تنفسی بویژه عضلات دمی است. براساس مصاحبه به عمل آمده با نمونه‌های شرکت‌کننده در ابتدا و انتهای طرح، مشاهده می‌شود که این بهبودی سبب ایجاد رضایت ولذت بهتر از زندگی برای آنها شده است. همچنین به نظر می‌رسد که عدم بهبودی در حجم  $FEV_1$  گروه‌های تحقیق، بیانگر وجود تغییرات غیرقابل برگشت در راههایی هوایی است. بنابراین حاصل نتایج تحقیق بر روی دو عملکرد اندازه‌گیری شده  $FEV_1$   $FVC$  بیماران شیمیایی گازهای جنگی نشان می‌دهد که فعالیت‌های ورزشی شنا موجب بهبودی در حجم  $FVC$  می‌شود براساس یافته‌های آماری و بررسی‌های فردی و بالینی، مشاهده گردید که نمونه‌های تحقیقی به کار گرفته شده دارای ویژگی‌های مشترکی از نظر سطح ضایعه شیمیایی در ریه بوده‌اند. نتایج حاصل از آزمون‌های عملکرد ریوی و آزمون شش دقیقه پیاده‌روی در گروه‌های تجربی شنا و دو وضعیت نسبتاً مشابهی را نشان می‌دهد.

## منابع و مأخذ

- ۱- بازرگان، عباس. «روش‌های تحقیق در علوم رفتاری». تهران، انتشارات آگاه، ۱۳۷۸، صص ۷۹-۱۴.
- ۲- جان - اف - نان. «فیزیولوژی کاربردی تنفس». ترجمه محمد شمس‌زاده، تهران، انتشارات مهر، ۱۳۷۴، صص ۸۴-۵۲.
- ۳- زحمتکش، محمد‌مهدی. «بیماری‌های تنفس». تهران، انتشارات حیا، ۱۳۷۶، صص ۲۶-۱۴.
- ۴- شانکار، علی. «درمان بیماری‌های آسم و دیابت». تهران، انتشارات فراوان، ۱۳۷۸، صص ۲۶-۲۲.
- ۵- قنبرزاده، محسن. «بررسی ظرفیت‌های ریوی دانشجویان دانشگاه شهید چمران پژوهشی دانشگاه شهید چمران». طرح تحقیقاتی، ۱۳۷۳، صص ۱۲-۱۱۲.

- ۶- کریمی، کوشیار. «درمان تنگی نفس». تهران، انتشارات نسل، ۱۳۷۶، صص ۱۸-۲۱.
- ۷- وست، جان بی. «اصول فیزیولوژی تنفس». ترجمه فرج شادان. تهران، انتشارات مهر، ۱۳۶۱، صص ۱۸-۱۲۶.
- ۸- هاربیسون. «بیماری‌های دستگاه تنفس». ترجمه علی اسفندی، انتشارات اشتیاق، ۱۳۷۸، صص ۳۲-۶۲.
- 9- Alison-JA-END. "Expiratory Lung Volum During Arm and Leg Exercise in Normal Subjects and Patients with Cystic Fibrosis". *Am, J, Respir, Crit, Care, Med* 1996, 158(5), PP: 1450-8.
- 10- Baarens-Em, "Peak Exercise Response in Relation to Tissue Deplicationin Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease". *Eur-Respir-J-* 1997, 10(12), PP : 2807-13.
- 11- Bendstrup-KE, "Patient Rehabilitation Improves Activities of Daily Living, Quality of Life and Exercise Tolerance in Chronic Obstructive Pulmonary Disease". *Eur-Respir-J*, Dec 1997, 10(12), PP: 2801-6.
- 12- Berry-MJ, "Exercise Traing and Chronic Obstructive Pulmonary Disease : Past and Future Research Directions". *J, Cardio Pulm, Rehabil*, 1998, 18(3), PP : 181-91.
- 13- Exercise in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease - *Am.J- Respir*, 1998 - 881-5.
- 14- Hasen-JH. "Exercise Testing in Patiens with Interstitial Lung Disease (Letter, Comment) *Chest*. 1998, 113(4), PP : 1148-9.
- 15- Honnick - DK. "Exercise and Sports in Adolescent with Chronic Pulmonary Disease Andolesce". *Med* 1998, 9 , PP : 467-81.
- 16- Kirsten - DK."Exercise Training Improves Recovery in Patints with COPD Ater an Acute Exacerbation", *Respir, Med* 1998, 92(10), PP : 1191-8.
- 17- Murray. N. "Text Book of Respiratory Medicine".1986, 3(2), P:841.

- 18- Richardson. Rs. "Evidence of Skeletal Muscle Metabolic Recerbe During Whole Body". 1998.
- 19- Yoshicawa. M."Exercise Performance and Body Composition in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease Mihon".J. Chest, 1997, 35(5), PP : 518-23.



