

حرکت

شماره ۲۶ - صن ص : ۱۰۶ - ۹۵

تاریخ دریافت : ۱۱ / ۰۷ / ۸۳

تاریخ تصویب : ۲۶ / ۰۲ / ۸۴

مقایسه دو روش گرم کردن در کاهش استرس قبل از مسابقه

نورالله مختاریان^۱

کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

چکیده

هدف از این تحقیق مطالعه تأثیر گرم کردن یکنواخت و حصول شرایط هوازی همراه تمرکز ذهن روی کاهش استرس قبل از مسابقه است. براین اساسن ۲ گروه ۲۰ نفره از بین ۸۱ شرکت کننده در مسابقات رسمی انتخاب شدند. هر در گروه ۱۰ دقیقه فرست گرم کردن داشتند. گروه اول به صورت آزادانه خود را گرم کرده که اغلب ۱ تا ۲ دقیقه دوبلند و سپس چند حرکت انفجاری و مرور چند تکنیک را شامل می شد. اما گروه دوم نخست ۸ تا ۱۰ دقیقه به صورت ملایم دوبلند و در این حین با شعارش احتماد می برد و مانند از افکار استرس زای مسابقه داشتند. قبل از ورود به مسابقه، فشار آنها ثبت و از خون آنها نمونه گیری شد که نتایج نشان داد میزان تولید آدرنالین خون (نشان دهنده سیزان استرس) در هر گروه پس از گرم کردن نسبت به علد آدرنالین در شرایط عادی اختلاف معنی داری داشت. در همین شرایط میزان تولید آدرنالین بین دو گروه نیز با هم اختلاف معنی داری نشان داد. گروه دوم از آدرنالین کمتری برخورد دار بوده که نشان دهنده تأثیر کمتر استرس روی این گروه است. در ضمن ۶۵ درصد برندگان مسابقه در گروه دوم قرار داشتند.

واژه های کلیدی

آدرنالین، استرس، گرم کردن یکنواخت.

دانشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی

^۱ - Email: N.mokhtarian2005@yahoo.com

مقدمه

پس از ماهها تمرین و آماده سازی، ورزشکار هنگام مسابقات اغلب به دلیل استرس ناشی از رقابت به نتایج مورد دلخواه و انتظار نمی رسد. از جمله دلائل استرس، کم تجربگی، محیط جدید، تمایل اچچی و... است. سؤالی که مطرح می شود این است که عامل استرس هرچه باشد، چه تغییراتی در فیزیک ورزشکار رخ می دهد که توانایی و روانی حرکت وی صلب یا کاسته می شود و چگونه می توان این رخدادهای فیزیکی را کنترل کرد. در پاسخ باید گفت بدن انسان سیستم عصبی خودمنخاری دارد. این سیستم به شکلی طراحی شده که می تواند در شرایط مختلف و غیرطبیعی ضربان قلب و فشار خون را در چند ثانیه تا ۲ برابر افزایش یا آنچنان کاهش دهد که حتی موجب غش گردد. به طور نمونه در مقابل خبر ناگوار یا واقعه ترمتاک، این تغییرات عملاً رخ می دهند و همگان تجربه آن را دارند. در چنین شرایطی اولاً استیل کولین (میانجی عصبی) در عضلات بشدت تخلیه شده و به دنبال آن از غدد فوق کلیوی هورمون آدرنالین به میزان زیادی تولید و در مسیر گردش خون قرار می گیرد. با رسیدن این هورمون به نقاط مختلف بدن یک هشدار عمومی به کلیه دستگاهها داده می شود به طوری که ضربان قلب و میزان متابولیسم به سرعت افزایش می یابد و بدن برای مقابله با شرایط حاد پیش آمده مهیا می شود. به همین دلیل به این هورمون، هورمون جنگ یا گریز نیز گفته می شود (۲ و ۸). اما بدن تمايل دارد به شرایط همومناظر یا پایداری طبیعی خود برگردد. بنابراین در صورتی که عامل تحریک و ایجاد شرایط غیرطبیعی تمام شده باشد، روند انهدامی آدرنالین مازاد موجود در خون بسرعت آغاز می گردد. ناگفته نماند برای افزایش متابولیسم در بدن و افزایش کارایی و توان بدن در فعالیت‌ها، نیاز به افزایش تولید آدرنالین از غدد فوق کلیوی است. اما در شرایط استرس این میزان تولید مازاد بر نیاز واقعی بدن است. از این رو پس از رخداد یا پس از مرحله استقامتی، روند انهدام آدرنالین مازاد آغاز می شود. اما اگر تحریکات پشت سر هم ادامه داشته باشد، بدن بدین گونه توسط هورمون به دستگاههای مختلف بدن، هشداری ارسال نموده، سپس این عمل را پیگیری می کند. در این مرحله که مرحله مقاومت بدن نامیده می شود، بدن سعی می کند با ادامه تولید و حفظ شرایط هشدار همچنان بدن را آماده مقابله با شرایط جدید سازد. اما به دلیل طبیعی نبودن میزان تولید آدرنالین (زیرا این تولید بر اثر تحریک عصبی صورت می گیرد و این مقدار آدرنالین لازم نیست)، روند انهدامی که به مرحله خستگی بدن معروف است، آغاز می شود (۱ و ۲). مرحله سوم که تجربه ناخوشایند بیشتر ورزشکاران است، به دلیل رخدادهای فیزیولوژیکی توان اجرا و روانی حرکت از دست رفته و کاهش می یابد. در واقع فردی که دچار استرس شده، ناخودآگاه به تنفس های عمیق و وسیع تر وادار می شود. بنابراین میزان اکسیژن بیشتری جذب و موئی اکسید بیشتری دفع می کند. این عمل موجب تغییرات در حالت اسید و باز و سطح کلسیم در خون می شود و عوارضی همچون ضعف ایجاد می کند (۸). این همان عامل دور شدن از رکورد یا پیروزی در مسابقه است. اما در پاسخ قسمت دوم سؤال باید گفت دو عامل

برای جلوگیری از این رخدادهای فیزیکی یا به تعدیل درآوردن آن وجود دارد که اولی عامل روانی و دوم عامل فیزیکی بدن است.

مطالعات نشان می‌دهد کسانی که هنگام ورزش یا رقابت تمرکز دارند و از توجه به افکار استرس‌زا مسابقه دوری می‌کنند هنگام مسابقه اضطراب کمتری دارند (۴، ۱۰، ۱۱ و ۱۲). از سوی دیگر، یافته‌های فیزیولوژیکی بیان می‌دارد چنانچه با فعالیت‌های (سیستم هوایی) به مدت چند دقیقه دمای بدن را ۱ تا ۲ فارنهایت افزایش دهیم، تحریکات سیستم سمپاتیک پاراسمپاتیک (تولید آدرنالین) کاهش می‌یابد و تولید آدرنالین محدود و مناسب با نیاز متابولیسمی شود (۹). بنابراین با ارائه شیوه گرم کردن یکنواخت همراه با تمرکز که پیشنهاد محقق در این تحقیق است، اولاً هنگام گرم کردن با تمرکز همراه اعداد ورزشکاران از توجه به افکار استرس‌زا دوری نموده و با دویلن یکنواخت به مدت ۵ تا ۸ دقیقه می‌تواند ۱ تا ۲ فارنهایت دمای بدن را افزایش دهد. در این شرایط انتظار می‌رود تحریکات استرسی اثر کمتری داشته باشد که نتایج تحقیق نیز مؤید این موضوع می‌باشد.

آزمودنی‌ها

آزمودنی‌های این تحقیق از بین ۸۶ شرکت کننده در مسابقات رزمی رشتہ سانشو که به صورت کشوری در اسفند ماه ۱۳۸۲ در شهرکرد برگزار شد، انتخاب شدند. برای انتخاب آزمودنی‌ها، یک جلسه توجیهی با حضور کلیه ورزشکاران و مریبان آنها برگزار شد و ضرورت طرح توجیه گردید. سپس به طور تصادفی ۴۰ نفر از آنان انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه ۲۰ نفره تقسیم شدند که ۲۰ نفر برای گرم کردن آغازین رقابت به صورت آزادانه به هر نحو که مایل بودند، گرم کردن و گروه دوم براساس روش پیشنهادی گرم کردن یکنواخت با تمرکز ذهن گرم نمودند.

ابزار و وسائل مورد نیاز

به منظور ثبت مواردی مثل فشار خون، ضربان قلب، برد و بالاخت و میزان آدرنالین، برگ ثبت انفرادی تهیه و اطلاعات مربوط به هر فرد ثبت شد. برای اندازه‌گیری ضربان قلب و فشار خون از دستگاه فشار سنج beurer استفاده شد که قادر است در مدت ۳۰ ثانیه حداقل ضربان و فشار خون را اعلام کند. برای نمونه‌گیری از خون ورزشکاران نیز از وسایلی چون سرنگ و... و جعبه نمونه‌گیری خون استفاده شد تا هیچ عاملی نمونه‌ها را تحت تأثیر قرار ندهد. عملیات نمونه‌گیری زیر نظر مسئلان آزمایشگاه انجام شد.

متغیرها

در این تحقیق میزان تولید آدرنالین در خون ورزشکاران قبل از شروع مسابقه و پس از اعمال یکی از دو روش گرم کردن اندازه‌گیری شد.

روش تحقیق

طی ماهنگی‌ای که با گروه برگزارکننده مسابقات انجام شد، ۱۵ دقیقه قبل از شروع مسابقه ورزشکار از طریق بلندگو آماده شد. در این مدت ورزشکاران گروه اول به هر نحوی که مایل بودند، خود را گرم کردند و یکی از همکاران، طرح نحوه گرم کردن آنها را مشاهده و ثبت می‌کرد تا در پایان، جمع‌بندی کلی از رفتارهای آنان برای گرم کردن داشته باشیم. گروه دوم در حدود ۱۰ دقیقه از فرصت را با پوشیدن لباس مانند کاپشن اقدام به دویدن ملایم کردند و سعی بر افزایش دمای بدن خود به صورت یکنواخت داشتند. در این مدت از آنها خواسته شد از ۱۰۰۰ تا ۱۷۰۰ را شمارش کرده و روی شمارش آنها تمرکز کنند تا از توجه روی مسائل مسابقه که عامل استرس‌اند، جلوگیری شود. مجدداً حدود ۴ تا ۵ دقیقه باقی‌مانده اقدام به حرکات کششی یا مرور تکنیک کردن و با پوشیدن لباس مخصوص آماده رقابت می‌شدند. از هر دو گروه قبل از ورود به روی تشک مبارزه، اندازه‌گیری فشار و نمونه‌گیری خون انجام شد. زیرا انتظار می‌رفت اوج آدرنالین در این زمان ظاهر شود. شایان ذکر است میزان آدرنالین در شرایط با زال به میزان ۱ تا ۱۸ درصد نانوگرم در میلی لیتر در خون است و این میزان در شرایط استرس تا ۲۰ برابر افزایش می‌یابد (۵، ۴ و ۶). به همین منظور از ۲۰ نفر از پذیرش شدگان مسابقات در شب قبل از مسابقه به صورت داوطلبانه نمونه‌گیری خون به عمل آمد تا میزان آدرنالین در شرایط عادی تعیین و معیاری برای بررسی‌های آماری وجود داشته باشد که اطلاعات این بخش تحت عنوان گروه افراد عادی در جدول ۳ آورده شده است.

نتایج و یافته‌های تحقیق

فرضیه‌ها با آزمون T مستقل بررسی شدند.

فرضیه ۱: میانگین تولید آدرنالین در شرایط طبیعی در افراد عادی با میانگین آدرنالین تولیدی در خون ورزشکارانی که به صورت آزادانه و متنوع گرم کده‌اند، در سطح $d_f = ۳۸$ ، $\alpha = ۰/۰۵$ معنی‌دار است.

$$t = \frac{\frac{\sum x_1}{N_1} - \frac{\sum x_2}{N_2}}{\sqrt{\left(\frac{\sum x_1^2 - (\sum x_1)^2}{N_1} + \sum x_2^2 - \frac{(\sum x_2)^2}{N_2} \right) \left(\frac{N_1 + N_2}{N_1 \times N_2} \right)}} =$$

$$\begin{aligned}
 t &= ۱۷/۱۷۵ \\
 t_c &= ۲/۴۴۳ \\
 \alpha &= +/۰ \\
 d_f &= ۳\Delta \\
 \Rightarrow t_0 &= ۱۷/۱۷۵ > t_c = ۲/۴۴۳
 \end{aligned}$$

فرضیه ۲: میانگین تولید آدرنالین در شرایط طبیعی در افراد عادی با میانگین تولید آدرنالین در خون ورزشکارانی که به صورت یکنواخت همراه تمرکز ذهن، اقدام به گرم کردن کرده‌اند در سطح $d_f = ۳\Delta$ ، $\alpha = +/۰$ معنی دار است.

$$t = \frac{\frac{\sum x_1 - \sum x_2}{N_1 - N_2}}{\sqrt{\left(\frac{\sum x_1^2 - (\sum x_1)^2}{N_1} + \frac{\sum x_2^2 - (\sum x_2)^2}{N_2} \right) \left(\frac{N_1 + N_2}{N_1 \times N_2} \right)}} =$$

$$\begin{aligned}
 t_0 &= ۹/\Delta \\
 t_c &= ۲/۴۴۳ \\
 \alpha &= +/۰ \\
 d_f &= ۳\Delta \\
 \Rightarrow t_0 &= ۹/\Delta > t_c = ۲/۴۴۳
 \end{aligned}$$

جدول ۱ - تولید آدرنالین در افراد در شرایط عادی (گروه ۱) بر حسب نانوگرم در لیتر (ng/ml)

آدرنالین	ردیف	آدرنالین	ردیف
۱۳۶	۱۲	۱۱۸	۱
۱۴۱	۱۳	۱۲۳	۲
۱۳۲	۱۴	۱۲۹	۳
۱۲۲	۱۵	۱۲۶	۴
۱۳۲	۱۶	۱۲۸	۵
۱۲۷	۱۷	۱۲۱	۶
۱۱۸	۱۸	۱۲۴	۷
۱۲۹	۱۹	۱۲۸	۸
۱۳۱	۲۰	۱۲۲	۹
۱۷۵	X	۱۱۴	۱۰
۱۰۶۸	SD	۱۱۸	۱۱

فرضیه ۳: میانگین تولید آدنالین دو گروه (گروهی که آزادانه و متنوع اقدام به گرم کردن کردند و گروه دوم که به طور یکنواخت همراه با تمرکز ذهن اقدام به گرم کردن کردند) در سطح $\alpha = 0.05$ ، $d_f = 38$ معنی دار است.

$$t = \frac{\frac{\sum x_1 - \sum x_2}{N_1 - N_2}}{\sqrt{\left(\frac{\sum x_1^2 - \frac{(\sum x_1)^2}{N_1} + \sum x_2^2 - \frac{(\sum x_2)^2}{N_2}}{N_1 + N_2 - 2} \right) \left(\frac{N_1 + N_2}{N_1 \times N_2} \right)}} =$$

$$\begin{aligned} t_0 &= 4.0 \\ t_e &= 2/447 \\ \alpha &= 0.0 \\ d_f &= 38 \end{aligned}$$

فرضیه ۴: اختلاف میانگین فشار خون دو گروه پس از مدت گرم کردن (هنگام آغاز رقابت) با همدیگر در سطح $\alpha = 0.05$ معنی دار است. هرچند میانگین ضربان قلب دو گروه قبل از شروع مسابقه در شرایط عادی با همدیگر تفاوت معنی داری نداشته است.

$$t = \frac{\frac{\sum x_1 - \sum x_2}{N_1 - N_2}}{\sqrt{\left(\frac{\sum x_1^2 - \frac{(\sum x_1)^2}{N_1} + \sum x_2^2 - \frac{(\sum x_2)^2}{N_2}}{N_1 + N_2 - 2} \right) \left(\frac{N_1 + N_2}{N_1 \times N_2} \right)}} =$$

$$\begin{aligned} t_0 &= 7.7 \\ t_e &= 2/447 \\ \alpha &= 0.0 \\ d_f &= 38 \end{aligned}$$

میانگین فشار خون در شرایط عادی قبل از گرم کردن بین دو گروه اختلاف معنی داری نداشت.

$$\begin{aligned} t_0 &= 4.0 \\ t_e &= 2/447 \\ \alpha &= 0.0 \end{aligned}$$

$$d_f = \tau A$$

$$t_0 = \tau / \sigma > t_c = 2/444$$

جلول ۲ - تولید آدرنالین در گروهی که آزادانه و متنوع خود را گرم کردند (گروه ۱)


P ₂	P ₁	بازنده	برنده	آدرنالین	ردیف
۱/۱/۵	۱۱	x		۱/۱۷	۱
۱۰/۳	۱۰/۰	x		۱/۳۲	۲
۹/۲	۱۱	x		۱/۶۶	۳
۱۰/۸	۱۰/۰		x	۱/۴۷	۴
۹/۱	۱۱	x		۱/۱۶	۵
۱۰/۶	۱۲		x	۱/۲۸	۶
۱۰/۴	۱۱	x		۱/۲۹	۷
۹	۱۰/۸	x		۱/۴۹	۸
۱۰/۲	۱۱/۲		x	۱/۱۲	۹
۱۲	۱۱/۸		x	۱/۸۸	۱۰
۱۰/۱	۱۲/۲	x		۱/۳۳	۱۱
۹/۲	۱۱/۸		x	۱/۳۳	۱۲
۹/۳	۱۲/۲	x		۱/۲۲	۱۳
۱۱/۱	۱۱/۲		x	۱/۴۷	۱۴
۱۰/۹	۱۰/۰	x		۱/۱۹	۱۵
۹/۷	۱۱	x		۱/۷۷	۱۶
۸/۸	۱۱/۲	x		۱/۰۸	۱۷
۹/۱	۱۰/۸	x		۱/۴۹	۱۸
۱۰	۱۰		x	۱/۲	۱۹
۸/۸	۱۰/۳	x		۱/۳۳	۲۰
۱۰	۱۱/۰۴			۱/۲۱	X
۱/۴	۱۰/۸			۱/۷۷	SD

p: فشار خون در حالت عادی، P₂: فشار خون پس از پایان مدت گرم کردن


جدول ۳ - تولید آدرنالین در گروهی که به طور یکنواخت خود را گرم کردند (گروه ۲)

P ₃	P ₁	پازنده	برنده	آدرنالین	ردیف
۱۰/A	۱۰/D		x	۱۹۷	۱
۱۰/F	۱۱		x	۱۹۳	۲
۱۲/I	۱۱/D	x		۱۱۱	۳
۱۰/V	۱۰/V		x	۱۹۸	۴
۱۰	۱۰/D	x		۱۷۲	۵
۹/F	۱۱		x	۱۹۳	۶
۱۰/A	۹/A	x		۱۷۳	۷
۱۰/Z	۱۰/V	x		۱۷۱	۸
۱۲/I	۱۰/A	x		۱۹۳	۹
۱۰/T	۱۰		x	۱۷۱	۱۰
۱۰/D	۱۱		x	۱۹۳	۱۱
۱۱/V	۱۱/T	x		۱۱	۱۲
۱۱/I	۱۱		x	۱۹۳	۱۳
۱۱/A	۱۰/D		x	۱۹۸	۱۴
۱۰/F	۱۱		x	۱۹۴	۱۵
۱۱/I	۱۱/D		x	۱۹۸	۱۶
۱۲	۱۰/D		x	۱۶	۱۷
۱۱/F	۱۰	x		۱۰۴	۱۸
۱۱/I	۱۱/D		x	۱۷۱	۱۹
۹/A	۱۱/T		x	۱۹۳	۲۰
۱۰/V	۱۰/V			۱۹۸	X
NF	۱۱/I			۱۹	SD


p₁: فشار خون در حالت عادی; P₃: فشار خون پس از پایان مدت گرم کردن



نمودار ۱ - مقایسه تولید آذرناکین در گروه‌های ۱ و ۲ با گروه ۳ (افراد عادی)



نمودار ۲ - نمودار مقایسه افت فشار خون در پایان دوره گرم کردن در دو گروه ۱ و ۲



نمودار ۳ - نمودار مقایسه برندگان دوره گرم کردن گروه ۱ و ۲

بحث و نتیجه گیری

در این تحقیق سه گروه مورد بررسی قرار گرفتند:

۱. گروه اول: ۲۰ ورزشکار که به صورت آزادانه در مدت تعیین شده خود را گرم کردند و حرکات آنان شامل چند حرکت کششی و چند حرکت انفجاری و مرور تکنیک و تاکنیک بود.
۲. گروه دوم: ۲۰ نفر ورزشکاری که با روش پیشنهادی محقق خود را گرم کردند. آنها به مدت ۵ تا ۸ دقیقه ملایم دویدند و هنگام دویدن روی شمارش اعداد از ۱۰۰۰ تا ۱۷۰۰ تمرکز کردند.
۳. گروه سوم: افراد عادی که فقط به منظور تعیین میزان آدرنالین خون در شرایط عادی و مقایسه با گروههای ۱ و ۲ از بین کلیه ورزشکاران پذیرش شده، انتخاب شده بودند.

در مقایسه میزان آدرنالین (معرف میزان استرس) در خون گروه اول پس از ۱۵ دقیقه فرصت گرم کردن با آدرنالین خون افراد عادی اختلاف معنی داری مشاهده شد که مؤید دو عامل است: نیاز متابولیکی بدن به آدرنالین بیشتر هنگام افزایش فعالیت، و تأثیر استرس روی این گروه.

در مقایسه میزان آدرنالین خون گروه دوم پس از ۱۵ دقیقه فرصت گرم کردن نسبت به میزان آدرنالین خون افراد عادی، اختلاف معنی داری مشاهده شد که در این گروه نیز دو دلیل افزایش متابولیسم و نیاز به آدرنالین و تا حدودی استرس موجب این اختلاف شده است.

اما مقایسه دو گروه اول و دوم نشان می دهد اختلاف میزان آدرنالین تولید شده در خون دو گروه پس از ۱۵ دقیقه با هم اختلاف معنی داری دارد. از آنجا که میزان فعالیت گروه دوم برای گرم کردن حتی از گروه اول نیز بیشتر بوده، اما میزان آدرنالین خون گروه دوم نصف میزان آدرنالین در خون گروه اول است، این تأثیر عامل روانی یعنی همان تمرکز روی اعداد و شمارش آنها با صدای بلند است که از توجه ورزشکار روحی افکار استرس زا جلوگیری می کند. از سوی دیگر، گرم کردن تا حصول شرایط پایداری موجب شد تحریکات سمپاتیکی و پاراسمپاتیکی در گروه دوم کمتر اثر داشته باشد. در مجموع این دو عامل توانسته میزان تولید آدرنالین خون گروه دوم را نصف گروه اول کند و گروه دوم بتوانند از حداکثر ظرفیت خود نسبت به گروه اول بهتر استفاده کنند. نتایج مسابقه نیز این موضوع را تایید می کنند به صورتی که ۶۵ درصد از برندگان مسابقه در گروه دوم که مطابق روش پیشنهادی گرم شده بودند، اقدام به آماده شدن برای مسابقه کردند. قطعاً انتظار می رود

پس از گرم کردن، فشار خون دو گروه افزایش یافته باشد اما در دقیقه‌های آخر گرم کردن، به دلیل اثر انهدام آدرنالین و کاهش فشار تعریبات گرم کردن افت فشار را شاهد باشیم.

افت فشار خون در دو گروه پس از ۱۵ دقیقه و مراحل آغازین رقابت را می‌توان ناشی از دو عمل عمدۀ دانست. در هر دو گروه میزان فعالیت فیزیکی بمراتب کاهش و بیشتر فعالیت حرکات کشی یا حرکات آرامبخش و پوشیدن لباس مخصوص مسابقه بود. انتظار کاهش فشار خون منطقی است، اما این میزان در گروهی که آزادانه و متنوع خود را گرم کردند از نوسانات بیشتری برخوردار است. دلیل این مسئله باتوجه به مراحل سه گانه هانس سلای که معتقد بود آدرنالین سه مرحله را طی می‌کند (هشدار عمومی، مقاومت و پایداری، و درمانده‌گی بدن) ذر این زمان مرحله انهدام آدرنالین است و مصادف افت فشار، ضربان و افت کارایی می‌باشد. و می‌توان افت معنی دار فشار خون در پایان دوره گرم کردن را برای گروه اول ناشی از مرحله سوم هانس سلای یا انهدام آدرنالین غیرضروری و آثار تابعه آن دانست. بنابراین محقق پیشنهاد می‌کند به منظور جلوگیری از اثرهای استرس و کاهش آن در هنگام مسابقات باید دو عامل تمرکز و دوری از افکار استرس زا و افزایش دما با شیوه‌های مناسب برای جلوگیری از استرس مدنظر قرار گیرد.

منابع و مأخذ

۱. آرتور گایتون. (۱۳۷۲). "فیزیولوژی پرشکی". جلد ۳، ترجمه فرج شادان، انتشارات سهامی چهر، صص ۱۴-۴۷ فصل غدد فوق کلیوی.
۲. ادینگتون و ادگرتون، (۱۳۷۲). "بیولوژی فعالیت بدنی"، ترجمه حجت الله نیکیخت، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها، ص ۲۱۱.
۳. بن گرین اشتاین، (۱۳۷۸). "هورمون‌شناسی در یک نگاه"، ترجمه پاتنہ آیزدیف، چاپ امیر، ص ۵۰.
۴. بلومف یلد، (۱۳۷۶). "دانش هوشیاری خلاق"، ترجمه ف. سیف، تهران. انتشارات خاتون، صص ۲۲۳-۲۲۲، ۲۲-۱۹۶.
۵. ر. هال. م. بسر، (۱۳۷۳). "مبانی غددشناسی بالینی"، جلد دوم، ترجمه فرزاد قشلاقی و بهمن طریقی، چاپ داد، ص ۴۸۰.

۶. دادستان، پریرخ. (۱۳۷۷). "تیندگی یا استرس"، سازمان چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صص ۱۲۵-۱۲۲.
۷. دیوید، ب. فرات. (۱۳۶۶). "روانشناسی ورزش"، ترجمه عیدی علیخانی، هوش نوریخش، ناشر سازمان تربیت بدنی، دفتر تحقیقات و توسعه، ص ۸۶.
۸. شهیان. دو. (۱۳۷۸). "بیماری اضطراب"، ترجمه نصرت الله پورافکاری، تهران، چاپ اختر شمال، صص ۳۷-۲۷.
۹. ف. اکس و ماتیوس. (۱۳۷۲). "فیزیولوژی ورزش"، جلد ۲، ترجمه اصغر خالدان، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزش دانشگاه تهران.
۱۰. گراهام و نیر، کنی مارتین. (۱۳۷۴). " Rahنمای علمی روانشناسی ورزشی"، ترجمه محمد کاظم واعظ موسوی، انتشارات کمیته ملی المپیک، صص ۳۷-۳۶.
11. Brown LL.S – Robinson She. (1998). "The relationship between meditation or exercise and three measures of self actualization", *Journal of mentu (Health seliny)* vol. 15, NL, PP:85-93.
12. Khasyad. Smith JC. (1999), "Relaxation, States and creativity". Rossevelt university stress justidute chicayo usa. Percept mot skills PP: 406-416.

پریل جامع علوم انسانی