

تأثیر فشار روانی مسابقه بر غلظت کورتیزول، تستوسترون و IgA براقی مردیان لیگ برتر فوتبال ایران

❖ مسعود معینی؛ عضو هیأت علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی
❖ دکتر علی اصغر رواسی؛ دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران
❖ دکتر خسرو ابراهیم؛ استاد دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی
❖ دکتر توراندخت امینیان؛ استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

چکیده: حرفة مردیگری فوتبال یکی از شغل‌های بر مخاطره در جهان به شمار می‌رود و فشارهای روانی ناشی از ماهیت این حرفة موجب فرسوده شدن مردیان فوتبال می‌شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر فشار روانی مسابقه بر غلظت کورتیزول، تستوسترون و ایمونوگلوبولین A مردیان لیگ برتر فوتبال در فصل مسابقات ۸۴-۸۳ بود. آزمودنیهای این تحقیق را ۱۶ نفر از مردیان حرفای لیگ برتر با میانگین سنی 27.5 ± 9.1 و سابقه مردیگری در لیگ 0.1 ± 0.6 سال تشکیل دادند. نمونه‌های براقی در روز مسابقه در پنج مرحله (یک ساعت قبل از مسابقه، قبل از مسابقه، بین دو نیمه، پایان مسابقه و یک ساعت پس از مسابقه) جمع‌آوری شدند. برای تعیین غلظت کورتیزول و تستوسترون براقی از روش رادیو ایمونو اسی و برای تعیین میزان ایمونوگلوبولین A از روش نفلومتری و دستگاه می‌نی فاستفاده شد. داده‌های حاصل از تحلیل آزمایشگاهی نمونه‌های براقی، با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری‌های مکرر (ANOVA) و آزمون تقيیی شفه برای آزمون فرضیه‌ها استفاده شدند. نتایج این پژوهش با سطح معناداری $p < 0.05$ نشان دادند که بین میزان غلظت کورتیزول براقی مردیان زمان استراحت با یک ساعت قبل از مسابقه، قبل از مسابقه، بین دو نیمه و پایان مسابقه و همچنین بین دو نیمه با یک ساعت بعد از مسابقه تفاوت معناداری وجود داشت. همچنین بین میزان غلظت تستوسترون براقی مردیان یک ساعت قبل از مسابقه با پایان مسابقه، پایان مسابقه با یک ساعت بعد از مسابقه تفاوت معناداری وجود داشت، اما تأثیر معناداری بر غلظت IgA براقی مردیان نداشت.

واژگان کلیدی: فشار روانی مسابقه، کورتیزول، تستوسترون، IgA، مردیان فوتبال

مقدمه
باشگاه‌ها با مجموعه‌ای از خواسته‌ها و ضرورتها در موقعیتهای گوناگون مواجهند. بسیاری براین باورند که نقش آنها از هدایت جلسه تمرینی فراتر رفته

فوتبال ورزشی است که بخش عظیمی از جمعیت جهان را به خود جلب کرده است. مردیان و مدیران

می شود (۳). مازون^۱ در سالهای ۱۹۷۵ و ۱۹۸۸ در دو تحقیق جداگانه نتیجه گرفت که عاملهای روانی در ترشح هورمونهای کورتیزول و آدرنالین هنگام فعالیتهای ورزشی نقش عمده‌ای داشتند (۱۲). الومی و همکارانش^۲ (۲۰۰۳) تغییرات کورتیزول و تستوسترون را در مسابقات راگبی مطالعه کردند. در جریان مسابقه، سطح کورتیزول به شدت افزایش یافت، ولی سطح تستوسترون اندکی کاهش داشت (۶). کوگلر و همکارانش^۳ (۱۹۹۶) در مطالعه‌ای به اثر استرس رقابتی بر کورتیزول و IgA برازی در مریبیان فوتبال پرداختند. هیجان و تنش بیشتر، در مریبیان هنگام مسابقه مشاهده شد. اوج غلظت کورتیزول بین دونیمه بود که صد درصد افزایش یافت. همبستگی معناداری بین کورتیزول و IgA مشاهده نشد. نتیجه این تحقیق نشان داد که تأثیر سرکوبیگری کورتیزول بر IgA درازمدت بود (۱۱). تأثیر عاملهای فیزیکی و روانی بر تغییرات کورتیزول، تستوسترون و IgA در بسیاری از مسابقات مورد مطالعه قرار گرفت و مشاهده شد که مقدار کورتیزول در مسابقات رسمی و پراهمیت نسبت به مسابقات غیر رسمی افزایش بیشتری داشت (۵، ۶، ۷، ۱۱). اما میزان تستوسترون در ورزشکاران با افزایش (۱۳) یا بدون تغییر بود (۶، ۱۹).

روش‌شناسی تحقیق جامعه و نمونه‌آماری

جامعه و نمونه‌آماری تحقیق را ۱۶ نفر از سرمریبیان لیگ برتر فوتبال ایران در فصل مسابقات ۸۳

- 1. Mason
- 2. Elloumi et al
- 3. Kugler et al

است، زیرا نقش گسترش یافته مربی و پذیرش مسئولیت ورزشکاران بیرون از محیط تمرین یا مسابقه و همچنین آگاهی از وضعیت اجتماعی و روانی آنها و سرنوشتی که ممکن است برای کسب نتایج ضعیف در انتظار مریبیان باشد، شرایطی را برای آنان به وجود آورده است که حاصل آن فشار روانی است و بسیاری از مریبیان روز مسابقه آن را تجربه کرده‌اند (۲). مطالعات پژوهشگران نشان داده‌اند که استرس‌های فیزیکی و روانی، موجب تغییراتی در ترشح هورمونها می‌شوند (۴). با توجه به ضرورتهای فیزیکی، روانی و محیطی بازی فوتبال، در کاین موضوع که چرا فوتبال رقابتی، بازیکنان و تماشاگران را تحت فشار زیاد روانی قرار می‌دهد، دشوار نخواهد بود (۲). اهمیت برنده شدن، موجب افزایش تعداد و شدت برخوردهای پر استرس در جریان بازی شده است که مریبیان نیز ناچار به کنار آمدن با رویدادهای استرس زاد در جریان مسابقه می‌شوند (۱۸). مطالعات پژوهشگران نشان داده‌اند که استرس، خواه فیزیکی خواه روانی، موجب تغییراتی در عملکرد قلب و ترشح هورمونهای استرسی می‌شود (۴). این تغییرات می‌تواند عواقب ناخوشایندی به دنبال داشته باشند، و از این رو باید کنترل شوند. برای کنترل استرس ناشی از مسابقه، باید اطلاعات دقیقی درمورد تغییرات هورمونی داشته باشیم. مکانیزم افزایش هورمونها به دنبال اجرای یک مسابقه چندان آشکار نیست. فشار جسمانی مسابقه بر مریبیان وارد نمی‌شود، اما تغییرات هورمونی ممکن است که در نتیجه فشار روانی مسابقه باشد (۴) از طرف دیگر، استرس‌های فیزیکی و روانی هنگام اجرای مسابقات موجب افزایش میزان کاتکولامینها و در نتیجه افزایش ترشح هورمون تستوسترون

آزمون تعییی شفه برای آزمون فرضیه‌ها استفاده شد. برای توصیف آماری داده‌ها از میانگین و انحراف استاندارد و همچنین برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از روش تحلیل عملیات آماری با استفاده از نرم‌افزار SPSS در سطح معناداری ($p \leq 0.05$) استفاده شد.

یافته‌های تحقیق

مشخصات آزمودنیها در جدول ۱ آمده‌اند.

کورتیزول بزاقی

نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیریهای مکرر بر میزان غلظت کورتیزول بزاقی میان مریبان در مرحله‌های نمونه‌گیری نشان دادند که بین میزان غلظت کورتیزول بزاقی مریبان هنگام استراحت با یک ساعت قبل از مسابقه، قبل از مسابقه، بین دو نیمه و پایان مسابقه و همچنین بین دو نیمه با یک ساعت

و ۸۴ تشکیل دادند. همه آزمودنیها در مرحله‌های گوناگون تحقیق شرکت کردند و هیچ یک از آنها اختلالات هورمونی نداشتند و در زمان پژوهش تحت درمان دارویی نبودند.

روش اندازه‌گیری و جمع آوری اطلاعات
 روشناندازه گیری و جمع آوری اطلاعات یک هفته پس از پایان فصل و اتمام مسابقات صورت گرفت. هنگام مسابقه، نمونه گیری بزاقی در پنج مرحله (یک ساعت قبل از مسابقه، قبل از آغاز مسابقه، بین دو نیمه، بلا فاصله بعد از مسابقه و یک ساعت پس از مسابقه) جمع آوری شد. آزمودنیها دهان خود را شستند و چهار میلی لیتر از بزاق خود را به طور تحریک نشده درون لوله آزمایش ۱۶ درصد ریختند. غلظت کورتیزول و تستوسترون بزاقی از روش رادیوایمونواسی و با تعیین غلظت پایه کورتیزول، تستوسترون و IgA آزمودنیها به این

جدول شماره ۱: میانگین و انحراف معیار ویژگیهای آزمودنیها


سابقه مریبگری در لیگ سال	وزن (کیلو گرم)	قد (سانتی متر)	سن (سال)	مریبان (تعداد)	متغیر
۱۱/۶۷ ± ۶/۰۱	۸۱/۸۷ ± ۷/۵۹	۱۷۶/۶۷ ± ۵/۶۸	۵۲/۲۷ ± ۹/۱۸	۱۵	میانگین ± انحراف معیار رو

بعد از مسابقه تفاوت معناداری وجود داشت. برای در کم بهتر اطلاعات به دست آمده، نمودار ۱ ارائه شده است ($p \leq 0.05$).

دلیل بود که در شرایط مسابقه قرار نداشتند و از کیت ایمونوتک استفاده شد. برای تعیین میزان ایمونو گلوبین A از کیت رادیم، روش نفلومتری و دستگاه می‌نی نف استفاده شد.

روشهای آماری


واریانس با اندازه گیریهای مکرر (ANOVA) و




نمودار ۱. میانگین میزان غلظت کورتیزول بزاقی مریبان در مرحله های نمونه گیری

مسابقه با پایان مسابقه، پایان مسابقه با یک ساعت بعد از مسابقه تفاوت معناداری وجود داشت. برای درک بهتر اطلاعات به دست آمده، نمودار ۲ ارائه شده است ($p \leq 0.05$).

نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیریهای مکرر بر میزان غلظت تستوسترون بزاقی مریبان در مرحله های نمونه گیری نشان دادند که بین میزان غلظت تستوسترون بزاقی مریبان یک ساعت قبل از



نمودار ۲. میانگین میزان غلظت تستوسترون بزاقی مریبان در مرحله های نمونه گیری



نمودار ۳. میانگین میزان غلظت IgA بزاقی مریبان در مرحله های نمونه گیری

داد. به نظر نمی رسد آزمودنیها در این تحقیق از نظر بدنش فشاری را متحمل شده باشند. از این رو، تغییر غلظت کورتیزول را احتمالاً می توان با استرسهای روانی ناشی از مسابقه توجیه کرد. تحقیقات گونزالز بونو^۲ روی مریبان بسکتبال پس از مسابقه رسمی، افزایش غلظت کورتیزول را در برندگان و بازندهان گزارش کردن که تفاوت معناداری در پاسخ کورتیزول بین مریبان برنده و بازنده مشاهده نشد (۹). از عاملهای دیگر قبل توجه در توجیه افزایش غلظت کورتیزول، می توان از ماهیت تهاجمی و رودررویی مسابقه فوتبال نام برد که گاهی در جریان مسابقه روی مریبان هردو تیم نیز تأثیرمی گذارد (۱۴). نتایج تحقیق بونین^۳ نشان دادند که برد و باخت از جمله عاملهایی که بر غلظت هورمونها و رفتار انسان اثر گذاشتند (۱۸). در ورزشیان رقابتی و رودررو، پیروزی باعث افزایش تستوسترون و شکست موجب کاهش این هورمون

نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیریهای مکرر در مرحله های نمونه گیری نشان دادند که بین میزان غلظت IgA بزاقی مریبان تفاوت معناداری وجود نداشت. برای درک بهتر اطلاعات به دست آمده، نمودار ۳ ارائه شده است ($p \leq 0.05$).

IgA بزاقی

مطالعات گراهام و زایر^۱ نشان دادند که بخش عمده ای از تأثیر فشار روانی مسابقه بر سطوح کورتیزول، با استرس زا بودن شغل مریبگری نسبت داشت (۲۱، ۸). تحقیقات کوگلر و الومی نیز نشان داده اند که مریبان در جریان مسابقات رسمی و حساس، تنفس و هیجان بیشتری داشتند که با افزایش کورتیزول همراه بود (۶، ۱۱). زایر در تحقیق دیگریه این نتیجه رسید که ترشح کورتیزول بیشتر تابع شدت فعالیت بود و فقط هنگام تمرینهای شدید آزاد می شد و پاسخ آن با فشار کار همبستگی داشت (۲۱). تحقیق حاضر، پاسخ کورتیزول به استرسهای ناشی از مسابقه افزایش معناداری را نسبت به زمان استراحت نشان

1. Graham & Zeier
2. Gonzalez Bono
3. P. F. Brain

نشد. مطالعات کوگلر که به مرور تحقیقات بر وضعیت استرسی و IgA برازی پرداخت، نشان داد که اثر استرس روانی بر IgA چندگانه بود و در دامنه بدون تغییر تا سیار زیاد قرار گرفت (۱۰). کوگلروهمکارانش در تحقیق دیگری به این نتیجه رسیدند که تأثیر سرکوبگری کورتیزول بر IgA دراز مدت و در کوتاه مدت بی تأثیر بود (۱۱). تمرینهای شدید و طولانی مدت موجب کاهش IgA برازی و در نتیجه ابتلای ورزشکاران به عفونتهای تنفسی مجاری فوقانی شد (۸) در تحقیق حاضر، تفاوت معناداری بین میزان غلظت IgA مریبیان در مراحلهای نمونه گیری مشاهده نشد. چون از هر یک از مریبیان فقط در یک مسابقه نمونه گیری برازی گرفته شد، تغییر نیافتن IgA برازی مریبیان را می توان به اثر سرکوبگری کورتیزول برای مونو گلوبولین A نسبت داد که دراز مدت بود (۱۱، ۱۶).

نتیجه

فشارهای روانی ناشی از مسابقه موجب افزایش معناداری در سطوح کورتیزول و تستوسترون برازی مریبیان شد، اما تغییر معناداری در غلظت IgA برازی آنان به وجود نیاورد.

می شود (۱۴). در شرایطی که مسابقه برای افراد اهمیت نداشته باشد، افزایش تستوسترون قبل و در جریان مسابقه مشاهده نمی شود (۱۵). پارهای از مطالعات نیز نشان دادند که سطوح تستوسترون در مسابقات رسمی و غیررسمی تفاوت معناداری نداشت (۱۹، ۶). نتایج تحقیق حاضر نشان دادند که غلظت تستوسترون در مریبیان یک ساعت قبل از مسابقه با اندکی کاهش و سپس تا پایان مسابقه به تدریج افزایش یافت که این افزایش در پایان مسابقه معنادار بود. اما یک ساعت بعد از مسابقه به پایین تراز سطح استراحت رسید. سازوکار افزایش تستوسترون به دنبال اجرای یک مسابقه چندان آشکارنیست. با توجه به ویژگیهای بازی فوتبال، ماهیت تهاجمی و رو در رویی آن، احتمالاً رقابت موجب تغییر تستوسترون در مریبیان می شود (۱۴). فشار روانی مسابقه محركی قوی است که بر استرس‌های فیزیکی در جریان مسابقه نیز افزوده می شود (۱۱). یافته‌های به دست آمده از مطالعات، اغلب ضدونقیض است، زیرا تحقیقات نتایج متفاوتی از تغییرات IgA متعاقب شرایط استرس‌زا نشان داده‌اند (۲۰). در تحقیق حاضر، تفاوت معناداری بین IgA برازی مریبیان در پاسخ به استرس‌های روانی ناشی از مسابقه مشاهده

منابع

۱. اشتراوی، بهزاد، (۱۳۷۴)، مقایسه آثار یک جلسه تمرين شدید در محیطهای معمولی و گرم بر غلظتهاهای ایمونو گلوبولین A و کورتیزول برازی در دوندگان استقامت مرد، فصل نامه المپیک، سال سیزدهم - شماره ۱ (پیاپی ۲۹)
۲. توماس رایلی؛ مارک ولیامز، (۱۳۸۴)، علم و فوتbal. ترجمه: عباس علی گاثینی، فتح الله مسیبی و محمد فرامرزی، تهران، کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی.
۳. رواسی، علی اصغر، (۱۳۷۴)، بررسی تأثیر تمرينات هوازی و بی هوازی بر روی سطوح هورمونهای تستوسترون و رشد، قدرت و ساختار بدن در افراد سالمند (پیان نامه دکترا)، دانشگاه تهران، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.
۴. واعظ موسوی، سید کاظم، محمد علی آذری‌یاجانی، مجید باغدانی، (۱۳۶۵)، «تأثیر یک دوره مسابقات تیر اندازی بر غلظت تستوسترون، کورتیزول برازی و خلق و خود در تیراندازان نخبه، گزارش طرح تحقیقی، دانشگاه امام حسین (ع)، گروه تربیت بدنی.
5. Aubets,J.,and Seggura,J. (1995) .Salivary cortisol as a maker of competition related Stress. Science et Sports.1Q:149-154.
6. Elloumi M , Maso F , Michaux O , Robert A , Lac G. (2003) . Behavior of saliva cortisol (C). testosterone (T) and the T/C ratio during a rugby match and during the post –competition recovery days Eur J Appl. Physiol: 1-2.
7. Filaire,E.,Le Scanff,C., duche, P., Lac,G. (1999) .The relationship between salivary adrenocortical hormones changes and personality in elite female athletes during handball and volleyball competition. Res Quar Exer sport.3 :297-302.
8. Graham N.M.H, Douglas R.M , & Rayan P. (1986) . Stress and acute respiratory infection. American jurnal of Epidemiology. 124:389-401
9. Gonzalez-Bono,E.,Salvador,A.,SerranoM.A.,Ricart (1999) .Testosterone,cortisol and mood in a sports team competition.Horm Behav.35: 55-62.
10. Kugler, J (1991) .Emotional status and immunoglobulin A in saliva: Review of the literature.Psychother Psychosom Med Psychol. 6:232-242
11. Kugler, J Reintjes, F Tewes, V Schedlowski, M. (1996) .Competition stress in soccer coaches increase salivary immunoglobulin A and salivary cortisol concentrations Sports Med Phys Fitness.36:117-12010-
12. Mason-j. W.(1988). A review of psycho endocrine research on sympathetic adrenal medulary system. Psychosom med. 30: 631-653.
13. Mazur, A. (1985) . A biosocial model of status in face-to-face primate groups.Soc.Forces.64 : 377-402.
14. Mazur,A.,Booth,A.,Dabbs,J.(1992). Testosterone and chess competition.Social Psychology quarterly.1:70-77
15. Mazur, A., and Lamb,T.A. (1980). Testosterone stauts and mood in human male.Horm. behave. 14:236-246.
16. Machinnon, L.T. (1997) .Effects of overtraining on immune functions. in Keerider.R.B Fry.A.C :O, Toole.M,L. Eds.overtraining in sports.Human Kinetics Books: 219-241.
17. Miletic,I,D:Schiffman,SS:Mitetic,V,D:Sttely Miller,E,A: (1996) .Salivary IgA secretion rate in young and elderly persons physiology and Behavior. 60 (1) :243-248
18. P,F.Brain. (1990) . Stress in agonistic contexts in rodents.in:R.Dantzer and R.Zayanm,editors,stress in domestic animals.Dordrecht, Kluwer: 73-85.
19. Passelergue, P., Lac, G . (1999) .saliva cortisol, testosterone andT/C ratio variations during a wrestling competition and during the post competitive recovery period.Int.J.Sports.Med.20:109-113.
20. Valdimarsdottir, H B Stone,AA (1997). Psychosocial factors an secretary immunoglobulin A Crit Rev.Oral Biol Med. 4:461-474.
21. Zeier, H Brauchli, P Joller, Jemelka, H I. (1996) .Effects of work demands on immunoglobulin A and cortisol in air traffic controllers. Biol Psychol.3:413-423.