

همه‌گیرشناسی بیماریهای روانی در ایران: بازنگری پژوهشی بررسیهای انجام شده

مجلتبی احسان منش*

چکیده

همه‌گیرشناسی بیماریهای روانی نقش مهمی در شناخت وضعیت موجود بهداشت روان جامعه و برآورده امکانات مورد نیاز آن در هر مقطع زمانی دارد. در این بازنگری با تکاهی به برخی از پژوهش‌های انجام شده در زمینه همه‌گیرشناسی بیماریهای روانی در جهان، یافته‌های پژوهشی ۲۹ بررسی انجام شده در ایران بازبینی شده و به چند ابزار به کار گرفته شده در پژوهش‌های همه‌گیرشناسی اشاره شده است. این بازنگری نشان داد که شیوع اختلال‌های روانی در بررسیهای مختلف بسیار متفاوت گزارش شده است. در این بررسیها که با به کار گیری ابزار مختلف و روشهای پژوهشی متفاوت انجام شده و بر روی جمعیت‌های گوناگون با شرایط اقتصادی - اجتماعی مختلف اجرا گردیده، میزان شیوع اختلال‌های روانی را در جمعیت‌های مورد بررسی از ۸٪ تا ۵۳٪ در نوسان نشان داده‌اند. شاید بتوان شیوع مقطعی قابل قبول را بین ۱۸ تا ۲۳٪ جمعیت عمومی دانست که رقمی بالاتر از کشورهای غربی است، شیوع پیشتر اختلال‌های روانی در زنان که گاهی به ۲ تا ۳ برابر میزان شیوع آن در مردان است از نکات مهم مورد اشاره در بررسیها بوده است. در پایان برخی مشکلات روش شناختی در پژوهش‌های همه‌گیرشناسی بیماریهای روانی بر شمرده شده است.

کلید واژه: همه‌گیرشناسی، بیماریهای روانی، ایران.

قرار گرفته است. با تکیه به بررسیهای دقیق همه‌گیرشناسی بیماریهای روانی، مسئولان بهداشت و درمان کشورها می‌توانند در هر مقطع زمانی به صورت دقیق و بدون صرف وقت میزان شیوع و بروز بیماریها را اعلام نمایند، برآورده از میزان خدمات بهداشتی - درمانی نیاز ارائه دهند و در راستای بهینه نمودن ارائه خدمات برنامه‌ریزی کنند. از سوی دیگر اهمیت انجام بررسیهای گسترده

نظر به اهمیتی که بررسیهای همه‌گیرشناسی بیماریهای روانی و اختلال‌های رفتاری در شناسایی ارتباط میان ویژگیهای جمعیت شناختی و بیماریها از یک سو و برآورده منابع مورد نیاز خدمات بهداشت روانی و برنامه‌ریزیهای مربوط به ارائه خدمات بهداشتی - درمانی از سوی دیگر دارند، بررسیهای همه‌گیرشناسی به ویژه بیماریهای روانی مورد توجه پژوهشگران و مسئولان امور بهداشتی - درمانی

* کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، پژوهشگر بخش پژوهش انتیپریو روانپژوهی تهران، تهران، خ طالقانی، کوچه جهان، پلاک ۱.

دیده می شود. مذهب، نژاد، سنتها، سیاست کلی کشورها و امکانات قابل دسترس بهداشت روانی برای همگان نه تنها در هر کشور متفاوت است بلکه خود در معرض تغییرات شدید و روزافزون قرار دارند. تنوع در ارائه خدمات بهداشت روانی از یک کشور تا کشور دیگر می تواند در نتیجه تفاوت‌های جغرافیایی، اقلیمی، جمعیتی، نسبت جمعیت روستایی به شهری و جلگه‌ای یا کوهستانی بودن کشورها باشد (اپلبی^(۲) و آرایا^(۳)، ۱۹۹۱).

کاربرد پرسی‌های همه‌گیرشناسی

موریس^(۴) (۱۹۵۷)، به نقل از استروم‌گرن^(۵) (۱۹۸۹) کاربرد بررسیهای همه‌گیرشناسی را به شرح زیر جمع بندی نموده است:

- ۱- بررسیهای تاریخی وضعیت موجود بهداشت جوامع، چگونگی فراز و نشیب بیماریها در جمعیت‌های مختلف و امکان پیش‌بینی همه‌گیرشناسی بیماریها را در آینده میسر می‌سازد.
- ۲- شناسایی توزیع فراوانی تشخیص‌های عنوان شده در مورد بیماریها و بهداشت جوامع.
- ۳- بررسی وضعیت ارائه خدمات بهداشتی - درمانی جامعه.
- ۴- برآورد میزان خطر ابتلاء افراد جامعه به بیماری‌های مختلف.
- ۵- تکمیل تابلوالینی با گنجاییدن انواع بیماران و بیماری‌های مربوطه و بررسی تغییرات به وجود آمده در طول زمان در کشورهای مختلف.
- ۶- شناسایی نشانگان مختلف.
- ۷- بررسی علل بیماری و سلامت، پژوهش در مورد تفاوت‌های موجود در سبک زندگی گروههای مختلف.

گرچه همه نکات یاد شده در مورد همه‌گیرشناسی

همه‌گیرشناسی بیماریهای روانی در کشورهای رو به رشد از هنگامی مورد توجه بیشتر واقع شد که بررسیهای پراکنده همه‌گیرشناسی در این کشورها شیوع بیماریهای روانی و اختلالهای رفتاری را بسیار بیشتر از آنچه که پیشتر گمان می‌رفت نشان دادند (صاحب الزمانی، ۱۳۴۲؛ سازمان جهانی بهداشت، ۱۹۷۵). این تصور از آنجا ناشی شده بود که گمان می‌رفت رشد شتابان پیشرفت‌های تکنولوژیک در کشورهای پیشرفته صنعتی به دلیل چندی از جمله زندگی در شهرهای شلوغ، آلودگیهای گوناگون محیطی، محدود شدن ارتباطها و حمایتهای سنتی خانوادگی، بیکاری ناشی از بحرانهای اقتصادی و مانند آن فشارهای روانی بی‌شماری را پیوسته بر ساکنین این شهرها تحمیل نموده اند که خود بروز اختلالهای روانی را به دنبال دارند و یا آن را تشید می‌کنند؛ در حالیکه این عوامل در کشورهای رو به رشد و یا مناطق روستایی کمتر دیده می‌شود.

بررسیهای انجام شده نشان داده اند که ۱٪ مردم جهان یعنی بیش از ۴۵ میلیون نفر از بیماری صرع رنج می‌برند (سازمان جهانی بهداشت، ۱۹۸۴) و میزان شیوع سالیانه اختلالهای روانی و اعتیاد ۱٪/۲۸٪ جمعیت جهان برآورده است که اختلالهای رفتاری و اعتیاد ۰٪/۲۰٪ از این افراد درمان نشده رها شده‌اند (سادوک^(۱) و سادوک، ۲۰۰۰). بررسیها همچنین گویای آن هستند که دست کم ۵٪ درصد از جمعیت جهان در دوره‌ای از زندگی خویش از بیماری‌های روانی رنج می‌برند (سازمان جهانی بهداشت، ۱۹۷۵). در کشورهای روبه رشد همانند دیگر نقاط جهان، بیماری‌های شدید روانی (مانند اسکیزوفرنیا و اختلالات عاطفی) بخش عظیمی از این بیماران را تشکیل می‌دهند. در این کشورها، بیماری‌های روانی پس از بیماری‌های عفونی مقام دوم را دارا می‌باشند (همان جا). از سوی دیگر تاثیر موازین فرهنگی را بر بیماری‌های روانی نه تنها بر نشانه‌ها و محتواهای هذیانها می‌توان دید، بلکه در چگونگی درمان بیماریها در جوامع مختلف نیز

گزارش شده است. پیش از آنکه بررسیهای همه‌گیرشناسی انجام شده در ایران باز نگری شود، نگاهی به تاریخچه و برخی از بررسیهای همه‌گیرشناسی بیماریهای روانی درجهان ضروری به نظر می‌رسد.

همه گیرشناسی بیماریهای روانی در جهان
گرچه این بررسیها از سالها پیش آغاز گردیده، اما تتابع بسیاری از آنها به دلیل به کار نبردن معیارهای علمی پژوهش قابل اعتماد نبوده و دارای ارزش محدودی هستند (رابینز^(۸)، ۱۹۸۵).

مروری بر بررسیهای انجام شده در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که بسیاری از بررسیهای همه‌گیرشناسی بیماریهای روانی بر اساس اطلاعات به دست آمده از پذیرش مراکز روانپزشکی و مراجعته کنندگان به درمانگاهها و بیمارستانهای روانی شکل‌گرفته‌اند. برای نمونه در پژوهش فاریس^(۷) و دانهایم^(۸) در سالهای ۱۹۳۴ - ۱۹۲۲، ۱۹۲۲، ۱۹۰۰۰۰ پرونده مراجعته کنندگان به یکی از مراکز روانپزشکی در شیکاگو مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین درصد پذیرش شدگان رابیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا تشکیل داده‌اند و بیشتر آنها از گروههای اقتصادی - اجتماعی پایین جامعه بوده‌اند. در بررسی دیگری که در سال ۱۹۶۰ در منطقه مونروی نیویورک انجام گردید، استفاده کنندگان از خدمات روانپزشکی در میان ساکنین منطقه یاد شده مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که ۳٪ از ساکنین منطقه یاد شده از مراقبتها و خدمات مراکز بهداشت روانی از جمله مطب روانسپزشکان استفاده کرده‌اند (کاپلان^(۹) و سادوک^(۱۰)، ۱۹۸۸).

بیماریهای روانی کاربرد دارد، اما بندهای ۱ و ۲ در بهداشت روانی دارای اهمیت ویژه‌ای است؛ زیرا آگاهی نسبت به گستره بیماریهای روانی در یک جمعیت معین در یک مقطع زمانی خاص بسیار ضروری است. از سوی دیگر بررسیهای همه گیری شناسی، گروههای در معرض خطر را شناسایی و مسئولین بهداشتی - درمانی کشورها را در مورد پیشگیری از پیامدهای خطرناک بیماریها و اختلالات مختلف آگاه می‌کنند (ساتوریوس^(۱)، ۱۹۸۹).

منابع کسب اطلاعات در بررسیهای همه‌گیرشناسی
اطلاعات و داده‌های مربوط به همه‌گیرشناسی بیماریهای روانی از چهار منبع مهم به دست می‌آیند:

۱- بررسیهای میدانی که بر روی جمعیت‌های عمومی در مناطق مختلف صورت می‌گیرد.

۲- مراجعه به پرونده بیماران مراجعه کننده به نخستین سطح تماس بیماران با مراکز بهداشتی - درمانی از جمله خانه‌های بهداشت، پزشکان عمومی، به ویژه پزشکان خانوادگی.

۳- بررسی موارد ثبت شده در کلیه مراکز درمانی اعم از بیمارستانهای روانی، مراکز بستری و سرپایی روانپزشکی که با عنوان بیمار روانی تحت درمان قرار گرفته‌اند و یا مشغول دریافت خدمات روانپزشکی هستند.

۴- کنترل موردي که در آن فرد معینی با اختلال رفتاری خاصی با فرد دیگری که به این اختلال مبتلا نیست مقایسه می‌شود (استرومگرن، ۱۹۸۹؛ شفرد^(۲)، ویلیامز^(۳)، ویلکینسون^(۴)، راوتزلی^(۵)، ۱۹۸۹).

روش

این بازنگری از یافته‌های پژوهشی بیش از ۲۹ بررسی همه‌گیرشناسی بیماریهای روانی که تساکنون در ایران انجام شده استخراج گردیده است. این بررسیها طی سالهای مختلف از سال ۱۳۴۲ تا سال ۱۳۷۹ انجام و

1-Sartorius	2-Shepherd
3-Williams	4-Wilkinson
5-Rawnsley	6-Robins
7-Faris	8-Dunham
9-Kaplan	10-Sadock

از امارات حاشیه خلیج فارس می باشد که در آن ۳۰۰ نفر از زنان امیر نشین دویسی مورد بررسی قرار گرفتند(گویا^(۱۲)، حمدی^(۱۴)، بینگتون^(۱۵)، ۱۹۹۲). این بررسی نشان داد که ۲۲/۷٪ از افراد مورد بررسی در ردیف بیماران روانپزشکی به شمار می رفتند. شایع ترین اختلال در میان این افراد، افسردگی (۱۳/۷٪ موارد)، اختلالهای اضطرابی (۴٪) و ترسهای مرضی (۳٪) بوده است. تایع چندبررسی همه گیری شناسی بیماریهای روانی در کشورهای مختلف جهان در جدول یک ارائه گردیده است.

بررسیهای همه گیری شناسی بیماریهای روانی در ایران
بررسیهای همه گیرشناسی بیماریهای روانی در ایران با پژوهشی‌های پروفسور باش^(۱۶) آغاز می‌شود که در اوایل دهه ۱۹۶۰ به عنوان استاد میهمان به دانشگاه شیراز دعوت شده بود. وی طی چند سال چندین بررسی همه گیرشناسی در چند روستای نزدیک شیراز، چند روستای خوزستان و مناطق شهری شهر شیراز انجام داد. این بررسیها میزان شیوع بیماریهای روانی را بسیار بیش از حد انتظار نشان دادند (باش، ۱۹۶۴؛ باش، ۱۹۶۹؛ باش، ۱۹۷۳).

پس از بررسیهای باش تا دهه ۱۳۷۰ چند بررسی همه گیری شناسی انجام گردید. اما بیشتر بررسیها در این زمینه در دهه ۱۳۷۰ انجام گردیده است (جدول ۲).

بازنگری بررسیهای انجام شده در زمینه همه گیرشناسی بیماریهای روانی در ایران نشان می‌دهد که از سال ۱۳۴۲ تا سال ۱۳۷۷ نزدیک به ۲۹ بررسی گزارش گردیده است. تایع کلی این پژوهشها نشان می‌دهند که

در سال ۱۹۵۴ تیمی به رهبری لئو سرول^(۱) و توماس رین^(۲) پژوهشی را در ارتباط با وضعیت روانشناختی و مشکلات روانی ۱۶۶۰ نفر که از بزرگسالان ساکن در منطقه میدتاون^(۳) مانهاتن^(۴) انتخاب شده بودند، اجرا نمودند(سرول^(۵)، فیشر^(۶)، ۱۹۸۹). این بررسی نشان داد که بیماریهای روانی با افزایش سن افزایش می‌یابند. ۸۱٪ از افراد ۲۰-۵۹ ساله مورد بررسی دارای نشانه‌هایی بوده‌اند که آنها دچار ناتوانی‌های خفیف تا شدید نموده اند. ۴/۲۳٪ از آنها دارای مشکلات اساسی روانشناختی بوده‌اند. کسانی که از طبقات اقتصادی - اجتماعی پایین بودند، شش برابر بیشتر از کسانی که از طبقات اقتصادی - اجتماعی بالاتر آمده بودند، مشکلات روانشناختی را گزارش نمودند. در بررسی دیگری نیز هالینگش^(۷) و ردلينج^(۸) در سال ۱۹۵۰ ارتباط شیوع بیماریهای روانی را با وضعیت اقتصادی - اجتماعی بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی در منطقه نیوهاون^(۹) مورد پژوهش قرار دادند. آنان ارتباط مشخصی رامیان طبقه اجتماعی و بیماریهای روانی نشان دادند. ایشان دریافتند که ۱۵/۱٪ جمعیت بزرگسال بالاتر از ۲۶ سال نشانه‌هایی از اختلال روانی داشته‌اند(کاپلان، سادوک، ۱۹۸۸).

لیگتون^(۱۰) در سال ۱۹۵۲ در منطقه استرلینگ^(۱۱) با ۲۰۰۰۰ جمعیت شیوع بیماریهای روانی را مورد بررسی قرار داد. این افراد در یک منطقه روستایی زندگی می‌کردند. تایع نشان داد که می‌توان ۵۷٪ افراد را به عنوان کسانی که در طول عمر خویش به بیماری روانی مبتلا می‌شوند، معرفی نمود. این بررسی نشان داد که ۲۴٪ افراد دچار آسیبهای قابل توجه روانشناختی و ۲۰٪ آنان نیازمند خدمات روانپزشکی بوده‌اند. همچنین زنان بیشتر از مردان به اختلالهای روانپزشکی دچار بوده‌اند (مورفی^(۱۲) و لیگتون، ۱۹۸۹). یکی از بررسیهای همه گیری شناسی بیماریهای روانی که به شرایط فرهنگی - اقتصادی - اجتماعی کشور مانزدیکتر است، بررسی همه گیرشناسی بیماریهای روانی در میان زنان یکی

1-Leo Srole	2-Renine
3-Midtown	4-Manhattan
5-Srole	6-Fischer
7-Hollingshead	8-Redlich
9-New Haven	10-Leighton
11-Stirling	12-Murphy
13-Ghubash	14-Hamdi
15-Babington	16-Bash

جدول ۱ - برخی برسی های انجام شده در زمینه همه گیرشناصی در کشورهای روانی در پژوهشگر، تاریخ انتشار، شمار آزمودنیها، سن آزمودنیها، محل پژوهش و میزان شیوع در زنان و مردان.

پژوهشگر	تاریخ انتشار	شمار آزمودنیها	محل پژوهش	میزان شیوع	کل
			مردان	زنان	
باشر (۱)	۱۹۶۱	-	مناطق روستایی سودان	-	۶/۶
لیکن و همکران (۲)	۱۹۶۳	۳۲۶	مناطق شهری و روستایی نیجریه	-	۳۳
چاپاوندر (۳)	۱۹۶۹	۲۵۰۶	مناطق روستایی سریلانکا	-	۱۰
لین (۴)	۱۹۶۹	-	مناطق شبهی و دریستی اندیمان	-	۱۷/۲
ذیل (۵)	۱۹۶۹	۳۲۰	انجعی	-	۱۲/۸
درب (۶)	۱۹۷۰	۲۹۴۶۸	مناطق شبهی و درستایی هند	-	۲۳/۷
ماریانکوی (۷)	۱۹۷۰ *	۲۹۰۱	لیدا پور	-	۱۸/۷
تارنیولسکی (۷) و همکران	۱۹۷۰ *	-	برئوس آبرس آرژانتین	-	۱۷/۴
هردویتر (۸) و همکران	۱۹۷۸ *	-	سانیاگو (۹) شیلی	-	۱۹
وینک (۱۰) و همکران	۱۹۷۹ *	۲۳۷	کسرول (۱۱) - لندن	-	-
همدرسون (۱۲) و همکران	۱۹۷۹ *	۷۰۹	کنتر (۱۳) - استرالیا	۱۱	۹
* به تقلیل از سازمان جهانی بهداشت، آ. ۱۹۷۵					

- 1-Baasher
- 2-Jayasundra
- 3-Lin
- 4-Giel
- 5-Dube
- 6-Mariategui
- 7-Tarnopolsky
- 8-Honwitz
- 9-Santiago
- 10-Wing
- 11-Camberwell
- 12-Henderson
- 13-Canberra

جدول ۱ - ادامه

کل	مردان	زنان	میزان شیوع	محل پژوهش	سن آزاد مودهها	شماره آزاد مودهها	تاریخ انتشار	پژوهشگر
۲۵/۳	۲۶/۹	۲۳/۵	روستاهای اولگاندا	۱۸+	۲۰	۱۹۷۹*	۱۹۷۹*	ارلی (۱) وینگ
۱۰/۴	۱۴/۹	۱/۶	کمپرول - لندن	۱۸-۲۶	۸۰۰	۱۹۸۱*	۱۹۸۱*	بیشنگون و همکاران
-	۸/۷	-	اوپنورگ (۳) - کالجند	۱۸-۲۶	۵۶۵	۱۹۸۳*	۱۹۸۳*	سورتیر و همکاران
۱۶	۲۲/۶	۸/۶	آتن - یونان	۱۸-۲۷	۲۸۹	۱۹۸۴*	۱۹۸۴*	ساورز (۴) و همکاران
۷/۳	۷/۵	۷/۲	بیچکم (۶) - هاند	۱۸-۲۶	۲۲۲۲	۱۹۸۷*	۱۹۸۷*	مودیامونت (۵) و همکاران
۱۲/۱	۱۹/۷	۸/۸	گریک کپریوت (۷) - لندن	۱۸-۲۶	۲۹۱	۱۹۸۷*	۱۹۸۷*	ساورز و بیشنگون
۱۲/۷	۲۰/۶	۸/۱	کات بریا (۱۰) - سپانیا	۱۷+	۱۲۲۲	۱۹۸۷*	۱۹۸۷*	وازکوئز (۸) ویارکورو (۹)
۱۲/۵	۱۲/۳	۱/۰	پالسیانگ (۱۱) - آندرزی	۱۸-۲۰	۱۰۰	۱۹۸۹*	۱۹۸۹*	باهر (۱۱)
۹/۴	۱۲/۴	۹/۶	فنلاند	۲۰-۲۸	۷۷۲	۱۹۹۰*	۱۹۹۰*	لهنین (۱۲) و همکاران
-	۷/۷	-	نیوزلند	۱۸-۲۶	۳۱۲	۱۹۹۰*	۱۹۹۰*	کلارکسن (۱۵)
۱۵/۳	۱۹/۶	۱۰/۵	ساردینیا (۱۷)	۱۸-۲۶	۳۷۳	۱۹۹۱*	۱۹۹۱*	رومانو (۱۲)، کارتا (۱۶) و همکاران
-	۲۲/۷	-	دویی - مارات متعدد عربی	۱۸-۲۶	۳۰۰	۱۹۹۲	۱۹۹۲	گوشاش (۱۸) و همکاران

* بد نقل از گمیش، ۱۹۹۲

- 1-Oriey
- 2-Surtees
- 3-Edinburgh
- 4-Mavreas
- 5-Hodiamont
- 6-Nijmegen
- 7-Kyriots
- 8-Vazquez
- 9-Barquero
- 10-Cantabria
- 11-Bahar
- 12-Palembang
- 13-Lehtinen
- 14-Romans
- 15-Clarkson
- 16-Carta
- 17-Sardina
- 18-Gobash

جدول ۱- بررسی بررسیهای روانی در زمینه مهله گیرشناختی شده در انجام تام پرورشگر، سال انتشار، محل پژوهش، گروه مورد بررسی، شمار افراد مورد بررسی، ابزار پژوهش و

محل		گروهمنی	افراد مورده بررسی	ازار پویه	کل
مردان	زنان	مردان	زنان	مردان	کل
بابش، ۱۹۶۹	فاسد آباد، زنجی آباد	عساله و بالاتر	۴۹۷	۲۳۶	۱۱/۸
بابش، ۱۹۷۳	قلمه عسکر جبار	عساله و بالاتر	۴۸۲	-	۱۴/۹
بابش، ۱۹۷۳	شمیرپلزار	۵۱۸/۱	-	-	۱۱/۱
بابلستان، ۱۳۰۳	۱۰ ساله و بالاتر	۵۲۳	۳۰۸	۷/۰	۶/۰
بابلستان، ۱۳۰۳	۱۵ ساله و بالاتر	۴۸۸	۲۹۹	۴/۴	۴/۴
شاهزاده باقری، ۱۳۷۳	کلیه سنین	۲۰۸۳	-	-	۱۳/۴۰
بابلستان، ۱۳۶۹	دو زرشک (زید)	۱۶۰۶	۵۱	۱۹/۷	۵۳/۷
بابلستان، ۱۳۷۰	دو زرشک (زید)	۱۳۷۰	۵۰	-	۳۴
بابلستان، ۱۳۷۰	برستنامه داویدیان	-	-	-	۵/۶۳
بابلستان، ۱۳۷۰	اصفهان	-	-	-	۳/۹۰
بابلستان، ۱۳۷۰	سبید (زید)	۴۰۰	۲۰۴	۹/۲۵	۳/۲۰
بابلستان، ۱۳۷۰	۱۰ ساله و بالاتر	۴۰۰	-	-	۱۲/۰
بابلستان، ۱۳۷۰	سدابه بالینی	۴۰۷	-	-	۵/۱۵
بابلستان، ۱۳۷۰	سدابه بالینی	۴۶۰	-	-	۴/۷۳
بابلستان، ۱۳۷۰	گتاباد (خوارسان)	۱۵	-	-	۱۱/۸
بابلستان، ۱۳۷۲	۱۰ ساله و بالاتر	۱۵	-	-	۱۶/۶
بابلستان، ۱۳۷۲	سروششت - خارس	۱۵	-	-	۱۳/۲
بابلستان، ۱۳۷۲	جایردی، ۱۳۷۲	۱۳۷۲	-	-	۵/۱۵
بابلستان، ۱۳۷۲	آذرشهر (تیرن)	۱۵	۲۰۱	۴۱۰	۳/۶
کوکب، ۱۳۷۲	کوکب، ۱۳۷۲	۱۳۷۲	۲۱۴	۹/۴	۱۳
شهم بزد	آذربایجان، ۱۳۷۲	۱۳۷۲	-	-	۱۳/۵
شهم بزد	آذربایجان، ۱۳۷۲	۱۳۷۲	-	-	۲۳/۷
شهم بزد	آذربایجان، ۱۳۷۲	۱۳۷۲	-	-	۱۸/۶
شهم بزد	آذربایجان، ۱۳۷۲	۱۳۷۲	-	-	۱۸/۴
شهم بزد	آذربایجان، ۱۳۷۲	۱۳۷۲	-	-	۲۶/۲
شهم بزد	آذربایجان، ۱۳۷۲	۱۳۷۲	-	-	۲۷
شهم بزد	آذربایجان، ۱۳۷۲	۱۳۷۲	۲۰	۰۰	۲۶/۴
کاشان	آذربایجان، ۱۳۷۲	۱۳۷۲	۲۱۶	۳۲۳	۱۶/۹
کاشان	آذربایجان، ۱۳۷۲	۱۳۷۲	-	-	۲۳/۷
مصحبه بالینی	مصحبه بالینی	-	-	-	-

جدول ۲ - ادامه

میزان شیوع (%)	افراد مود برسی		محل	گروه‌منی مود برسی
	مردان	زنان		
کل	۱۲۲	۵۱	GHO-28	بعنی و همکاران، ۱۳۷۳
۲۷/۷ ۱۷۳	۱۷۲	۵۱	SCL-90-R	صومده سرا (گلستان)
۱۱/۷	۱۷/۰	-	-	۱۰ ساله و بالاتر
۱۱/۲	-	-	-	۱۱-۱۶ ساله
۱۸/۹	۱۹/۴	GHO-28	کلیه انسانها	بیو الهوی و همکاران، ۱۳۷۳
۶/۹	۶/۷	۱۰۰	کلیه سینن	کلیه انسانها
۱۴	-	SCL-90-R	کلیه انسانها	بیو ع ۱۳۷۳
۱۹/۹	-	PSE فرم مصاحبه	کلیه انسانها	ایرانشهر سیستان و بلوچستان
۲۵/۴	۲۶/۵	SRQ-20	۱۵ ساله و بالاتر	۱۳۷۳
۱	۵۹/۲	۴۰/۸	DSM-IV	افشاری مشهد و همکاران، ۱۳۷۳
۲۱/۵	۲۷/۷	SCL-90-R	شوشترستان سمنان	شوشترستان سمنان
۲۲/۱	۲۱/۸	SRO-20	۱۵ ساله و بالاتر	شوشترستان سمنان
۲۲/۲۰	۲۱/۳	GHO-28	شوشترستان سمنان	شوشترستان سمنان
۱۶/۰۵	۲۲/۲۲	SRQ	۱۵ ساله و بالاتر	شوشترستان سمنان
۲۶/۹	۳۵/۷	GHO-28	۱۵ ساله و بالاتر	شوشترستان سمنان
۱۶/۸	۱۴/۱	پرسشنامه رائز	۱۵ ساله و بالاتر	شوشترستان سمنان
		مساحبه روانپردازی	۱۱-۱۶ ساله	شوشترستان سمنان
			بیو شهر	کشتکولی، ۱۳۷۹
			شہرکرد	شہرکرد
			شہر تهران	نورپلا و همکاران، ۱۳۷۳
			دانشجویان پرشکی	فروغان و همکاران، ۱۳۷۹
			نظر	امیدی و همکاران، ۱۳۷۹
			کرمانشاه	صادقی و همکاران، ۱۳۷۹
			ساوجبلاغ	شمس علیزاده و همکاران، ۱۳۷۹
				کشتکولی، ۱۳۷۹

پرسشنامه فهرست علایم ۹۰ مفهولی

این پرسشنامه توسط دراگوتیس^(۵)، لیپمن^(۶) و کووی^(۷) (۱۹۷۳) تدوین و معرفی گردیده است. این پرسشنامه دارای ۹۰ پرسش است که در ۹ بخش نشانه های اختلالاتی روانی را مورد سنجش قرار می دهد: شکایات جسمانی، وسوس و اجبار، حساسیت در روابط متقابل، افسردگی، اضطراب، پرخاشگری، ترس مرضی، افکار پارانوییدی و روانپریشی. تفسیر نمره های آزمون بر پایه سه شاخص کلی علایم مرضی (GSI)، معیار ضریب ناراحتی (PSDI) و جمع علایم مرضی (PST) انجام می شود.

در بررسیهای هنجاریابی انجام شده برای اعتبار و پایایی این آزمون نمره برش ۴/۰ در شاخص کلی علایم مرضی مناسب تشخیص داده شده (میرزاپی، ۱۳۵۹). در بررسیهای چندی (باقری یزدی و همکاران، ۱۳۷۳؛ جاویدی، ۱۳۷۲؛ بهادرخان، ۱۳۷۲) نیز همین نمره به عنوان نقطه برش به کار برده شده است. گفتنی است که نمره گذاری این آزمون بسته به نظر نمره گذار می تواند بسیار متفاوت بوده سطح نمرات و دیگر شاخصهای اساسی آزمون را بسیار بالا یا بسیار پایین نشان دهد. از این رو درک ماهیت ارزیابی نشانه های روانشناختی از سوی نمره گذار نقش اساسی در بازنگشتن نشانه های روانشناختی واقعی آزمودنی دارد.

پرسشنامه سلامت عمومی

این پرسشنامه که توسط گلد برگ^(۸) (۱۹۷۲) تدوین گردید، برای شناسایی اختلالاتی روانی غیر پسیکوتیک در شرایط گوناگون در سطح گسترده ای به کار گرفته شده است. فرم کوتاه و کامل این پرسشنامه در بررسیهای

میزان شیوع اختلالاتی روانی در بررسیهای مختلف از ۱۱/۷٪ (باش، ۱۳۴۲) تا ۵/۵٪ (جلیلی، ۱۳۵۷) در نوسان بوده است. برای نمونه بررسی باش (۱۹۶۴) در مناطق مرودشت فارس، روستاهای خوزستان (باش، ۱۹۶۹) و مناطق شهری شیراز (باش و باش، ۱۹۷۳) به ترتیب ارقام ۱۱/۷، ۱۴/۹ و ۱۸/۶ را نشان می دهد. شیوع بیماریهای روانی در بررسیهای باقری یزدی، بوالهری و شاه محمدی (۱۳۷۳)، کوکبه (۱۳۷۲) بهادرخان (۱۳۷۲) و جاویدی (۱۳۷۲)، که در سالهای اخیر اجرا شده اند، به ارقام ارائه شده از سوی باش (۱۹۶۹، ۱۹۶۴) و باش و باش (۱۹۷۳) بسیار نزدیک است که به ترتیب ارقام ۱۲/۵٪، ۱۳٪، ۱۶/۶٪ و ۱۶/۷٪ را گزارش نموده است. در سوی دیگر طیف بررسیهای انجام شده توسط داویدیان و همکاران (۱۳۷۰) و داویدیان و جلیلی (۱۳۵۰) قرار دارد که به ترتیب ارقام ۲/۴۳٪ و ۷/۵۳٪ را یادآور شده اند (جدول ۲). باش در مروزی بر بررسیهای انجام شده در ایران، شیوع بیماریهای روانی را در مناطق روستایی ۹/۱۴٪ و در مناطق شهری ۶/۱۶٪ عنوان کرد. گفتنی است که در برخی از پژوهشها همه گیرشناصی اختلالاتی رفتاری تنها بر یک اختلال رفتاری معین مانند اسکیزوفرنیا، افسردگی و یا اختلال سلوکی تاکید شده است. در زمینه ابزار پژوهشی به کار برده شده در پژوهشها همه گیرشناصی بیماریهای روانی در ایران، با نگاهی به این پژوهشها می توان دریافت که چند آزمون بیش از سایر آزمونها به عنوان ابزار سرند اختلالاتی روانی به کار برده شده اند که از آن جمله می توان به آزمون (۱) GHQ، (۲) SCL-90-R و مصاحبه روانپردازی اشاره نمود. در

بررسی پژوهشها انجام شده در زمینه همه گیرشناصی بیماریهای روانی به ابزارهای دیگری از جمله پرسشنامه SRQ-20^(۹) و مقیاس رویدادهای زندگی (ILES)^(۱۰) نیز بر می خوریم که برای هر یک از آنها شرح کوتاهی ارائه می گردد.

1-General Health Questionnaire

2-Symptom Checklist-90-Revised

3-Self Report Questionnaire

4-Interview Life Events Scale

5-Derogatis

6-Lipman

7-Covi

8-Goldberg

برش این پرسشنامه (۲۲) حساسیت، ویژگی و میزان کلی اشتیاء را به ترتیب ۸۸٪، ۷۹٪ و ۱۶٪ گزارش تمودند.

SRQ-20

این پرسشنامه که توسط سازمان جهانی بهداشت با بهره‌گیری از چهار ابزار سرند ماخته شده در یک بررسی ماهانگ در چند کشور رو به رشد به کار رفته است (هارдинگ^(۱۴)، آرانگو^(۱۵)، بالتازار^(۱۶) و کلیمنت^(۱۷)، ۱۹۸۰). پاییو^(۱۸) و همکاران (۱۹۹۰) در یک بررسی پرسشنامه SRQ-20 را در کشور نیکاراگوئه بر روی بیماران مراکز مراقبتهاي بهداشتی اوليه اعتبار يابي نمودند. آنان حساسيت و ويژگي پرسشنامه را با نقطه برش ۸ به ترتيب ۸۱٪ و ۵۸٪ گزارش نمودند. وکسیل زاده و پالاهنگ (۱۳۷۷) اين پرسشنامه را در شهرکرد بر روی جمعيت عمومي و با استفاده از فهرست مصاحبه باليني بر اساس ملاكمهای تشخيصی DSM-IV اعتبار يابي نمودند. حساسيت، ويژگي و ميزان کلى اشتباه طبقه بندي با نقطه برش ۷ به ترتيب ۸۲٪، ۸۱٪ و ۱۸٪ و با نقطه برش ۸ به ترتيب ۷۶٪، ۸۳٪ و ۲۰٪ بود.

مقیاس رویدادهای زندگی

یکی از ابزارهایی که به عنوان سرند اختلالهای روانپژشکی در جمیعت عمومی معرفی گردیده (دورنوند^(۱۹)، کراسنوف^(۲۰)، اسکناسی^(۲۱) و دورنوند، ۱۹۷۸) مقیاس رویدادهای زندگی است.

پیمایشی جامعه (دونکان - جونز^(۱)، هندرسون^(۲)، ۱۹۷۸؛ تارناپولسکی^(۳) و همکاران، ۱۹۷۹؛ بنجامین^(۴) و همکاران، ۱۹۸۲) پزشکی عمومی (گلدنبرگ، ۱۹۷۲؛ فوتانزی^(۵) و همکاران، ۱۹۸۵؛ شماساندر^(۶) و همکاران، ۱۹۸۶)، بیماران سرپا یی بیمارستانی (بالینگر^(۷)، ۱۹۷۷؛ بایرن^(۸)، ۱۹۸۴؛ واژکوئز-بارکوئرو و همکاران، ۱۹۸۵) و در مورد بیماران بستری در بیمارستان (دپاتتو و همکاران، ۱۹۸۰؛ بریجز و گلدنبرگ، ۱۹۸۶) به شکل گستردگی کاربرد داشته است.

این پرسشنامه به ۳۶ زبان زنده دنیا ترجمه شده است (گلدنبرگ و ویلیامز، ۱۹۸۸) نسخه ۱۲ مسئولی آن با موفقیت به عنوان ابزار سرنزد اولیه در بررسیهای همه‌گیرشناسی چندی از جمله در هند (شماساندار، ۱۹۸۶) به کار رفته است.

بررسیهای انجام شده در مورد اعتبار GHQ در زبانهای غیرانگلیسی نشان داده است که ضریب‌های همبستگی در مورد اعتبار آن با ضریب‌های همبستگی نسخه انگلیسی قابل مقایه است (گلدبُرگ و ویلیامز، ۱۹۸۵). در یک پژوهش چان^(۹) (۱۹۹۵) تأثیر زبان را بر پاسخهای GHQ در چینی زبانها مورد بررسی قرار داد. وی دریافت که نسخه‌های انگلیسی و چینی GHQ در ابعاد مقیاس قابل مقایسه هستند و تفاوت‌های مشخصی میان دو نسخه دیده شد که به عوامل فرهنگی و زبان‌شناختی نسبت داده می‌شد. در بررسی دیگری که با استفاده از روشی شبیه "چان" در هند انجام شد (سریرام^(۱۰)، چاندراشکار^(۱۱)، ایساک^(۱۲) و شان‌موگام^(۱۳)، ۱۹۸۹) نشان داد که در سطح مقیاس GHQ ویژگیهای روان‌سنجی کافی هم در نسخه‌های انگلیسی و هم در نسخه‌های هندی داشته واژ ثبات درونی خوبی برخوردار بوده است. یعقوبی و همکاران (۱۳۷۴) حساسیت این ابزار را در مهمترین نمره برش آن (۲۳) برابر با ۸۶/۵٪، ویژگی آن را برابر ۸۴ درصد و ضریب پایایی بازآزمایی و آلفای کرونباخ را برابر ۸۸/۰ گزارش نمودند. پالاهنگ و همکاران (۱۳۷۵) برای بهترین نقطه

۴- ناهمسان بودن روشهای بررسی و مانند آن در بررسیهای مختلف سبب گشته که مقایسه یافته های پژوهشی و ارقام ارائه شده با دشواریهایی روبرو گردد.

بحث

مروری بر یافته های پژوهشی بررسیهای انجام شده در زمینه همه گیرشناسی بیماریهای روانی در ایران نشان می دهد که شیوع بیماریهای روانی در ایران را باید بین ۱۸٪ تا ۲۳٪ کل جمعیت دانست. مقایسه این یافته با نتایج بررسیهای مشابه انجام شده در کشورهای شمال اروپا (جدول ۱) میزان شیوع بیماریهای روانی را در کشور ما بسیار بالاتر از بررسیهای یاد شده نشان می دهد. بهیان دیگر شیوع بیماریهای روانشناختی در کشور ما بیش از کشورهای شمال اروپا است که رقمی نزدیک به ۸٪ تا ۱۰٪ را گزارش نموده اند. این بازنگری همچنین نشان داد که گرچه شیوع بیماریهای روانی در ایران بالاتر از بررسیهای مشابه در کشور های جنوب اروپا است، اما تفاوت اندکی با آنها دارد (جدول ۱). مقایسه یافته های به دست آمده از بررسیهای انجام شده در ایران، با بررسیهای انجام شده در برخی از کشورهای کمتر توسعه یافته مانند دویی و اوگاندا نشان می دهد که در این کشورها تا حدودی شیوع بیماریهای روانی بالاتر از ایران است. باید دانست که تفاوت در یافته های پژوهشی مختلف در بررسیهای انجام شده در ایران شاید به دلیل استفاده از روشهای پژوهشی متفاوت، ابزار پژوهشی مختلف، روشهای نمونه گیری نامشابه، جمعیت های گوناگون و شرایط اقتصادی - اجتماعی متفاوت باشد که این بررسیها در آن انجام گردیده است. از این رو نمی توان انتظار داشت که یافته های گزارش شده در بررسیهای همه گیرشناسی به هم نزدیک باشند. این بررسیها نشان می دهند که شرایط اقتصادی - اجتماعی، چگونگی سطح زندگی، رعایت موازین بهداشتی به مفهوم عام آن تأثیری انکار ناپذیر در شیوع بیماریها و نابسامانی های روانی مختلف به جای می گذارد.

این پرسشنامه بر پایه کارهای انجام شده در زمینه شرح حال آزمودنیها (مهیر، ۱۹۴۹؛ به نقل از دوروند و همکاران، ۱۹۷۸) و مقیاس رتبه بندی سازکاری اجتماعی (هلمز و راهه، ۱۹۶۷؛ به نقل از همانجا) ساخته شده در آنها تأثیر رویدادهای استرس آمیز زندگی بر اختلالهای رشد، سوخت و ساز، اختلالهای چشم، دستگاه تنفس، دستگاه گوارش، ماهیچه ها، مفصل ها، همچنین اختلالهای قلبی - عروقی مورد تأکید قرار گرفت. منطق استفاده از این ابزار در بررسیهای همه گیرشناسی آن بودکه هر اندازه تغییرات یا بحرانهادر زندگی بیشتر باشد، احتمال بروز بیماریها و اختلالها بیشتر خواهد بود. به بیان دیگر هر اندازه که تغییرات استرس آمیز در گروهی بیشتر رخ داده باشد، خطرابتلاء آنان را به بیماریها بالاتر خواهد برد (همانجا). گرچه این منطق و نارسایهای روش شناختی پژوهشها مربوطه مورد انتقاد قرار گرفت، اما از زمان معرفی این ابزارها به ویژه در دهه ۱۹۷۰ در پژوهشها بسیاری به کاربرده شده است (همانجا). این مقیاس در بردارنده ۱۰۲ ماده است که به رویدادها و شرایطی اشاره دارند که اگر فرد آنها را تجربه نموده است؛ مشخص می کنند که در برابر آنها احساس شکست و زیان داشته، احساس پیروزی و موفقیت نموده و یا هیچیک از این دو را نداشته است.

Andeeshet
Va
Raftar
تدبیر برقرار

۶۴

مشکلات روش شناختی

۱- یکی از نارسایهای پژوهشی در مورد همه گیری شناسی بیماریهای روانی آن است که این بررسیها بیشتر مقطعی هستند و کمتر بررسی طولی در این زمینه انجام شده است.

۲- مشکل دیگر، به کار نبردن ملاکهای طبقه بندی یکسان و معتبر به دلیل اتفاق نظر نداشتن در مورد سبب شناسی بیماریهای روانی است.

۳- در دست نبودن ابزار سرند هنجاریابی شده از دیگر مشکلات موجود در این زمینه است.

(کاپلان و سادوک، ۱۹۹۸). به بیان دیگر با بالا رفتن سطح زندگی و رعایت بیشتر موازین بهداشتی، مراقبتهای دوران بارداری، هنگام زایمان و مراقبتهای ویژه سالهای اولیه کودکی، میزان ابتلاء کودکان و نوجوانان به بیماریهای روانی به شکل چشمگیری کاهش می‌یابد. نکته دیگری که در بازنگری بررسیهای همه‌گیرشناسی انجام شده در ایران و سایر کشورها میتوان دریافت، شیوع بیشتر بیماریهای روانی در زنان است. نگاهی به یافته‌های این پژوهش‌ها نشان می‌دهد که تقریباً همه آنها، شیوع اختلالهای روانی را در زنان بالاتر از مردان گزارش نموده‌اند؛ و گاهی تفاوت میزان شیوع اختلالهای روانی در زنان ۲ یا ۳ برابر مردان است. (برای نمونه، داویدیان، ۱۳۵۳؛ جلیلی و داویدیان، ۱۳۷۰؛ باقری یزدی و همکاران، ۱۳۷۳؛ جاویدی، ۱۳۷۲؛ بهادر خان، ۱۳۷۲؛ پالانگ و همکاران، ۱۳۷۵؛ بیینگتون و همکاران، ۱۹۸۱؛ مارویز و همکاران، ۱۹۸۶؛ مارویز و بیینگتون، ۱۹۸۷؛ وازکوئز و بارکورو، ۱۹۸۷). این یافته لزوم ارتقاء بهداشت روانی زنان و بهبود شرایط زندگی آنان را بیش از پیش گوشزد می‌نماید، چراکه زنان به عنوان یکی از ارکان اصلی خانواده نقشی انکار ناپذیر در سلامت روانی اعضای خانواده و افراد جامعه دارند. از این رو تأمین بهداشت روانی زنان به معنی تأمین بهداشت روانی جامعه است؛ اصلی که کمتر به آن توجه شده است.

منابع

- امیدی، عبداله؛ طباطبایی، اعظم؛ سازور، سیدعلی؛ عکاشه، گودرز (۱۳۷۹). بررسی همه‌گیرشناسی اختلالهای روانی در مناطق شهری شهرستان نظری (اصفهان). مقاله پذیرفته شده برای چاپ در فصلنامه اندیشه و رفتار، سال هفتم.
- باقری یزدی، سیدعباس؛ بوالهری، جعفر؛ شاه محمدی، دارد (۱۳۷۳). همه‌گیرشناسی اختلالهای روانی در مناطق روستایی (۱۳۷۷). همه‌گیرشناسی اختلالات روانی در شهر زاهدان. گزارش منتشرنشده.
- بخارانی، نورمحمد؛ کیان پور، محسن؛ سردارانی، محمد رضا (۱۳۷۷). همه‌گیرشناسی اختلالات روانی در شهر زاهدان. گزارش منتشرنشده.
- بوالهری، جعفر؛ بینا، مهدی؛ احسان منش، مجتبی؛ کربیمی کیمی، میس (۱۳۷۶). بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد بهورزان. فصلنامه اندیشه و رفتار، سال سوم، شماره ۱، ۴-۱۲.
- بهادرخان، جواد (۱۳۷۲). بررسی همه‌گیرشناسی بیماریهای روانی در مناطق روستایی گناباد (استان خراسان). پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. انتیتو روانپزشکی تهران.
- پالانگ، حسن؛ نصر، مهدی؛ براهانی، محمدتقی؛ شاه محمدی، داود (۱۳۷۵). بررسی همه‌گیرشناسی اختلالهای روانی در شهر کاشان. فصلنامه اندیشه و رفتار، سال دوم، شماره ۴، ۱۹-۲۷.
- پرو، درا (۱۳۷۶). بررسی ابتلاء روانی در مرکز بهداشتی - درمانی شهر ایرانشهر. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. انتیتو روانپزشکی تهران.
- جاویدی، حجت... (۱۳۷۲). بررسی همه‌گیرشناسی اختلالات روانی در منطقه مرودشت (استان فارس).
- پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. انتیتو روانپزشکی تهران.
- جلیلی، احمد؛ داویدیان، هاراطون (۱۳۷۰). بررسی اپیدمیولوژیک بیماریهای روانی در یک روستا در حاشیه کویر. مقاله ارائه شده در سومین کنگره پژوهش‌های

- در باره بهداشت روانی در ایران. تهران: چاپخانه زهره.
فروغان، مهشید؛ امامی، حبیب؛ عبدی فرکوش، بهرام (۱۳۷۹).
بررسی اپیدمیولوژیک افرادگی در دانشجویان پزشکی بندر
عباس. *فصلنامه علمی - پژوهشی طب و توانبخشی*،
سال اول، شماره اول، ۱۹-۲۹.
- قاسمی، غلامرضا؛ اسدالهی، قربانعلی؛ احمدزاده، غلامحسین؛
پالاهنگ، حسن (۱۳۷۶). بررسی میزان شیوع اختلالات
روانی در شهر اصفهان، مقاله ارائه شده در پنجمین کنگره
پژوهش‌های روانپزشکی و روانشناسی در ایران. دانشگاه علوم
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، تهران، ۹ تا
۱۲ آسفند.
- کشکولی، غضنفر (۱۳۷۹). بررسی همه گیرشناسی اختلالات
رفتاری کودکان در مدارس ابتدایی شهرستان بوشهر.
پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. انتستیتو
روانپزشکی تهران.
- کوکب، فرج (۱۳۷۲). بررسی همه گیرشناسی اختلالات روانی
در مناطق روستایی آذربایجان، تبریز. پایان نامه کارشناسی
ارشد روانشناسی بالینی. انتستیتو روانپزشکی تهران.
- میرزایی، رقیه (۱۳۵۹). ارزیابی، پایابی و اعتبار آزمون
Scl-90 در ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی و
علوم رفتاری. دانشگاه تهران.
- نوربلا، احمد علی؛ محمد، کاظم؛ باقری یزدی، سید عباس
(۱۳۷۸). بررسی شیوع اختلالهای روانپزشکی در شهر تهران،
مجله پژوهشی حکیم، دوره دوم، شماره ۴، ۲۲۳-۲۲۲.
وکیل زاده، سید بهاء الدین؛ پالاهنگ، حسن (۱۳۷۷). بررسی شیوع
اختلالهای روانی در مطب خصوصی پزشکان (شهرکرد -
(۱۳۷۶). *فصلنامه اندیشه و رفتار*، سال چهارم، شماره ۲،
۴-۱۲.
- هاشم وزیری، محمد (۱۳۷۰). بررسی همه گیرشناسی بیماری
اسکیزوفرنیا در استان اصفهان. مقاله ارائه شده در سومین
کنگره پژوهش‌های روانپزشکی و روانشناسی در ایران. دانشگاه
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی شهید بهشتی،
تهران، ۱۱-۱۴ آذرماه.

روانپزشکی و روانشناسی در ایران. دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، تهران، ۱۱-۱۴ آذر
ماه.

جوافشانی، محمد علی (۱۳۷۴). بررسی میزان شیوع
بیماریهای روانی نوروتیک در شهر مسکونی الوند
و صنعتی قزوین و رابطه افسردگی زنان با مهاجرت از
روستا به شهر و وضع اجتماعی - اقتصادی. پایان نامه
تخصصی رشته اپیدمیولوژی. دانشکده بهداشت و انتستیتو
تحقیقات بهداشتی.

حرازی، محمد علی؛ باقری یزدی، سید عباس (۱۳۷۲). بررسی
اپیدمیولوژیک اختلالات روانی در مناطق شهری
شهرستان یزد. یزد: انتشارات حوزه معاونت پژوهشی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی.

خسروی، شمسعلی (۱۳۷۳). بررسی اپیدمیولوژی اختلالات
روانی در مناطق شهری و روستایی بروجن، چهارمحال
و بختیاری. پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
آموزش بهداشت. دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی تهران.

داویدیان، هاراطون؛ ایزدی، سیروس؛ وارتکس، نهابتان؛ معتبر،
مصطفور (۱۳۵۳). بررسی همه گیرشناسی بیماریهای روانی در
منطقه بحر خزر (شهرستان رودسر ۱۳۵۰). مجله بهداشت
ایران، سال سوم، شماره ۴، ۱۵۶ - ۱۴۵.

زاده باقری، قادر (۱۳۷۳). بررسی همه گیرشناسی اختلالات
رفتاری در دانشآموزان شهر یاسوج. پایان نامه
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. انتستیتو روانپزشکی تهران.
شاه محمدی، دارد (۱۳۶۹). ادغام بهداشت روانی در
مسراقبتهاي بهداشتی اولیه (روستاهای شهرکرد،
۱۳۶۸-۶۹). اداره کل مبارزه با بیماریها.

شمس علیزاده، نرگس؛ بوالهری، جعفر؛ شاه محمدی، دارد
(۱۳۷۹). بررسی همه گیر شناسی اختلالهای روانی: مطالعه
یک روستا در استان تهران. مقاله ارائه شده برای چاپ در
فصلنامه اندیشه و رفتار، سال هفتم.

صاحب الزمانی، ناصرالدین (۱۳۴۲). روح نایسماں، پژوهشی

Chan,D.W.(1995). The two scaled versions of the Chinese Health Questionnaire: A comparative analysis. *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*, 30, 85-91.

Derogatis, L. R., Lipman, R. S., & Covi, L. (1973). SCL-90: An out-patient psychiatric rating scale preliminary report. *Psychopharmacology Bulletin*, 9, 13-27.

Dohrenwend, B. S., Krasnoff, L., Askenasy, A. R., & Dohrenwend, B.P. (1978). Exemplification of a method for scaling life events : The Perl Life Events Scale. *Journal of Health and Social Behavior*, 19,205-229.

Dube,K.C.(1970).A study of prevalence and biosocial variables in mental illness in a rural and an urban community in Uttar Pradesh, India. *Acta Psychiatrica Scandinavica*, 46, 327-332.

Duncan, J.P., & Henderson,S. (1978).The use of a two phase design in a prevalence survey. *Social Psychiatry*, 13,231-237.

Fontanesi, F., Gobetti, C., Zimmerman-Tansella, C. H., & Tansella, M.(1985). Validation of Italian version of the GHQ in general practice. *Psychological Medicine*, 15, 411-415.

Ghubash,R., Hamdi,E., & Bebbington, P.(1992).The Dubai community psychiatric surveys prevalence and socio-demographic correlates. *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*, 27,53-61.

Giel, R., & Lijk, J. N. (1969). Psychiatric morbidity in a small Ethiopian town. *British Journal of Psychiatry*, 115,149-155.

Goldberg, D. (1972). The detection of psychiatric illness by questionnaire. *Mansley Monograph No.*

یعقوبی، نورا...؛ نصر، مهدی؛ شاه، محمدی؛ دارد (۱۳۷۴). بررسی همه گیرشناسی بیماریهای روانی در مناطق روستایی و شهری شهرستان صومعه سرا (استان گیلان). *فصلنامه اندیشه و رفتار*، سال اول، شماره ۴، ۵۵-۶۵.

Appby,L., & Araya,R.(1991).*Mental health services in the global village*. London: Royal College of Psychiatrists.

Ballinger, B. (1977). Psychiatric morbidity and the menopause:survey of a gynecological out-patient clinic. *British Journal of Psychiatry*, 131,83-89.

Baasher, T. (1961). Survey of mental illness in Wadi Halfa, *World Mental Health*, 13, 181-186.

Bash,K.W. (1964).First preliminary reports on neuro-psychiatric epidemiology. Marvdasht mental health survey,province of Fars,Iran.In A. Petrosian, K. Shayan, K.W. Bash, B. Jessup (Eds.). *The health and related characteristics of four selected village and tribal communities in Fars Ostan*, Iran, Shiraz.

Bash, K. W., & Bash, L. J. (1969). Studies on the epidemiology of neuro-psychiatric disorders among the rural population of the province of Khuzistan, *Iran Social Psychiatry*, 4, 137-143.

Bash, K. W., & Bash-Liechti, J. (1973). Psychological testing and psychiatric morbidity in Iran. *International Mental Health Research News*, 15,1-2.

Bridges, K. W., & Goldberg, D. P.(1986). The validation of the GHQ-28 and the use of the MMSE in neurological in-patients. *British Journal of Psychiatry*, 148,548-553.

Byrne, P.(1984).Psychiatric morbidity in a gynecological survey. *British Journal of Psychiatry*, 144, 28-34.

21. Oxford: Oxford University Press.
- Goldberg, D., & Williams, P. (1988). *A user's guide to the General Health Questionnaire*. NFER: Windsor
- Harding, T. W., DeArango, M. V., Baltazar, J., & Climent, C.E. (1980). Mental disorders in primary health care: A study of their frequency and diagnosis in four developing countries. *Psychological Medicine*, 10, 231-241.
- Holmes, T.H., & Rahe, R.H. (1967). The Social Readjustment Rating Scale. *Journal of Psychosomatic Research*, 11, 213-218.
- Jalili, A., & Davidian, H. (1984). *Psychiatric disorders* in proceedings 36th Annual Conference of the Indian Psychiatric Society. Ranchi, India.
- Jayasundera, M. G. (1969). Mental health surveys in Ceylon. In W. Caudill, & Lin, T. Y. (Eds.). *Mental health research in Asia and the Pacific*. Honolulu: East - West Center Press.
- Kaplan, H. I., & Sadock, B. J. (1988). *Synopsis of psychiatry (8th ed.)*. Baltimore: Williams & Wilkins.
- Leighton, A. H. (1963). Psychiatric disorders in west Africa. *American Journal of Psychiatry*, 120, 521-527.
- Lin, T. Y. (1969). Mental disorders in Taiwan, Fifteen years later. In W. Caudill, T. Y. Lin (Eds.). *Mental Health Research in Asia and the Pacific*. Honolulu: East - West Center Press.
- Murphy, J. M., & Leighton, A. H. (1989). Repeated investigations of prevalence: The Stirling County study. *Acta Psychiatrica Scandinavica*, 79, (Suppl. 348) 45-60.
- Paulo, J. R., Folskin, M. F., & Gordon, B. (1980). Psychiatric screening on a neurological ward. *Psychological Medicine*, 125-132.
- Penayo, U., Kullgren, G., & Galderia, T. (1990). Mental disorders among primary health care patients in Nicaragua. *Acta Psychiatrica Scandinavica*, 82, 82-85.
- Robins, L. N., Helzer, J. E., Orvaschel, H. (1985). The Diagnostic Interview Schedule. In Eaton, W. W., Kessler, L. G. (Eds.). *Epidemiologic field methods in psychiatry: The NIMH Epidemiologic Catchment Area Program*. Orlando, FL: Academic Press.
- Sadock, B. J., & Sadock, V. A. (2000). *Comprehensive textbook of psychiatry*. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins.
- Sartorius, N. (1989). Translating mental concepts into programmes. *International Journal of Mental Health*, 18, 55-71.
- Sartorius, N. (1993). WHO's work on the epidemiology of mental disorders. *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*, 25, 147-155.
- Shamasundar, C., Krishna Murthy, S., Om Prakash, Prabhakar, N., & Subbakrishna, D. K. (1986). Psychiatric morbidity in general practice in an Indian city. *British Medical Journal*, 292, 1713-1714.
- Shepherd, M., Williams, P., Wilkinson, G. (1989). *The scope of epidemiological psychiatry*. New York: Routledge.
- Sriram, T. G., Chandrashekhar, C. R., Isaac, M. K., & Shanmugham, V. (1989). The General Health Questionnaire (GHQ). *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*, 25, 147-155.

Andesheb
Va
Raftari
اندیشه و رفتار

Vol. 6 / NO. 4 / Spring 2001

Psychiatric Epidemiology, 24,317-320.

Srole, L., & Fischer, A.K.(1989). Changing lives and well-being: The Midtown Manhattan Panel study 1954-1976. *Acta Psychitrica Scandinavica*, 79 (suppl. 348),35-44.

Stromgren,E.(1989). Psychiatric epidemiology scope and principles.*Acta Psychitrica Scandinavica*, (Suplement, 348), 7-10.

Tarnapolsky, A., Hand, D. J., & Mclean, E. K. (1979). Validity and uses of screening questionnaire (GHQ) in the community. *British Journal of Psychiatry*, 134, 508-515.

Vieweg, B. W., & Hodlund, J. L. (1983). The General

Health Questionnaire (GHQ) a comprehensive review. *Journal of Operat Psychiatry*, 14,74-81.

WHO (1975a). Organization of mental health services in developing countries. Geneva: WHO.

WHO(1975b).Mental health services in the developing countries. *WHO Chronicle*, 29, 231-235.

WHO (1984a). *Mental health care in developing countries: A critical appraisal of research findings*. Geneva :WHO.

WHO (1984b). *Health planing and managment glossary*. India: WHO.

اولین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان

بخش روانپزشکی کودک و نوجوان دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور، مؤسسه مطالعات علوم شناختی و دانشگاه علوم بهزیستی کشور اقدام به برگزاری اولین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان از تاریخ هفتم لغایت دهم اردیبهشت ماه ۱۳۸۱ در محل دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی تهران نموده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر با دبیرخانه همایش با شماره تلفن ۰۲۰۶۳۸۸۰۸۸ تاسیس حاصل فرمائید.

آدرس دبیرخانه: تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از زرتشت شرقی، کوچه پژوهشک پور، پلاک ۱۷

کد پستی: ۱۵۹۴۸ فاکس: ۰۵۲۶ ۸۹۰۰