



اختلال وسواسی-اجباری در بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی I و اسکیزوفرنیا

دکتر آزاد معروفی*، دکتر سید محمدعلی قریشی زاده**

چکیده

هدف: این پژوهش شیوع اختلال وسواسی-اجباری را در دور اختلال اسکیزوفرنیا و دوقطبی نوع I بررسی نموده است.

روش: به کمک یک طرح مفقطی ۱۵۰ بیمار مراجعه کننده به درمانگاه روانپردازی مرکز آموزشی و درمانی تبریز که بروایه‌تی معیارهای DSM-II مبتلا به یکی از اختلال‌های دوقطبی I و یا اسکیزوفرنیا بودند، به شیوه‌ی نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. تشخیص گذاری بیماران از نظر وجود اختلال وسواسی-اجباری با مصاحبه‌ی غیرساختاریانه العجم گرفت و از مقیاس وسواسی-اجباری بیل-براون استفاده شد.

یافته‌ها: از ۷۰ بیمار مبتلا به اختلال دوقطبی I و ۷۰ بیمار مبتلا به اسکیزوفرنیا به ترتیب ۱۷ نفر (۲۳٪) و ۲۷ نفر (۳۶٪) زمانی در طول عمر خود مبتلا به اختلال وسواسی-اجباری بوده‌اند.

نتیجه: اختلال وسواسی-اجباری در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا و مبتلایان به اختلال دوقطبی I شیوع چشمگیری دارد.

کلیدواژه: اختلال وسواسی-اجباری، اختلال دوقطبی I، اسکیزوفرنیا، همبودی

بر آن داشته است تا بررسی‌های خود را متوجه همبودی و شیوع اختلال وسواسی-اجباری در افراد مبتلا به اختلال‌های یادشده نمایند. وجود نشانه‌های اختلال وسواسی-اجباری در اختلال‌های عمدی‌ای چون اسکیزوفرنیا و دوقطبی نوع I که همواره بخش مهمی از

مقدمه

در گیری مدارهای نورونی و پیام‌رسان‌های عصبی مشابه (سروتونرژیک) در اختلال دوقطبی نوع I و اسکیزوفرنیا از یک سو و اختلال وسواسی-اجباری از سوی دیگر (کاپلان^۱ و سادوک^۲، ۱۹۹۸) پژوهشگران را

هم چنین برخی بررسی‌ها همراهی اختلال وسوسی-اجباری را در بیماران دوقطبی بیش از شیوع آن در جمعیت عادی برآورد کرده‌اند (چن و دیلساور، ۱۹۹۵). گاه شیوع اختلال وسوسی-اجباری در اختلال دوقطبی برابر با شیوع آن در افسردگی یک‌قطبی دانسته شده است (کروگر، برانیگ، هوفلر^۱ و همکاران، ۲۰۰۰). یافته‌های برخی بررسی‌های انجام شده در این زمینه در جدول ۱ آورده شده است.

هدف کلی پژوهش حاضر با توجه به موارد یادشده، بررسی میزان شیوع اختلال وسوسی-اجباری در اختلال دوقطبی I و اسکیزوفرنیا و اهداف فرعی آن بررسی شیوع اختلال وسوسی-اجباری در اختلال دوقطبی I و اسکیزوفرنیا بر حسب سن، جنس، وضعیت تأهل، شغل، میزان تحصیلات و موارد بستری بوده است.

هزینه‌ها و توان کاری دستگاه‌های درمانی و بهداشتی را به خود اختصاص می‌دهند، می‌تواند پیچیدگی‌هایی در نشانه‌های این اختلال‌ها پدید آورد و تشخیص آنها را دشوار نماید.

با آن که بررسی‌های چندی در این زمینه انجام شده، چگونگی همراهی اختلال وسوسی-اجباری با اسکیزوفرنیا و یا اختلال دوقطبی نوع I روشن نشده است. هم چنین از فراوانی و چگونگی علایم اختلال وسوسی-اجباری برحسب زیرگونه‌های اسکیزوفرنیا و یا ویژگی‌های جمعیت‌شناختی افراد و ارتباط آن با طول مدت ابتلاء اسکیزوفرنیا یا اختلال دوقطبی نوع I آگاهی نداریم (کروگر^۱، برانیگ^۲ و کوک^۳؛ چن^۴ و دیلساور^۵، ۱۹۹۵).

گروهی از پژوهشگران شیوع اختلال وسوسی-اجباری را در اسکیزوفرنیا ۷/۸٪ تا ۴/۶٪ برآورد می‌کنند (پویوروفسکی^۶، فوکس^۷ و ویسمان^۸، ۱۹۹۹).

Andeesheh
Va
Raftari
نهضه و رفاه

۳۸

جدول ۱ - یافته‌های برخی بررسی‌های انجام شده در زمینه‌ی شیوع OCD در اسکیزوفرنیا و اختلال دوقطبی I

اسکیزوفرنیا	محل پژوهش	سال پژوهش	نمونه مورد بررسی	تعداد نمونه	شیوع OCD
فیش ^۱ و همکاران	تریش	۲۰۰۱	اسکیزوفرنیا و اسکیزوفانکیو حاد	۱۵۰	٪۱۰
پویوروفسکی و همکاران	فلسطین اشغالی	۲۰۰۱	اسکیزوفرنی مزمن و بستری	۶۸	٪۲۲/۵
تیبو ^۲ و همکاران	کانادا	۲۰۰۰	اسکیزوفرنی	۵۲	٪۲۵
پویوروفسکی و همکاران	فلسطین اشغالی	۱۹۹۹	اسکیزوفرنی اولین اپیزود	۵۰	٪۱۴
ابسن ^۳ و همکاران	ایالات متحده آمریکا	۱۹۹۷	اسکیزوفرنی و اسکیزوفانکیو	۷۷	٪۷/۸
کروگر و همکاران	آلمان	۲۰۰۰	اسکیزوفرنی	۷۶	٪۱۵/۸
ماسایوکی ^۴ و همکاران	ژاپن	۲۰۰۳	اسکیزوفرنی	۷۱	٪۱۸/۳
اختلال دوقطبی I					
چن و دیلساور	ایالات متحده آمریکا	۱۹۹۰	دوقطبی I	۹	٪۲۱
کروگر و همکاران	آلمان	۱۹۹۰	دوقطبی I	۳۷	٪۲۵/۱
کروگر و همکاران	کانادا	۲۰۰۰	دوقطبی I و II	۱۴۳	٪۷/۷ فقط در دو قطبی II
تمام ^{۱۶} و ازپویراز ^{۱۵}					
پینی ^{۱۷} و همکاران	ترکیه	۲۰۰۲	دوقطبی I	۴۳	٪۳۹
کوسوف ^{۱۸} و هافتر ^{۱۹}	ایتالیا	۱۹۹۷	دوقطبی	۲۴	٪۲۱/۱
	استرالیا	۱۹۹۸	دوقطبی I	۱۰۰	٪۳۰

- | | |
|---------------|---------------|
| 1- Kruger | 2- Braunig |
| 3- Cooke | 4- Chen |
| 5- Dilsaver | 6- Poyurovsky |
| 7- Fuchs | 8- Weisman |
| 9- Hoffler | 10- Fabisch |
| 11- Tibbo | 12- Eisen |
| 13- Masayuski | 14- Tamam |
| 15- Ozpoyraz | 16- Pini |
| 17- Cosoff | 18- Hafner |

روشن

این پژوهش یک طرح مقطعی است. در اجرای این پژوهش ۷۵ بیمار مبتلا به اسکیزوفرنیا و ۷۵ بیمار مبتلا به اختلال دو قطبی نوع I که به صورت سرپایی در مدت سه ماه به درمانگاه مرکز آموزشی و درمانی رازی تبریز مراجعه کرده بودند، به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند.

داده‌های پژوهش به کمک مصاحبه‌ی غیرساختاریافته و مقیاس وسوسی-اجباری بیل-براؤن^۱ (YBOCS) گردید. در مصاحبه‌ی غیرساختاریافته از فهرست تشخیصی اختلال وسوسی-اجباری بهره گرفته شد. ماده‌های فهرست یادشده برپایه‌ی ملاک‌های تشخیصی DSM-IV^۲ ساخته شده بود.

YBOCS را که گودمن^۳، پرایس^۴، راسموسن^۵ مازور^۶ و فلیشمن^۷ در سال ۱۹۸۶ ساختند، یک مصاحبه نیمه‌ساختار یافته برای ارزشیابی نشانه‌ها، شدت آن و پاسخ به درمان اختلال وسوسی-اجباری است (سادوک و سادوک، ۲۰۱۰). فهرست علایم بیل-براؤن شامل بیش از پنجاه علامت شایع وسوسی و اجبار از جمله افکار وسوسی پیرامون پرخاشگری، آلودگی، مسائل جنسی و اجبارها در زمینه پاکیزگی، وارسی، نظم و ترتیب، گردآوری و انبار کردن می‌باشد. پایابی همسانی درونی بیل-براؤن در سطح قابل قبول تا خوب و در دامنه ۰/۶۹ تا ۰/۹۱ گزارش شده است (ملکوتی، مهرانی، بوالهی و دادر، ۱۳۸۰؛ میرسپاسی و سالیانی، ۱۳۸۲؛ امیر، کاشمن و فوا، ۱۳۷۷).

این فهرست مجموعه علایم اختلال وسوسی-اجباری در DSM-IV است. نخست با بهره‌گیری از مصاحبه غیرساختاریافته و انطباق آن با اطلاعات موجود در پرونده، تشخیص اسکیزوفرنیا یا اختلال دو قطبی I برای بیمار تأیید و همراه آن برخی اطلاعات جمعیت‌شناختی از جمله سن، جنس، تحصیلات، شغل و وضعیت تأهل یادداشت شد. سپس به کمک فهرست

یافته‌ها

ویژگی‌های جمعیت‌شناختی آزمودنی‌های مبتلا به OCD برحسب ابتلاء هم‌زمان به اسکیزوفرنیا یا اختلال دو قطبی نوع I در جدول ۲ دیده می‌شود. سن آزمودنی‌های پژوهش از ۱۸ تا ۶۵ سال بود. انواع پارانویید، باقیمانده^۸ و نامتمایز^۹ به ترتیب در ۲۸، ۴۰ و ۷ نفر از آنها تشخیص داده شد.

از ۷۵ بیمار مبتلا به اسکیزوفرنیا ۲۷ نفر (۳۶٪) دارای اختلال وسوسی-اجباری بودند. جدول ۳ فراوانی توزیع علایم وسوسی-اجباری را در این گروه از بیماران نشان می‌دهد. همان‌گونه که در این جدول دیده می‌شود، در این گروه بیشترین نشانه‌های وسوسی-اجباری از نوع آلودگی (۵۱/۹٪) و کمترین مربوط به افکار مزاحم و نوع مختلط (۱۴/۸٪) بود.

جدول ۴ چگونگی توزیع علایم وسوسی-اجباری را در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا نشان می‌دهد.

- 1- Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale
2- Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4th ed.)
3- Goodman
4- Price
5- Rasmussen
6- Mazure
7- Fleischman
8- Mixed
9- residual
10- undifferentiated

افراد از ۱۹ تا ۸۰ سال سن داشتند. از ۷۵ بیمار مبتلا به اختلال دو قطبی I، ۱۷ نفر (۲۲٪) دارای اختلال وسوسی-اجباری بودند.

جدول ۳ فراوانی توزیع علایم وسوسی-اجباری را در بیماران مبتلا به اختلال دو قطبی I نشان می‌دهد. همان‌گونه که در جدول دیده می‌شود، در این گروه نیز پیشترین نشانه‌های وسوسی-اجباری از نوع آلودگی و کمترین‌ها افکار وسوسی و نوع مختلط است.

جدول ۴- توزیع فراوانی آزمودنی‌های پژوهش بر حسب علایم وسوسی-اجباری و نوع اسکیزوفرنیا

نوع اسکیزوفرنیا		علایم وسوسی-			راهنمایی و دیبرستان	دانشگاهی
فروانی (%)	فروانی (%)	پارانویید	تامتمایز	باقی‌مانده		
(۶۰) ۳	(۵۰) ۵	(۵۰) ۶	آلودگی			
(۲۰) ۱	(۱۰) ۱	(۲۰) ۳	تردید و وارسی			
(۰) ۰	(۳۰) ۳	(۸) ۱	افکار مزاحم			
(۰) ۰	(۰) ۰	(۰) ۰	تفارن			
(۲۰) ۱	(۱۰) ۱	(۱۷) ۲	مختلط			
(۱۰۰) ۵	(۱۰۰) ۱۰	(۱۰۰) ۱۲	جمع			

آزمون خی دو در این گروه نیز مانند بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا، میان سن، جنس، وضعیت تحصیلی، وضعیت تأهل، شغل و سابقه‌ی ابتلا به اختلال دو قطبی I با شیوع علایم وسوسی-اجباری رابطه‌ی معنی‌دار آماری نشان نداد. همچنان میان نوع اختلال وسوسی-اجباری و اختلال دو قطبی I رابطه‌ی معنی‌داری دیده نشد.

بحث

این بررسی شیوع مادام‌العمر اختلال وسوسی-اجباری را در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا ۳۶٪ و در بیماران مبتلا به اختلال دو قطبی I ۲۲٪ نشان داد که

جدول ۲- توزیع فراوانی آزمودنی‌های مبتلا به OCD بر حسب ابتلا به اسکیزوفرنیا و اختلال دو قطبی نوع I

اسکیزوفرنیا		دوقطبی I		متغیرها
فروانی (%)	فروانی (%)	فروانی (%)	فروانی (%)	
(۸۸/۲) ۱۵	(۷۰/۳) ۱۹	(۷۰/۳) ۱۹	(۷۰/۳) ۱۹	جنس مرد
(۱۱/۸) ۲	(۲۹/۷) ۸	(۲۹/۷) ۸	(۲۹/۷) ۸	زن
(۲۳/۵) ۴	(۶۶/۷) ۱۸	(۶۶/۷) ۱۸	(۶۶/۷) ۱۸	تأهل مجرد
(۷۷/۵) ۱۳	(۳۲/۳) ۹	(۳۲/۳) ۹	(۳۲/۳) ۹	تأهل متأهل
(۰/۹) ۱	(۲۲/۲) ۶	(۲۲/۲) ۶	(۲۲/۲) ۶	شغل خانه‌دار
(۰۸/۷) ۱۰	(۱۴/۸) ۴	(۱۴/۸) ۴	(۱۴/۸) ۴	کارمند بی‌کار
(۳۵/۴) ۶	(۶۳) ۱۷	(۶۳) ۱۷	(۶۳) ۱۷	تحصیل بی‌سواد
(۱۷/۶) ۳	(۲۵/۹) ۷	(۲۵/۹) ۷	(۲۵/۹) ۷	ابتدایی ابتدایی
(۲۳/۵) ۴	(۱۴/۸) ۴	(۱۴/۸) ۴	(۱۴/۸) ۴	راهنمایی و دیبرستان
(۵۲/۸) ۹	(۴۸/۱) ۱۳	(۴۸/۱) ۱۳	(۴۸/۱) ۱۳	
(۷/۱) ۱	(۱۱/۲) ۳	(۱۱/۲) ۳	(۱۱/۲) ۳	

Andeesheh
Va
Raftari
الدشنه و رفتار
۴۰

جدول ۳- توزیع فراوانی آزمودنی‌های پژوهش بر حسب علایم وسوسی-اجباری در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا و دوقطبی

اسکیزوفرنیا		دوقطبی I		علایم وسوسی-اجباری
فروانی (%)	فروانی (%)	فروانی (%)	فروانی (%)	
(۵۸/۸) ۱۰	(۵۱/۹) ۱۴	(۵۱/۹) ۱۴	(۵۱/۹) ۱۴	آلودگی
(۱۷/۶) ۳	(۱۸/۵) ۵	(۱۸/۵) ۵	(۱۸/۵) ۵	تردید و وارسی
(۱۱/۸) ۲	(۱۴/۸) ۴	(۱۴/۸) ۴	(۱۴/۸) ۴	افکار مزاحم
(۰) ۰	(۰) ۰	(۰) ۰	(۰) ۰	تفارن
(۱۱/۸) ۲	(۱۴/۸) ۴	(۱۴/۸) ۴	(۱۴/۸) ۴	مختلط
(۱۰۰) ۱۷	(۱۰۰) ۲۷	(۱۰۰) ۲۷	(۱۰۰) ۲۷	جمع

نتایج آزمون خی دو نشان داد که میان سن، جنس، وضعیت تأهل، شغل و سابقه‌ی ابتلا به اسکیزوفرنیا با اختلال وسوسی-اجباری رابطه‌ی معنی‌داری وجود ندارد.

جدول ۲ ویژگی‌های جمعیت شناختی آزمودنی‌های مبتلا به اختلال دو قطبی I را نیز نشان می‌دهد. این

به طوری که در اختلال سوسای-اجباری بیشتر مدارهای کورتیکو استریاتال^۲ و در سایر اختلال‌های اضطرابی مدارهای آمیگدالوفوگال^۳ درگیر هستند (سادوک و سادوک، ۲۰۰۰).

برپایه‌ی یافته‌های بررسی حاضر از ۷۵ بیمار مبتلا به اختلال دو قطبی I، ۱۷ نفر (۲۲/۷٪) اختلال وسوسی-اجباری را در دوره‌ای از زندگی خود تجربه کرده بودند. این میزان تفاسوت چشمگیری با شیوع اختلال وسوسی-اجباری در جمعیت عمومی دارد. چن و دیلساور (۱۹۹۵) و کروگر، کوک، هیسی^۱، جارنا^۲ و فرساد^۳ (۱۹۹۵) شیوع اختلال وسوسی-اجباری را در بیماران دو قطبی I به ترتیب ۲۱٪ و ۳۵٪ آورده‌اند، که با یافته‌های بررسی حاضر هم خوانی دارد. بنابراین به نظر می‌رسد که اختلال وسوسی-اجباری در بیماران مبتلا به اختلال دو قطبی I نیز هم چون گروه بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا شیوع بالاتری نسبت به جمعیت عمومی دارد.

در گروه بیماران دو قطبی I نیز همانند بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا ارتباط آماری معنی داری میان سن، جنس، وضعیت تاہل، مدت ابلا و اختلال دو قطبی، شغل و تحصیلات با شیوه اختلال وسوسی- اجباری دیده نشد. در بررسی های پیشین نیز ارتباطی میان این عوامل با شیوه اختلال وسوسی- اجباری گزارش نشده است (کروگر، برانینگ و کوک، ۲۰۰۰؛ چن و دیلسارو، ۱۹۹۵). هم چنین در این پژوهش میان الگوی شیوه عالیم وسوسی- اجباری در بیماران دو قطبی I با الگوی شایع آن در جمعیت عمومی تفاوتی دیده نشد.

با توجه به آنچه که بیان شد به نظر می‌رسد اختلال سوسایی-اجباری در شمار زیادی از مبتلایان به اسکیزوفرنیا و اختلال دو قطبی I رخ می‌دهد. این که آیا این همبودی از یک بیان علیتی و یا آسیب‌شناختی مشترک ناشی می‌شود و چه تأثیری بر سیر و پیشرآگهی

در مقایسه با شیوه مادام‌العمر آن در جمعیت عمومی که ۷۲٪ است (کاپلان و سادوک، ۱۹۹۸) به‌شکل چشم‌گیری بیشتر است. این یافته در گروه بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا با یافته‌های فیش، (۲۰۰۱)، پویوروفسکی و همکاران (۱۹۹۹) (۱۴٪)، پویوروفسکی و همکاران (۲۰۰۱) (۲۳٪) و تیسو و همکاران (۲۰۰۰) (۲۵٪) هم خوانی دارد. نتایج این بررسی با یافته‌های پویوروفسکی و همکاران (۲۰۰۱) که بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیای مزمن و بستری را بررسی نموده بودند هم خوانی بیشتری دارد، چرا که بیماران بررسی شده در این پژوهش نیز اغلب بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیای مزمن و از نوع باقی‌مانده بوده‌اند.

همانگونه که دیده می‌شود، شیوع اختلال سوسایی-اجباری در بررسی‌های یادشده، متفاوت گزارش شده است. این تفاوت‌ها ممکن است به دلایل ذیر باشند.

- ۱) گوناگونی معیارهای به کار گرفته شده برای ارزیابی علایم و دشواری‌های استخراج علایم.
 - ۲) اثر احتمالی به کار گرفتن داروهای آنتی‌پسیکوتیک در تغییر میزان و شدت علایم اختلال و موسوی - اجباری، به ویژه در بیماران مزمن که به مدت طولانی این داروها را مصرف کرده‌اند.

نبود ارتباط معنی دار میان هیچ یسک از متغیرهای زمینه‌ای مانند سن، جنس، شغل، وضعیت تأهل، تحصیلات و سابقه‌ی ابتلا به اسکیزوفرنیا با شیوع اختلال وسواسی- اجباری با یافته‌های پوییروفسکی و همکاران (۱۹۹۹) هم خوانم، دارد.

بررسی‌های یادشده احتمال مرتبط بودن اختلال وسوسی-اجباری و اسکیزوفرنیا را افزایش می‌دهند. بررسی‌های اولیه نشان داده‌اند که در میان اختلال‌های اضطرابی، تنها ییمساران مبتلا به اختلال وسوسی-اجباری پس از به کار بردن مواد هراس‌زا^۱، دچار حمله‌ی پانیک نمی‌شوند. همچنین تفاوت در مدارهای مغزی در گیر در اختلال وسوسی-اجباری در مقایسه با سایر اختلال‌های اضطرابی نشان داده شده است.

میرسپاسی، غلامرضا؛ سالیانی، انوشه (۱۳۸۲). مقایسه کارآیی فلوكستین - دارونما در بیماران اختلال وسواسی - اجباری. *فصلنامه اندیشه و رفتار*، سال هشتم، شماره ۴، ۱۰-۶.

Chen,Y.W.,& Dilsaver,S.C.(1995).Comorbidity for obsessive-compulsive disorder in bipolar and unipolar disorders. *Journal of Psychiatry Research*, 59, 57-64.

Cosoff,S.J.,& Hafner,R.J.(1998). The Prevalence of comorbid anxiety in schizophrenia, schizoaffective and bipolar disorder. *Australia and New Zealand Journal of Psychiatry*, 32,67-72.

Fabish,K.,Fabisch,H.,Langs,G.,Huber,H.P.,& Zapotoczky, H.G.(2001).Incidence of obsessive-compulsive phenomenon in the course of acute schizophrenia and schizoaffective disorders.*European Psychiatry*, 16, 336-341.

Goodman,W.K.,Price,L.H.,Rasmussen,S.A.,Mazure, C.,& Fleischman,R.L.(1986).The yale-Brown Obsessive Compulsive Scale.Development, use, reliability. *Archives of General Psychiatry*, 46, 1006-1011.

Kaplan,H.I.,& Sadock,B.J.(1998). *Synopsis of psychiatry*, Baltimore: Williams & Wilkins, (p.610).

Kruger,S.,Cooke,R.G.,Hasey,G.M.,Jarna,I.,& Fersad, E.(1995).Comorbidity of obsessive-compulsive disorder in bipolar disorder. *Journal of Affective Disorders*, 34,117-120.

Kruger,S.,Braunig,P.,& Cooke,R.G.(2000).Comorbidity of obsessive-compulsive disorder in recovered inpatients with bipolar disorder.*Bipolar Disorders*, 2,71-74.

Kruger,S.,Braunig,P.,Hoffler,J.,Shugar,G.,Burner,J., & Lankrar,J. (2000). Prevalence of obsessive-compulsive disorder in schizophrenia and significance of motor symptoms. *Journal of Neuro-*

و روشهای درمانی اختلال‌های یادشده دارد، نیازمند بررسی‌های کنترل شده در مقیاس‌های گستردۀ تری می‌باشد.

برخی از محدودیت‌های پژوهش حاضر عبارتند از:

- ۱) نامعلوم بودن روایی و پایایی معیارهای تشخیصی DSM-IV برای اختلال وسواسی - اجباری در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا و بیماران دو قطبی،
- ۲) شمار کم آزمودنی‌های پژوهش، (۳) مقطعی بودن پژوهش، (۴) کم بودن دقت در جستجوی علایم به علت ناتوانی در یادآوری یا توضیع علایم توسط بیماران یا همراهان آنها و (۵) احتمال سوگیری مصاحبه‌گر در ارزیابی علایم به خاطر وابسته بودن مقیاس ییل - برآون بر پایه‌ی درجه‌بندی مصاحبه‌گر.

انجام بررسی‌های طولی برای تعیین تفاوت‌های احتمالی در پیش‌آگهی و پاسخ به درمان در بیمارانی که افزون بر اسکیزوفرنیا و یا اختلال دو قطبی علایم وسواسی - اجباری نیز نشان می‌دهند، انجام بررسی‌های مشابه در چند مرکز به شکل آینده‌نگر و انجام بررسی بر روی شمار بیشتری از آزمودنی‌ها پیشنهاد می‌شود.

سپاسگزاری

از تمامی بیماران و خانواده‌ی آنها که در این پژوهش شرکت کردند و نیز از همه‌ی کادر درمانی درمانگاه بیمارستان رازی صمیمانه تشکر می‌گردد.

منابع

- امیر، نادر؛ کاشمن، لوری؛ فوا، ادناب (۱۳۷۷). راهبردهای کنترل فکر در اختلال وسواس ذکری - عملی. ترجمه محمد غفاری‌خان، فرهود کاظمی و مالک میرهاشمی. *فصلنامه اندیشه و رفتار*، سال چهارم، شماره ۱، ۶۸-۷۳.
- ملکوتی، کاظم؛ مهرابی، فریدون؛ بوالهی، جعفر؛ دادر، محبوبه (۱۳۸۰). تأثیر اختلال‌های شخصیت بر نتیجه درمان دارویی بیماران وسواسی - جبری. *فصلنامه اندیشه و رفتار*، سال ششم، شماره ۴، ۲۳-۱۳.

psychiatry and Clinical Neuroscience, 12, 16-24.

Masayuki,O.,Masahiro,K.,& Yoshio,M.(2003). Features of obsessive-compulsive disorder in patients primary diagnosed with schizophrenia. *Psychiatric and Clinical Neurosciences*, 57,67.

Pini,S.,Cassano,G.B.,Simonini,E.,& Piatti,E. (1997). Prevalence of anxiety disorders comorbidity in bipolar depression, unipolar depression and dysthymia. *Journal of Affective Disorders*, 42,145-153.

Poyurovsky,M.,Fuchs,C.,& Weisman,A.(1999). Obsessive-compulsive disorder in patients with first episode schizophrenia. *American Journal of Psychiatry*, 156,1998-2000.

Poyurovsky,M.,Hramenkov,S.,Isakov,V.,Rauchverger, B.,Modai,I.,Schneidman,M.,Fuchs,C.,& Weizman, I..(2001).Obsessive-compulsive disorder in hospitalized patients with chronic schizophrenia. *Journal of Psychiatry Research*, 102, 49-57.

Sadock,B.J.,& Sadock,V.A.(2000). *Comprehensive textbook of psychiatry*. Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia, (p.77).

Tamam,L.,& Ozpoyraz,N.(2002).Comorbidity of anxiety disorder among patients with bipolar I disorder in remission.*Psychopathology*, 35, 203-209.

Tibbo,P.,Kroetsch,M.,Chue,P.,& Warneke,J. (2000). Obsessive-compulsive disorder in schizophrenia. *Journal of Psychiatry Research*, 34, 139-146.