

ترکیب و تفکیک و تولیدگله در البرز شرقی

حسین بارانی^(۱)

دکتر علی اکبر مهرابی^(۲)

دکتر محمدرضا مقدم^(۳)

چکیده

اگر هر گله مشکل از گوسفندها و بیز متعلق به یک خانواده را یک واحد مدیریتی جداگانه تلقی کنیم طبق آمار موجود بیش از ۹۰۰ هزار گله کوچک و بزرگ در کشور وجود دارد که هر کدام می‌تواند به عنوان یک واحد تولیدی در نظر گرفته شود. شناخت عمیق و دقیقی از ساختار گله و کارکرد اقتصادی این واحدهای تولیدی وجود ندارد. به همین علت آمار تفکیک شده دام یا ترکیب گله به اشکال مختلف و بعضًا به صورت مبهمی ارایه می‌شود. همچنین درباره کارکرد اقتصادی این واحدها

نقشه نظرهای متفاوتی ابراز شده است. در مقاله حاضر که حاصل پژوهش مشارکتی در بین گله داران البرز شرقی است، سعی شده تا ترکیب گله داشتی و دام هایی که هر سال از این ترکیب حذف شده و به فروش می رسد به وضوح آشکار گردد. بدین ترتیب امکان تفکیک سرمایه و تولید از یکدیگر بیشتر شده و بر این مبنای حساب و کتاب گله روال روشنتری پیدا کند.

واژه های کلیدی: ترکیب گله، تولید گله، گله داری، مردمشناسی اقتصادی، البرز شرقی

مقدمه

بنابر تحقیقات باستان شناسی، پرورش دام در ایران سابقه‌ای حدوداً ده هزار ساله دارد (امان اللهی ۱۳۷۸). در این میان پرورش دام‌های نشخوار کننده کوچک یعنی پرورش گوسفند و بز و زندگی شبانی مبتنی بر پرورش آنها چه از نظر تاریخی و چه از نظر گسترش جغرافیایی اهمیت قابل توجهی دارد. بر اساس آمارهای منتشر شده، حدود ۱۱۵ میلیون راس گوسفند و بز وابسته به مرتع در کشور وجود دارد (علیزاده و همکاران ۱۳۷۸) که متعلق به حدود ۹۵۰ هزار خانوار روستایی و عشايري است (اسکندری ۱۳۷۸ آقابasi ۱۳۷۹). اگر دام معلوم و مربوط به هر خانوار را در قالب یک گله تفکیک پذیر بدانیم، بالطبع همین تعداد گله کوچک و بزرگ قابل تفکیک در کشور وجود خواهد داشت. اگر پذیریم که هر خانوار تضمیم‌گیری جداگانه‌ای درباره فروش و جایگزینی دام گله خود اتخاذ می‌کند می‌توانیم دام متعلق به هر خانوار - که قالب تفکیک در قالب یک گله است - را یک واحد تولیدی حساب کنیم. با این حساب حدود یک میلیون واحد تولیدی در کشور وجود دارند که به تولید فرآورده‌های دامی و پرورش گوسفند و بز می‌پردازنند. حال از زاویه دیگری بنگریم: اگر تعداد دام مطلوب در هر گله را چه از نظر تکافوی نیاز خانوار دامدار (اسکندری ۱۳۷۸) و چه از نظر سهولت هدایت گله حدود ۲۵۰ راس و حداقل واحد دامی گوسفتندی در شرایط آینده را بر اساس سیاستهای کاهش جمعیت دامی وابسته به مرتع حدود ۵۰ میلیون واحد دامی در نظر بگیریم، در این شرایط حدود ۲۰۰

هزار گله مشکل از دام کوچک و بر این اساس قریب دویست هزار واحد تولیدی فرآورده‌های دامی گوسفتند و بز وجود خواهد داشت که حدوداً برابر با تعداد خانواری است که می‌توانند متکی بر عرصه مراتع به پرورش گوسفتند و بز بپردازند (علی‌زاده و همکاران ۱۳۷۸). چه به شرایط موجود توجه کنیم و چه به شرایطی که برای آینده تصور می‌شود، در هر صورت نکته مهم تلقی گله به عنوان واحد تولیدی است. ارتقاء این واحد تولیدی مستلزم شناخت و کسب اطلاع از چگونگی ساختار و کارکرد آنها است (پاپلی یزدی و لباف خانیکی ۱۳۷۹). مطالعات و پژوهش‌هایی که تاکنون درباره گله و گله داری صورت گرفته و انتشار یافته‌اند، اطلاعاتی را از ساختار و کارکرد اقتصادی این واحدها ارایه می‌دهند که مرور آنها بدون شک بر دانش و آگاهی خوانندگان خواهد افزود. لیکن کنار هم گذاردن آنها بیش از آنکه همگرایی بین این یافته‌ها را نشان دهد خواننده را با مجموعه‌ای متنوع از نظریات مواجه می‌سازد که نمی‌توان از کنار تفاوت آنها به سادگی گذشت. به عنوان مثال هر یک از مولفان زیر طبقات سنی و جنسی گوسفتند را به تحری کاربرده‌اند. امان‌اللهی (۱۳۷۸) در سه طبقه قوچ - میش - بره، مزینی (۱۳۸۰) در چهار طبقه میش - قوچ - تو قولی - شیشک، قنبری (۱۳۶۸) در پنج طبقه میش بالغ - بره ماده یک و نیم ساله - بره ماده - بره نر - قوچ، دیگار (۱۳۶۹) در شش طبقه بره - کاور - یارون - شیشک - نر - میش - میش و در نهایت پاپلی یزدی و لباف خانیکی (۱۳۷۹) در دوازده طبقه بره - کاور - ترش - میش - سه زه - چهار زه - پیر میش - شیشک - دو برقوچ - سه برقوچ - چهار برقوچ - پنج برقوچ و بخته دسته‌بندی کرده‌اند. اهمیت این طبقات و اسامی از آن جهت است که آمار تفکیک شده دام در آن قوالب جمع آوری شده و بالطبع بر تجزیه و تحلیل‌های اقتصادی و فنی تاثیر می‌گذارند. به عنوان مثال اگر آمار مربوط به تعداد و ترکیب دام‌های گله در یک منطقه در شش طبقه جمع آوری شده باشد، اطلاعات گسترده‌تری را نسبت به آماری که تنها در دو طبقه جمع آوری و گزارش شده است فراهم می‌سازد. تفکیک دام گله بر اساس تمایزات جنسی، نوعی و مهم‌تر از همه تفکیک سنی آنها از فرهنگ شبانی نشأت می‌گیرد و تاکنون برخی از مردم نگاران به بررسی و ثبت این طبقه بندی‌ها و ثبت نام‌های هر طبقه سنی و نوعی پرداخته‌اند. (پاپلی یزدی و لباف خانیکی ۱۳۷۹، دیگار ۱۳۶۹، نیر ۱۳۷۸، صفحه زاده ۱۳۷۰) بررسی جنبه‌هایی از

فرهنگ که با ساختار و کارکرد اقتصادی جوامع و گروه‌های انسانی ارتباط پیدا می‌کند موضوع مردم‌شناسی اقتصادی است. هدف مردم‌شناسی اقتصادی آن است که نشان دهد در حالات، طرز تفکر و عمل تولید کنندگان، یک منطق درونی وجود دارد و مسایل برای تحلیل بهتر می‌باشد از دیدگاه خود گروه‌های انسانی نگریسته شوند و رابطه بین اشیاء و پدیده‌ها از یک سو و انسان‌ها از سوی دیگر بر مبنای تجربه‌های مردم‌شناسی تحلیل و تبیین شوند (کیاء ۱۳۵۴). وانگهی مردم‌شناسی اقتصادی با کشف ابعاد و زوایای جدید فرهنگی، مفاهیم پذیرفته شده اقتصادی را مورد تجدید نظر قرار می‌دهد (طبیبی ۱۳۷۴).

سوابق و منابع مرتبط با موضوع

درباره موضوع این مقاله منابع و مراجعی که مستقل‌به این قضیه پرداخته باشند در اختیار نیست، لیکن در منابع مربوط به دامپروری و مقاله‌های مرتبط با اقتصاد زندگی عشايری و کتب و مقاله‌های مربوط به مردم‌شناسی عشاير مطالبی به طور پراکنده در این زمینه وجود دارد که در دو بند جداگانه مرور خواهند شد:

الف - تفکیک و تشریع دام و گله: دام‌ها چه به طور فردی و چه در شکل گله بر اساس خصوصیات متفاوتی از هم قابل تفکیک هستند. در اینجا ویژگی‌های مربوط به دام‌ها و گله‌ها به طور جداگانه توضیح داده می‌شوند.

۱- تفکیک و تمایز دام‌ها: که ممکن است خصوصیات جنسی، سنی، نوعی و بهره‌دهی باشد.

۱-۱- تفکیک و تمایز بر اساس نوع: در اکثر گزارش‌های آماری و یا کتب و مقاله‌های علمی مرتبط با موضوع، دام‌های کوچک از نظر نوع به دو نوع گوسفتند و بز تفکیک می‌شوند که البته امری بدیهی است (نظریر پاپلی بزدی و لباف خانیکی ۱۳۷۹، امان اللہی ۱۳۷۸، عمادی و آقا علی نژاد ۱۳۶۸، قنبری ۱۳۷۸، رحیم پور ۱۳۷۸)

۲-۱- تفکیک و تمایز بر اساس جنس: برخی از گزارش‌ها و نوشته‌های علمی مربوط به گله داری از تفکیک جنسی در ارایه آمار و ارقام یا محاسبات اقتصادی و نظایر آن استفاده

کرده‌اند. این تفکیک ممکن است بصورت اسمی جنسی نظری جدا کردن قوچ از میش (نظریه دهقانیان و کهنسال، ۱۳۷۹، قنبری ۱۳۶۸) یا بصورت ذکر صفات جنسی یعنی نرینه و مادینه باشد (نظریه امان اللهم، ۱۳۷۸، کیاوند ۱۳۷۴).

۱-۲- تفکیک و تمایز سنی: مشابه تفکیک نوعی و جنسی مؤلفان مختلف برای ارایه گزارش آماری، محاسبات اقتصادی و تشریح و توصیف گله داری از تفکیک سنی بهره گرفته‌اند. مهم‌ترین نمود این تفکیک، متمایز بودن بره از گوسفتند و بزغاله از بز می‌باشد (نظریه پاپلی بزدی و لباف خانیکی، ۱۳۷۹، دیگار ۱۳۶۹، نیر ۱۳۸۰، قنبری ۱۳۶۸). اما در تفکیک و تمایز سنی نکته‌ها و ابهام‌های زیادی وجود دارد که پرداختن و روشن ساختن این موارد لازمه استفاده از آنها در آمار برداری و محاسبات اقتصادی و امثال آن است. به عنوان مثال در مراحل زندگی گوسفتدان، دوره‌ای وجود دارد بین ۶ تا ۱۸ ماهگی که در آن دوره دام از شیر گرفته شده ولی هنوز به بلوغ جنسی رسیده است. در اکثر آمارها و محاسبات مربوط به گله، معلوم نیست دام واقع در این دوره را جزو بالغین به حساب آورده یا بره قلمداد کرده‌اند. به عبارتی دیگر اگر لفظ بره به گوسفتانی اطلاق می‌شود که بین تولد تا شش ماهگی سن داشته باشد و قوچ یا میش، گوسفتند بالغی باشد که به سن بلوغ یعنی تا ۱۸ ماهگی رسیده است، گوسفتدان بین شش ماه تا ۱۸ ماهگی در کدام طبقه قرار می‌گیرند؟ برخی از مؤلفان به این نکته توجه نکرده و دام‌های گله را یا بره و قابل فروش و یا قوچ و میش بالغ و قابل باروری و جفت‌گیری دانسته و محاسبات اقتصادی مربوط به گله داری را بر این مبنای انجام داده‌اند (نظریه کیاوند ۱۳۷۴ و امان اللهم ۱۳۷۸). رفع این ابهام نیازمند آشنایی با چرخه حیاتی گوسفتند و بز از تولد تا پیری است که متأسفانه حتی منابع علمی مربوط به پژوهش گوسفتند و بز نیز تاکنون به آن نپرداخته‌اند.

۱-۳- تفکیک بر اساس خصوصیات بهره دهی: تفکیک بر اساس نوع بهره دهی در منابع و متون مختلف به صور متفاوتی تشریح شده است. دام‌ها بر اساس نوع بهره دهی به انواع گوشتشی، پشمی، پوستی و چند منظوره (سعادت نوری و سیاه منصور ۱۳۶۱)، براساس صفات بهره دهی به اسلحه در مقابل دوش (فرهادی ۱۳۷۹، پاپلی و لباف خانیکی ۱۳۷۹) و داشتنی در مقابل پرواری (سعادت نوری و سیاه منصور ۱۳۶۱) تقسیم می‌شوند.

۵-۱- تفکیک و تمايز بر اساس رنگ: این تفکیک در منابع علمی مربوط به دامپروری چندان توجه نشده است ولی در پژوهش‌های مردم شناختی کاملاً مورد توجه قرار گرفته است (نظری شاه حسینی ۱۳۷۷). از آنجاکه این تفکیک با موضوع مقاله ارتباط چندانی نداشته و از طرفی نیز دستور پیچیده‌ای دارد از پرداختن به آن صرفنظر می‌شود.

۱- تفکیک و تمایز گله‌ها: در باب تفکیک گله‌ها و وجوده تمایز آنها از هم دیگر در نظام دامداری سنتی ایران با کمال تاسف منابع و مراجع مربوط به دامپروری اشاره‌ای نداشته‌اند و بیش از همه به طور مستقیم یا غیرمستقیم، مردم شناسان و متخصصان علوم انسانی به این موضوع پرداخته‌اند. از مهم‌ترین مراجع مربوط به این مقوله می‌توان به مقاله‌های «نگاهی به انواع گله و شبان و یاریگری در چهاریند گله‌های چکانه در ایران» نوشته فرهادی (۱۳۷۹) و ترکیب گله در دامداری سنتی ایران» نوشته پاپلی یزدی و لباف خانیکی (۱۳۷۹) اشاره نمود. با توجه به آنچه در مقاله‌های فوق الذکر و دیگر منابع مرتبط (نظیر دیگار (۱۳۶۹) آمده است، گله‌های مشتمل از دام‌های نشخوار کننده کوچک (گوسفند و بز) را می‌توان به شرح زیر تفکیک نمود:

- تفکیک نوعی گلهای یا جدا کردن گلهای زن‌ها از گلهای میش‌ها.

- تفکیک سنی، گله‌ها یعنی، جدا کردن برده‌ها از بین غاله‌ها در لنگه‌های جداگانه.

- تفکیک گله بر اساس خصوصیات بهره دهنده و جدا کردن گله های دوشای اساغه از یکدیگر.

- تفکیک گله‌ها بر اساس رنگ مثلاً جدا کردن گله‌گو سفیدان سیاه از سفید.

آنچه در این زمینه از اهمیت والایی برخوردار است و به درک ساختار و کارکرد اقتصادی گله و گله داری کمک می‌کند، تشریع دلایل تفکیک و تمایز گله‌ها بخصوص گله‌های داشتی از پروراری است که متساقانه تاکنون به طور تفصیلی به این موضوع پرداخته نشده است.

ب - تفکیک و تشریح سرمایه و تولید در گله داری: مردم شناسان، اقتصاد دانسان و متخصصان دامپروری هر یک از زاویه تخصص خود کم و بیش به این موضوع پرداخته‌اند که براساس موضوع در بندۀای جداگانه توضیح داده می‌شوند.

۱- محاسبه دام مازاد یا قابل فروش: قنبری (۱۳۶۸) در مقاله بهره وری در نظام دامداری عشايری در محاسبه تولیدات دامی عشاير، دام مازاد را معادل ۲۵ درصد دامهای بالغ به علاوه برههای اضافه بر جایگزین می‌داند. امیری (۱۳۶۹) در گزارش از وضعیت دام کشور اعلام می‌دارد که طبق آمارهای پذیرفته شده با توجه به زایش و حذف دام مازاد، معمولاً ۳۳ درصد دامها سالانه به بازار مصرف عرضه می‌شوند. ترکمان (۱۳۶۹) نیز در کتاب آشنایی با جامعه عشايری ایران یادآور می‌شود که طبق برآوردهای انجام شده، عشاير ایران هر ساله ۱۵/۷ درصد دامهای خود را به بازار عرضه می‌کنند. کیاوند (۱۳۷۴) دام مازاد هر گله را برههای نر تولیدی هر سال می‌داند که در هر گله ۱۰۰ رأسی حدود ۳۲ بره نر [درصد] می‌باشد. امان الهی (۱۳۷۸) در بحث تولیدات دامی به صراحت بره را جزو تولیدات گله قلمداد کرده و تعداد آنرا در یک گله ۱۰۰ رأسی در هر سال ۸۰ رأس بره و بیزغاله [۸۰ درصد] می‌داند. افزارخته (۱۳۷۲) میزان فروش دام در یک گله ۱۰۰ رأسی را سالیانه ۲۰ رأس دام پیر و ۲۵ رأس بره [جمعاً ۴۵ رأس و معادل ۴۵ درصد گله] می‌داند.

دهقانیان و کهنسال (۱۳۷۹) در معرفی اقتصاد عشاير استان خراسان چنین اظهار می‌کنند که عشاير استان به طور متوسط سالانه ۱۵/۴ درصد دامهای خود را به فروش می‌رسانند، لیکن در مثالی که ارایه می‌نمایند این نسبت را به گونه‌ای دیگر و متفاوت از اظهار قبلی خود معرفی می‌نمایند. ایشان برههای متولد شده در هر سال در یک گله ۲۵۰ رأسی را ۱۴۰ رأس (۷۰ رأس ماده و ۷۰ رأس نر) می‌دانند و فروش را در هر سال ۷۰ رأس بره نر و ۳۷ رأس میش [جمعاً ۱۰۷ رأس و معادل ۴۲/۸ درصد گله] ارزیابی می‌کنند.

۲- سایر تولیدات گله: تقریباً اکثر منابع علاوه بر دام مازاد، از پشم، کرك، مو و فرآوردهای لبنی به عنوان تولیدات گله یاد می‌کنند (قنبری ۱۳۶۸، دهقانیان و کهنسال ۱۳۷۹، افزارخته ۱۳۷۲، ترکمان ۱۳۶۹). کود دامی کمتر به عنوان یک فرآورده دامی محسوب شده است (سعادت نوری و سیاه منصور ۱۳۶۱ قنبری ۱۳۶۸). کیاوند (۱۳۷۴) و افروخته (۱۳۷۲) صرفاً فروش دام مازاد را جزو منابع درآمدی گله داری دانسته‌اند.

۳- هزینه‌های گله: پرداختن به تولیدات گله بدون اشاره به هزینه‌هایی که بایست صرف

شود چندان شایسته نیست. منابع مرور شده در مجموع از ده مورد به عنوان موارد هزینه‌ای گله یاد کرده‌اند:

- ۱- دستمزد چوپان ۲- هزینه خوراک ۳- هزینه درمان و دارو ۴- هزینه تلفات دام ۵-
- هزینه علوفه و خوراک دام ۶- هزینه حمل و نقل ۷- هزینه اجاره مرتع ۸- هزینه بابت ته‌چر ۹- هزینه نگهداری سگ گله ۱۰- هزینه‌های متفرقه

هر کدام از منابعی که در ذیل معرفی می‌گردند به تعدادی از این اقلام اشاره کرده‌اند. سعادت نوری و سیاه منصور (۱۳۶۱) هزینه را بصورت سرمایه جاری و شامل دستمزدها، هزینه درمان، هزینه تلفات و هزینه علوفه می‌دانند. افراخته (۱۳۷۲) هزینه‌های گله را شامل دستمزد چوپان - برای هر گله ۱۰۰ رأسی دو نفر - هزینه خوراک چوپانان، هزینه حمل و نقل، هزینه دارو و درمان گله و هزینه‌های سالیانه نگهداری سگ گله می‌داند. ایشان برای اولین بار هزینه نگهداری سگ گله را جزو هزینه‌ها بر شمرده و آنرا معادل هزینه دارو و درمان گله برآورد نموده است. قنبری (۱۳۶۸) هزینه‌های نگهداری گله در بین عشاير را با نام هزینه‌های واسطه‌ای شامل هزینه علوفه و خوراک دام و هزینه بهداشت و درمان گله دانسته و حدود نیم درصد هزینه‌های واسطه‌ای را نیز هزینه متفرقه به حساب آورده است.

دهقانیان و کهنصال (۱۳۷۹) هزینه‌های یک گله را شامل هزینه تعلیف دستی، دستمزد چوپان، هزینه دارو، هزینه حمل و نقل و هزینه ته‌چر دانسته و حدود ۳ درصد هزینه‌های گله را نیز هزینه‌های متفرقه می‌دانند.

امان اللهی (۱۳۷۸) نیز از درآمدهای گله نام می‌بود لیکن از این هزینه‌ها صرفاً در بحث نیروی انسانی و تحت عنوان مخارج خانوار کوچ نشین یاد کرده و آنرا مشتمل بر دستمزد چوپان و اجاره بهای مرتع می‌داند.

کیاوند (۱۳۷۴) و ترکمان (۱۳۶۸) از درآمدهای گله نام می‌برند لیکن هیچ اشاره‌ای به مخارج یا هزینه‌های گله داری نمی‌نمایند.

جمع بندی مطالعات و سوابق موجود:

۱- واگرایی و ناروشنی در تفکیک سئی دام‌های گله در گزارش‌های آماری و محاسبات اقتصادی: به عنوان مثال در مورد گوسفتند الفاظ بره، تقلی، شیشک، قوچ و میش در دو طبقه گوسفتند و بره و یا مجموعاً با هم اعلام می‌گردند. در اینصورت جایگاه تقلی و شیشک به عنوان دام‌های حد واسط ناروشن است و معلوم نیست این دامها جزو بره‌ها شمارش شده‌اند یا جزو بالغین.

۲- عدم وضوح در تفکیک سرمایه و تولید و عدم وضوح در تعریف و توصیف گله‌های داشتی: در برخی از منابع مرور شده، دام مازاد گله به عنوان درصدی از موجودی گله تلقی می‌شود. به عبارتی تولید همواره بخشی از سرمایه تلقی می‌گردد و این امر درک ساختار و کارکرد گله را با ابهام مواجه می‌سازد، بدیهی است گله داشتی به عنوان گله پایه و تولید کننده دام مازاد تلقی می‌شود و گله دار در حذف و فروش دام، دام داشتی را کاملاً متفاوت از دام فروشی به حساب می‌آورد.

۳- ناهمانگی در محاسبات مالی گله و گله داری: در محاسبات اقتصادی مربوط به گله داری در شمول هزینه‌ها و درآمدها روال درستی وجود ندارد. به عنوان مثال در برخی از مقاله‌ها هزینه‌های نیروی انسانی جزو هزینه‌های گله به حساب نیامده و یا در برخی منابع از پشم و شیر حاصل از دام‌های گله به عنوان تولیدات گله صرف نظر شده است.

منطقه و روش بررسی

الف - منطقه بررسی: این بررسی در البرز شرقی صورت گرفته است. البرز شرقی قسمتی از رشته کوه البرز است که طول جغرافیایی ۵۴ تا ۵۶ درجه شرقی به صورت کمانی گسترش یافته است. ارتفاع منطقه از سطح دریا بین ۲۰۰ تا ۳۹۴۵ متر است. جبهه شمالی تا ارتفاع ۲۵۰۰ متر از سطح دریا پوشیده از جنگل‌های خزری است و بالاتر از آن نیز پوشش کوهستانی مرتفع می‌باشد. جبهه جنوبی نیز هر سه منطقه رویش استپی، نیمه استپی و کوهستانی مرتفع از ناحیه ایران و تورانی را در خود جای داده است. از نظر جغرافیای انسانی نیز البرز شرقی

منطقه‌ای است که در دو استان گلستان و سمنان گسترش یافته است. شهرستان‌های شاهروود، دامغان در حاشیه جنوبی و شهرستان‌های گرگان، علی‌آبادکوه، رامیان، آزادشهر، مینودشت و کلاله در حاشیه شمالی منطقه کوهستانی واقع شده‌اند. ساکنان این روستاها به کشاورزی و دامداری می‌پردازند. مراعع البرز شرقی توسط پرورش دهنگان میش و بز - که گله دار شناخته می‌شوند - بهره برداری می‌شود. گله داران و شبانان البرز شرقی به گونه‌هایی از زبان فارسی که منبعث از موقعیت جغرافیایی منطقه و آمیخته‌ای از زبان فارسی دری و گویش طبری است سخن می‌گویند.

ب - روش بررسی: این مقاله براساس یافته‌های حاصل از پژوهش مشارکتی در البرز شرقی تنظیم شده است. در این روش پژوهشگر در ابتدا نمونه یا نماینده‌هایی را به صورت تشخیصی انتخاب کرده است. با برقراری ارتباطات دوستانه و دریافت پذیرش از سوی آنها به مشارکت در فعالیت‌ها پرداخته و در فرصت مناسب به مصاحبه و گفت و گوی بدون ساختار معطوف شده است. گفته‌ها اعم از کلمه‌ها و جمله‌ها را بصورت کلیدی یا مفصل ثبت کرده و در فرصت‌های مقتضی ایجاد شده بین گفت و گوها و یا در دوره‌های کوتاه عدم حضور بین آنها به تجزیه و ترکیب مقدماتی مفاهیم پرداخته و مجددًا استفهام درباره این مضماین را در مکانی دیگر و با افراد متفاوت ادامه داده است. پرس و جو درباره مضماین و مفاهیم تا آنجا ادامه یافته است که ادامه پرسش چیزی به ابعاد معنایی و مفهومی یافته‌های اولیه نیز نموده و این کیفیت در اثر تکرار پاسخ‌های مشابه از ناحیه افراد متفاوت برای محقق محرز گردیده است. پژوهش مشارکتی از مهرماه ۷۹ آغاز و در مهرماه ۸۰ اندکی پیش از یکسال به نحوی ادامه یافته است که تمامی پدیده‌های تقویم شبانی مورد مشاهده و مصاحبه قرار گیرد. پس از جمع آوری اطلاعات و اتمام دوره یکساله، یافته‌ها براساس روش‌های کیفی تحلیل و در قالب گزارش علمی تدوین شده‌اند.

یافته‌های پژوهش

چون پرداختن به گله و گله داری مستلزم آگاهی از چرخه فعالیت‌های شبانی است. در ابتدا

تقویم شبانی به اجمالی معرفی می‌شود. چرخه سالانه شبانی در این منطقه به پنج دوره کاملاً متفاوت از هم قابل تفکیک است که عبارتند از: دوره نرکل انداختن، دوره نگهداری از گله داشتنی، دوره زهگاه و چفاندن خلامه‌ها (بره‌ها و بزغاله‌ها)، دوره بره دنبال (بره‌پی) و در نهایت دوره دام و دوش.

الف - دوره نرکل انداختن: در اوایل شهریور ماه قوچ‌ها و کل‌ها با رمه آمیخته شده و گله واحدی را تشکیل می‌دهند. گله ترکیبی در چراگاهی خوش آب و هوا و علف نگهداری و چرانیده می‌شود. این دوره در اوایل مهرماه به پایان رسیده و کوچ پاییزه شروع می‌شود.

ب - دوره نگهداری از گله داشتنی: در فصل پاییز گله در دوره آبستنی قرار دارد. در این دوره فعالیت شبانی صرفاً در چفاندن گله داشتنی خلاصه می‌شود. این دوره نیز تا اوایل بهمن ادامه می‌یابد.

ج - دوره زهگاه و چفاندن بره‌ها و بزغاله‌ها: متناسب با ایام جفت‌گیری، در بهمن ماه نیز زایش گله به مدتی حدود یک ماه طول می‌کشد. پس از پایان یافتن زایش، چفاندن خلامه‌ها تا علف خوار شدن آنها که اغلب مصادف با ایام نوروز است ادامه می‌یابد.

د - دوره بره دنبال: همزمان با زایش گل و گیاه، خلامه‌ها تأوم با رمه یا گله مادر به چرا برده می‌شوند و در ساعات خاصی از مادر جدا نگه داشته می‌شوند. این دوره را بره دنبال می‌گویند که معمولاً تا رسیدن به بیلاق در اول خرداد ادامه می‌یابد.

ه - دوره دام و دوش: با رسیدن گله به مراتع بیلاقی و تعلیف رمه از علوفه سبز و تازه کوهستان بخشی از شیر میش‌ها و بزها برای تهیه فرآورده‌های لبنی دوشیده می‌شود، این دوره با نام دام و دوش شناخته می‌شود. این دوره از اول خرداد ماه آغاز شده و تا اواخر مرداد ماه ادامه می‌یابد.

با شناخت اجمالی که از چرخه سالانه فعالیت‌های شبانی حاصل شد، بهتر می‌توان مضامین و مفاهیم اقتصادی گله و گله داری در البرز شرقی را بیان نمود.

۱- تفکیک و طبقه‌بندی دام‌ها:

مهم‌ترین تفاوت دام‌های گله عبارت است از تفاوت‌های نوعی، جنسی و سنی. از نظر نوع به دو گونه گوسفند و بز تقسیم می‌شوند. از آنجا که لفظ گوسفند بر کل گله آمیخته نیز اطلاق می‌شود، گله داران نوع اول را با لفظ میشینه و نوع دوم را با لفظ بزینه از هم متمایز می‌کنند. دام‌های مزبور از نظر جنس نیز در شمارش و امثال آن دو دسته مادینه و نرینه تقسیم می‌شوند. لیکن تفاوت و تفکیک سنی به توضیحات تفصیلی احتیاج دارد. گوسفند و بز از تولد تا حدود شش ماهگی شیر خوار تلقی می‌شوند. در این سن از شیر گرفته شده و به فروش رسیده یا به عنوان جایگزین دام‌های پیر نگهداری می‌شوند. در یک سالگی اولین جفت دندان اصلی که دندان نیش می‌باشد در فک پایین آنها جایگزین دندان‌های شیری می‌شود. در یک و نیم سالگی از نظر جنسی قابلیت بارور شدن یا بارور ساختن را دارا می‌شود و اولین جفت‌گیری را تجربه می‌کند. در دو سالگی، سه سالگی و چهار سالگی به ترتیب دومین، سومین و چهارمین جفت دندان اصلی آنها ظاهر می‌شود. دندان‌های کامل شده در چهار سالگی بسته به وضعیت تغذیه ححدود یک تا دو سال سالم و کار آمدند، سپس به تدریج شکسته یا از هم فاصله می‌گیرند. در این وضعیت دام‌ها قدرت چراخی خود را کم کم از دست می‌دهند. به همین دلیل و برای جلوگیری از ضعف تدریجی، آنان را از گله خارج ساخته و مستقیماً یا پس از پروار کردن به کشتارگاه می‌فرستند.

با این توضیحات اسامی نوعی، جنسی و سنی که دام‌های یک گله به خود می‌پذیرند در جدول شماره (۱) درج شده است. دام‌های بالغ یا دام‌هایی که بیش از دو سال سن دارند، عموماً حداقل تا هفت سالگی نگهداری می‌شوند. گله داران برای اشاره به یک دام در خلال دوره دو تا هفت سالگی آنها علاوه بر نام، از صفاتی که تعیین کننده سن آنها باشد نیز بهره می‌گیرند. صفات مذکور ممکن است به وضعیت دندانی یا تعداد دفعات چیده شدن پشم یا موی آنها مرتبط باشد. لیکن مهم‌ترین و برجسته‌ترین صفت که در این مورد استفاده می‌شود، خصوصیات باروری آنها است. نرینه‌ها براساس تعداد سنواتی که بارور ساخته‌اند و مادینه‌ها براساس تعداد دفعات زایش تعیین صفت می‌شوند. جدول شماره (۲) صفات دام‌های بالغ اعم از گوسفند و بز

را که متناسب سن آنهاست نشان می دهد.

دام بالغ مادینه چنانچه بارور نشده باشد قسر نامیده می شود. دام بالغ نرینه بخصوص کل ها نیز چنانچه در اثر کھولت سن قادر به باروری نباشد پوته نامیده می شوند. اگر این ناباروری از ناحیه انسان و تعمداً ایجاد شده باشد، اخته نامیده می شود. اخته کردن معمولاً بر روی دو یا سه کل از گله انجام می شود. به کل های اخته شده که معمولاً نقش رهبری در گله را ایفا می کنند دور بر می گویند که احتمالاً به ناکار شدن دو بیضه آنها اشاره دارد. دامی که در گله نگه داشته می شود و تا سن پیری از آن بهره گیری شود دام داشتی و دامی که از گله خارج می شود تا پس از چاق کردن به فروش بر سد دام پرواری (کشتی) نامیده می شود.

جدول شماره (۱) - اسمی نوعی / جنسی / سنی دامهای گله در البرز شرقی

نوع		سن	خصوصیت
بزینه	میشینه		
(Bozqâleh)	(Bareh)	بزه	تولد تا ۶ ماهگی
(Kulâr)	(Toqoli)	تُقلی	۶ تا ۱۲ ماهگی
(Cabos)	(Šišak)	شیشک	یک تا ۲ سالگی
(Boz)	(Miš)	میش	بالغ یا بیش از دو سال
نر بزغاله (NarBozqâleh)	(Narbareh)	نر بره	تولد تا ۶ ماهگی
نر کولار (NarKulâr)	(Nartoqoli)	نر تُقلی	۶ تا ۱۲ ماهگی
نر چیش (NarCaboš)	(Naršišak)	نرشیشک	یک تا ۲ سالگی
کل	(Nar)	نر	بالغ یا بیش از دو سال

جدول شماره (۲) - صفات تعیین کننده سن دام‌های بالغ گله در البرز شرقی

خصیصه	دو تاسه‌سالگی	سه تا چهار سالگی	پنج تا شش سالگی	چهار تا پنج سالگی	شش تا هفت سالگی	پنجم ران - پیر کل	پنجم ران
نرینه	یک ران	دو ران	سه ران	چهار ران	پنجم ران - پیر کل	پنجم ران - پیر نر	پنجم ران - پیر نر
مادینه	یک زه	دو زه	سه زه	چهار زه	پنجم زه - پیر میش	پنجم زه - پیر بزر	پنجم زه - پیر بزر

۲- ترکیب گله

دسته یا گروهی از حیوانات که باهم باشند گله نامیده می‌شوند. حال ممکن است از نظر نوع، جنس یا سن یک دست و همانند بوده یا آنکه کاملاً متنوع باشند. گله‌هایی که در مالکیت گله داران البرز شرقی نگهداری می‌شوند از نظر نوع، آمیخته‌ای از میشینه و بزینه و از نظر جنس به غیر از دوره خاصی از سال - آمیخته‌ای از نرینه و مادینه و از نظر سن نیز آمیخته‌ای از تمامی سنین می‌باشند، نسبت هر کدام می‌تواند توسط عوامل مختلفی تعیین شود که در اینجا به مهم‌ترین آنها اشاره می‌شود:

الف - نسبت بزینه به میشینه: می‌توان گفت که هیچ گله‌ای یافت نمی‌شود که از نظر نوع دام کاملاً یک دست باشد. بزها از نظر تغذیه‌ای به چریدن بوته‌ها علاقه‌مند بوده و جست و خیز بیشتری دارند و در مناطق پر شیب و سنگلاخی بهتر چرا می‌نمایند. علاوه بر اینها در هر گله حداقل تعدادی بز لازم است تا در هدایت و جابجایی گله از وجود آنها استفاده شود. نسبت بزینه به میشینه بنا به دلخواه مالک گله و معمولاً متناسب با چراگاهی که در اختیار دارد تعیین می‌شود. معمولاً این نسبت در این منطقه حدود ۳۰ تا ۲۰ درصد گله است. با این حال گله‌هایی وجود دارند که بیش از هشتاد درصد احشام آن بزینه هستند.

ب - نسبت نرینه به مادینه: دام اصلی هر گله میش‌ها یا بزهایی هستند که هر ساله زایش نموده و منافعی را برای گله‌دار در پی داشته باشند. لاجرم برای بارور ساختن این دام‌ها حضور نرها صورت پیدا می‌کند. در قدیم به ازای هر ۱۰۰ رأس میش یا بز حدود ۱۰ رأس قوچ یا کل در

گله نگه می داشته اند لیکن در حال حاضر که امکان تغذیه تکمیلی نرها در دوره جفتگیری وجود دارد این نسبت به ۳ الی ۵ درصد کاهش یافته است.

ج - نسبت سنی: یک گله می تواند از نظر سنی کاملاً همسال یا کاملاً ناهمسال باشد. گله کاملاً همسال در دوره کوتاهی از چرخه فعالیت شبانی یعنی دوره دام و دوش متشكل از برههای بزغالهای تازه متولد بوجود می آید که معمولاً تا پایان دوره دوام می یابد. چنین گلهای که اغلب به پرواربندی فرستاده می شود با نام گله پرواری شناخته می شود. در قیاس با این گله، گلهای که همواره دوام و ثبات دارد همانا گله داشتی یا گله پایه است که از نظر سنی کاملاً ناهمسال است. بدین معنی که دامهای چنین گلهای بطور عادی بین طبقات سنی کم و بیش به طور یکسان توزیع شده اند و این نکته از اسرار و رموز شبانی و گله داری است که شناخت آن هم چنان نیازمند بررسی های منفصل تر و دقیق تری است. با این توضیحات یک گله فرضی ۲۵۰ رأسی در منطقه البرز شرقی و در اول پاییز می تواند توزیعی شبیه مندرجات جدول شماره (۳) داشته باشد. همان طور که در این جدول مشاهده می شود گله از نظر نوعی به دو گروه می شینه و بزینه، از نظر جنسی به دو گروه نرینه و مادینه و از نظر سنی به شش طبقه سنی تقسیم شده است. نسبت بزینه به می شینه به نحوی است که حدود یک سوم گله را بزینه ها تشکیل می دهند. توزیع تعداد در طبقات مختلف سنی تقریباً یکسان است و کاهش تدریجی آن ناشی از وقوع تلفات تا سن پیری است که در بند جداگانه ای توضیح داده خواهد شد.

۳- مرگ و میر گله داشتی

گله داشتی در خلال سال با حوادث و خطرات مختلفی مواجه است که از آن جمله می توان گرگ زدگی، صاعقه زدگی، مسمویت های گیاهی و انواع بیماری های میکروبی را نام برد. از این رو درصدی از گله داشتی در اثر این حوادث تلف شده و از بین می روند. گرگ زدگی مهمترین حادثه خسارت آور است که در مواردی قریب نصف گله را تلف کرده است. مواردی نیز

جدول شماره (۳) - توزیع نوعی، جنسی و سنی یک گله مفروض ۲۵۰ رأسی در البرز

شرقی در اوایل دوره نو کل انداختن

هزینه	میشته	خصیصه
۱۴	کولار	تقلی
۱۳	چپش	شیشک
۱۲	بز یک زه	میش یک زه
۱۱	بز دو زه	میش دو زه
۱۰	بز سه زه	میش سه زه
۱۰	بز چهار زه	میش چهار زه
۷۰	۱۵۴	جمع
۲	نر کولار	نر تقلی
۲	نر چپش	نر شیشک
۱	کل یک ران	نر یک ران
۱	کل دو ران	نر دو ران
۱	کل سه ران یا دو بر	نر سه ران
۱	کل چهار ران یا دو بر	نر چهار ران
۸	۱۸	جمع
۷۸	۱۷۲	جمع کل

وجود داشته‌اند که در خلال سال کمتر از یک درصد تلفات ناشی از گرگ زدگی داشته‌اند.^(۱) بطور کلی تلفات و مرگ و میر یا زیان ناشی از حوادث در گله داشتی را می‌توان حدود ۲ تا ۱۰ درصد در سال در نظر گرفت. در مثال مفروض در این مقاله مرگ و میر در حدود ۵ درصد در سال در نظر گرفته شده است. یعنی گله پایه ۲۵۰ رأسی پس از یک سال و با اضافه شدن ۱۵۴ برهایی که تا پایان شیر خوارگی باقی می‌مانند، گله آمیخته بدون تحمل تلفات می‌باشد به ۴۰۴ رأس می‌رسید در حالی که این گله در اواخر چرخه سالانه شبانی یعنی آغاز نرکل انداختن به ۳۸۵ رأس رسیده و ۱۹ رأس کاهش را در سال نشان می‌دهد که در جداول شماره (۳) و (۴) بصورت کاهش یک یا دو رأس از هر گروه سنی به گروه سنی بالاتر نشان داده شده است. لازم به تأکید و توجه است که مرگ و میر گله داشتن در خلال یک سال غیر از مرگ و میر نوزادان تا پایان شیرخوارگی است. این مرگ و میر را می‌توان به نحو دیگری نیز بیان نمود و آن اختلاف بین برها و بزرگاله‌های پرورش یافته در گله و دام مازاد قابل فروش است که در مثال مفروض مقاله، تفاوت بین ۱۵۴ رأس خلامه اضافه شده و ۱۳۵ رأس دام به فروش رفته، که در صفحات بعدی به روشنی توضیح داده شده است (جدول شماره ۵) می‌باشد.

۴- گله، چهارپایان بارکش و سگان گله

در مناطق کوهستانی البرز نیز مانند اکثر مناطق ایران گله‌های گوسفند و بز نگهداری و تعلیف می‌شوند. چراندن گله در چنین مناطقی حضور و وجود دو نوع دام اهلی دیگر را ضروری می‌سازد:

الف - دام سواری و بارکشی: تقریباً در تمام نقاط از الاغ و اسب و دام حاصل از

۱- بازناب مشکل و مسئله گرگ در زندگی چوبانی را می‌توان به روشنی در توانه‌های چوبانی و از آن جمله توانه‌های کار مشک زنی مشاهده کرد برای نمونه نک به:
مرتضی فرهادی، «توانه‌های کار مشک زنی...». فصلنامه راه دانش، ش ۹ و ۱۰ (بهار و تابستان ۱۳۷۶)

تلاقی این دو یعنی قاطر به عنوان دام سواری و بارکش همراه گله استفاده می‌شود. تعداد و نوع دام بارکش به ابعاد گله و شرایط اجتماعی و اقتصادی گله دار ارتباط دارد. معمولاً به ازای هر یکصد رأس دام یک رأس دام سواری / بارکش در گله وجود خواهد داشت.

ب - دام نگهبان: وجود گرگ و احیاناً دیگر درندگان در مناطق کوهستانی ایجاد می‌کند تا هیچ گله‌ای بدون حضور سگ قابل نگهداری نباشد و شاید بتوان گفت حرفه گله داری در مناطق کوهستانی البرز شرقی بدون حضور سگ عملأً غیر ممکن است. معمولاً به ازای هر ۷۰ الی ۱۰۰ رأس دام گله یک قلاده سگ به همراه گله وجود دارد.

۵- طبقه‌بندی گله‌ها

همان طور که ذکر شد گله‌ها از نظر هدف نگهداری به دو دسته تقسیم می‌شوند: گله داشتی و گله پرواری. گله داشتی مشابه با گله مفروضی است که در جدول شماره (۳) معروفی شد، در دوره زهگاه شروع به زایش می‌کند و همان طور که قبل اشاره شد بردها و بزغاله‌های تازه متولد شده موقتاً به جمعیت گله اضافه می‌شوند. در مثال ارایه شده در مقاله، گله مفروض ۲۵۰ رأسی با اضافه شدن حدوداً ۱۵۰ بره و بزغاله تازه متولد شده، به حدود ۴۰۰ رأس می‌رسد. خلامه‌های اضافه شده به گله داشتی در دوره بره دنبال (بره‌پی) در معیت مادر به چرا برده می‌شوند و تمام شبانه روز را همراه مادر بوده و فقط در ساعات خاصی از مادر جدا نگه داشته می‌شوند. این وضعیت تا رسیدن گله به چراگاه ییلاقی در آغاز خردادماه ادامه دارد. در دوره ییلاقی، گله آمیخته فوق الذکر به چهار لنگه قابل تقسیم است. این تقسیم بدان جهت صورت می‌گیرد تا کار شبانی به سهولت ادامه یابد. این لنگه‌ها عبارتند از:

۱- لنگه رمه: گله مادینه‌هایی که زاییده‌اند و اکنون شیر وارند.

۲- لنگه خلامه‌ها: بردها و بزغاله‌هایی که تازه متولد شده‌اند و همچنان شیرخوارند.

۳- لنگه خشکه‌ها: مادینه‌هایی که به سن بلوغ نرسیده‌اند یا پس از بلوغ نا بارور مانده‌اند.

۴- لنگه نرها: به جهت آنکه امکان جفت‌گیری بدون نظم در گله وجود دارد، نرها و کل‌ها

تا ابتدای دوره نر کل انداختن دور از رمه نگهداری می‌شوند.

جدا کردن خشکه‌ها و ترها در لنگه‌های جداگانه امری حتمی نیست. ممکن است تعداد مادینه‌های نابارور کم باشند و یا به دلیل نیافن چوپان و نظایر آن با لنگه رمه آمیخته شوند. نرها نیز امروزه کمتر در لنگه جداگانه‌ای نگهداری می‌شوند. در قدیم که امکان تغذیه کمکی مثل امروز فراهم نبوده است، - تعداد نرها بیشتر بوده و اغلب به عنوان یک لنگه جدا می‌شدند اما امروزه با تغذیه کمکی که نرها در دوره جفت‌گیری دریافت می‌کنند بالتبیع به تعداد کمتری نگهداری می‌شوند و به جای آنکه لنگه جداگانه‌ای را تشکیل دهند موقتاً با لنگه خلامه‌ها آمیخته می‌شوند و یا آنکه هر گله دار آنها را تا موعد نر کل انداختن به خانه رostenایی خود منتقل کرده و موقتاً در آنجا نگهداری می‌کند. در هر مرحله از سال چنانچه گله پایه - که از نظر سنی، جنسی و نوعی آمیخته است - سنتگین باشد، بنابر اقتضای عرصه چراگاهی یا تغذیه کمکی و یا نظایر آن، گله به چند لنگه شکسته می‌شود. مثلاً لنگه‌ای از نر بیزها، بیزها یا بزغاله‌ها در برابر لنگه نرها، میش‌ها و بره‌ها بوجود می‌آید. البته تفکیک گله‌ها از نظر نوع کمتر مشاهده می‌شود.

با این وصف گله داشتی عمدهاً بصورت آمیخته نگهداری می‌شود و معمولاً فقط در دوره بیلاقی به دو لنگه (خلامه‌ها و رمه) تقسیم می‌شود و در دوره نر کل انداختن مجدداً همه چیز به جای خود بر می‌گردد. پس بهتر است به چنین گله‌های موقتی نام لنگه اطلاق گردد و مفهوم لنگه از مفهوم گله متمایز دانسته شود.

۶- زاد و ولد، حذف و فروش دام

گله داشتی که در جدول شماره (۳) معرفی شد، در فصل پاییز دوره آبستنی را طی می‌کند. مادینه‌های قابل باروری گله (یعنی شیشک‌ها، میش‌ها، چبش‌ها و بیزها) تماماً بارور نمی‌شوند. نرخ باروری معمولاً به سلامت گله و تغذیه مناسب گله در دوره جفت‌گیری بستگی دارد. طبیعی است که این نرخ در گله‌های مختلف با هم تفاوت چشم‌گیری داشته باشد. در برخی موارد دیده شده است که در دو گله مجاور، در یک گله کمتر

از ۵ درصد ولی در گله دیگر بیش از ۳۰ درصد مادینه‌های قابل باروری قسر مانده‌اند. مادینه‌های بارور شده پس از طی پنج ماه دوره آبستنی بره یا بزغاله خود را به دنیا می‌آورند. در هنگام زایش معمولاً به علت سوء تغذیه و بیماری‌های دیگر بره‌های تازه متولد شده در معرض مرگ و میر قرار دارند. چنانچه مادینه‌های پا به زا بطور مناسب تغذیه شوند و نوزادان متولد شده نیز به نیکویی مراقبت و پرستاری گردند، مرگ و میر برها و بزغاله‌ها ممکن است به کمتر از دو درصد نیز برسد.

در گله مفروض این مقاله چنانچه نرخ باروری ۹۰ درصد و نرخ مرگ و میر نوزادان تا آخر دوره شیرخوارگی حدود ۵ درصد فرض شود، از ۱۸۰ مادینه قابل باروری تعداد ۱۶۲ مادینه بارور شده و تعداد ۱۸ مادینه قسر می‌مانند. همچنین از ۱۶۲ خلامه متولد شده نیز تعداد ۸ نوزاد تلف شده، ۱۵۴ خلامه سالم مانده و به گله اضافه می‌شوند. برها و بزغاله‌های مذکور تا اواسط تابستان یعنی تا حدود شش ماهگی شیر می‌خورند و در ضمن بطور جداگانه نیز به چرا می‌پردازند و در این سن از شیر گرفته می‌شوند. پس از چندین روز از آنکه به خلامه‌ها اجازه چیزین داده نشد، نالمید می‌شوند و شیر پستان مادرها می‌خشکد. در این زمان لنگه خلامه‌ها می‌تواند با لنگه رمه آمیخته شود. در مثال این مقاله، گله به ۳۸۵ رأس خواهد رسید که به شکل جدول شماره (۴) قابل وصف است. تأمین مخارج گله و ثابت نگهداشت آن به لحاظ محدودیت‌های محیطی و مدیریتی ایجاب می‌کند که گله مجدداً به ۲۵۰ رأس که همان پایه یا داشتی است کاهش یابد.

اواخر مردادماه و اوایل شهریورماه معمولاً زمان کاهش گله و فروش دام ممتاز است. زیرا برها و بزغاله‌ها دیگر به مادر واپستگی ندارند و از سوی دیگر علف سبز بهاره و تابستانه نیز در کوهستان چرانیده شده است و چنانچه علوفه‌ای باقی مانده باشد نیز باید صرف تعییف گله داشتی شود. بنابراین باید تعدادی دام حذف شوند. دام‌های حذف شده در درجه اول دام‌های پیر هستند که قدرت چرایی خود را از دست داده یا می‌دهند. این گروه عبارتند از میش‌ها، بزهای پنج زه، نوها و کل‌های پنج ران که در جدول شماره (۴) مندرج است. به تناسب این تعداد دام که حذف می‌شوند باید از بردها و بزغاله‌ها که از این پس به

علت رسیدن به سن شش ماهگی و پایان یافتن شیرخوارگی تقلی و کولار شناخته می‌شوند، جاییگزین شوند. خلامه‌های مازاد نیز حذف شده و به فروش می‌رسند و بدین ترتیب گله داشتی با ترکیبی مشابه سال گذشته، ثابت باقی می‌ماند. در مثال این مقاله

جدول شماره (۴) - گله آمیخته در اواخر دوره دام و دوش که از گله فرضی ۲۵۰ رأسی حاصل شده است.

جنس/نوع	میشینه	بزینه	مادینه
بره		بزغاله	۲۴
شیشک		چپش	۱۳
میش یک زه		بز یک زه	۱۲
میش دو زه		بز دوزه	۱۱
میش سه زه		بز سه زه	۱۰
میش چهار زه		بز چهار زه	۱۰
میش پنج زه		بز پنج زه	۹
نر بره		نر بزغاله	۲۴
نر شیشک		نر چپش	۲
نر یک ران		کل یک ران	۱
نر دو ران		کل دو ران	۱
نر سه ران		کل سه ران یا دو بر	۱
نر چهار ران		کل چهار ران یا دو بر	۱
نر پنج ران		کل پنج ران یا دو بر	۱
جمع کل	۲۶۵	۱۲۰	

چنانچه دام‌ها مطابق جدول شماره (۵) از گله آمیخته جدول شماره (۴) حذف شوند گله مجدداً به حالت داشتی در می‌آید (گله مفروض معرفی شده در جدول شماره (۳)). در مثال فوق ۳۰ رأس بره ماده، ۵ رأس بره نر، ۱۴ رأس بزغاله و ۲ رأس نر بزغاله در گله باقی مانده و مابقی به همراه دام‌های واژده به فروش می‌رسند. بنابراین از گله آمیخته جدول شماره (۴) تعداد ۱۰۳ رأس خلامه و ۳۲ رأس دام پیر و واژده، مجموعاً به تعداد ۱۳۵ رأس به شرح جدول شماره (۵) حذف شده، و بلافاصله یا پس از پرواپاریندی چند هفتاهی یا چند ماهه به کشتارگاه فرستاده می‌شوند. با این وصف یک گله داشتی ۲۵۰ رأسی هر سال حدود ۱۳۵ رأس دام مازاد تولید می‌کند، که قابل عرضه به بازار گوشت خواهد بود.

جدول شماره (۵) - دام‌های حذف شده برای فروش از یک گله داشتی ۲۵۰ رأسی

نرینه	مادینه	نوع/جنس
۴۸(۵۳-۵)	بره	میشینه
۲	میش پنج زه	
۲۲(۲۴-۲)	بزغاله	بزینه
۱	بز پنج زه	
۷۳	۶۲(۱۳۵)	جمع

۷- حساب و کتاب گله و گله داری

حساب و کتاب گله داری می‌تواند با دیدگاه‌های مختلفی انجام شود. لیکن آنچه در اینجا مد نظر بوده است معرفی چهار چوب جدیدی برای حسابداری و در عین حال تحلیل اقتصادی گله است که در آن دام سرمایه‌ای از دام تولیدی کاملاً تفکیک شده و هزینه‌ها و درآمدها با جزئیات بیشتری روشن شده‌اند. در ذکر سرمایه ثابت، هزینه‌ها و دریافت‌ها، یک گله داشتی ۲۵۰ رأسی

مد نظر بوده است.

۱-۷- مال و اموال: مال و اموال یا به مطابیه دار و ندار که در اقتصاد و حسابداری با نام دارایی یا سرمایه ثابت از آن یاد می شود عبارتند از:

الف- چراگاه که بصورت حق علیقیر یا پروانه چرا عینیت می یابد.

ب- چفت یا جایگاه قشلاقی

ج- بنه یا جایگاه بیلاقی

د- دام ثابت گله داشتی (مطابق جدول شماره ۳)

ه- دام همراه گله

۱- دام سواری شامل یک رأس اسب و یک رأس الاغ

۲- دام نگهبان شامل سه قلاده سگ

و- اسباب و لوازم: شامل انواع ظروف شیر دوشی، دوره یا ابزار کره گیری، آخورها، لوازم مربوط به چوپان، لوازم مربوط به حیوانات همراه گله و نظایر آن.

۲-۷- خرج و برج: که در اقتصاد و حسابداری با نام سرمایه جاری از آن یاد می کنند:

الف - خرج دام گله

۱- خوراک زمستانی برای گله داشتی برای ۲۵۰ رأس به مدت ۹۰ روز، هر روز نیم کیلو به ازای هر رأس.

۲- خوراک خلامه ها برای ۱۵۴ رأس بمدت ۶۰ روز، هر روز ۲۰۰ گرم به ازای هر رأس.

۳- خوراک نرها در زمان جفت گیری برای حدود ۱۰ نر قابل جفت گیری حدود یک ماه هر روز یک کیلو به ازای هر رأس.

۴- هزینه بهداشت و درمان، واکسیناسیون گله داشتی در مقابل تب برفکی، سیاه زخم آگالاکسی، علفری (آنتروتوکسومی) برای گله داشتی، خوراندن قرص کرم روده و جگر برای کل گله آمیخته یا بخشی از آن، شستشوی دام علیه انگل های خارجی حداقل یک بار در سال، درمان

موردی علیه زردی و امثال آن.

۵- هزینه بابت اجاره ته چر مزارع و باغات.

۶- هزینه پشم چینی کل گله داشتی یک بار در سال.

۷- هزینه بابت تأمین آب مورد نیاز گله

ب - خرج دام همراه گله

۱- خوراک سگ‌ها: روزانه حدود یک کیلو آردجو برای سه قلاوه سگ در تمام سال.

۲- خوراک دام سواری: روزانه حداقل دو کیلوگرم جو برای اسب در فصل پاییز و زمستان

و روزانه حدود یک کیلوگرم خوراک تکمیلی برای الاغ در فصل زمستان.

ج - هزینه چوپانان

۱- دستمزد:

- مزد دو چوپان برای تمام سال جهت گله داشتی.

- مزد کارگر فصلی در دوره زهگاه یک نفر برای دو ماه.

- مزد خلامه چران برای هدایت گله در دوره دام و دوش یک نفر برای سه ماه.

- مزد مختاریاب برای شیردوشی و انجام امور جایگاه در دوره دام و دوش یک نفر

برای سه ماه.

۲- خوراک چوپانان در خلال سال شامل:

ده کیسه آرد، دو گوسفند گوشتی، قند و چای، روغن هر ماه یک حلب، برنج نیمه یا سالم

۱۵۰ کیلو، سایر هزینه‌ها (کربیت، نفت و...).

۳- لباس چوپانان:

- چوپانان دائم هر کدام حداقل یک یا دو دست در سال یا بر اساس توافق.

- چوپانان فصلی با توجه به توافق.

- د - هزینه ترمیم جایگاه قشلاقی و بیلاقی.
ه - هزینه دام تلف شده در اثر گرگ زدگی، بیماری‌ها و نظایر آن.
و - هزینه تمدید پروانه چرا در بیلاق و قشلاق.

۷-۳- فروش یا دریافت‌ها

- الف - دریافت‌های حاصل از فروش دام زنده حذف شده از گله (مطابق جدول شماره ۵).
- ب - دریافت‌های حاصل از فروش شیر یا فرآورده‌های حاصل از آن: حدود ۱۵۰ رأس میش و بز شیرده، هر رأس به طور متوسط ۳۰۰ گرم به مدت سه ماه در دوره دام و دوش.
- ج - دریافت حاصل از پشم و مو: پشم حاصل از پشم چینی ۱۷۰ رأس میشینه هر رأس ۲ کیلوگرم (موی بز به ندرت تراشیده شده و به فروش می‌رسد).
- د - دریافت حاصل از فروش کود: صرفاً از اقامت گله در چفت یا جایگاه زمستانی قابل استحصال است حدود ۱۰ تن در سال از یک گله ۲۵۰ رأسی.
- ۴-۷- درآمد: درآمد گله یا گله داری عبارتست از مابه التفاوت دریافت‌ها و هزینه‌ها که به صورت درآمد سالانه محاسبه و بیان می‌گردد.

- ۵-۷- صرف: صرف داشتن، صرفیدن یا صرف کردن در گله داری عبارتست از برتری درآمد سالانه حاصل از گله داری به درآمدی که از تبدیل سرمایه در مشاغل دیگر قابل استحصال است. این شاخص که عمدتاً با محاسبات ذهنی و سرانگشتی و صرفاً بطور مقایسه‌ای معنا می‌یابد یکی از نکاتی است که به استناد آن از گله داری صرف نظر کرده و یا احياناً بر آن اصرار می‌ورزند.

بحث و نتیجه‌گیری

همان‌طور که در آغاز مقاله نیز اشاره شد هدف از مردم‌شناسی اقتصادی بازنگری در مفاهیم و محاسبات مالی و اقتصادی است. با در نظر داشتن این امر و با توجه به یافته‌های تحقیق و

مقایسه آنها با منابع و متنون موجود در این زمینه، نکات زیر بطور برجسته‌تری قابل استنتاج و یادآوری است:

۱- تفکیک سنتی، جنسی و نوعی دام‌های گله برای تحلیل ساختاری و کارکردی هر گله ضروری است. بسیاری از مقاله‌های علمی به این تفکیک‌ها اشاره نموده‌اند و یا در صورت اشاره جایگاه آن را در ساختار و کارکرد اقتصادی گله تحلیل نکرده‌اند.

۲- گله داشتی به عنوان گله پایه یا واحد تولیدی در نظر گرفته می‌شود. در این صورت تفکیک برده‌های به عنوان بخشی از گله یا سرمایه، بلکه به عنوان تولیدات گله در هرسال در نظر گرفته می‌شود. چه این برده‌ها مستقیماً به کشتارگاه فرستاده شوند و چه به عنوان گله پرواری جدا شوند. در بسیاری از مقاله‌های علمی که به اقتصاد گله و گله داری پرداخته‌اند، فروش دام مازاد به طور مبهم به عنوان حذف درصدی از گله -که جزو سرمایه تلقی می‌شود- در نظر گرفته شده است.

۳- یک گله داشتی ممکن است بنابر مقتضیات حرفه‌ای و شغلی به طور موقت به لنگه‌های جداگانه‌ای تفکیک شوند و از این رو نمی‌توان آنها را بعنوان گله و بالتبغ واحد تولیدی مستقل در نظر گرفت. واحد تولیدی یا بنگاه اقتصادی می‌باشد بر مبنای یک گله داشتی و یک دوره یکساله منظور شود و تفکیک آن به لنگه‌های متفاوت همچنان در قالب گله پایه یا گله داشتی قابل توجیه اقتصادی و فنی خواهد بود.

۴- با در نظر گرفتن گله داشتی و یا گله پایه به عنوان واحد تولیدی برای محاسبه تراز مالی، لازم است تمامی هزینه‌ها با جزئیات و بدون اهمال و الزاماً در یک دوره یکساله در نظر گرفته شوند. در غیر اینصورت محاسبات معطوف به بخشی از گله و یا بخشی از سال خواهد بود و بالتبغ نتیجه نادرستی را در پی خواهد داشت.

گله داران در محاسبه صرفه اقتصادی همواره تمام جزئیات را منظور می‌دارند در حالی که در بسیاری از مقاله‌های علمی بخشی از این هزینه‌ها یا درآمدها در محاسبات وارد نشده‌اند و یا اینکه درآمدهای گله در بیلاق بدون پیوستگی گله داری با قشلاق در نظر گرفته شده است که احتیاج به تجدیدنظر دارد.

سپاسگزاری

از تمامی گله داران و شبانان که از همراهی و همکاری با پژوهشگر میدانی درین نورزیدند و نهایت حوصله را در پاسخ به سؤالات مکرر محقق ارایه داشتند، از معاونت پژوهشی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران به جهت حمایت مالی تحقیق، از کارشناسان واحدهای تابعه سازمان جنگل‌ها و مرتع کشور در حوزه ستادی و استان‌های گلستان و سمنان و از تمام افرادی که به نحوی در انجام این پژوهش همکاری داشته‌اند، صمیمانه سپاسگزاری می‌شود.

منابع و مراجع مورد استفاده

- ۱- آقا عباسی، ناصر. «بررسی امکانات بالقوه و بالفعل جهت خودبستگی در تأمین گوشت قرمز»، *فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه*، سال هشتم، شماره ۲۹، ۱۳۷۹.
- ۲- اسکندری، نگهدار. «تعادل دام و مرتع، توازن بین تولید و مصرف»، (میزگرد کارشناسی)، *مجله جنگل و مرتع*، ش ۴۴، ۱۳۷۸.
- ۳- افراخته، حسن. «دامداری سنتی در فومنات»، *فصلنامه تحقیقات جغرافیایی*، سال هشتم، شماره پیاپی ۲۸، ۱۳۷۲.
- ۴- امان اللہی، اسکندر. *کرج نشینی در ایران، پژوهشی درباره عشاير و ایلات*، چاپ پنجم، انتشارات آگاه، تهران، ۱۳۷۸.
- ۵- امیری، مسعود. «گزارشی از وضعیت دام و گوشت در کشور و بررسی اقدامات ضروری»، *فصلنامه عشايري ذخایر انقلاب*، ش ۱۱، ۱۳۶۹.
- ۶- پاپلی یزدی، محمد حسین و مجید لباف خانیکی. «ترکیب گله در دامداری سنتی ایران»، *فصلنامه تحقیقات جغرافیایی*، سال پانزدهم، شماره پیاپی ۵۶ و ۵۷، ۱۳۷۹.
- ۷- ترکمان، منوچهر. آشنایی با جامعه عشايري ایران، شرکت چاپ و انتشارات نشر ایران، تهران، ۱۳۶۹.
- ۸- دهقانیان، سیاوش و محمدرضا کهنسال. «بررسی اقتصاد تولید عشاير خراسان».

- فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال هشتم، شماره ۲۹، ۱۳۷۹
- ۹- دیگار، ژان پی. بیرون کوچ نشینان بختیاری، ترجمه اصغر کریمی، انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد، ۱۳۶۹
- ۱۰- رحیم پور، پرویز. «بررسی وضعیت موجود نظام دامداری عشاپر کوچنده کشور»، فصلنامه عشاپر ذخایر انقلاب، ش ۲۳، ۱۳۷۸
- ۱۱- سعادت نوری منوچهر و صدرالله سیاه منصور. گوسفند داری در ایران، انتشارات اشرافی، تهران، ۱۳۶۱
- ۱۲- شاه حسینی، علیرضا. «شمارش و نامگذاری دام‌ها در ایل سنگسری»، فصلنامه عشاپری ذخایر انقلاب، ش ۲، ۱۳۷۷
- ۱۳- صفی زاده، فاروق. «سیر نام دام‌ها در کردی»، فصلنامه عشاپری ذخایر انقلاب، ۱۳۷۰
- ۱۴- علیزاده عسگر، داریوش شیر محمدی و حسن معین الدین. «طرح تعادل دام و مرتع»، مجله جنگل و مرتع، ش ۴۴، ۱۳۷۸
- ۱۵- عمادی، محمدحسین و علیرضا آقاعلی تژاد. «تحلیلی بر تحول نظام‌های دامداری و راهبردهای مداخله دولت در ایران طی نیم قرن اخیر»، روستا و توسعه، سال ۳، ش ۲، ۱۳۷۸
- ۱۶- طبیبی حشمت الله، مبانی جامعه‌شناسی و مردم‌شناسی ایلات و عشاپر، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۷۴
- ۱۷- فرهادی مرتضی. «نگاهی به انواع گله و شبان و یاریگری در چرانیدن دام چکنده در ایران»، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، ش ۵۸ و ۵۹، ۱۳۷۹
- ۱۸- قنبری علی. «بهره وری نظام دامداری عشاپری»، فصلنامه عشاپری ذخایر انقلاب، ش ۸ و ۹، ۱۳۶۸
- ۱۹- کیا، محمود. مردم‌شناسی اقتصادی، دانشکده علوم اجتماعی و تعاون دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۵۴

۲۰- کیاوند، عزیز. در برزخ گذار: بررسی طایفه بامدی از ایل بختیاری، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۷۴

۲۱- مزینی، پروین، مبانی کارشناسی دام، نشر سپهر، تهران، ۱۳۸۰

۲۲- تیر، حسین. «واژگان دامداری در عشایر ترکمن»، *فصلنامه ذخایر انقلاب*، ش ۲۱،

۱۳۷۸



پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتمال جامع علوم انسانی



پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتمال جامع علوم انسانی