

بررسی پدیدهای شناختی تجربه‌های مشترک خانواده‌های دارای بیمار روانی

محمد ذوالعدل^{*}، دکتر فرخنده شریف^{**}، دکتر فضل الله غفاری پور^{***}،

دکر انوشیروان کاظم نژاد^{****}، دکتر حمید اشکانی^{*****}

چکیده

مقدمه: هدف اصلی این پژوهش، دستیابی به تجربه‌های مشترک زنده خانواده‌های دارای بیمار روانی می‌باشد. مواد و روش کار: در این بررسی پدیدهای شناختی، ۳۱ خانواده دارای بیمار روانی و بستگان درجه یکی که بازی زندگی می‌کردند، به روش نسونه گیری در دسترس گزینش شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، مصاحبه نیمه‌ساختاری با پرسش‌های باز و ضبط صوت بود. پس از پایان مصاحبه، محتويات نوار بر روی کاغذ بازنویسی شد. تحلیل داده‌ها با بهره گیری از شیوه جبوری انجام شد. **یافته‌ها:** یافته‌های پژوهش بازتاب تجربه‌های خانواده‌های دارای بیمار روانی بود که در چهار جوب چگونگی برخورد با پدیده "بیماری روانی"، تأثیرات هیئت و ذهنی آن و تجربه‌های مربوط به درمان و مراقبت از بیماران روانی طبقه‌بندی واره شد.

نتیجه‌گیری: این‌لای یکی از اعضای خانواده به بیماری روانی، فشار، نگرانی و تغییرات منفی چشمگیری برخانواده وارد می‌کند.

کلیدواژه: پدیده‌شناسی، تجربه‌های زنده، خانواده، بیمار روانی

اعضای خانواده شده و با توجه به این که درجه بهبودی این افراد به توانایی‌های خانواده در فراهم نمودن حمایت‌های بدنی، عاطفی و اجتماعی بستگی دارد و این امر نیز به نوعه خود، به تجربه‌ها، واکنش‌های بیماران و خانواده‌هایشان در مورد بیماری روانی وابسته می‌باشد (تسلر^۱ و گاماج^۲؛ لارسن^۳؛ نویلیان، سالار و کیخانی^۴؛ یاگلاد^۵ و هاینز^۶، ۱۹۹۲)، بررسی تجربه‌های زنده مشترک خانواده‌های دارای بیمار روانی دارای اهمیت دانسته شده و کوشش شده است، در پژوهش حاضر، به این پرسش، پاسخ داده شود: تجربه‌های بیماران روانی و سایر اعضای خانواده آنان در مورد ابتلاء به بیماری روانی، مراقبت و چگونگی برخورد با آن چیست؟

مقدمه

یکی از استرس‌های مهم در خانواده، ابتلاء یکی از اعضای خانواده به بیماری‌های روانی است که سبب اختلال در ابعاد بهداشتی می‌شود (چیتی^۷، ۱۹۹۷). این بیماری‌ها در اثر عوامل زمینه‌ای و آشکارساز روانی - زیستی و اجتماعی ایجاد می‌شوند و احساس ناخنودی از زندگی و کاهش کیفیت زندگی را در پی دارند (انجمان ملی بهداشت روانی^۸؛ ۲۰۰۵؛ فلاحتی خشکناب، ۱۳۸۰؛ کارسون^۹ و آرنولد^{۱۰}؛ ۱۹۹۶؛ سوالهری، ۱۳۷۱؛ باورز^{۱۱}؛ ۱۹۹۸).

از آنجا که هر فرد مبتلا به بیماری روانی، افزون بر تحمیل هزینه‌های فراوان بر خانواده و جامعه، موجب ایجاد فشار روانی در

* دانشجوی دکترای پرستاری دانشگاه تربیت مدرس، تهران، تقاطع بزرگراه‌های جلال آلمحمد و چمران، دانشگاه تربیت مدرس، ساختمان شماره ۵، دانشکده علوم پزشکی، گروه پرستاری (نویسنده مسئول).
E-mail: mzoladl@sums.ac.ir

** دکترای پرستاری، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز، خیابان زند، فلکه نمازی، دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه (س).

*** دکترای آموزش بهداشت، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس، تهران، تقاطع بزرگراه‌های جلال آلمحمد و چمران، دانشگاه تربیت مدرس، ساختمان شماره ۵، دانشکده علوم پزشکی، گروه پرستاری.

**** دکترای آمار حیاتی، استاد دانشگاه تربیت مدرس، تهران، تقاطع بزرگراه‌های جلال آلمحمد و چمران، دانشگاه تربیت مدرس، گروه آمار زیستی.

***** روانپژوه، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، بلوار چمران، بیمارستان حافظ، بخش روانپژوهی.

مواد و روش کار

شرکت کنندگان به زبان مفاهیم علمی و ۷- ساخت و ارایه دید کلی از تجربه‌ها و مفهوم پدیده مورد بررسی (استروبرت و کارپتر، ۱۹۹۹).

افزون بر مصاحبه با شرکت کنندگان در پژوهش، از روش مشاهده میدانی نیز استفاده گردید. در طول جلسات مصاحبه، مشاهدات یادداشت شده نیز به اطلاعات گردآوری شده در حین مصاحبه افزوده شد.

یافته‌ها

یافته‌های بدست آمده از این پژوهش را می‌توان در پنج گروه زیر یان نمود:

۱- تجربه‌های مربوط به شیوه برخورد با پدیده «بیماری روانی»؛ این بررسی نشان داد که خانواده‌های دارای بیمار روانی از بیماری روانی و شیوه برخورد با آن آگاهی ندارند. یافته‌های این پژوهش در مورد نگرش نسبت به پدیده «بیماری روانی» گویای آن است که بسیاری از افراد، بیماری روانی را با دیوانگی برابر دانسته و شخص مبتلا به آن را ناکارآمد و خطرناک می‌دانند. بسیاری از خانواده‌ها در برخورد با بیماری‌های روانی، انکار را پیشه نموده، کوشش در پنهان نگداشتند. احساس گناه، احساس شرم و خجالت و حمایت بیش از حد از بیمار روانی نیز یافته دیگر این بررسی است. ۲- یافته‌ها نشان دادند که ابتلای یک فرد به بیماری روانی در وضعیت اقتصادی، عادات‌های شخصی و عملکرد شغلی سایر اعضای خانواده نیز تأثیر می‌گذارد. ۳- نگرانی از آینده، سپر بلا واقع شدن و به کارگیری شیوه‌های مقابله‌ای نامناسب، از جمله تأثیرات ذهنی ناشی از وجود بیمار روانی در خانواده به شمار می‌روند. ۴- اعتقاد به تأثیر منفی محیط‌های درمان بیماری‌های روانی، عوارض جانبی داروهای روپرژشکی و بی‌توجهی به خانواده بیماران، از جمله تجربه‌های منفی آزمودنی‌ها بوده است. ۵- آزمودنی‌های پژوهش ضمن تأکید بر امر مراقبت از خود، به جنبه‌های گوناگون آن ماند فکر نکردن به گذشته و تمرکز بر حال برای ساختن آینده‌ای بهتر، شرکت در کلاس‌های ورزشی، مطالعه کتاب، توجه به توصیه‌های گروه درمانی و به کارگیری شیوه‌های تخلیه عاطفی اشاره نموده و تأثیرات سودمند آنها را یادآور شده‌اند.

این پژوهش از نوع کیفی^۱ بوده، به شیوه پژوهشی پدیدارشناسی^۲ انجام شده است. در این نوع بررسی، پژوهشگر در بی تجربه‌های زنده افراد و به دنبال شناخت معنی و مفهوم پدیده‌ها از دیدگاه آنان است. افراد، عمل یا تجربه و احساس خود را برای پژوهشگر بیان نموده، آنگاه پژوهشگر، توضیحات مطرح شده آنان را تفسیر می‌نماید (برنز^۳ و گراو^۴، ۱۹۹۹؛ استروبرت^۵ و کارپتر^۶، ۱۹۹۹). این شیوه پژوهشی می‌تواند اطلاعاتی درباره تجربه‌ها و دیدگاه‌های جامعه پژوهشی در اختیار پژوهشگران قرار دهد.

جامعه پژوهش، خانواده‌های دارای بیمار روانی بوده که از میان آنان، ۳۱ خانواده دارای بیمار روانی، همراه باستگان درجه یکی که با او زندگی می‌نمودند به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان آزمودنی‌های پژوهش انتخاب شدند. معبار انتخاب آزمودنی‌ها، داشتن اطلاعات لازم در زمینه موضوع پژوهش بود. از دیدگاه استروبرت و کارپتر (۱۹۹۹)، در بررسی‌های پدیدارشناسی، نازمان احساس اشیاع در مورد مفهوم پدیده مورد بررسی باستی نمونه گیری ادامه نیافرید؛ تا جایی که با افزایش حجم نمونه، حجم اطلاعات افزوده شده چشمگیر نباشد. در این بررسی، پژوهشگران به منظور رفع نورش در دیدگاه و استبانت فردی خود در تشخیص اشیاع اطلاعاتی، افزون بر ادامه نمونه گیری تاریخیدن به اشیاع اطلاعاتی، داده‌های گردآوری شده از آزمودنی‌ها را در اختیار سه کارشناس دیگر فرار داده و تأیید کفايت اطلاعات گردآوری شده توسط هر سه نفر آنان، نمونه گیری ادامه یافت (فلاحی خشکناب، ۱۳۸۰؛ پولیت^۷ و هانگلر^۸، ۱۹۹۹).

ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش، مصاحبه نیمه‌ساختاریافته^۹ با پرسش‌های باز^{۱۰} و نوار ضبط صوت بود. برای در نظر گرفتن ملاحظات اخلاقی، رضایت نامه لازم در مورد استفاده از ضبط صوت، از شرکت کنندگان گرفته شد. مدت مصاحبه با بیماران روانی، ۴۵-۹۰ دقیقه و زمان صرف شده برای مصاحبه با خانواده‌های دارای بیمار روانی، ۱۸۰-۶۰ دقیقه بود.

تحلیل داده‌های گردآوری شده به شیوه جیبورجی^{۱۱} و طی مراحل زیر انجام شد: ۱- خواندن کل تجربه گزارش شده تا حسن کلی آن به دست آید، ۲- خواندن دوباره گزارش‌ها، ۳- شناسایی بخش‌هایی از مطالب مرتبط با هم در بین گزارش‌ها، ۴- مشخص نمودن ارتباط اجزاء با یکدیگر و با کل، ۵- مقایسه اجزاء با زبان شرکت کنندگان به منظور اطمینان از این که مفاهیم شناسایی شده، بازنایی از صحبت‌های آنان می‌باشد، ۶- تبدیل زبان

1- qualitative research 2- phenomenology
 3- Burns 4- Grove
 5- Streubert 6- Carpenter
 7- Polit 8- Hungler
 9- semi-structured interview 10- open-ended question
 11- Giorgi

بحث

سپاسگزاری

بدینویسه از خانواده‌های دارای بیمار روانی شرکت کننده در پژوهش، مسئولین و کارکنان محترم بیمارستان‌های حافظ و ابن سينا و مرکز مشاوره راه زندگی که مرا را در انجام این پژوهش باری نمودند، قدردانی می‌شود.

دربافت مقاله: ۱۳۸۴/۸/۱۳؛ در بافت نسخه نهایی: ۱۳۸۴/۹/۹

پذیرش مقاله: ۱۳۸۴/۱۰/۱۴

منابع

- بوالهری، جعفر(۱۳۷۱). بهداشت روان برای کارآموزی دانشجویان پزشکی. مجله آموزش مددکوم در پزشکی، سال دوم، شماره ۷، ۱۲.
- حسن‌زاده، مهدی(۱۳۷۷). نگاهی به بیماری‌های روانی از دیدگاه فرهنگ مردم. *فصلنامه الکلیشه و رفتار*، سال چهارم، شماره ۱، ۶۱-۵۷.
- داویدیان، هاراطون(شاه‌محمدی)، داؤد؛ آزردگان، فیروز؛ کریمی کیمی؛ عیسی؛ باقری بزدی، سیدجباس(۱۳۸۰). علایم و نشانه‌های مشترک و شایع اختلالات روانی در فرهنگ ایرانی. مجله پژوهشی حکیم، سال چهارم، شماره ۱، ۱۰-۱.
- فلاحی خشکاب، مسعود(۱۳۸۰). طراحی و ارزشیابی مدل پرستاری توانبخشی چند بعدی در مراقبت از بیماران استکبریوپریست. پایان‌نامه دکتری پرستاری دانشگاه تربیت مدرس.
- محمدی، محمدرضاء؛ داویدیان، هاراطون؛ نوربالا، احمدعلی؛ ملک‌افضلی، حسین؛ نقوی، حمیدرضا؛ پوراعتماد، حمیدرضا؛ باقری بزدی، سیدجباس؛ راهگذر، مهدی؛ حلاقندراد، جواد؛ اینی، همایون؛ رزاقی، عمران‌محمد(۱۳۸۲). همه گیری شناسی اختلالات روانپزشکی در ایران سال ۱۳۸۰. مجله پژوهشی حکیم، سال ششم، شماره ۱، ۶۴-۵۵.
- مرostenی، عفت‌السادات(۱۳۸۰). تأثیر بیماری‌های مزمن بر خواهر و برادرهای سالم. مجله علمی پژوهشی دشکده بیماری و هماقیه عشود، ویژه‌حامله خلاصه مقالات هماقیه سراسری آموزش و مراقبت در مبتلایان به بیماری‌های مزمن، سال سوم، شماره ۹، ۱۰-۹۶.
- ملکوتی، کاظم؛ سوری قاسم‌آبادی، ربابه؛ نقوی، محسن؛ احمدی‌اپهی، علی؛ نصراصنهانی، مهدی؛ افه، سوسن؛ صالحی، پروریزا؛ همتی، محمدراعلی؛ افندمیان، مسعود(۱۳۸۲). فشار روانی مرآقیان بیماران مزمن روانی و نیاز آن‌ها به خدمات مراقبتی و درمانی. مجله پژوهشی حکیم، دوره ششم، شماره ۲، ۱-۱۰.
- نوربالا، احمدعلی؛ محمد، کاظم؛ باقری بزدی، سیدجباس؛ یاسن؛ محمدتقی(۱۳۸۱). پررسی وضعیت سلامت روان در افراد ۱۵ سال و بالاتر در جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۸. مجله پژوهشی حکیم، سال پنجم، شماره ۱۰، ۱-۱.
- نویدیان، علی؛ سالار، علیرضا؛ کیخاپی، اسدالله(۱۳۸۰). پرسی میزان فشار روانی مرآقیان خانوادگی بیماران روانی مراجعت کننده به بیمارستان و مرکز جامع روانپزشکی زاهدان. مجله پژوهشی رومیه، سال دوازدهم، شماره ۳، ۲۱۲-۲۰۶.

یافته‌های این پژوهش نشان داد که استلاتی یکی از اعضای خانواده به بیماری روانی، فشار، نگرانی و تغییرات منفی چشمگیری را به نظام خانواده وارد نموده و سلامت آنان را به خطر می‌اندازد. این با یافته‌های تسلی و گاماج (۲۰۰۰) منی بر وجود انکار و عصبانیت و با نتایج مروضتی (۱۳۸۰) در مورد وجود حساسیت، شرم و تغییر در ارتباط اعضای خانواده این بیماران هم‌سویی دارد. خانواده بیماران روانی، اغلب نخستین مراقبین این دسته از بیماران هستند؛ آنها باز سنتگین هزینه‌های درمان و مراقبت از بیماران را بر عهده داشته و افزون بر فشار و تنش ناشی از بیماری در یکی از عزیزان، در معرض انگ اجتماعی، تعییض و محدودیت قرار دارند. از خود گذشتگی خانواده‌ها برای فراهم نمودن امکانات درمانی و مراقبتی بهینه برای بیمار تا مرز حمایت بیش از حد از بیمار روانی نیز تا اندازه‌ای در سایر بررسی‌ها از جمله تسلی و گاماج (۲۰۰۰) اشاره شده است. در بررسی حاضر، هیچ کدام از آزمودنی‌ها، تجربه‌ای مبنی بر طرد بیمار روانی را بیان ننمودند. در کشور ما، با وجود این که خانواده بیماران روانی، فشار ناشی از اختلال در آرامش و روابط درونی را تجربه می‌نمایند، اما مراقبت از بیمار روانی را با غرور، محبت، احساس رضایت و آسایش وجدان همراه می‌دانند (ملکوتی و همکاران، ۱۳۸۲).

سروز اختلال‌های بدنی گوناگون مانند سردرد، کمردرد، میگرن، حمله‌های قلبی و تنگی نفس از جمله مواردی بوده که در تجربه‌های بیان شده توسط خانواده‌های دارای بیمار روانی، اشاره شده است. در این راستا حسن‌زاده (۱۳۷۷) و داویدیان، شاه‌محمدی، آزردگان، کریمی کیمی و باقری بزدی (۱۳۸۰) نیز بر این باورند که بیمار ایرانی، افسردگی خود را بیان ننموده و آن را باشکایت‌های بدنی مانند دردهای گوناگون و پراکنده یاد می‌کند. به کار گیری شیوه‌های کنارآیی هیجان مدار^۱ و کمتر سودمند مانند گریه و زاری، فال گیری، مراجعة به جن‌گیر، از دیگر یافته‌های این پژوهش هستند.

به طور کلی این بررسی نشان داد که مبتلا بودن یکی از اعضای خانواده به بیماری روانی، فشار نگرانی و تغییرات منفی زیادی را بر سایر اعضای خانواده تحمیل می‌کند، در برخی احساس گناه، شرم و خجالت ایجاد می‌کند و گاهی سبب حمایت بیش از حد از بیمار می‌شود. هم‌چنین سبب بروز مشکلات اقتصادی، شغلی و میان‌فردي اعضای خانواده می‌گردد.

- Bowers, L. (1998). *The social nature of mental illness*. London: Routledge .
- Burns, N., & Grove, S. K. (1999). *Understanding nursing research (2nd ed)*. Philadelphia: W. B. Saunders CO.
- Carson, V. B., & Arnold, E. N. (1996). *Mental health nursing*, Philadelphia: W.B. Saunders.
- Chitty, K. (1997). *Professional nursing: Concepts and challenges (2nd ed)*. Philadelphia: W. B. Saunders.
- Larsen, L. S. (1998). Effectiveness of counseling intervention to assist family caregivers of chronically ill relatives. *Journal of Psychosocial Nursing*, 36, 26 -32.
- National Mental Health Association. (2005). *Mental illness and the family: Stigma, building awareness and understanding about mental illness*. Available on: <http://www.nmha.org/infoctr/factsheets/14.cfm>.
- Polit, D. F., & Hungler, B. P. (1999). *Nursing research: Principles and methods (6th ed)*. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
- Sandelowski, M. (1995). Focus on qualitative methods: Sample size in qualitative research. *Research in Nursing and Health*, 18, 179-183.
- Streubert, H. J., & Carpenter, D. R. (1999). *Qualitative research in nursing: Advancing the humanistic imperative (2nd ed)*. Philadelphia: Lippincott. Williams & Wilkins.
- Tessler, R., & Gamache, G. (2000). *Family experiences with mental illness*. Westport: Greenwood Publishing Group.
- Yougblood, N. M., & Hines, J. (1992). The influence of the family's perception of disability on rehabilitation outcomes. *Rehabilitation Nursing*, 17, 323-326 .