

بررسی آلودگی‌های باکتریایی در محیط آشپزخانه برخی از بیمارستان‌ها

دکتر جمیله نوروزی^۱

چکیده

مقدمه: محیط آشپزخانه، میز تهیه غذا، ظروف، مایع ظرفشویی و غیره در معرض آلودگی با باکتری‌های مختلف قرار دارند و باکتری‌ها از این طریق می‌توانند به بیماران نیز انتقال یابند. هدف از این بررسی، تعیین میزان و نوع آلودگی باکتریایی در محیط آشپزخانه در برخی از بیمارستان‌ها است.

روش بررسی: در این بررسی توصیفی-تحلیلی،^۴ باز از محیط اطراف آشپزخانه، ظروف شسته شده آماده مصرف، میز تهیه غذا، یخچال، سردخانه و مایع ظرفشویی نمونه برداری شد و باکتری‌های ایزو_۲ شده باروش‌های استاندارد شناسایی گردیدند.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که باکتری‌ها در ظروف شسته شده، میز، مایع ظرفشویی و سایر سطوح آشپزخانه وجود داشتند. فراوان ترین باکتری‌های یافت شده شامل انترباکتر، اشريشياکلي و كليسيلابودند.

بحث و نتیجه گیری: باکتری‌های روده‌ای که نشان دهنده آلودگی بامدفوع است در سطوح مختلف آشپزخانه یافت شد. بنابراین، بر افزایش آگاهی و کوشش جهت رعایت بهداشت در بیمارستان برای کنترل عفونت تأکید می‌گردد.

کلید واژه‌ها: آلودگی باکتریایی، مایع ظرفشویی، کنترل عفونت

در نتیجه باکتری‌های روده‌ای که نشان دهنده آلودگی با مدفع است در سطوح مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. این امر نشان دهنده آن است که مشاهده چشمی برای کاهش بیماری‌های ناشی از غذا در آشپزخانه کافی نیست. به منظور یافتن شیوع پاتوژن‌های غذایی و انتقال عفونت از آشپزخانه، ۱۲ مکان متفاوت از آشپزخانه در سال ۲۰۰۲ نمونه برداری شد. وجود باکتری‌های اشريشياکلي، استافيلوكوك، سالمونلا و كمپيلوباکتر با روش شمارش در پليت (پليت کانت) مورد بررسی قرار گرفت (۲). نتیجه اين پژوهش نشان داد که انتقال ميكروارگانيزم‌ها به مصرف غذای آلوده و تماس دست با سطوح مختلف آشپزخانه و رعایت بهداشت در آن بستگی دارد.

مقدمه

اکثر مسئولین بهداشت فقط با مشاهده چشمی به بررسی آشپزخانه‌ها می‌پردازنند و توجه چندانی به ميكروبيولوژي آن ندارند.

در سال ۲۰۰۱، جهت کاهش خطر شیوع عفونت ناشی از غذا، برای ارزیابی تست‌های ميكروبي نمونه‌هایی جمع آوری شد. اين نمونه‌ها توسط سواب از دست کارکنان، سطوح شسته شده‌ای که با غذا در تماس است، شير ظرفشویی و وان زير آن، و دستگيره سردخانه و فريزر ۷۰ رستوران جمع آوري شد (۱). سواب‌ها به محیط‌های مختلف کشته تلقیح شد و باکتری‌های پاتوژن و غير پاتوژن با روش‌های استاندارد شناسایی گردید.

صرف در آشپزخانه، سه نمونه از هر ظرف به طور تصادفی انتخاب و خطوطی در سطوح مختلف آنها به وسیله سواب کشیده شد. سپس، سواب در محیط کشت مایع مک کانکی و آب پیتونه قرار داده شد و بعد از ۲۴ ساعت نگهداری در حرارت ۳۷ درجه سانتیگراد بر روی محیط‌های اختصاصی مورد بررسی قرار گرفت. جنس و نوع باکتری‌ها طبق روش‌های استاندارد باکتریولوژی شناسایی گردید و نتایج به صورت واحد تشکیل کلنی در هر سانتی‌متر مربع بیان شد.

در این بررسی، به پیروی از موسمیه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، وجود بیش از ۲ کلنی در هر سانتی‌متر مربع از ظروف موردن بررسی، به عنوان نشانه‌ای از آلودگی سطوح در نظر گرفته شده است.

ذخیره کردن نامناسب غذا خطری برای سلامتی است. شستن دست قبل از تماس با غذای پخته یا پخته نشده، خطر مسمومیت غذایی را کاهش می‌دهد. آگاهی از دمای یخچال در کاهش خطر مسمومیت غذایی مهم است. شستن میز با آب گرم و صابون یا ماده ضد عفونی کننده دیگر موجب کاهش عفونت می‌شود^(۳). میزان انتقال باکتری از طریق تماس دست هانیز بر غذا و سطوح مختلف آشپزخانه از ۱۰٪ تا ۱۰۰٪ گزارش شده است^(۴). جدا سازی گوشت خام از سایر غذاها در هنگام تهیه غذا در آشپزخانه تاکید شده است^(۵).

هدف از این بررسی، یافتن میزان و نوع آلودگی باکتریایی در محیط آشپزخانه در برخی از مرکز آموزشی درمانی بوده است تا در صورت یافتن آلودگی، نکاتی جهت کاهش آلودگی توصیه گردد.

یافته‌ها

این بررسی که در مدت یک سال انجام شد، نتایج نشان داد که از ظروف شسته شده، ۶۸/۵٪ فاقد آلودگی و ۳۱/۵٪ دارای آلودگی، از ۱۶ میز سرو غذا، ۱۲/۵٪ فاقد آلودگی و ۸۷/۵٪ دارای آلودگی، از دستگیره ۲۹ یخچال و سردخانه، ۲۷/۶٪ دارای آلودگی و ۷۲/۴٪ فاقد آلودگی، از ۳۷ مایع ظرفشویی، ۳۲/۵٪ فاقد آلودگی و ۶۷/۵٪ دارای آلودگی و در تمام ۱۴ مورد کف آشپزخانه شسته شده مورد بررسی، آلودگی وجود داشت (جدول ۱). باکتری‌های بدست آمده شامل انتروباکتر، باسیلوس سوبیلیس، کلبسیلا، سودوموناس، اشریشیاکلی، استافیلوکوک کواگولاز منفی، آکالی ژنر، سراشیا، سیتروباکتر، پروتئوس و مخمر بودند. انتروباکتر، بالاترین میزان باکتری مشاهده شده در مایع ظرفشویی (۴۰/۵٪)، در میز سرو غذا (۳۷/۵٪) و ظروف شسته شده (۱۷/۳٪) و کف آشپزخانه (۲۸/۶٪) بود.

روش بررسی

فرم اطلاعاتی در مورد پاکیزگی و وضعیت ظاهری آشپزخانه و وجود سوسک و مگس و حشرات موذی دیگر در آن از قبل تهیه شده بود که با مراجعه مستقیم به بیمارستان در هنگام نمونه برداری توسط یک فرد تکمیل شد.

در این روش توصیفی - تحلیلی که در دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام گرفت، ۴ بار از مایع ظرفشویی جهت شستشوی ظروف، وسایل آشپزخانه (نظیر سینی غذا، قاشق، چنگال و غیره)، یخچال و سردخانه مکان نگهداری مواد غذایی، محیط اطراف نظیر میز سرو غذا و کف آشپزخانه در مدت یک سال نمونه برداری شد. در برخی از آشپزخانه‌ها هم مایع ظرفشویی رقیق نشده و هم رقیق شده موجود بود که از هر دو، نمونه برداری شد. برای تعیین میزان آلودگی ظروف موردن

جدول ۱

| مواد موردن بررسی | مواد آلودگی (درصد) | مواد آلودگی (درصد) | مواد موردن بررسی | آنتروباکتر | باسیلوس | کلبسیلا | سودوموناس |
|------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------|---------|---------|-----------|
| ۱۲۴ | ۶۸/۵ | ۳۱/۵ | ۲۱/۵ | ۱۱/۳ | ۵/۶ | ۵/۶ | ۴/۸ |
| ۱۶ | ۱۲/۵ | ۸۷/۵ | ۱۲/۵ | ۳۷/۵ | ۱۲/۵ | ۱۲/۵ | ۲۵ |
| ۲۹ | ۲۷/۶ | ۷۲/۴ | ۱۳/۸ | ۷/۲ | ۳/۴ | ۳/۴ | ۸/۹ |
| ۳۷ | ۳۲/۵ | ۶۷/۵ | ۴۰/۵ | - | ۱۶/۲ | ۱۶/۲ | ۲/۷ |
| ۱۴ | - | ۱۴ | ۲۸/۶ | ۷/۱ | ۵۰ | ۵/۶ | ۷/۱ |

ادامه جدول ۱

| مخمر | پروتئوس | پروتوباکتر | سیتروباکتر | سراسیا | آلکالی | استافیلوکوک کوکولازمنفی | اشریشیاکلی | |
|------|---------|------------|------------|--------|--------|----------------------------|------------|-----------------|
| - | - | ۰/۸ | ۰/۸ | ۲/۴ | ۳/۴ | ۴ | ۶ | ظرف شسته شده |
| - | ۶/۳ | - | - | - | ۱۲/۵ | ۱۸/۲ | ۱۸/۲ | میز سرو غذا |
| ۳/۴ | - | ۳/۴ | - | - | ۲۴/۱ | ۸/۹ | ۸/۹ | یخچال و سردخانه |
| - | - | ۲/۷ | - | ۱۳/۵ | - | ۱۸/۹ | ۱۸/۹ | مابع خرفشویی |
| - | ۷/۱ | ۷/۱ | - | - | ۲۸/۶ | ۷/۱ | ۷/۱ | کف آشپزخانه |

غليظ كه در آشپزخانه موجود بود، فاقد آلودگي بوده اما مابع ظرفشویي رقيق شده آماده مصرف كه جهت شستشوی ظروف آشپزخانه به کار مى رفت در ۶۷/۵٪ از موارد آلوده بوده است. توصيه مى شود که دقت بيشرى در هنگام رقيق كردن مابع ظرفشویي انجام گيرد.

در اين بررسی، پاتوژن های عمدۀ باکتریاني مشاهده نشدو اکثر باکتری های یافت شده، فلور طبیعی بدن بوده اند. اين باکتری ها اغلب باکتری های مدفعوعی بوده اند، و اين امر نشان دهنده عدم رعایت بهداشت کارکنان آشپزخانه می باشد. به همين دليل، نکات زير جهت بهبود وضع آشپزخانه ها پيشنهاد مى شود:

- کارکنان آشپزخانه ها ثابت باشند و آموزش بهداشت به آنها داده شود.

- توری پنجره های آشپزخانه ها سالم باشد.

- سماپاشی دقیق و بهتر جهت از بین بردن سوسک و مگس به طور منظم انجام شود.

- سقف و کف برخی از آشپزخانه ها تعمیر گردد.

- سینی بيماران در آيدارخانه بخش و سینی کارکنان در آشپزخانه شسته شود تا از آلودگی جلوگيري گردد.

- روش شستن ظروف، مورد بررسی مجدد قرار گيرد.

- سطح میز سرو غذا با دقت شسته و تمیز و پاک شود.

- زباله ها را در مكانی مناسب دور از محیط اطراف آشپزخانه نگهداري نمایند.

- دقت بيشرى در هنگام رقيق كردن مابع ظرفشویي به عمل آيد و مابع ظرفشویي را در ظرفی رقيق كنند که آلوده نباشد.

همانگونه که در جدول (۱) نشان داده شده است، وسائل آشپزخانه حتی ظروف شسته شده، به انواع باکتری ها آلوده بوده است.

در ۱۲ مورد از ۱۴ مرکز آموزشی درمانی مورد بررسی، سوسک (۱۷/۵٪)، مگس (۷۷/۴٪)، موش (۲۷/۴٪) و گربه (۱۴/۳٪) مشاهده شد. حيوانات فوق در ۲ بيمارستان وجود نداشتند.

بحث و نتيجه گيري

ميکروارگانيزم ها به طور مستقيم توسط مواد غذائي آلوده نظير سبزیجات تازه و به حد كافي شسته شده با توجه به اينکه در برخی از آشپزخانه ها، مواد غذائي شسته شده يا و شسته شده نظير سبزی، پیاز، سیب زمیني و غيره راه هرا با گوشت شسته شده يا ماست بدون در، در يك سردخانه نگهداري مى كنند، آلودگي با باکتری ها در اکثر موارد مشاهده شد. بنابراین توصيه مى شود که توجه بيشرى به روش نگهداري مواد غذائي در يخچال و سردخانه مبذول گردد. آلودگي با باکتری هادر فريزر برخی از آشپزخانه ها یافت شد، اما موادی که در فريزر نگهداري مى شوند معمولاً قبل از مصرف، پخته مى شوند که به اين ترتيب آلودگي آن به احتمال زياد از بين خواهد رفت.

در سال ۲۰۰۲، باکتری آلکالی ژنز از ۵ نمونه کشت خون و مابع مغزی نخاعی از ۵ کودک بستري در بخش هماتولوژي بيمارستان کودکان و همچنين از دو دستگاه تنفسی مورد استفاده دو کودک بستري در بخش مراقبت هاي ویژه بدست آمد. كميته كنترل عفونت بيمارستان بدنال تحقيقات اپيدميولوژي، محلول ضد عفونی کننده را به عنوان منيع آلودگي معرفی کرد (۱۱). نتایج مانیز نشان داد، مابع ظرفشویي

References

- 1- Kassa H, Harrington B, Bisesi M, Khuder. Comparisons of microbiological evaluations of selected kitchen areas with visual inspections for preventing potential risk of foodborne outbreaks in food service operations, *J. Food Prot* 2001 Apr. 64 (4): 509-13.
- 2- Gorman R, Bloomfield S, Adeley CC: A study of cross contamination of food borne pathogens in the domestic kitchen in the Republic of Ireland, *Int. J. Food. Microbiol.* 2002 June 5. 76 (1-2): 143-50.
- 3- Angelillo IF, Foresta MR, Scozzafava C, Pavia M: Consumers and foodborne disease: Knowledge, attitudes and reported behavior in one region of Italy, *Int. J. Food. Microbiol.* 2001 Feb 28. 64 (1-2): 161-6.
- 4- Chen Y, Jackson KM, Chea FP, Schaffner DW Quantification and variability analysis of bacterial cross contamination rates in common food service tasks, *J. Food Prot.* 2001 Jan, 64 (1): 72-80.
- 5- Winquist AG, Roome A, Mshar R, Fiorentino T, Mshar P, Hadler. Outbreak of Campylobacteriosis at a senior center, *J. Am Geriatr. Soc.* 2001 Mar. 49 (3): 304-7.

- به روش نگهداری مواد غذایی در یخچال و سردخانه توجه بیشتری مبذول گردد.
- از دستکش در هنگام تهیه و توزیع غذا استفاده شود.
- در تهیه سالاد دقت بیشتری شود.
- هر بیمارستان، کمیته کنترل عفونت فعالی داشته باشد که به سرعت رویداد بیماری از طریق انتقال غذای آلوده را شناسایی و کنترل کند.
- حداقل هر ۳ ماه یکبار، نمونه برداری از غذا و محیط اطراف انجام شود.
- مقاومت آنتی بیوتیکی موجود مورد بررسی قرار گیرد. زیرا تست حساسیت ضد میکروبی از میکرووارگانیزم های بدست آمده می تواند در شناسایی منع ارگانیزم ها کمک کند.
- آلدگی مواد غذایی با قارچ های نیز مورد بررسی قرار گیرد.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی

Study on Bacterial Contamination of Environment kitchen in Some Hospitals

Norozi (Ph.D)¹

Abstract

Introduction: Kitchen environment, food preparation tables, dishes, washing liquids,... etc are at risk of being exposed to different bacteria that can be transferred to patients. The objective of this survey was to determine the bacterial contamination in Kitchen environment in some hospitals.

Methods: In this analytical descriptive study, 4 times samples were taken from kitchen environment, washed dishes, food preparation tables, freezers, cold room, washing liquids. Isolated bacteria were identified by standard methods.

Findings: Our results showed that bacteria were found in washed dishes, tables, washing liquids and other surfaces in the kitchen. The commonest bacteria were Enterobacter, E. coli, Klebsiella.

Results: Enteric bacteria (that may indicate fecal contamination) were found on different surfaces of the kitchens. therefore improvement in hospital hygiene to control infections were emphasized.

Key words: *Bacterial Contamination, Washing Liquid, Control Infection.*

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی

1- Associate professor in Department Microbiology, Iran University of Medical Sciences