

مقاله پژوهشی
اصل
Original Article

ارزشیابی برنامه ادغام بهداشت روان در نظام مراقبت‌های بهداشتی اولیه روستایی شهرستان سندج

فریبا طیری^{*}، دکتر علی‌اصغر اصغرزاده فرید^{**}، دکتر جعفر بوالهری^{***}، دکتر احمد قاضی‌زاده^{****}

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف ارزشیابی برنامه ادغام بهداشت روان در نظام مراقبت‌های بهداشتی اولیه روستایی شهرستان سندج انجام شده است.

روش: در این پژوهش توصیفی- مقاطعی اطلاعات مرسوط به ۳۳۰ نفر از جمعیت روستایی، ۶۰ نفر از بهورزان، ۳۳ خانه بهداشت، ۱۱ مرکز روستایی و ۶۳ بیمار روانی با خانواده‌هایشان که به روش نمونه‌گیری تصادفی در سال ۱۳۸۲ انتخاب شده بودند، بررسی شد. ابزار گردآوری داده‌ها بر سرش نامه‌های بیماریابی افراد جامعه روستایی، بررسی آگاهی و نگرش افراد جامعه، آگاهی و نگرش بهورزان، بررسی برنامه بهداشت روان در مرکز بهداشتی- درمانی روستایی، بررسی وضعیت بیماران شد. روانی و بررسی وضعیت بیماران صرعنی بود. تحلیل داده‌ها به کمک روش‌های آمار توصیفی و آزمون آماری خی دو انجام شده است.

یافته‌ها: این پژوهش نشان داد که آگاهی و نگرش بهورزان نسبت به بیماری‌های خوب اما بیماری‌ای آنها ضعیف است. پزشکان شاغل در مرکز روستایی، به عنوان مهره کلیدی این مرکز در برنامه‌های بهداشت روان نظارت ضعیفی دارند. بیش از ۴۶٪ داروهای اساسی بهداشت روان در مرکز روستایی وجود ندارد و در طی این یک سال هیچ گونه نظارتی بر تعالیت پزشکان مرکز روستایی از سوی مشاور علمی برنامه بهداشت روان (روانپژوهشک) انجام نشده است.

نتیجه‌گیری: شرکت پزشکان عمومی در برنامه ادغام بهداشت روان در مراقبت‌های بهداشتی اولیه چشم‌گیر نیست.

کلیدواژه: ارزشیابی، ادغام، بهداشت روان، مراقبت‌های بهداشتی اولیه، سندج

مقدمه

میلیون نفر مبتلا به اختلال‌های روانی هستند که از این عده ۵۰ میلیون نفر به اختلال‌های شدید و ۲۵۰ میلیون نفر به بر پایه برآورد سازمان جهانی بهداشت نزدیک به ۵۰۰

* کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی کردستان. سندج، خیابان پاسداران، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی کردستان، مرکز مشاوره دانشجویی. فاکس: ۰۷۱-۶۶۲۵۷۴۳ (نویسنده مسئول). E-mail: faribatair@yahoo.com

** دکترای روانشناسی عمومی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی ایران. مرکز تحقیقات بهداشت روان.

*** روانپژوهشک، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی ایران. انسیتو روانپژوهشکی تهران و مرکز تحقیقات بهداشت روان.

**** دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی کردستان.

به متخصص سطح بالاتر ارجاع شده‌اند (بینا، بوالهری و باقری‌یزدی، ۱۳۷۴).

بوالهری و همکاران (۱۳۷۶) در ارزشیابی آگاهی و نگرش بهورزان نسبت به بیماری‌های روانی، عملکرد آنان را در ارایه خدمات بهداشتی موفق ارزیابی نمودند. یک بررسی نشان داد که تا پایان سال ۱۳۸۲ جمماً ۲۴۰۵۴۲ بیمار روانی از خدمات بهداشت روانی برخوردار گردیده‌اند. میزان شیوع بیماری‌های روانی در سراسر کشور، نزدیک به $\frac{1}{3}/4$ در هزار می‌باشد (اداره کل پیشگیری و مبارزه با بیماریها، ۱۳۸۳) که از این میزان $1/5$ در هزار مربوط به بیماران شدید و $8/14$ در هزار مربوط به بیماران خفیف روانی، $2/7$ در هزار مربوط به بیماران صرعی، $2/8$ در هزار مربوط به عقب‌ماندگی ذهنی و $1/6$ در هزار مربوط به سایر اختلال‌های عصبی- روانی بوده است. در مجموع 2786052 نفر جمعیت شهری و روستایی کشور از خدمات بهداشت روان برخوردار بوده‌اند (همان‌جا).

ارایه خدمات بهداشتی - درمانی در کشورهایی هم‌چون چین، کویا، بنگلادش، نپال و هند نشان داد که با استفاده از مشارکت مردمی می‌توان این خدمات را به طور مؤثر و سودمند ارایه نمود که افزایش آگاهی و تغییر نگرش افراد جامعه را در پی دارد (اولی، ۱۹۸۹ و سپیدیو، ۱۹۹۴)، به نقل از باقری‌یزدی و همکاران، (۱۳۸۰). با توجه به زیان‌های مالی و معنوی ناشی از این بیماری‌ها و هم‌چین کمبود تسهیلات، امکانات و نیروی تخصصی لازم برای ارایه خدمت به آنها، به‌نظر می‌رسد که انجام اقدامات پیش‌گیرانه در این زمینه ضروری است.

یکی از جنبه‌های مهم برنامه‌ریزی جامع خدمات بهداشت روانی، ارزشیابی ارایه خدمات می‌باشد. در این راستا باید شاخص‌هایی به کار رود تا میزان قدرت و ضعف خدمات بهداشت روانی و میزان موقوفیت برنامه در رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده با تأکید بر ارزشیابی کیفی خدمات ارایه شده ارزیابی شود (پریانی، ۱۳۷۷).

هدف اصلی پژوهش حاضر، ارزشیابی برنامه ادغام بهداشت روان در نظام مراقبت‌های بهداشتی اولیه روستایی در شهرستان سنتوج و شناسایی نقاط ضعف آن در راستای پیشبرد برنامه‌های بهداشت روان و ارتقای سطح سلامت روان افراد جامعه بود. اهداف اختصاصی پژوهش شامل بررسی آگاهی و نگرش افراد جامعه روستایی و بهورزان نسبت به بیماری‌های

اختلال‌های خفیف روانی مبتلا هستند. هم‌چنین 120 میلیون نفر از عقب‌ماندگی ذهنی، 50 میلیون نفر از صرع و 30 میلیون نفر از دماسن رنج می‌برند (سازمان جهانی بهداشت، ۱۳۷۳). از آن‌جا که بهداشت روان بخشی از بهداشت عمومی است، ادغام برنامه بهداشت روان در شبکه‌های بهداشتی کشور در سال ۱۳۶۷ انجام شد. نخستین مرحله آزمایشی آن در شهرضا (حسن‌زاده، ۱۳۷۱)، شهرکرد (شاه‌محمدی، گزارش منتشرشده) و هشتگرد (بوالهری و محیط، ۱۳۷۴) با موفقیت انجام شد و پس از آن بررسی‌های دیگری (فاضی‌زاده، ۱۳۷۴؛ فرج‌پور، ۱۳۷۷؛ عبه‌ری، ۱۳۷۸؛ محمدی، ۱۳۷۷؛ بوالهری، بینا، احسان منش و کریمی، ۱۳۷۶؛ باقری‌یزدی، ملک‌افضلی، شاه‌محمدی، نقوی و حکمت، ۱۳۷۸؛ دواساز ایرانی و اخلاصی، ۱۳۷۹؛ رئیسی، ۱۳۸۲؛ دواساز ایرانی، ۱۳۸۳) اثربخشی ادغام برنامه بهداشت روان در مراقبت‌های بهداشتی اولیه^۱ را مورد تأیید قرار دادند.

در ارزشیابی برنامه کشوری بهداشت روان که توسط انتیتو روانپزشکی تهران و سازمان جهانی بهداشت (محیط، شاه‌محمدی و بوالهری، ۱۳۷۴) انجام شد. ۲۶۶ خانه بهداشت، ۹۱ مرکز بهداشتی - درمانی روستایی و ۷۳۷ خانوار از مناطقی که طرح بهداشت روان در آنها اجرا نشده بود مورد بررسی قرار گرفتند. یافته‌های این ارزشیابی نشان داد که ادغام برنامه بهداشت روان کشور در نظام مراقبت‌های بهداشتی اولیه، موجب شناسایی بیش از شش هزار بیمار روانی در مناطق موربد بررسی شده که تحت درمان، مراقبت و پیگیری قرار گرفته‌اند. میزان بیماریابی بهورزان در جمعیت 483465 نفری، $12/59$ در هزار نفر بوده که از این میزان $1/15$ در هزار مربوط به بیماری‌های شدید روانی، $2/25$ در هزار مربوط به صرع، $2/6$ در هزار مربوط به عقب‌ماندگی ذهنی و $5/35$ در هزار مربوط به بیماری‌های خفیف روانی بوده است (همان‌جا).

ارزشیابی عملکرد پژوهان عمومی سراسر کشور در ارایه خدمات بهداشت روان در مناطق روستایی نشان داد که با ادغام بهداشت روان در مراکز روستایی، 8283 بیمار یعنی 1% جمعیت روستایی زیر پوشش این مراکز، از درمان و سایر خدمات بهداشت روان برخوردار شده‌اند، پژوهان آموزش‌دیده این مراکز توانایی تشخیص و درمان بیماران روانی مراجعه کننده به این مراکز را داشته‌اند و تنها $3/2\%$ آنها

۱- پرسش نامه بیماریابی افراد جامعه روستایی: دارای ۱۰ پرسش به صورت بلی - خیر در زمینه شناسایی افرادی که علایم اختلال‌های خفیف و شدید روانی، صرع، اختلال‌های روانی سالم‌دان و اختلال‌های رفتاری کودکان و نوجوانان را دارند، می‌باشد.

۲- پرسش نامه برسی آگاهی و تکریش افراد جامعه: این پرسش نامه دارای ۱۰ پرسش به صورت بلی - خیر - نمی‌دانم در زمینه شناخت علایم و نشانه‌های اختلال‌های روانی، صرع، عقب‌ماندگی ذهنی و روش‌های پیش‌گیری از ایجاد این بیماری‌ها است.

۳- پرسش نامه برسی آگاهی و تکریش بهورزان: دارای ۱۴ پرسش درباره میزان آگاهی و نگرش بهورزان نسبت به اختلال‌های روانی، صرع، علل بروز بیماری‌ها و روش‌های درمانی آنها می‌باشد.

۴- پرسش نامه برسی برنامه بهداشت روان در خانه بهداشت: دارای نه پرسش در سه بخش مربوط به اطلاعات زمینه‌ای، خدمات و برنامه‌های بهداشت روانی منطقه زیر پرسش است.

۵- پرسش نامه برسی برنامه بهداشت روان در مرکز بهداشتی - درمانی روستایی: دارای ۳۰ پرسش در چهار بخش مربوط به اطلاعات زمینه‌ای، عملکرد پزشک مرکز، وجود داروهای بهداشت روان در مرکز روستایی و فعالیت کارдан بهداشتی در مرکز می‌باشد.

۶- پرسش نامه برسی وضعیت بیماران شدید روانی: دارای ۱۹ پرسش مربوط به ویژگی‌های جمعیت‌شناختی بیمار و سیر بیماری است.

۷- پرسش نامه برسی وضعیت بیماران صرعی: دارای ۲۱ پرسش مربوط به ویژگی‌های جمعیت‌شناختی بیمار و سیر بیماری‌ها می‌باشد.

پرسش نامه با مراجعه به در منزل بیماران و خانواده‌های آنها و یا حضور در خانه بهداشت و مرکز بهداشتی - درمانی روستایی و مصاحبه با آنان توسط پرسشگران تکمیل شد. پرسشگری توسط کارشناسان بهداشت عمومی، کاردان‌های بهداشت خانواده و محیط که آشنا به برنامه بهداشت روان بودند انجام شد.

منع گرفتن اطلاعات در تکمیل پرسش نامه‌ها عبارت بود از یک فرد کلیدی یا کسی که در طول روز همراه بیمار است، مانند همسر، پدر و مادر، فردی که بیمار را به خوبی بشناسد مانند

روانی، بررسی وضعیت بیماران روانی، پزشکان عمومی و کاردان‌های بهداشتی زیر پوشش این برنامه، بررسی وضعیت داروهای بهداشت روان در مرکز روستایی، تعیین میزان بیماران شناسایی شده، موارد ارجاع و پیگیری بیماران روانی و بررسی علل عدم مراجعه بیماران روانی به خانه بهداشت و مرکز روستایی بود.

روش

این پژوهش از نوع توصیفی - مقطوعی بوده و با هدف برآورد میزان آگاهی و نگرش افراد جامعه روستایی شهرستان در سال ۱۳۸۲ انجام شده است. برای انتخاب افراد نمونه در خانوارهای زیر پوشش هر خانه بهداشت (پنج پرونده به تصادف انتخاب شده و به ترتیب پرسش نامه آگاهی و نگرش افراد جامعه و پرسش نامه بیماریابی برای ۳۳۰ نمونه مورد بررسی تکمیل گردید)، بررسی میزان آگاهی و نگرش بهورزان (از بهورزان شاغل در خانه‌های بهداشت زیر پوشش ۱۱ مرکز بهداشتی - درمانی روستایی، ۶۶ بهورز؛ از هر مرکز سه خانه بهداشت و از هر خانه بهداشت دو بهورز به تصادف انتخاب شدند و پرسش نامه آگاهی و نگرش بهورزان را تکمیل نمودند) و بررسی چگونگی فعالیت در خانه بهداشت و مرکز بهداشتی - درمانی روستایی (از بین خانه‌های بهداشت زیر پوشش ۱۱ مرکز بهداشتی - درمانی روستایی، ۳۳ خانه بهداشت انتخاب و پرسش نامه بررسی برنامه بهداشت روان در خانه بهداشت توسط پرسشگران آموزش دیده تکمیل شد) انجام شده است. ۱۱ مرکز بهداشتی - درمانی روستایی نیز به کمک پرسش نامه بررسی برنامه بهداشت روان در مرکز بهداشتی - درمانی روستایی بررسی گردید که در این بررسی فعالیت ۱۱ پزشک عمومی، ۱۱ کاردس، بهداشتی و وضعیت داروهای بهداشت روان ارزیابی شد.

داده‌ها به کمک هفت پرسش نامه مربوط به ارزشیابی کشوری بهداشت روان (اداره کل پیشگیری و مبارزه با بیماریها، ۱۳۷۶) گردآوری گردیدند. این پرسش نامه‌ها که بر پایه متون آموزشی کارکنان سطوح مختلف ارایه خدمات، تهیه شده و در سه کارگاه آموزشی مورد بررسی و تجدیدنظر قرار گرفته، به صورت آزمایشی بر روی ۱۰٪ از خانه‌های بهداشت شش استان کشور انجام شده است. نتایج آزمایشی این طرح نشان‌دهنده پایابی و رواجی پرسش‌های این پرسش نامه‌ها بوده است (همان‌جا). این ابزارها عبارت بودند از:

داروهای ایمپرامین ۱۰ و ۲۵ میلی‌گرمی، کلردیازپوکساید و آمی‌تریپتیلین در تمام مراکز روانسازی موجود بود. آمپول بی‌پریدن در هیچ مرکزی موجود نبود. داروهای ضد صرع در ۶٪ از مراکز روانسازی و داروهای ضدسایکوز در ۳٪ از مراکز روانسازی وجود داشت. بین آگاهی و نگرش خانواده بیماران روانی مورد بررسی و مصرف مرتب دارو ارتباط معنی‌داری دیده نشد.

جدول ۱- توزیع فراوانی بیماران شناسایی شده در مناطق مورد بررسی بر حسب جنس، سن، وضعیت تأهل، تحصیل و اشتغال

متغیر	بیماری روانی شدید		فرابانی (%)	فرابانی (%)	کل	صوع
	فرابانی (%)	فرابانی (%)				
جنسیت						
مرد	(۵۹/۵) ۲۵	(۵۹/۵) ۱۴	(۶۶/۷)	(۵۹/۵)	(۶۱/۷) ۳۹	(۵۹/۵)
زن	(۴۰/۵) ۱۷	(۳۳/۳) ۷	(۳۳/۳)	(۴۰/۵)	(۳۸/۳) ۲۴	(۴۰/۵)
سن						
۱-۱۰	(۱۱/۹) ۵	-	(۱۱/۹)	(۱۱/۹) ۵	(۷/۹) ۵	(۷/۹)
۱۱-۲۰	(۳۰/۹) ۱۳	(۴/۷) ۱	(۴/۷)	(۳۰/۹) ۱۳	(۲۲/۲) ۱۴	(۲۲/۲)
۲۱-۳۰	(۱۹/۸) ۸	(۲۸/۵) ۶	(۲۸/۵)	(۱۹/۸) ۸	(۲۲/۲) ۱۴	(۲۲/۲)
۳۱-۴۰	(۳۳/۳) ۱۴	(۳۳/۳) ۷	(۳۳/۳)	(۳۳/۳) ۱۴	(۳۳/۳) ۲۱	(۳۳/۳)
۴۱-۵۰	(۴/۷) ۲	(۱۹/۴) ۴	(۱۹/۴)	(۴/۷) ۲	(۴/۵) ۶	(۴/۵)
۵۱-۶۰	-	(۱۴/۲) ۳	(۱۴/۲)	-	(۴/۷۶) ۳	(۴/۷۶)
وضعیت تأهل						
مسجد	(۵۹/۵) ۲۵	(۴۷/۶) ۱۰	(۴۷/۶)	(۵۹/۵) ۲۵	(۵۵/۵) ۳۵	(۵۵/۵)
متاهل	(۴۲/۹) ۹	(۴۲/۹) ۹	(۴۲/۹)	(۴۲/۹) ۹	(۴۸/۶) ۲۵	(۴۸/۶)
جدا از همسر	(۶/۵) ۲	(۶/۵) ۱	(۶/۵)	(۶/۵) ۲	(۴/۷۶) ۳	(۴/۷۶)
وضعیت تحصیل						
بی‌سواد	(۵۲/۳) ۲۲	(۴۷/۸) ۱۰	(۴۷/۸)	(۵۲/۳) ۲۲	(۵۰/۷) ۳۲	(۵۰/۷)
ابتدایی	(۴۷/۶) ۲۰	(۴۲/۹) ۹	(۴۲/۹)	(۴۷/۶) ۲۰	(۴۶) ۲۹	(۴۶)
متوسطه	-	(۹/۵) ۲	(۹/۵)	-	(۳/۱) ۲	(۳/۱)
وضعیت اشتغال						
کشاورز	(۹/۵) ۴	(۱۴/۳) ۳	(۱۴/۳)	(۹/۵) ۴	(۱۱/۱) ۷	(۱۱/۱)
خانه‌دار	(۳۵/۷) ۱۵	(۲۸/۶) ۶	(۲۸/۶)	(۳۵/۷) ۱۵	(۳۳/۳) ۲۱	(۳۳/۳)
بی‌کار	(۲۸/۶) ۱۲	(۵۲/۴) ۱۱	(۵۲/۴)	(۲۸/۶) ۱۲	(۴۶/۵) ۲۳	(۴۶/۵)
کارگر	(۴/۸) ۲	(۴/۸) ۱	(۴/۸)	(۴/۸) ۲	(۴/۷۶) ۳	(۴/۷۶)
محصل	(۲۱/۴) ۹	-	-	(۲۱/۴) ۹	(۱۴/۲) ۹	(۱۴/۲)

بهورز، اطلاعات ثبت‌شده در پرونده بیمار، همچنین خود بیمار. در مجموع ۴۹۷ پرسشنامه در جمعیت ۹۶۵، ۲ نفری روانسازی مناطق مورد بررسی تکمیل و با بهره‌گیری از روش‌های آمار توصیفی و آزمون آماری خی دو تحلیل گردید.

یافته‌ها

ویژگی‌های جمعیت‌شناختی بیماران مورد بررسی در جدول ۱ آمده است. همان‌گونه که در جدول دیده می‌شود، ۶۱٪ افراد مورد بررسی مرد و ۳۸٪ زن می‌باشند. بیشترین فراوانی (۳۲٪) در گروه سنی ۳۱-۴۰ سال بود. ۵۵٪ بیماران مورد بررسی بی‌کار و ۵۰٪ آنها بی‌سواد بودند.

جدول ۲، میزان بیماریابی در مناطق روانسازی سنجش را در مقایسه با سایر بررسی‌های انجام شده در ایران نشان می‌دهد. در زمینه بررسی آگاهی و نگرش افراد جامعه روانسازی، نتایج نشان داد که تفاوت زیادی بین این دو دیده نشده، ۶٪ از افراد روانسازی بیشتر از ۵٪ نمرات مربوط به آگاهی را به دست آورده‌اند و ۶۵٪ آنها نگرش مثبت به بیماری‌های روانی داشته‌اند (جدول ۳). بین میزان آگاهی افراد جامعه روانسازی مورد بررسی در زمینه بیماری‌های روانی و فاصله محل سکونت آنان تا شهر سنجش را در جدول ۴ نشان می‌دهد.

یافته‌ها نشان دادند که بهورزان توانستند بیشتر از ۵۰٪ نمره‌های مربوط به آگاهی را به دست آورند و ۹۲٪ از آنان دارای نگرش مثبت نسبت به بیماری‌های روانی بودند. بین میزان آگاهی و نگرش بهورزان در زمینه بیماری‌های روانی رابطه معنی‌داری دیده شد ($p < 0.05$, $df = 9$, $\chi^2 = 6.31$).

یافته‌ها نشان دادند که تنها ۵٪ از پزشکان عمومی شاغل در مراکز روانسازی، دوره دو ماهه بهداشت روان را گذرانده‌اند. تنها ۱۷٪ از کارданهای بهداشتی شاغل در مراکز روانسازی دوره آموزشی بهداشت روان را دیده بودند و ۲۶٪ از آنها بر فعالیت بهورزان نظارت داشته‌اند. بین نظارت پزشک مرکز روانسازی بر فعالیت‌های بهورزان در زمینه بهداشت روان و نظارت کاردان مرکز در همین زمینه ارتباط معنی‌داری دیده نشد. پزشکان مراکز روانسازی مورد بررسی عملکردی پایین‌تر از ۵٪ داشته‌اند.

۴۰۶

حدو[۲] - توزیع فی اواني، بیماران شناسایی شده مورد بررسی و پاقته های سایر بررسی های انجام شده در ایران

محل اجرا									
شهرضا ۷۱	شهر کرد ۷۱	ارزشیابی کشوری ۷۴	ساوچلاخ ۷۶	اندیمشک ۸۳	گزارش‌های دانشگاه‌های علوم پژوهشکی کشور ۸۳	ستندج ۸۲			
فراوانی در هزار	فراوانی در هزار	فراوانی در هزار	فراوانی در هزار	فراوانی در هزار	فراوانی در هزار	فراوانی در هزار	روانی شدید		
۱/۷	۰/۹۳	۱/۱۵	۱	۱/۹	۱/۵	۰/۵			
۲/۹	-	۵/۳۵	۴/۴	۲/۷	۴/۸	۰/۵۳	روانی خفیف		
۱/۰۳	۲/۹۴	۲/۲۵	۱/۷	۲/۷	۲/۷	۱/۳	صرع		
۲/۴	۳/۷	۲/۶	۲/۴	۲/۵	۲/۸	۱/۸	عقب‌ماندگی ذهنی		
-	۱	۱/۲۵	۲	-	۱/۶	۰/۱	سایر		
۸	۸/۵۸	۱۲/۵۹	۱۲	۱۰	۱۳/۴	۴/۳	کل		

(۱) داده کامیونتگری و مبارزه با سماریها، (۲) دوازد ایرانی، (۳) عهری، (۴) بوالهیری و همکاران، (۵) شاه محمدی، (۶) ایشان

۱۳۷۱) حسن‌زاده،

همان گونه که در جداول ۴ و ۵ دیده می‌شود بیشتر از ۵٪
بیماران برای دریافت خدمات بهداشت روان به مراکز
بهداشتی - درمانی روستایی و خانه بهداشت مراجعه نکرده‌اند.
دور بودن از محل زندگی و مراجعه به بخش خصوصی از
مهمنترین علل عدم مراجعه به خانه بهداشت به گفته خود
بیماران بد.

بر اساس میزان آگاهی و نگرش خانواده بیماران روانی بر حسب فاصله محل زندگی آنها تا شهر سنج رابطه معنی داری دیده شد ($p < 0.05$ ، $df = 1$ ، $\chi^2 = 4.94$). بین مصرف مرتب دارو در بیماران شدید روانی و عود بیماری آنان و بین مصرف مرتب دارو در بیماران صرعی و شمار حملات آنان رابطه معنی داری دیده نشد.

جدول ۴- توزیع فراوانی علل عدم مراجعت بیماران روانی به خاله‌های بدهاشت و مراکز روانی، از نظر خودشان

متغیرها	علت عدم مراجعه	خانه بهداشت	مرکز رستایی
دور بودن از محل سکونت	فراآنی (%)	فراآنی (%)	(۳۷/۵) ۱۵
نامناسب بودن زمان ارایه خدمت	(۲۰) ۶	(۴۳/۳) ۱	(۰) ۰
کیفیت پایین خدمات	(۶/۶) ۲	(۱۶/۶) ۵	(۱۰) ۴
ارایه نداندن خدمات بهداشت روان	برخورد نامناسب کارکنان	(۶/۶) ۲	(۷/۵) ۳
مراجعةه به بخش خصوصی	مراجعةه به بخش خصوصی	(۳۳/۳) ۱۰	(۲۰) ۸
دیازی به دریافت خدمات ندارم	(۳/۳) ۱	(۱۰) ۴	(۱۵) ۶
سایر	(۱۰) ۴	(۱۰۰) ۳۰	(۱۰۰) ۴۰
کل			

جدول ۳- توزیع فراوانی نمره های آگاهی و تکرش خانواده بیماران شدید روانی و صرعی، افراد جامعه روستایی و بهورزان مورد بررسی نسبت به بیماری های روانی

متغیرها	خانواده بیمار شدید روانی	خانواده بیمار صرعی	خانواده جامعه روستایی	افراد فراآنی (%)
	آگاهی بالا	نگرش مثبت	نگرش منفی	فراآنی (%)
۵۴	۱۲۰	۲۵	۸	(۸۹/۴)
(۷۳/۶)	(۵۹/۵)	(۴۲/۸۵)		
۵۵	۱۱۸	۲۵	۷	(۹۲)
(۶۵/۹)	(۵۹/۵)	(۳۳/۳)		
۶۰	۱۶۵	۴۲	۲۱	(۱۰۰)
(۱۰۰)	(۱۰۰)	(۱۰۰)	(۱۰۰)	

بحث

آنان و فاصله محل زندگی تا سنتدج رابطه معنی داری دیده نشد. به نظر می رسد که نگرش این افراد کمتر از آگاهی تحت تأثیر عوامل محیطی قرار می گیرد و دیگر این که افزایش آگاهی لزوماً موجب افزایش و بهبود نگرش نمی گردد که با یافته های شاه محمدی (۱۳۷۱) و فرج پور (۱۳۷۷) هم خوانی دارد.

در این پژوهش، آگاهی بالای بهورزان و نگرش مثبت آنان در زمینه بیماری های روانی با بررسی های بوالهری و محیط (۱۳۷۴)، بوالهری و همکاران (۱۳۷۶) و یافته های پژوهش انجام شده در هند (مؤسسه ملی بهداشت روانی و علوم عصبی هند، ۱۹۹۰) هم خوانی دارد. در این بررسی بین آگاهی بهورزان در زمینه بیماری های روانی و نگرش آنان رابطه معنی داری وجود داشت.

بین آگاهی و نگرش خانواده بیماران روانی مورد بررسی و فاصله محل زندگی آنان تا سنتدج رابطه معنی داری دیده شد. به نظر می رسد که مراجعه بیماران روانی به بخش خصوصی برای درمان های سرپایی و یا بستری توسط خانواده آنان، و هم چنین ارتباط بیشتر این خانواده ها با جامعه شهری، در دسترس بودن امکانات و بهره گیری بیشتر از ابزارهای آموزشی و درمانی علت این امر باشد.

این بررسی نشان داد، با آن که بیماران روانپزشکی برای درمان به مراکز روستایی مراجعه می کنند، اما درمانگران سنتی هنوز بخشی از بیماران را به خود جلب می کنند، به طوری که ۴۷٪ از بیماران روانی مورد بررسی، مراجعه به دعานویس را گذارش کرده اند.

در زمینه روند مصرف دارو، افزون بر آگاهی و نگرش خانواده ها می توان مالی در خرید داروها یا حضور پیوسته بیمار نزد خانواده را مؤثر دانست.

عدم وجود یا کمبود برخی از داروهای اساسی در مراکز روستایی را می توان به عملکرد و نظارت ضعیف پزشکان بر فعالیت های بهداشت روان و بهرمنگرفتن از داروهای روانپزشکی در هنگام تجویز برای بیماران روانی دانست.

یافته های این بررسی در مورد عملکرد پزشکان با یافته های حسن زاده (۱۳۷۱) و بوالهری و محیط (۱۳۷۴) مبنی بر موافقیت پزشکان در زمینه تشخیص و درمان بیماران روانی، هم خوانی ندارد. عملکرد ضعیف پزشکان مراکز روستایی بر فعالیت های بهداشت روان را می توان ناشی از نگذراندن دوره آموزشی بهداشت روان و عدم نظارت مشاور علمی برنامه بهداشت روان (روانپزشک) بر فعالیت های پزشکان دانست.

هدف اصلی پژوهش حاضر، ارزشیابی برنامه ادغام بهداشت روان در نظام مراقبت های بهداشتی اولیه روستایی شهرستان سنتدج، از جمله آگاهی و نگرش افراد جامعه روستایی و بهورزان و عملکرد پزشکان عمومی و کارдан های شاغل در مراکز روستایی در زمینه ارایه خدمات بهداشت روان بوده است. یافته های به دست آمده نشان می دهند که فراوانی بیماران مرد در این بررسی با ۶۱٪ بیشتر از بیماران زن با ۳۸٪ است؛ در حالی که در بررسی دوازاس ایرانی (۱۳۸۳) بیماران مرد ۳۷٪ و بیماران زن ۶۲٪ بوده اند. هم چنین در این بررسی نسبت بیماران شناسایی شده تو سط بهورزان پایین تر از ارقام به دست آمده در سایر بررسی ها (دوازاس ایرانی، ۱۳۸۳؛ عهری، ۱۳۷۷؛ محیط و همکاران، ۱۳۷۴؛ شاه محمدی، ۱۳۷۱؛ حسن زاده، ۱۳۷۱) است و با بررسی انجام شده در نیال (مورتی و برنز، ۱۹۹۲)، به نقل از محمدی، ۱۳۷۷) در زمینه شناسایی بیماران روانی و صرع هم خوانی ندارد. نتایج به دست آمده در این بررسی عقب ماندگان ذهنی را بالاتر از بررسی انجام شده در نیال نشان داد. یافته های این پژوهش در زمینه شناسایی بیماران روانی شدید، صرع و عقب ماندگی ذهنی با بررسی انجام شده در هشتگرد (بالهری و محیط، ۱۳۷۴) هم خوانی دارد.

یافته های این بررسی شناسایی بیماران شدید روانی در روستا را ۵/۰ در هزار، بیماران خفیف روانی ۵/۳ در هزار، صرع ۱/۳ در هزار، عقب ماندگی ذهنی ۱/۸ در هزار و اختلال های رفتاری کودکان را ۱/۰ در هزار نشان داده است که با گزارش های دانشگاه های علوم پزشکی کشور در سال ۱۳۸۳ (اداره کل پیشگیری و مبارزه با بیماریها، ۱۳۸۳)، بررسی های بناء، بوالهری و باقری یزدی (۱۳۷۴) و نتایج ارزشیابی کشوری (محیط، شاه محمدی و بوالهری، ۱۳۷۴) هم خوانی ندارد؛ به طوری که گزارش های ارسالی از سوی دانشگاه ها، فراوانی بیماری های شدید روانی را ۱/۵ در هزار، خفیف روانی را ۴/۸ در هزار، صرع را ۲/۷ در هزار، عقب ماندگی ذهنی را ۲/۸ در هزار و اختلال های رفتاری را ۱/۶ در هزار نشان داده اند. به نظر می رسد ناهم خوانی یافته های این پژوهش با آمارهای موجود در کشور و سایر بررسی ها به علت عدم تشخیص پزشک عمومی و عدم شناسایی این بیماران توسط بهورزان باشد که نشان دهنده ضعیف بودن بیماریابی توسط بهورز و پزشک مراکز است.

بین میزان آگاهی افراد جامعه و محل سکونت آنان تا شهر سنتدج رابطه معنی داری وجود داشت، اما بین میزان نگرش

نزکیه، شماره ۲۵، ۷-۱۲.

پریانی، عباس (۱۳۷۷). بررسی رضایتمندی دریافت کنندگان خدمات از عملکرد خانه بهداشت و مراکز بهداشتی - درمانی روستایی شهرستان قزوین. پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی ایران.

حسن زاده، سیدمهدي (۱۳۷۱). بررسی ادغام خدمات بهداشت روانی در نظام خدمات اولیه شبکه شهرضا. دارو و درمان، سال دهم، شماره ۱۰، ۲۷-۴۳. دوازی ایرانی، رضا (۱۳۸۳). بررسی وضعیت ادغام بهداشت روان در مراکز بهداشتی - درمانی اندیمشک. *فصلنامه اندیشه و رفتار*، سال دهم، شماره ۱، ۱۱۵-۱۱۰.

دواسان ایرانی، رضا؛ اخلاصی، عبدالکریم (۱۳۷۹). گزارش توصیفی ادغام خدمات بهداشت روان در نظام مراقبت اولیه بهداشتی شبکه های بهداشت و درمان استان خوزستان. اهواز معاونت بهداشتی استان خوزستان.

رنیسی، پوران؛ جهانبانی، عفت (۱۳۸۲). چگونگی عملکرد مدبربری برنامه بهداشت روان در شبکه های بهداشت و درمان استان خوزستان. *فصلنامه اندیشه و رفتار*، سال نهم، شماره ۲، ۴۸-۴۰.

سازمان جهانی بهداشت (۱۳۷۳). ادغام بهداشت روان در مراقبت های بهداشتی اولیه. ترجمه داود شاه محمدی، عباس باقری بزدی، حسن بالاهنگ. تهران: انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد.

شاه محمدی، داود (۱۳۷۱). گزارش جامع از طرح تحقیقاتی ادغام بهداشت روان در P.H.C. در روستاهای شهرکرد. تهران: اداره کل مبارزه با بیماریها، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی.

صدقانی، ابراهیم (۱۳۷۶). ارزیابی مراقبت های بهداشتی - درمانی و استانی از راههای بیمارستانی. تهران: انتشارات معنی.

عاطف وحدی، محمد کاظم (۱۳۸۳). بهداشت روان در ایران: دستاوردها و چالش ها. *فصلنامه رفاه اجتماعی*، سال چهارم، شماره ۱۴، ۵۷-۴۱. عبیری، محمد (۱۳۷۷). گزارش توصیفی خدمات بهداشت روانی و ادغام بهداشت روان در مراقبت های بهداشتی اولیه در منطقه ساوجبلاغ، *فصلنامه اندیشه و رفتار*، سال چهارم، شماره ۳، ۴۰-۲۹.

فرج پور، محمد (۱۳۷۷). بررسی هیزان داشت، تکریش و عملکرد بهسوزان شهرستان کرمان در زمینه بیماری های روانی بعد از گذشت عسال از طرح ادغام بهداشت روانی در P.H.C. پایان نامه دوره دکتری تخصصی اعصاب و روان. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی کرمان.

قاضی زاده، احمد (۱۳۷۴). تحلیل هزینه - منفعت بیماران تحت پوشش طرح ادغام بهداشت روانی در مراقبت های بهداشتی اولیه. پایان نامه دکترای مدبربری بهداشت. تهران، دانشگاه آزاد اسلامی.

محمدی، سعید (۱۳۷۷). اثربخشی ادغام بهداشت روان بر بیماران سایتوتیک و بالینی. استینتو راپتیزشکی تهران.

محیط، احمد؛ شاه محمدی، داود؛ بوالهی، جعفر (۱۳۷۶). ارزش با کشوری بهداشت روانی. *فصلنامه اندیشه و رفتار*، سال سوم، شماره ۳، ۱۶-۴.

National Institute of Mental Health and Neurosciences (1990). *Training of PHC personal in mental health care experiences*. Bangalore: NIMHANS.

بهطور کلی، یافته های پژوهش حاضر نشان داد که ادغام بهداشت روان در نظام مراقبت های بهداشتی اولیه روستایی شهرستان سندنج با موفقیت هایی همراه بوده است. با آن که آگاهی و نگرش مثبت نسبت به بیماری های روانی در افراد جامعه روستایی، خانواده بیماران روانی و بهسوزان در سطح مطلوبی است، اما بیماریابی، وضعیت ارایه دارو، ارجاع و بیگیری بیماران روانی در سطح ضعیفی است و نیازمند تغییر و اصلاحات اساسی در برنامه های اجرایی و نظارتی می باشد.

سپاسگزاری

با سپاس فراوان از بهسوزانی که در اجرای پژوهش همکاری نمودند و با تشکر فراوان از همکاری خانواده های بیماران.

دریافت مقاله: ۱۳۸۴/۲/۲۶؛ دریافت نسخه نهایی: ۱۳۸۴/۵/۱۶

پذیرش مقاله: ۱۳۸۴/۶/۹

منابع

ادار، کل پیشگیری و مبارزه با بیماری ها (۱۳۷۶). ارزشیابی کشوری در شش استان بهطور آزمایشی. گزارش منتشر نشد.

ادار، کل پیشگیری و مبارزه با بیماری ها (۱۳۸۳). گزارش ارسالی از عملکرد پسته های بهداشت روان. *دانشگاه های حکوم پژوهشی سراسر کشور*. تهران: اداره کل پیشگیری و مبارزه با بیماری ها.

بالاقری بزدی، سید عباس؛ ملک افضلی، حسین؛ شاه محمدی، داود؛ نقوی، محسن؛ حکمت، سیمین (۱۳۷۸). ادغام برگامه بهداشت روان در شبکه مراقبت های بهداشتی درمانی بروجن استان چهار محال و بختیاری. اداره کل پیشگیری و مبارزه با بیماریها.

بالاقری بزدی، سید عباس؛ ملک افضلی، حسین؛ شاه محمدی، داود؛ نقوی، محسن؛ حکمت، سیمین (۱۳۸۰). ارزیابی عملکرد بهسوزان و رابطین داوطلب بهداشت در ارایه خدمات بهداشت روان در شبکه مراقبت های بهداشتی اولیه شهرستان بروجن - استان چهار محال بختیاری. مجله حکیم، دوره چهارم، شماره دوم، ۱۰۹-۱۰۰.

بالهی، جعفر (۱۳۷۷). بهداشت روان برای کارگران بهداشتی. تهران: انتشارات بشري.

بالهی، جعفر (۱۳۸۱). بهداشت روان برای کارشناسان بهداشتی. تهران: انتشارات بشري.

بالهی، جعفر؛ بیتا، مهدی؛ احسان منش، مجتبی؛ کریمی کیسمی، عیسی (۱۳۷۶). بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد بهسوزان. *فصلنامه اندیشه و رفتار*، سال سوم، شماره ۱، ۱۲-۴.

بالهی، جعفر؛ محیط، احمد (۱۳۷۴). ادغام بهداشت روان در مراقبت های بهداشتی و لیه در منطقه هشتگرد. *فصلنامه اندیشه و رفتار*، سال دوم، شماره ۱، ۲۴-۱۶.

بیتا، مهدی؛ بالهی، جعفر؛ بالاقری بزدی، سید عباس (۱۳۷۴). بررسی عملکرد پژوهشکان عمومی در مراکز بهداشتی - درمانی روستایی ایران. مجله طب و