

رابطه بین عفونت‌های توکسoplasma گوندی و اسکیزوفرنیا

دکتر مهرزاد سرانی صحته‌سرانی^۱، دکتر فرهاد شاملو^۱، دکتر حسن جهانی‌هاشمی^۲، فرهاد خباز^۳، صفرعلی علیزاده^۴

Relation Between Toxoplasma Gondii Infections and Schizophrenia

Mehrzed Saraei-Sahnesaraei^{*}, Farhad Shamloo^۱, Hassan Jahani Hashemi^۲,
Farhad Khabbaz^۳, Safar-ali Alizadeh^۴

Abstract

Objectives: With reference to the hypothesis of association between central nervous system infections and schizophrenia, in this study the relationship between Toxoplasma gondii infections and schizophrenia was studied. **Method:** In this case-control study, the serums of 104 inpatient schizophrenic patients admitted to 22 Bahman Hospital in Qazvin, Iran and 114 matched control subjects were examined. IgG and IgM specific antibodies to Toxoplasma gondii were detected using enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). Data were analyzed using χ^2 test, t-test and Fisher exact test. **Results:** 55.3% of the cases and 50.9% of the controls were seropositive for IgG specific antibodies to Toxoplasma gondii; and the differences were not statistically significant. The proportion of seropositive subjects was significantly lower in the first-episode patients (33.3%) than those in the next episodes (59.8%) ($P<0.05$). Moreover, 14.6% of the cases and 20% of the controls were seropositive for IgM specific antibodies to Toxoplasma gondii. However, the differences were not statistically significant. **Conclusion:** An epidemiological association between Toxoplasma gondii infections and schizophrenia was not observed.

Key words: *Toxoplasma gondii; toxoplasmosis; schizophrenia; ELISA*

[Received: 2 December 2007; Accepted: 23 June 2008]

چکیده

هدف: با توجه به فرضیه رابطه میان عفونت‌های مزمن دستگاه عصبی مرکزی و اختلال‌های روان‌پردازی، در این پژوهش رابطه ابتلاء توکسoplasma گوندی و اسکیزوفرنیا بررسی شد. **روش:** در این بررسی در مورد-شامدی، سرم‌های ۱۰۴ بیمار مبتلا به اسکیزوفرنیا استری در بیمارستان ۲۲ بهمن قزوین و ۱۱۴ فرد گروه مراجعه کننده به آزمایشگاه هم‌اشاء از نظر آتشی‌بادی‌های IgG و IgM برای توکسoplasma، آزمایش شدند. برای سنجش آتشی‌بادی‌ها، آزمون ELISA به کاربرده شد. داده‌ها با آزمون χ^2 ، آزمون دقیق فیشر و آزمون آنجلیل شدند. **یافته‌ها:** ۵۵.۳٪ از مبتلایان به اسکیزوفرنیا، آزمون χ^2 به کاربرده شد. داده‌ها با آزمون χ^2 ، آزمون دقیق فیشر و آزمون آنجلیل شدند. آتشی‌بادی IgG علیه توکسoplasma بودند که از نظر آماری تفاوت معنی‌دار نبود. نسبت افراد IgG توکسoplasma مثبت در بیمارانی که در تحصیل دوره بیماری بودند (۳/۳۳) از آنها بیکاری که در دوره‌های بعدی بیماری بودند (۱/۱) به طور معنی‌دار کثیر بود ($P<0.05$). هم‌چنین، ۱۴.۶٪ از بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا و ۲۰٪ از افراد گروه دارای آتشی‌بادی IgM علیه توکسoplasma بودند که از نظر آماری تفاوت معنی‌دار نبود. **نتیجه گیری:** بین آنودگی به توکسoplasma و بروز اسکیزوفرنیا رابطه همه‌گیر شناسی دیده نشد.

کلیدواژه: توکسoplasma گوندی؛ توکسoplasmoz؛ اسکیزوفرنیا؛ الایزا

[دریافت مقاله: ۱۳۸۶/۹/۱۱؛ پذیرش مقاله: ۱۳۸۷/۴/۳]

* دکترای انگل شناسی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی قزوین، باهر، دانشکده پزشکی شهید بابایی، بخش انگل شناسی و فارج شناسی دوره‌گذار: ۱۳۸۱-۱۳۸۰ (نویسنده مسئول). E-mail: msraei@qums.ac.ir.
** متخصص روانپردازی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی قزوین؛ دکترای آمار جیانی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی قزوین؛ دانشجوی دکترای مکروب شناسی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین؛ دکترای اسکیزوفرنیا، دانشکده پزشکی قزوین.

* Corresponding author: PhD. in Parasitology, Assistant Prof. of Qazvin University of Medical Sciences, Faculty of Medicine, Shahid Beheshti Faculty of Medicine, Shahid Beheshti Boulevard, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran, IR. Fax: +98281-3324971. E-mail: msraei@qums.ac.ir. * Psychiatrist, Assistant Prof. of Qazvin University of Medical Sciences; † PhD. in Bio-statistics, Associate Prof. of Qazvin University of Medical Science; ‡ Postgraduate Student in Microbiology, Qazvin University of Medical Science.

44.350

توکسوبلاسم آلووده می‌شوند (هالونز^{۱۸}، لیمن^{۱۹} و چیو^{۲۰}). در بررسی پس از مرگ بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا (۱۹۹۶)، نیز کاهش شمار آسترتوسیت‌ها گزارش شده است (دویل^{۲۱} و دیکین^{۲۲}، ۲۰۰۲). چند داروی به کار برده شده برای درمان بیماری‌های روان‌پریشی از جمله هالوپریدول^{۲۳} می‌تواند افزایش تاکی‌زونیت‌های توکسوبلاسم را در کشت یاخته‌های فیروblast انسانی مهار کند (جونز-براندو^{۲۴}؛ توری و بولکن، ۲۰۰۳). این داروها به مانند داروهای ضد توکسوبلاسم در پیش‌گیری از تغییرات رفتاری در موش‌های رت^{۲۵} مؤثر می‌باشند (وست و همکاران، ۲۰۰۶).

در بررسی‌های همه‌گیر شناسی از الگوهای گوناگونی برای تعیین ارتباط میان توکسوپلاسمای اسکیزوفرنیا بهره گرفته شده است. در بیشتر بررسی‌ها شیوع توکسوپلاسمای در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا و گروه گواه مقایسه شده است (لویسک^{۲۶} و همکاران، ۲۰۰۴؛ یولکن و همکاران، ۲۰۰۱؛ سین کایا^{۲۷}، یازار^{۲۸}، جیکیکی^{۲۹} و ناملی^{۳۰}؛ ۲۰۰۷؛ ال-سنهن^{۳۱}، شاتات^{۳۲} و گیانی^{۳۳}؛ ۲۰۰۵؛ آلسواردو-اسکوئیول^{۳۴} و همکاران، ۲۰۰۶؛ وانگ^{۳۵} و همکاران، ۲۰۰۶؛ باخمن^{۳۶}، شرودر^{۴۷}، بوتمر^{۴۸}، توری و یولکن، ۲۰۰۵؛ آمنینجر^{۴۹} و همکاران، ۲۰۰۶؛ گو^{۵۰} و همکاران، ۲۰۰۱؛ آپاریشیو گاردیو^{۵۱} و پانیا گوا ردوندو^{۵۲}؛ ۱۹۶۸؛ کوئینیگ^{۵۳}، کسپیانو بان^{۵۴} و لی^{۵۵}، ۱۹۹۹). در بررسی‌های دیگری چنین فرض شده که در عفونت‌های دوران بارداری،

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1- psychotic | 2- Sadock |
| 3- Yolken | 4- Torrey |
| 5- Toxoplasma gondii | 6- Webster |
| 7- Lamberton | 8- Donnelly |
| 9- Torrey | 10- tissue cysts |
| 11- oocysts | 12- tachyzoites |
| 13- Montoya | 14- Remington |
| 15- Berdoy | 16- Stibbs |
| 17- Macdonald | |
| 18- indoleamin 2,3-dioxygenase | |
| 19- kynurenine | 20- Silva |
| 21- nitric oxide | 22- microglia |
| 23- Rozenfeld | 24- Martinez |
| 25- Figueiredo | 26- glial cells |
| 27- astrocytes | 28- Halonen |
| 29- Lyman | 30- Chiu |
| 31- Doyle | 32- Deakin |
| 33- haloperidol | 34- Jones-Brando |
| 35- rat | 36- Leweke |
| 37- Cetinkaya | 38- Yazar |
| 39- Gecici | 40- Namli |
| 41- El-Sahn | 42- Shatat |
| 43- Ghitany | 44- Alvarado-esquivel |
| 45- Wang | 46- Bachmann |
| 47- Sheroeder | 48- Bottmer |
| 49- Amninger | 50- Gu |
| 51- Aparicio Garrido | 52- Paniagua Redondo |
| 53- Qiuying | 54- Xiaonian |
| 55- Li | |

اسکیزوفرینیا یک اختلال روانپریشی^۱ با سبب‌شناسی ناشناخته است که با ناهنجاری‌هایی در تفکر، خلق و رفتار مشخص می‌گردد. میزان شیوع آن در جمعیت عمومی ۰/۱۵٪ است (زادوک^۲ و زادوک^۳، ۲۰۰۵). رُتیک، زمینه‌ساز اصلی ابتلاء به این بیماری است. عوامل عغونی در سبب‌شناسی اسکیزوفرینیا مطرح هستند و بیشتر بررسی‌ها بر عوامل شناخته شده‌ای متمرکز شده‌اند که امکان انتقال مادرزادی آنها وجود داشته است (بولکن^۴ و توری^۵، ۲۰۰۶). یکی از این عوامل توکسوپلاسمای گوندی^۶ است. این تک‌یاخته انتشار جهانی دارد و ۲۰-۸۰ درصد افراد در بیشتر مناطق به آن آلوده هستند (وستر^۷، لمبرتون^۸، دونلی^۹ و توری^{۱۰}، ۲۰۰۶). انسان به طور معمول با خوردن گوشت خام یا نیم‌پز دارای کیست‌های نسجی^{۱۱} یا خوردن آب، غذا و سبزیجات دارای او اوسیست‌های^{۱۲} دفع شده با مدفع گریه، آلوود می‌شود. عفونت مادرزادی با انتقال از جفت تاکی زوئیت‌های^{۱۳} توکسوپلاسمارخ می‌دهد. اشکال بدیخیم توکسوپلاسموز شامل موارد مادرزادی و اختلال اینمی است (مونتایا^{۱۴} و رمینگتون^{۱۵}، ۲۰۰۵).

فرضیه ارتباط توکسoplاسما با اسکیزوفرنیا در گذشته دورتر مورد توجه بود، اما در سال‌های اخیر بیشتر مورد بررسی قرار گرفته است. این فرضیه از آنجا سرچشمه گرفت که اسکیزوفرنیا یک بیماری روانپریشی با سیر مزمن است و توکسoplاسما نیز انگلی است که به صورت عفونت مزمن (نهفته) در بافت‌های گوناگون به ویژه مغز باقی می‌ماند. بنابراین چنین فرض شد که ممکن است این تک باخته در برخی موارد اسکیزوفرنیا نقش داشته باشد. توکسoplاسما سبب تغییرات رفتاری در موش‌ها شده (بردوی^{۱۵}، ویستر و مکدونالد^{۱۶}، ۲۰۰۰) و افزایش دوپامین در مغز موش‌های باعث نیازمندی را در پسی دارد (استیس^{۱۷}، ۱۹۸۵). دوپامین بیام‌سان عصبی اصلی در گیر در پاتوزن اسکیزوفرنیا است. هم‌چنین، آلدگی به توکسoplاسما سبب افزایش بیان اندول آمین، ۲-۳-۴ دی اکسیتاز^{۱۸} و کیتوزین^{۱۹} در مغز موش‌ها شده (سیلو^{۲۰} و همکاران، ۲۰۰۲) و باعث تغییر چشم گیر در میزان اکسید نیتریک^{۲۱} در میکروگلیا^{۲۲} و سایر باخته‌های دستگاه عصبی مرکزی می‌شود (روزنفلد^{۲۳}، مارتینز^{۲۴} و فیگویردو^{۲۵}، ۲۰۰۳). چنین تغییراتی در مغز افراد مبتلا به اسکیزوفرنیا نیز نشان داده شده است. در کشت باخته‌های عصبی، باخته‌های گلیال^{۲۶} به ویژه آستروسیت‌ها^{۲۷} به

از بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا و افراد گواه سرم تهیه شد. همه این افراد برای آزمایش‌هایی غیر از سرولوژی توکسوپلاسموز خون‌گیری شده بودند. سرم‌ها تا زمان انجام آزمایش در دمای ۲۰–۲۰ درجه سانتی گراد نگهداری شدند.

از روش ELISA^۱ برای سنجش آنتی‌بادی‌های IgG و IgM اختصاصی علیه توکسوپلاسما در سرم افراد بهره گرفته شد. سرم‌های ابابه کسارگیری کیست‌های تجاری شد. سرم‌های آزمایش شدند. نتایج آزمون‌ها به کمک دستگاه "Trinity Biotech, USA" Microplate Reader, Anthos 2020^۲ با بررسی خوانده شد و بر حسب IU/ml^۳ گزارش گردید. مقادیر پایین تر از ۱۷/۴ IU/ml^۴ منفی، بیشتر یا مساوی ۲۱/۹ IU/ml^۵ مثبت و مقادیر بین این دو، حد مرزی^۶ در نظر گرفته شدند. مقادیر حد مرزی در آنالیز آماری لحاظ نشدند. آزمون‌ها در آزمایشگاه مرکز تحقیقات علوم پایه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی–درمانی قزوین انجام شدند. از آنجا که هیچ یک از بیماران گروه گواه برای انجام

بررسی، حاضر به خون‌گیری نشدند، در همه موارد از سرم‌های باقی مانده آنها برای انجام سایر آزمایش‌ها استفاده گردید. از اطلاع‌رسانی به افراد بیمار و گواه در زمینه انجام آزمون توکسوپلاسموز پرهیز شد، زیرا آگاهی از آن‌دگی به توکسوپلاسما سبب تشویش خاطر می‌شود (بیشتر عفونت‌های توکسوپلاسما مزمن بوده و تاکنون علایم و عوارض مشخصی به این مرحله عفونت نسبت داده نشده است و به دلیل بی‌تأثیربودن داروهای موجود بر کیست‌های نسجی، اقدام درمانی هم ندارد). ولی به پزشک معالج نتایج آزمایش‌ها اطلاع داده شد.

برای تحلیل داده‌ها آزمون خسی دو، آزمون دقیق فیشر و آزمون ایکار برده شد.

آنتی‌بادی‌های علیه عوامل عفونی از راه جفت به رویان منتقل می‌شوند و این آنتی‌بادی‌ها مسئول بروز اسکیزوفرنیا در سال‌های پس از تولد می‌باشد. برای اثبات این ادعا سرم‌های ذخیره‌شده مادران در سه ماهه سوم بارداری آزمایش شدند و نشان داده شد که آنتی‌بادی‌های مادری علیه ویروس آلفا‌ولتا A (براون^۷ و همکاران، ۲۰۰۴)، ویروس هرپس سیمپلکس نوع ۲ (HSV-2)^۸ (بuka^۹ و همکاران، ۲۰۰۱) و تک‌یاخته توکسوپلاسما گوندی (براون و همکاران، ۲۰۰۵) با بروز اسکیزوفرنیا در فرزندان آنها ارتباط دارد. در الگویی دیگر، خون‌های ذخیره‌شده دوران نوزادی افرادی بررسی شد که در آغاز بلوغ اختلال‌های روان‌پریشی شدیدی نشان دادند. فراوانی نوزادانی که بعدها به اسکیزوفرنیا مبتلا شدند از نظر آنتی‌بادی‌های IgG علیه توکسوپلاسما به طور معنی‌دار از افراد کنترل بیشتر بوده، ولی از نظر آنتی‌بادی‌های IgM علیه این انگل تفاوت معنی‌دار بین دو گروه دیده نشد (مورتنسن^{۱۰} و همکاران، ۲۰۰۷).

در فراتحلیل ۴۲ بررسی انجام شده در زمینه ارتباط توکسوپلاسما با اسکیزوفرنیا نسبت بخت‌ها^{۱۱} طی پنج دهه در ۱۷ کشور دنیا در مجموع ۲/۷۳ (CI: ۲/۱۰–۳/۶۰) بود (توری، بارتکو^{۱۲}، لون^{۱۳} و یولکن، ۲۰۰۷). در برخی از این بررسی‌ها گروه گواه هم‌ناشده به کار برده شده و یا شمار افراد گواه از بیماران کمتر بوده است (بولکن و همکاران، ۲۰۰۱؛ ستین کایا و همکاران، ۲۰۰۷؛ وانگ و همکاران، ۲۰۰۶؛ توری و یولکن، ۲۰۰۳). با توجه به اهمیت رعایت این دو مورد در پژوهش‌های مورد-شاهدی، بررسی حاضر انجام شد. به این معنی که افراد گروه گواه از نظر سن، جنس، شغل، سطح تحصیل و محل سکونت (شهر/ روستا) با بیماران همتا شدند و شمار آنها از بیماران بیشتر بود.

روش

آزمودنی‌های پژوهش ۱۰۴ نفر بودند که به تشخیص پزشک متخصص اعصاب و روان بر پایه معیارهای تشخیصی DSM-IV-TR^{۱۴} (انجمن روانپریشکی آمریکا، ۲۰۰۴) به اسکیزوفرنیا مبتلا و در بخش اعصاب و روان مرکز پزشکی جامعه‌نگر قزوین بسته شده بودند.

شمار آزمودنی‌های گروه گواه ۱۱۴ نفر بود که برای انجام آزمایش‌های پیش از ازدواج و آزمایش‌های بهداشت مشاغل به آزمایشگاه مرکز بهداشت شهید بلندیان قزوین مراجعه کرده بودند. اینها از نظر سن، جنس، میزان تحصیل، شغل و محل سکونت با گروه بیمار همتا شدند.

مشخص و شش نفر از بیماران (۵/۶۳٪) مرد و ۲۸ نفر (۵/۲۶٪) زن بودند. ۲۷ نفر (۲۶٪) زنان خانه‌دار و ۳۹ نفر (۵/۲۷٪) کارگر و کشاورز بودند. ۷۰ نفر (۶۷/۳٪) ساکن شهر و ۳۴ نفر (۷/۲۲٪) ساکن روستا بودند. میزان تحصیلات

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1- Brown | 2- herpes simplex virus-type 2 |
| 3- Buka | 4- Mortensen |
| 5- odds ratio | 6- Bortko |
| 7- Lun | |
| 8- Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4th. ed.) Text Revision | |
| 9- Enzyme-Linked Immunosorbent Assay | |
| 10- international unit | 11- borderline |

جدول ۱- نتایج سنجش آنتی‌بادی‌های IgG و IgM علیه توکسoplاسما در بیماران اسکیزوفرنیا و سکرود گواه با آزمون ELISA

	جمع	IgM (+)	جمع	IgG (+)
گروه اسکیزوفرنیا	۵۷ (۷/۵۵٪)	۱۴ (۱۴/۹۷٪)	*۱۰۳	۱۰۳ (۱۰۳/۹۷٪)
گروه گواه	۵۸ (۷/۵۰٪)	۲۲ (۷/۱۱٪)	۱۱۴	۱۱۴ (۷/۱۱٪)

* نتیجه آزمون یک بیمار در حد مرزی بود و مورد محاسبه قرار نگرفت؛ ** نتیجه آزمون هفت بیمار و چهار فرد گواه در حد مرزی بود و مورد محاسبه قرار نگرفت.

نیود (جدول ۱). نتایج آزمون هفت بیمار و چهار فرد گواه در حد مرزی بود.

بحث

در این بررسی شیوع توکسoplاسما در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا و افراد گواه تفاوت معنی دار نداشت، حال آن که در بیشتر گزارش‌ها شیوع آن در مبتلايان به اسکیزوفرنیا به طور معنی داری پیشتر از افراد گواه بوده (لویک و همکاران، ۲۰۰۴؛ یولکن و همکاران، ۲۰۰۱؛ ستین کابا و همکاران، ۲۰۰۷؛ ال-سهن و همکاران، ۲۰۰۵؛ آلواردو-اسکونیول و همکاران، ۲۰۰۶؛ وانگ و همکاران، ۲۰۱۶؛ آمنیجر و همکاران، ۲۰۰۶؛ گو و همکاران، ۲۰۰۱) و در شمار کمی از آنها تفاوت معنی دار دیده نشده است (آپاریشیو گاردو و پانیا گو آردوندو، ۱۹۶۸؛ کوئینگ و همکاران، ۱۹۹۹). به نظر می‌رسد، این تفاوت‌ها تا اندازه‌ای به تفاوت شیوه گزینش گروه گواه در پژوهش‌های گوناگون مربوط به توکسoplاسما بوده است.

همتابودن افراد گواه با بیماران از نظر متغیرهای جمعیت‌شناختی بمویژه سن، وضعیت اجتماعی - اقتصادی و مکان جغرافیایی که در آن زندگی می‌کنند، بسیار مهم و تعیین‌کننده است. این مهم در بررسی حاضر و پیشتر بررسی‌های انجام شده در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. از سیزده بررسی مربوط به سال‌های پیش از ۱۹۸۰، در ده بررسی، جمعیت عادی، در یک بررسی، بیماران با اختلال‌های عصب‌شناختی، در یک بررسی، کارمندان بیمارستان و در یک بررسی زنان تحت عمل جراحی به عنوان گروه گواه در بررسی وارد شده‌اند. هم‌چنین در هشت بررسی، شیوع توکسoplاسما در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا به طور معنی داری بیشتر از گروه گواه بوده است (توری و

۷۶ نفر (۷/۷۳٪) پایین‌تر از دیبرستان بود. فراوانی هذیان ۸۸ نفر (۸۴/۶٪)، توهمند ۷۹ نفر (۷/۷۶٪)، سخن‌گفتن نابسامان ۲۴ نفر (۷/۲۲٪)، رفتار نابسامان ۶۳ نفر (۶/۶۰٪)، اختلال عملکرد ۸۴ نفر (۸/۸٪) و علایم منفی ^۱ ۴۲ نفر (۴/۴۰٪) بود. هیجده نفر (۷/۱۷٪) از بیماران در دوره نخست و ۸۳ نفر (۷/۷۹٪) در دوره‌های بعدی بیماری بودند. برای سه بیمار دوره بیماری تعیین نشده بود. ۸۴ نفر (۸/۸۰٪) آزمودنی‌ها پارانویید، ۸ نفر (۷/۷٪) کاتاتونیک، ۸ نفر (۷/۷۷٪) آشفته و ۲ نفر (۱/۹٪) باقیمانده بودند. برای دو بیمار، نوع بیماری اسکیزوفرنیا تعیین نشده بود. سن بیماران از ۱۶ سال تا ۷۳ سال بود. میانگین سنی آنها $۴۵/۳۶ \pm ۱۲/۶۵$ سال بود.

پنجاه و هفت نفر (۷/۵۵٪) از ۱۰۳ بیمار مبتلا به اسکیزوفرنیا (یک نفر به دلیل مرزی بودن نتیجه آزمون، در محاسبه وارد نشد) و ۵۸ نفر (۷/۵۰٪) از ۱۱۴ فرد گواه از نظر آنتی‌بادی‌های IgG علیه توکسoplاسما مثبت بودند، ولی تفاوت معنی دار نبود (جدول ۱).

نسبت افراد دارای آنتی‌بادی‌های IgG علیه توکسoplاسما در بیمارانی که در دوره‌های بعدی بیماری بودند (۷/۵۹٪) از بیمارانی که در دوره نخست بودند (۷/۳۳٪)، به طور معنی دار بیشتر بود ($p < 0/05$). میانگین سنی بیماران در آنها به ترتیب $۳۷/۶۹ \pm ۱۲/۳۸$ و $۲۵/۴ \pm ۶/۲۲$ سال بود که تفاوت معنی دار بود ($p < 0/001$). نسبت افراد دارای آنتی‌بادی‌های IgG علیه توکسoplاسما در بیماران آشفته و پارانویید از افراد کاتاتونیک بیشتر بود ولی تفاوت معنی دار نبود. هم‌چنین، نسبت افراد دارای آنتی‌بادی‌های IgG اختصاصی علیه توکسoplاسما در بیماران ساکن روستا (۷/۵۷٪) از بیماران ساکن شهر (۷/۵۴٪) بیشتر بود ولی تفاوت معنی دار نبود.

از نظر آنتی‌بادی‌های IgM اختصاصی علیه توکسoplاسما، ۱۴ نفر (۷/۱۴٪) از ۹۷ بیمار مبتلا به اسکیزوفرنیا و ۲۲ نفر (۲/۲۰٪) از ۱۱۰ فرد کنترل، مثبت بودند، ولی تفاوت معنی دار

میزان شیوع اسکیزوفرنیا در جمعیت عادی نزدیک به ۱/۵ درصد است (سادوک و سادوک، ۲۰۰۵). با براین، با در نظر داشتن نقش قوی تر ژنتیک در سبب‌شناسی این بیماری و نقش احتمالی برخی از عوامل عفونی و محیطی در سبب‌شناسی آن، شاید یافته‌های بررسی‌های همه گیرشناختی در زمینه ارتباط توکسوپلاسمای اسکیزوفرنیا گمراه کننده باشد. با توجه به این که بسیاری از افراد مبتلا به اسکیزوفرنیا از نظر آلودگی به توکسوپلاسمای منفی بوده و بسیاری از افراد آلوده به توکسوپلاسمای نیز علایمی از اسکیزوفرنیا نشان نمی‌دهند، فرضیه حساسیت ژنتیکی در این رابطه مطرح است (بولکن و توری، ۲۰۰۶).

شاید یکی دیگر از دلایل متفاوت‌بودن یافته‌های بررسی حاضر با سایر بررسی‌های انجام شده به ژنتیپ^۱ توکسوپلاسمای گوندی مربوط باشد. این نکایت دارای ژنتیپ‌هایی است که از نظر ویرولانس متفاوتند (دردی، ۲۰۰۴) و ممکن است انتشار جغرافیایی ژنتیپ‌های توکسوپلاسمای گوندی متفاوت باشد.

با آن که در بررسی حاضر شیوع توکسوپلاسمای در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا افزایش معنی دار نسبت به گروه گواه نداشت، اما به معنی رد فرضیه ارتباط سببی بین توکسوپلاسمای اسکیزوفرنیا نیست، بلکه گویای آن است که برای اثبات این نظریه به بررسی‌های بیشتر با بهره گیری از روش‌های مطمئن‌تر نیاز است.

در سایر بررسی‌ها تشخیص بالینی اسکیزوفرنیا در هر بیمار توسط تیمی از روانپزشکان انجام شده است، ولی در بررسی حاضر این امر میسر نبود که از محدودیت‌های این پژوهش به شمار می‌رود. پیشنهاد می‌شود، بررسی گسترده‌تر با آزمودنی‌های بیشتری در این زمینه انجام شود، و در آن گروهی از متخصصان انگل‌شناسی و روانپزشکی همکاری داشته باشد. هم‌چنین پیشنهاد می‌شود، در بررسی جداگانه‌ای میزان شیوع توکسوپلاسمای در دو منطقه کشور با بیشترین و کمترین میزان شیوع اسکیزوفرنیا بررسی و مقایسه شود.

سپاسگزاری

این پژوهش با حمایت مالی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در مرکز توسعه تحقیقات علوم پایه دانشکده پزشکی قزوین انجام شد. بدین‌وسیله از همه همکاران بهویژه خانم دکتر معصومه اصلانی مهر، رئیس مرکز تحقیقات علوم پایه، آقای دکتر غلامرضا درگاهی، رئیس آزمایشگاه

بولکن، ۲۰۰۳)، در بررسی‌هایی که پس از سال ۱۹۹۸ انجام شده، بیشتر از گروه گواه هم‌تا بهره گرفته شده است. در بررسی گو و همکاران (۲۰۰۱)، گروه گواه از نظر سن، جنس و محل تولد با بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا هم‌تشاده بودند و توکسوپلاسمای در گروه مورد به طور معنی دار بیشتر بود. در بررسی‌های بالکن و همکاران (۲۰۰۱) و لویک و همکاران (۲۰۰۴)، گروه گواه از نظر سن، جنس و وضعیت اجتماعی-اقتصادی با بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا هم‌تا بودند و توکسوپلاسمای در بیماران افزایش معنی دار داشت. در بیشتر گزارش‌های منتشر شده، توکسوپلاسمای در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا به طور معنی دار بیشتر از گروه شاهد بوده است.

با توجه به ماهیت بیماری‌های روانی، داوری در زمینه ارتباط همه گیرشناختی اسکیزوفرنیا با توکسوپلاسمای ملاحظاتی دارد که مهم‌ترین آن امکان آلودگی به توکسوپلاسمای پس از آغاز بیماری است. اسکیزوفرنیا یک بیماری با سیر مزمن است و پس از سپری شدن یک دوره زمانی به تشخیص قطعی می‌انجامد. ممکن است با آغاز بیماری عادات‌های بهداشتی بیمار تغییر نموده و فرد بیشتر در معرض ابتلاء عفونت‌ها از جمله توکسوپلاسمای قرار گیرد. در برخی پژوهش‌ها برای کاهش تأثیر این عامل، بیماران در دوره نخست بیماری بررسی شده‌اند (لویک و همکاران، ۲۰۰۴؛ بولکن و همکاران، ۲۰۰۱؛ گو و همکاران، ۲۰۰۱؛ باخمن و همکاران، ۲۰۰۵).

در بررسی حاضر نسبت افراد دارای آنتی‌بادی‌های IgG اختصاصی علیه توکسوپلاسمای در بیمارانی که در دوره‌های بعدی بیماری بودند از بیمارانی که در نخستین دوره بیماری بودند به طور معنی دار بیشتر بود. این یافته می‌تواند دو علت احتمالی داشته باشد. نخست تفاوت سنی بیماران در دو گروه است، زیرا سن بر شیوع توکسوپلاسمای تأثیر دارد و با افزایش آن، میزان شیوع زیادتر می‌شود. میانگین سنی گروه اول به طور معنی دار از گروه دوم بیشتر بود. علت دیگر، طولانی تر بودن دوره بیماری در بیمارانی است که در دوره‌های بعدی بیماری هستند. شاید این بیماران بیشتر در معرض تماس با منابع آلوده کننده باشند.

به نظر می‌رسد، یکی دیگر از علت‌های احتمالی تفاوت یافته‌های بررسی‌های انجام شده در زمینه همه گیرشناختی توکسوپلاسمای اسکیزوفرنیا تفاوت در میزان شیوع این دو در جامعه است. ۲۰ تا ۸۰ درصد افراد در بیشتر نقاط به توکسوپلاسمای آلوده هستند (وبستر و همکاران، ۲۰۰۶) ولی

مرکز بهداشت شهید باندیان قزوین و خانم هاجر صادقی
کارشناس مرکز تحقیقات علوم پایه سپاسگزاری می‌شود.

منابع

- Darde, M. I. (2004). Genetic analysis of the diversity in *Toxoplasma gondii*. *Annual Ist Super Sanita*, 40, 57-63.
- Doyle, C., & Deakin, J. F. W. (2002). Fewer astrocytes in frontal cortex in schizophrenia, depression and bipolar disorder. *Schizophrenia Research*, 53, 106.
- El-Sahn, A. A., Shatat, H. Z., & Ghitany, E. M. (2005). Seropositivity of toxoplasmosis in patients with schizophrenia. *Journal of Egyptian Public Health Association*, 80, 209-224.
- Gu, H., Yolken, R. H., Phillips, M., Yang, F., Bilder, R. M., & Gilmore, J. H. (2001). Evidence of *Toxoplasma gondii* infection in recent-onset schizophrenia. *Schizophrenia Research*, 49, 53.
- Halonen, S. K., Lyman, W. D., & Chiu, F. C. (1996). Growth and development of *Toxoplasma gondii* in human neurons and astrocytes. *Journal of Neuropathology and Experimental Neurology*, 55, 1150-1156.
- Jones-Brando, L., Torrey, E. F., & Yolken, R. (2003). Drugs used in the treatment of schizophrenia and bipolar disorder inhibit the replication of *Toxoplasma gondii*. *Schizophrenia Research*, 62, 237-244.
- Leweke, F. M., Gerth, C. W., Koethe, D., Klosterkötter, J., Ruslanova, I., Krivogorsky, B., Torrey, E. F., & Yolken, R. H. (2004). Antibodies to infectious agents in individuals with recent onset schizophrenia. *European Archives of Psychiatry Clinical Neuroscience*, 254, 4-8.
- Montoya, J. C., & Remington, J. S. (2005). *Toxoplasma gondii*. In G. L. Mandell, J. E. Bennett, & R. Dolin (Eds.), *Mandell, Douglas and Bennett's principles and practice of infectious diseases*. Philadelphia: Churchill Livingston.
- Mortensen, P. B., Nørgaard-Pedersen, B., Waltoft, B. L., Sørensen, T. L., Hougaard, D., Torrey, E. F., & Yolken, R. H. (2007). *Toxoplasma gondii* as a risk factor for early-onset schizophrenia: Analysis of filter paper blood samples obtained at birth. *Biological Psychiatry*, 61, 688-693.
- American Psychiatric Association (2004). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (4th. ed., text revision). Washington, DC: APA.
- Alvarado-Esquivel, C., Alanis-Quiñones, O. P., Arreola-Valenzuela, M. A., Rodriguez-Briones, A., Piedra-Nevarez, L. J., Duran-Morales, E., Estrada-Martinez, S., Martinez-Garcia, S. A., & Liesenfeld, O. (2006). Seroepidemiology of *Toxoplasma gondii* infection in psychiatric inpatients in a northern Mexican city. *BMC Infectious Diseases*, 19, 178.
- Amninger, G. P., McGorry, P. D., Berger, G. E., Wade, D., Yung, A. R., Phillips, L. J., Harrigan, S. M., Francey, S. M., & Yolken, R. H. (2006). Antibodies to infectious agents in individuals at ultra-high risk for psychosis. *Biological Psychiatry*, 61, 1215-1217.
- Aparicio Garrido, J., & Paniagua Redondo, V. (1968). Toxoplasmosis y enfermedades mentales. *Archives de Neurobiología*, 31, 161-172.
- Bachmann, S., Schroeder, J., Bottmer, C., Torrey, E. F., & Yolken, R. H. (2005). Psychopathology in first-episode schizophrenia and antibodies to *Toxoplasma gondii*. *Psychopathology*, 38, 87-90.
- Berdoy, M., Webster, J. P., & Macdonald, D. W. (2000). Fatal attraction in rats infected with *Toxoplasma gondii*. *Biological Sciences*, 267, 1591-1594.
- Brown, A. S., Schaefer, C. A., Quesenberry, C. P., Liu, L., Babulas, V. P., & Susser, E. S. (2005). Maternal exposure to toxoplasmosis and risk of schizophrenia in adult offspring. *American Journal of Psychiatry*, 162, 767-773.
- Brown, A. S., Begg, M. D., Gravenstein, S., Schaefer, C. A., Wyatt, R. J., Bresnahan, M., Babulas, V. P., & Susser, E. S. (2004). Serologic evidence of prenatal influenza in the etiology of schizophrenia. *Archives of General Psychiatry*, 61, 774-780.
- Buka, S. L., Tsuang, M. T., Torrey, E. F., Klebanoff, M. A., Bernstein, D., & Yolken, R. H. (2001). Maternal infections and subsequent psychosis among offspring. *Archives of General Psychiatry*, 58, 1032-1037.

- Qiuying, L., Xiaonian, L., & Li, L. (1999). The control study of schizophrenia and affective disorders and toxoplasma infections. *Acta Academiae Medicinae Hubei*, 20, 223-225.
- Rozenfeld, C., Martinez, R., & Figuciredo, R. T. (2003). Soluble factors released by toxoplasma gondii-infected astrocytes down-modulate nitric oxide production by gamma interferon-activated microglia and prevent neuronal degeneration. *Infection and Immunity*, 71, 2047-2057.
- Sadock, B. J., & Sadock, V. A. (2005). *Kaplan & Sadock's pocket handbook of clinical psychiatry*. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
- Silva, N. M., Rodrigues, C. V., Santoro, M. M., Reis, L. F., Alvarez-Leite, J. I., & Gazzinelli, R. T. (2002). Expression of indoleamine 2, 3-dioxygenase, tryptophan degradation, and kynurenine formation during in vivo infection with toxoplasma gondii: Induction by endogenous gamma interferon and requirement of interferon regulatory factor 1. *Infection and Immunity*, 70, 859-868.
- Stibbs, H. H. (1985). Changes in brain concentrations of catecholamines and indoleamines in toxoplasma gondii infected mice. *Annals of Tropical Medicine and Parasitology*, 79, 153-157.
- Torrey, E. F., Bartko, J. J., Lun, Z. R., & Yolken, R. H. (2007). Antibodies to toxoplasma gondii in patients with schizophrenia: A meta-analysis. *Schizophrenia Bulletin*, 33, 729-736.
- Torry, E. F., & Yolken, R. H. (2003). Toxoplasma gondii and schizophrenia. *Emerging Infectious Diseases*, 9, 1375-1380.
- Wang, H. L., Wang, G. H., Li, Q. Y., Shu, C., Jiang, M. S., & Guo, Y. (2006). Prevalence of toxoplasma infection in first-episode schizophrenia and comparison between toxoplasma-seropositive and toxoplasma-seronegative schizophrenia. *Acta Psychiatrica Scandinavica*, 114, 40-48.
- Webster, J. P., Lamberton, P. H., Donnelly, C. A., & Torrey, E. F. (2006). Parasites as causative of human affective disorder? The impact of anti-psychotic, mood-stabilizer and anti-parasite medication on Toxoplasma gondii's ability to alter host behaviour. *Biological Sciences*, 273, 1023-1030.
- Yolken, R. H., Bachmann, S., Roushanova, I., Iillehoj, E., Ford, G., Torrey, E. F., & Schroeder, J. (2001). Antibodies to toxoplasma gondii in individuals with first-episode schizophrenia. *Clinical Infectious Diseases*, 32, 842-844.
- Yolken, R. H., & Torrey, E. F. (2006). Infectious agents and gene-environmental interactions in the etiopathogenesis of schizophrenia. *Clinical Neuroscience Research*, 6, 97-109.