

سطح پلاسمایی لیپوپروتئین (a) در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی

شراره حمیدی فرد^۱، دکتر علی فخاری^۱، دکتر سلطانعلی محبوب^۲، دکتر بهرام پورقاسم گرجاری^۳

Plasma Levels of Lipoprotein (a) in Patients with Major Depressive Disorder

Sharareh Hamidifard¹, Ali Fakhari¹, Soltanali Mahboob², Bahram Pourghassem Gargari^{3*}

Abstract

Objectives: Raised lipoprotein (a) concentration is known as a probable cause of development of cardiovascular disease. Therefore, the present study was carried out to measure lipoprotein (a) in individuals with major depressive disorder and to compare them with normal individuals.

Method: In this case-control study, plasma levels of lipoprotein (a) and the lipid profile was measured in 35 patients with major depressive disorder and 35 normal individuals (control group) using standard methods. Data were analyzed using chi-square, Pearson's correlation coefficient and student's t-test. **Results:** Total Cholesterol and LDL-c was significantly lower in patients (144.65 ± 3.74 vs. 186.14 ± 5.82 , and 72.78 ± 3.00 vs. 110.21 ± 5.27 mg/dl, $p=0.001$). The mean of lipoprotein (a) in patients with major depressive disorder was 74% higher than healthy controls (34.94 ± 3.04 vs. 20.08 ± 1.90 (mg/dl), $p=0.001$). **Conclusion:** The increase of lipoprotein (a) may contribute to higher risk of cardiovascular disease in patients with major depressive disorder.

Key words: major depression; lipoprotein (a); cardiovascular disease

[Received: 9 October 2007; Accepted: 7 April 2008]

چکیده

هدف: از آن جا که افزایش غلظت لیپوپروتئین (a) به عنوان یک عامل احتمالی پیشرفت بیماری های قلبی - عروقی مطرح شده است، برای تعیین میزان لیپوپروتئین (a) و چربی های خون در افراد مبتلا به اختلال افسردگی اساسی مقایسه آنها با افراد سالم این بررسی انجام شد.

دوش: این بررسی از نوع مورد - شاهدی است. سطح لیپوپروتئین (a) و چربی های خون در ۳۵ بیمار مبتلا به اختلال افسردگی اساسی و ۳۵ فرد

سالم با روش های استاندارد اندازه گیری شدند. داده های بدینه

آزمون های آماری خود را، ضریب همبستگی پرسون و آزمون اتحلیل

گردیدند. **یافته ها:** کلسترول تام و LDL (لیپوپروتئین با چگالی پایین)

به طور معنی داری در بیماران پایین تر بود (144.65 ± 3.74 در برابر 186.14 ± 5.82 و 72.78 ± 3.00 در برابر 110.21 ± 5.27 mg/dl, $p=0.001$). میانگین Lp (a) خون در بیماران 34.94 ± 3.04 میلیگلی (mg/dl) بود و میانگین افراد سالم بود 20.08 ± 1.90 mg/dl ($p=0.001$).

نتیجه گیری: افزایش Lp(a) ممکن است عاملی برای افزایش خطر بروز بیماری های قلبی - عروقی در بیماران مبتلا به افسردگی اساسی باشد.

کلیدواژه: افسردگی اساسی؛ لیپوپروتئین (a)؛ بیماری های قلبی -

عروقی

[دریافت مقاله: ۱۳۸۶/۷/۱۷، پذیرش مقاله: ۱۳۸۷/۱/۱۹]

^۱ دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه، دانشکده بهداشت و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تبریز؛ ^۲ روانپرداز، استاد بار دانشگاه علوم پزشکی تبریز؛ ^۳ دکترای علوم تغذیه و بیوشیس، استاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز؛ ^۴ دکترای علوم تغذیه، استاد بار دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده بهداشت و تغذیه، گروه تغذیه و بیوشیس، کد پستی ۱۴۶۶۶۱۷۱۱-۳۳۴، دورگاه: ۶۳۴، تبریز، (نوبنده منزل).

E-mail : bahrampg@yahoo.com

* Corresponding author: PhD. in Nutritional Sciences, Assistant Prof. of Nutritional Research Center, Faculty of Health and Nutrition, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran, IR. Fax: +98411-3340634. E-mail: bahrampg@yahoo.com; ^a Master's degree student in Nutrition, Faculty of Health and Nutrition, Tabriz University of Medical Sciences; ^b Psychiatrist, Assistant Prof. of Tabriz University of Medical Sciences; ^c PhD. in Nutrition and Biochemistry, Professor of Tabriz University of Medical Sciences.

مقدمه

پالوماسکی^{۴۴}، کلولند^{۴۵} و هادو^{۴۶}؛ ۱۹۹۸؛ دانش^{۴۷}، کلینز^{۴۸} و پتو^{۴۹}، ۲۰۰۰؛ انسس^{۵۰} و سنتیلکامور^{۵۱}، ۲۰۰۲؛ گامبهیر^{۵۲}، کار^{۵۳}، گامبهیر و پرابهو^{۵۴}، ۲۰۰۰؛ گیتانجالی^{۵۵}، جوزه^{۵۶} و کاناگاساباپاتی^{۵۷}، ۲۰۰۲؛ کلر^{۵۸}، ۲۰۰۷؛ لوس^{۵۹} و همکاران، ۲۰۰۲؛ موہان^{۶۰} و همکاران، ۱۹۹۸). بالایودن میزان لیپوپروتئین (a) سه تا ۱۰ برابر احتمال خطر وجود CHD را بسته به بودن یا نبودن سایر عوامل خطر افزایش می‌دهد (هاپکیتر^{۶۱} و همکاران، ۱۹۹۷). همچنین میزان سرمی (لیپوپروتئین (a)) بالاتر از ۲۵ mg/dl، یک عامل مستقل برای بروز آتروواسکلروز بوده است (اماونث^{۶۲} و همکاران، ۲۰۰۶). بیماری‌های کرونری قلب در میان بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی رایج است (بونت و همکاران، ۲۰۰۵؛ موریست^{۶۳}، ۲۰۰۰؛ اسچیتز و همکاران، ۲۰۰۴)، اما دلیل اصلی آن تا کنون روشن نشده است. سطوح سرمی لیپوپروتئین (a) تا به امروز در چند بررسی انگشت‌شمار در بیماران مبتلا به MDD گزارش شده است (اماونث و همکاران، ۲۰۰۶). از این روبرای روشن شدن بهتر این موضوع که آبا سطوح لیپوپروتئین (a) در بیماران مبتلا به MDD با افراد سالم تفاوت دارد یا خیر، این بررسی انجام شد.

اختلال افسردگی اساسی^۱ (MDD) و بیماری‌های قلبی-عروقی دو دلیل عمده ناتوانی در سرتاسر جهان هستند (موری^۲ و لوپز^۳، ۱۹۹۷). این دو بیماری از پنج بیماری اصلی میزان در سالمندان به شمار می‌روند (شربرون^۴، ولز^۵ و استرم^۶، ۱۹۹۷؛ وولی^۷، ۲۰۰۶). خطر گسترش بیماری‌های قلبی-عروقی و افزایش مرگ و میر در بیماران مبتلا به افسردگی دو تا چهار برابر بیشتر از افراد عادی است (آریو^۸ و همکاران، ۲۰۰۰؛ جینت^۹، ولن^{۱۰} و اکنور^{۱۱}؛ لسپرنس^{۱۲}، فراشر-اسیت^{۱۳}، تلاجیک^{۱۴} و بوراسا^{۱۵}، ۲۰۰۲). از ۲۰ سال پیش در زمینه ارتباط میان افسردگی و بیماری کرونری قلب^{۱۶} (CHD) بررسی‌های انجام شده است (فراشر-اسیت و لسپرنس، ۲۰۰۶).

سازوکارهای زیست‌شناختی و رفتاری چندی برای تبیین ارتباط میان CHD و افسردگی پیشنهاد شده‌اند (جوینت، ولن و اکنور، ۲۰۰۳). از جمله اینها می‌توان به زمینه زنگیکی (مک‌کافری^{۱۷} و همکاران، ۲۰۰۶)، افزایش فعالیت محور هیپوتالاموس-هیپوفیز (أت^{۱۸} و همکاران، ۲۰۰۴)، افزایش فعالیت پلاکت‌ها (سربروای^{۱۹} و همکاران، ۲۰۰۳)، افزایش میزان کاتکولامین‌ها (أت، نیلان^{۲۰}، پیپکین^{۲۱}، برونز^{۲۲} و وولی، ۲۰۰۵)، افزایش سروتونین خون (اسچیتز^{۲۳} و همکاران، ۲۰۰۴)، فرآیندهای التهابی (امپان^{۲۴} و همکاران، ۲۰۰۵)، کاهش میزان اسیدهای چرب امگا^{۲۵} (فراشر-اسیت، لسپرنس و جولین^{۲۶}، ۲۰۰۴)، مسحومیت با داروهای ضد افسردگی حلقوی (کوهن^{۲۷}، گیسنون^{۲۸} و آلدمن^{۲۹}، ۲۰۰۰)، کم تحرکی (روو^{۳۰}، رامسلد^{۳۱}، پیپکین و وولی، ۲۰۰۴)، قطع درمان (جهی^{۳۲}، هاس^{۳۳}، پیپکین و وولی، ۲۰۰۵)، حمایت اجتماعی ضعیف (بارفووت^{۳۴} و همکاران، ۲۰۰۳) و سبک زندگی ناسالم (بونت^{۳۵} و همکاران، ۲۰۰۵) اشاره کرد.

از زمان شناخت لیپوپروتئین (a)^{۳۶} در پلاسمای انسان (برگ^{۳۷}، ۱۹۶۳) بررسی بر روی چگونگی، ساخت و ساز و نقش آتروزی آن تا کنون ادامه یافته است. لیپوپروتئین (a) یک ملکول هتروژن است و بخش چربی آن به LDL^{۳۸} شبیه است و شامل مرکز غنی از استر کلسترول می‌باشد (مارکوینا^{۳۹}، کوشینسکی^{۴۰}، آلبس^{۴۱} و اسکارلاتوس^{۴۲}، ۲۰۰۳). در بسیاری از بررسی‌ها افزایش میزان سرمی لیپوپروتئین (a) با بیماری‌های قلبی-عروقی ارتباط داشته است (کرایگ^{۴۳}، نوو^{۴۴}،

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 1- major depressive disorder | 2- Murray |
| 3- Lopez | 4- Sherbourne |
| 5- Wells | 6- Sturm |
| 7- Whooley | 8- Ariyo |
| 9- Joyst | 10- Whellan |
| 11- O'Connor | 12- Esperance |
| 13- Frasure-Smith | 14- Talajic |
| 15- Bourassa | 16- coronary heart disease |
| 17- McCaffery | 18- Otte |
| 19- Serebruany | 20- Neylan |
| 21- Pipkin | 22- Browner |
| 23- Schins | 24- Empana |
| 25- Julien | 26- Cohen |
| 27- Gibson | 28- Alderman |
| 29- Ruo | 30- Rumsfeld |
| 31- Gehi | 32- Haas |
| 33- Barefoot | 34- Bonnet |
| 35- lipoprotein (a) | 36- Berg |
| 37- low-density lipoprotein | 38- Marcovina |
| 39- Koschinsky | 40- Albers |
| 41- Skarlatos | 42- Craig |
| 43- Neveux | 44- Palomaki |
| 45- Cleveland | 46- Haddow |
| 47- Danesh | 48- Collins |
| 49- Peto | 50- Enas |
| 51- Senthilkumar | 52- Gambhir |
| 53- Kaur | 54- Prabhu |
| 55- Geethanjal | 56- Jose |
| 57- Kanagasabapathy | 58- Keller |
| 59- Luc | 60- Mohan |
| 61- Hopkins | 62- Emanuele |
| 63- Morrisett | |

آنژیماتیک و رنگ‌سنجی و به کمک کیت شرکت پارس آزمون و با دستگاه اتو آنالیزور 300 Alcyon اندازه گیری شدند و LDL-C^{۱۴} با بهره گیری از فرمول فایروالد محاسبه گردید (فایروالد^{۱۵}، لوی^{۱۶}، فردیکسون^{۱۷}، ۱۹۷۲). برای ارزیابی نمایه توده بدن^{۱۸} (BMI)، وزن و قد افراد به کمک ترازوی باسکولی با دقیق ۰/۵ کیلو گرم متصل به قدسنج مدرج بادقت ۱/۰ سانتی‌متر اندازه گیری شد. این اندازه گیری‌ها با کمترین لباس و بدون کفش انجام شد و BMI به کمک رابطه زیر محاسبه گردید: $\text{BMI} = \frac{\text{وزن}}{\text{ قد}} (\text{kg}/\text{m}^2)$.

لیپوپروتئین(a) با روش ایمونوتوربیدیمتریک^{۱۹} به وسیله کیت راندوکس^{۲۰} ساخت انگلستان با دستگاه اتو آنالیزور 300 Alcyon اندازه گیری گردید. این روش از روش فوتومتریک اندازه گیری واکنش آتشی ژن-آتشی بادی بین آتشی بادی لیپوپروتئین(a) و لیپوپروتئین(a) موجود در نمونه بهره گیرد (مولیناری^{۲۱}، آپیچلر^{۲۲}، گریلهوفر^{۲۳} و کاستر^{۲۴}، ۱۹۹۵).

داده‌ها به کمک آزمون خودکار ضربی همبستگی پرسون و آزمون تحلیل شدند.

یافته‌ها

میانگین سنی آزمودنی‌های گروه افسرده و گروه سالم به ترتیب ۳۵/۲ و ۳۳/۷ بود. در گروه افسرده اساسی ۱۷/۱٪ و در گروه گواه سالم ۱۷/۱٪ مرد بودند.

تفاوت در شاخص‌های خونی مربوط به گلوبول‌های قرمز و سفید و تفاوت دو گروه در کراتینین سرم، گلوکز پلاسما، سطح HDL و تری‌گلیسریدها معنی دار نبود. اما کلسترول تام و LDL در بیماران به صورت معنی داری کمتر از گروه گواه بود (۰/۰۰۱ < p) (شکل ۱). همچنین سطح لیپوپروتئین(a) در بیماران افسرده به طور معنی داری بیشتر از گروه گواه بود (جدول ۱).

1- Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4th. ed.)	2- Beck Depression Inventory
3- Ward	4- Mendelson
5- Mock	6- Erbaugh
7- Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia	
8- Endicott	9- Spitzer
10- mean cell volume	11- mean cell hemoglobin
12- mean cell hemoglobin concentration	
13- high-density lipoprotein-cholesterol	
14- low-density lipoprotein	
15- Friedewald	16- Levy
17- Fredrickson	18- body mass index
19- Immunoturbidimetric	20- Randox
21- Molinari	22- Apichler
23- Grillhofer	24- Kostner

روش

این بررسی از نوع مورد-شاهدی و مقطعی بود. در این پژوهش ۷۰ نفر در دو گروه (۳۵ بیمار مبتلا به اختلال افسردگی اساسی و ۳۵ فرد سالم) بررسی شدند. بیماران افسرده را روپریشک می‌باشد (روپریشک آمریکا، ۱۹۹۴) از میان بیماران مراجعه کننده به بیمارستان اسدآبادی تبریز انتخاب نمود. همه بیماران با پرسشنامه افسردگی بک^۱ (BDI) (بک، وارد، مندلسون، موک^۲ و ارباگ^۳، ۱۹۶۱) و مصاحبه ساختاری روپریشکی بر پایه SADS^۴ (اندیکات^۵ و اسپیتر^۶، ۱۹۷۸) توسط متخصص روپریشکی ارزیابی شدند. سن افراد مراجعه کننده بین ۱۸ تا ۶۵ سال بود. معیارهای خروج از پژوهش شامل داشتن سن کمتر از ۱۸ و بالاتر از ۶۵ سال، تاریخچه بیماری قلبی، تاریخچه درمان با داروهای کم کننده کلسترول خون، وجود اختلال‌های مربوط به غدد درون‌ریز، بیماری بدنه سخت، غیرطبیعی بودن خون، عملکرد غیرطبیعی کلیه و کبد، اختلال‌های خوردن، اختلال‌های اضطرابی، عقب ماندگی ذهنی، تاریخچه سوء‌صرف الکل و مواد مخدر یا وابستگی به آنها، درمان با داروهای روپریشکی در شش ماه گذشته و وجود هم‌زمان چند اختلال روانی، بود. در گروه گواه ۳۵ فرد سالم از کارمندان، دانشجویان و داوطلبان در بیمارستان و دانشگاه جای داده شدند. روش نمونه گیری به صورت تصادفی بود. معیارهای خروج از بررسی برای افراد گروه گواه، مانند گروه بیمار بود. افزون بر آن، این گروه دارای تاریخچه بیماری روانی نبودند و از نظر سن و جنس با گروه بیمار همتاسازی شدند. هدف بررسی به طور کامل برای همه افراد توضیح داده شد و رضایت‌نامه کتبی از آنها گرفته شد.

برای تعیین وضعیت شاخص‌های بیوشیمیایی از هر بیمار ۱۰ خون در حالت ناشناخته در ساعت هشت صبح گرفته شد و پس از سانتریفیوژ، پلاسمای آنها جداسازی و در دمای ۷۰ درجه سانتیگراد تا زمان انجام آزمایش‌ها نگهداری شد. گلوبول‌های سفید و قرمز خون، هموگلوبین، هماتوکربت، حجم متوسط گلوبول قرمز (MCV)، میزان متوسط هموگلوبین گلوبول قرمز (MCH) و میانگین غلظت هموگلوبین گلوبول قرمز (MCHC) به کمک دستگاه شمارش گر مدل Cell Taca ساخت ژاپن اندازه گیری شدند. کراتینین سرم به عنوان شاخصی از ارزیابی عملکرد کلیه توسط کیت شرکت پارس آزمون آزمون اندازه گیری شد. گلوکز پلاسما، کلسترول تام، تری‌گلیسرید و HDL-C^۷ بر پایه روش


گروه معنی دار بود ($11/21 = 52\% = 11/21$, $p < 0.01$). این بررسی ارتباط معنی داری بین سن و جنس با یافته های آزمایشگاهی نشان نداد، ولی رابطه میان BMI و لیپوپروتئین (a) در افراد سالم از نظر آماری معنی دار بود ($r = 0.54$, $p < 0.01$).

در شکل ۳، شیوع لیپوپروتئین (a) بالای ۲۵ میلی گرم در دسی لیتر در دو گروه سالم و بیمار نشان داده شده است. ۴۳٪ (۱۱ نفر) بیماران و ۷۱٪ (۲۵ نفر) گروه گواه، لیپوپروتئین (a) کمتر از ۲۵ میلی گرم در دسی لیتر داشتند و از این نظر تفاوت دو

جدول ۱- ویژگی های خونی و بیوشیمیایی و سطح پلاسمایی لیپوپروتئین (a) در گروه های مورد بررسی (میانگین \pm خطای معیار)

سطح معنی داری	کنترل سالم (n=۲۵)	افسردگی اساسی (n=۲۵)	
*N.S.	۲۴/۷۷ \pm ۱/۲۲	۲۵/۸۲ \pm ۰/۷۴	نمایه نوده بدن (kg/m^2)
N.S.	۵/۷۲ \pm ۰/۲۰	۶/۰۵ \pm ۰/۲۷	گلوبول سفید خون ($10^9/\mu\text{l}$)
۰/۰۸	۴/۸۲ \pm ۰/۰۶	۵/۰۱ \pm ۰/۰۸	گلوبول قرمز خون ($10^9/\mu\text{l}$)
N.S.	۱۴/۰۵ \pm ۰/۱۸	۱۳/۸۱ \pm ۰/۲۱	همو گلوبین (g/dl)
N.S.	۴۱/۷۲ \pm ۰/۴۴	۴۰/۲۸ \pm ۰/۶۰	هماتو کریت (%)
N.S.	۸۴/۹ \pm ۱/۰۲	۸۲/۰۴ \pm ۱/۰۴	حجم متوسط گلوبول قرمز [MCV (FL)]
N.S.	۲۹/۶۹ \pm ۰/۴۷	۲۸/۳۴ \pm ۰/۵۳	مقدار متوسط همو گلوبین گلوبول قرمز (MCH) (pg)
N.S.	۳۲/۲۰ \pm ۰/۱۲	۳۲/۹۹ \pm ۰/۲۱	میانگین غلظت همو گلوبین گلوبول قرمز (MCHC) (g/dl)
N.S.	۸۸/۹۱ \pm ۲/۴۸	۹۲/۳۴ \pm ۱/۱۰	گلوبول پلاسما (mg/dl)
N.S.	۰/۸۵ \pm ۰/۰۱	۰/۸۰ \pm ۰/۰۱	کراتینین (mg/dl)
۰/۰۰۱	۱۸۶/۱۴ \pm ۵/۸۲	۱۲۴/۶۵ \pm ۳/۷۴	کلسترول تام (mg/dl)
N.S.	۱۲۰/۰۸ \pm ۱۲/۷۲	۱۲۰/۰۸ \pm ۱۶/۱۲	تری گلیسرید (mg/dl)
N.S.	۵۱/۹۱ \pm ۲/۳۶	۴۷/۷۱ \pm ۱/۵۹	HDL (mg/dl)
۰/۰۰۱	۱۱۰/۲۱ \pm ۵/۲۷	۷۲/۷۸ \pm ۳/۰۰	LDL (mg/dl)
۰/۰۰۱	۲۰/۰۸ \pm ۱/۹۰	۳۴/۹۴ \pm ۳/۰۴	لیپوپروتئین (a)

* non-significant



شکل ۳- درصد بیماران دارای لیپوپروتئین (a) در دو گروه مورد و گروه مباید

شکل ۱- باکس پلات سطح لیپوپروتئین (a) در دو گروه مورد بررسی (افسردگی اساسی و گواه)

بحث

همکاران، ۲۰۰۰؛ آناس و سنتیلکامور، ۲۰۰۲؛ گامبهیر و همکاران، ۲۰۰۰؛ گیتانجالی و همکاران، ۲۰۰۲؛ مارکوینا و همکاران، ۲۰۰۳؛ ایمهوف^{۱۴} و همکاران، ۲۰۰۳؛ کلر، ۲۰۰۷). یافته‌های این بررسی می‌توانند نشان‌دهنده نقش لیپوپروتئین (a) در ارتباط میان MDD و افزایش خطر بیماری‌های قلبی-عروقی باشد. آپوپروتئین a با باند دی‌سولفیدی، به آپوپروتئین B می‌چسبد.^{۳۴} ایزوفرم گوناگون لیپوپروتئین (a) بر پایه اندازه آپو a وجود دارد. میزان لیپوپروتئین (a) تحت تأثیر پلی‌مورفیسم آپو a می‌باشد. عوامل گوناگونی بر سطح لیپوپروتئین (a) از جمله عوامل ارشی اثرگذار هستند (آناس و همکاران، ۱۹۹۶). سازوکارهای چندی برای بیماری زایی افزایش لیپوپروتئین (a) از جمله: افزایش لخته‌زایی^{۱۵} و اختلال در تجزیه فیرین به وسیله پلاسمینوژن (گریننگر^{۱۶} و همکاران، ۱۹۹۳)، بی‌باتی پلاکی^{۱۷}، افزایش تکثیر سلولی در ماهیچه‌های صاف و جایجاپی آن (موریست، ۲۰۰۰)، اختلال در تشکیل رگ‌های جانی، افزایش اکسیداسیون و برداشت و احتباس LDL-لوگز^{۱۸} و همکاران، ۲۰۰۲) دخالت داشته‌اند.

در این پژوهش تعیین فنوتیپ لیپوپروتئین (a)، تعیین اندازه و شدت آنها و بروز علایم رگی آترواسکلروز برای نمونه با روش داپلر انجام نشد. در حال حاضر، دلایل این که چرا غلظت لیپوپروتئین (a) در بیماران MDD بالا است به صورت دقیق روشن نشده است؛ از این رو با توجه به محدودیت بررسی حاضر، انجام بررسی‌های گسترده‌تر و با حجم نمونه بیشتر پیشنهاد می‌شود.

سپاسگزاری

از مرکز تحقیقات علوم تغذیه و دانشکده بهداشت و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی تبریز بهدلیل حمایت مالی در اجرای طرح و هم‌چنین از همه کارکنان بیمارستان اسدآبادی تبریز و شرکت کنندگان در این پژوهش که در اجرای این بررسی همکاری نمودند سپاسگزاری می‌شود.

این بررسی سطح کلسترول خونی را در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی پایین تر از گروه گواه سالم نشان داد. این یافته با یافته‌های بررسی‌هایی که کلسترول پایین را بر کاهش سبالت غشاء نورونی مؤثر گزارش نموده‌اند (جو،^۱ بانگ^۲ و چن^۳، ۲۰۰۶؛ کراوس^۴، هاک^۵، شولد^۶، هیتز-سکلچ^۷ و پولماچر^۸، ۲۰۰۱) هم‌سو است. با کاهش سبالت غشاء نورونی، فعالیت سورونی ۵-هیدروکسی تربپتامین بر روی جایگاه‌های پیش‌ستاپی و پس از آن کاهش می‌یابد. کاهش فعالیت سروتونرژیک مرکزی ممکن است در ارتباط با افسردگی، و رفتارهای مربوط به خودکشی باشد (جو و همکاران، ۲۰۰۶؛ کراوس و همکاران، ۲۰۰۱).

یافته دیگر این بررسی بالاترین سطح لیپوپروتئین (a) در بیماران MDD در مقایسه با گروه سالم بود. لیپوپروتئین (a) یک لیپوپروتئین پیچیده است که از آپولیپوپروتئین ۱-۱۰۰ (که شبیه LDL و عامل خطر برای آترواسکلروزیس است) و آپولیپوپروتئین a که از نظر ساختاری همانند پلاسمینوژن بوده و بخشی از سامانه تجزیه کننده فیرین می‌باشد، تشکیل شده است (موریتا، هیمنو^۹، یاکوا^{۱۰} و یوسوی^{۱۱}، ۲۰۰۶). بررسی‌ها نشان داده‌اند که سطح بالای لیپوپروتئین (a) سرم یک عامل خطر برای بیماری رگ‌های کرونری قلب می‌باشد (جو و همکاران، ۲۰۰۶؛ پلتیر^{۱۲} و همکاران، ۲۰۰۲) و بیماران مبتلا به افسردگی اساسی یک گروه با خطر بالا برای بیماری‌های قلبی-عروقی هستند.

امانوئل و همکاران (۲۰۰۶) سطح لیپوپروتئین (a) را در چهار گروه بیماران روانی (اسکیزوفرنیا، اختلال افسردگی اساسی، اختلال‌های دوقطبی و اختلال‌های شخصیت) با گروه گواه سالم مقایسه و تفاوت معنی‌داری را در سطح لیپوپروتئین (a) در افراد مبتلا به اسکیزوفرنیا، MDD و اختلال دوقطبی در مقایسه با گروه گواه سالم گزارش نمودند.

یافته‌های بررسی حاضر هم‌سو با یافته‌های امانوئل و همکاران (۲۰۰۶) است. بررسی حاضر نشان داد که تغییرات سطح لیپوپروتئین پلاسمایی می‌تواند یکی از عوامل تبیین کننده ارتباط میان افسردگی اساسی و افزایش خطر بیماری‌های قلبی-عروقی باشد. هم‌چنین بیماران MDD دارای غلظت بالاتری از لیپوپروتئین (a) در مقایسه با گروه گواه سالم هستند. غلظت بالای لیپوپروتئین (a) در بیماری‌های قلبی-عروقی نیز دیده شده است (کرایگ، ۱۹۹۸؛ دانش و

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1- Jow | 2- Yang |
| 3- Chen | 4- Kraus |
| 5- Haack | 6- Schulz |
| 7- Hinze-Selch | 8- Pollmacher |
| 9- Morita | 10- Himeno |
| 11- Yakuwa | 12- Usui |
| 13- Peltier | 14- Imhof |
| 15- thrombogenesis | 16- Grainger |
| 17- plaque | 18- Lugens |

منابع

- American Psychiatric Association (1994). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (4th. ed.). Washington, DC: APA.
- Ariyo, A. A., Haan, M., Tangen, C. M., Rutledge, J. C., Cushman, M., Dobs, A., & Furberg, C. D. (2000). Depressive symptoms and risks of coronary heart disease and mortality in elderly Americans. *Circulation*, 102, 1773-1779.
- Barefoot, J. C., Burg, M. M., Carney, R. M., Cornell, C. E., Czajkowski, S. M., Freedland, K. E., Hosking, J. D., Khatri, P., Pitula, C. R., & Sheps, D. (2003). Aspects of social support associated with depression at hospitalization and follow-up assessment among cardiac patients. *Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation*, 23, 404-412.
- Berg, K. (1963). A new serum type system in man: The Lp system. *Acta Pathologia Microbiologica Scandinavica*, 59, 369-382.
- Bonnet, F., Irving, K., Terra, J. L., Nony, P., Berthezenne, F., & Moulin, P. (2005). Anxiety and depression are associated with unhealthy lifestyle in patients at risk of cardiovascular disease. *Atherosclerosis*, 178, 339-344.
- Craig, W. Y., Neveux, L. M., Palomaki, G. E., Cleveland, M. M., & Haddow, J. E. (1998). Lipoprotein (a) as a risk factor for ischemic heart disease: Meta-analysis of prospective studies. *Clinical Chemistry*, 44, 2301-2306.
- Cohen, H. W., Gibson, G., & Alderman, M. H. (2000). Excess risk of myocardial infarction in patients treated with antidepressant medications: Association with use of tricyclic agents. *American Journal of Medicine*, 108, 2-8.
- Danesh, J., Collins, R., & Peto, R. (2000). Lipoprotein (a) and coronary heart disease: Meta-analysis of prospective studies. *Circulation*, 102, 1082-1085.
- Emanuele, E., Carlin, M.V., D'Angelo, A., Peros, E., Barale, F., Geroldi, D., & Politi, P. (2006). Elevated plasma levels of lipoprotein (a) in psychiatric patients: A possible contribution to increased vascular risk. *European Psychiatry*, 21, 129-133.
- Empana, J. P., Sykes, D. H., Luc, G., Juhan-Vague, I., Arveiler, D., Ferrieres, J., Amouyel, P., & Bingham, A. (2005). Contributions of depressive mood and circulating inflammatory markers to coronary heart disease in healthy European men: The prospective epidemiological study of myocardial infarction. *Circulation*, 111, 2299-2305.
- Enas, E. A., Garg, A., Davidson, M. A., Nair, V. M., Huet, B. A., & Yusuf, S. (1996). Coronary heart disease and its risk factors in first generation immigrant Asian Indians to the United States of America. *Indian Heart Journal*, 48, 343-353.
- Enas, E. A., & Senthilkumar, A. (2002). Role of Lipoprotein (a): Reality and relevance. In: D. Gambhir (Ed.), *Cardiology Update*. New Delhi: CSI.
- Friedewald, W. T., Levy, R. I., & Fredrickson, D. S. (1972). Estimation of low-density lipoprotein cholesterol in plasma, without use of the preparative ultracentrifuge. *Clinical Chemistry*, 18, 499-508.
- Frasure-Smith, N., Lesperance, F., & Julien, P. (2004). Major depression is associated with lower omega-3 fatty acid levels in patients with recent acute coronary syndromes. *Biological Psychiatry*, 55, 891-896.
- Frasure-Smith, N., & Lespérance, F. (2006). Recent evidence linking coronary heart disease and depression. *Canadian Journal of Psychiatry*, 51, 730-737.
- Gambhir, J. K., Kaur, H., Gambhir, D. S., & Prabhu, K. M. (2000). Lipoprotein (a) as an independent risk factor for coronary artery disease in patients below 40 years of age. *Indian Heart Journal*, 52, 411-415.
- Geethanjali, F. S., Jose, V. J., & Kanagasabapathy, A. S. (2002). Lipoprotein (a) phenotypes in South Indian patients with coronary artery disease. *Indian Heart Journal*, 54, 50-53.
- Gehi, A., Haas, D., Pipkin, S., & Whooley, M. A. (2005). Depression and medication adherence in outpatients with coronary heart disease: Findings from the heart and soul study. *Archives of Internal Medicine*, 165, 2508-2513.
- Grainger, D. J., Krischenlohr, H. L., Metcalfe, J. C., Weissberg, P. L., Wade, D. P., & Lawn, R. M. (1993). Proliferation of human smooth muscle promoted by lipoprotein (a). *Science*, 260, 1655-1658.
- Hopkins, P. N., Wu, L. L., Hunt, S. C., James, B. C., Vincent, G. M., & Williams, R. R. (1997). Lipoprotein (a) interactions with lipid and nonlipid risk factors in

- early familial coronary artery disease. *Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology*, 17, 2783-2792.
- Imhof, A., Rothenbacher, D., Khuseyinova, N., Hoffmeister, A., Maerz, W., Nauck, M., Scharnagl, H., Koenig, W., & Brenner, H. (2003). Plasma lipoprotein Lp (a), markers of haemostasis and inflammation, and risk and severity of coronary heart disease. *European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation*, 10, 362-370.
- Jow, G. M., Yang, T.T., & Chen, C. I. (2006). Leptin and cholesterol levels are low in major depressive disorder, but high in schizophrenia. *Journal of Affective Disorders*, 90, 21-27.
- Joynt, K. E., Whellan, D. J., & O'Connor, C. M. (2003). Depression and cardiovascular disease: Mechanisms of interaction. *Biological Psychiatry*, 54, 248-261.
- Keller, C. (2007). Apheresis in coronary heart disease with elevated Lp (a): A review of Lp (a) as a risk factor and its management. *Therapeutic Apheresis Dialysis*, 11, 2-8.
- Kraus, T., Haack, M., Schuld, A., Hinze-Selch, D., & Pollmacher, T. (2001). Low leptin levels but normal body mass indices in patients with depression and schizophrenia. *Neuroendocrinology*, 73, 243-247.
- Lesperance, F., Frasure-Smith, N., Talajic, M., & Bourassa, M. G. (2002). Five-year risk of cardiac mortality in relation to initial severity and one-year changes in depression symptoms after myocardial infarction. *Circulation*, 105, 1049-1053.
- Luc, G., Bard, J. M., Arveiler, D., Ferrieres, J., Evans, A., Amouyel, P., Fruchart, J. C., & Ducimetiere, P. (2002). Lipoprotein (a) as a predictor of coronary heart disease: The PRIME Study. *Atherosclerosis*, 163, 377-384.
- Lugens, E., Gijbels, M., Snook, M., Heeringa, P., Gotwals, P., Koteliansky, V. E., & Daemen, M. J. (2002). Transforming growth factor-beta mediates balance between inflammation and fibrosis during plaque progression. *Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology*, 22, 975-982.
- Marcovina, S. M., Koschinsky, M. L., Albers, J. J., & Skarlatos, S. (2003). Report of the National Heart, Lung, and Blood Institute workshop on lipoprotein (a) and cardiovascular disease: Recent advances and future directions. *Clinical Chemistry*, 49, 1785-1796.
- McCaffery, J. M., Frasure-Smith, N., Dubé, M. P., Thérioux, P., Rouleau, G. A., Duan, Q., & Lespérance, F. (2006). Common genetic vulnerability to depressive symptoms and coronary artery disease: A review and development of candidate genes related to inflammation and serotonin. *Psychosomatic Medicine*, 68, 187-200.
- Mohan, V., Deepa, R., Harnath, S. P., Premlatha, G., Rema, M., Sastry, N. G., & Enas, E. A. (1998). Lipoprotein (a) is an independent risk factor for coronary artery disease in NIDDM patients in South India. *Diabetes Care*, 21, 1819-1823.
- Molinari, E. A., Apichler, P. F., Grillhofer, H., & Kostner, G. M. (1995). Immunoturbidimetric determination of lipoprotein (a): Improvement in the measurement of turbid and triglyceride-rich samples. *Clinica Chimica Acta*, 241, 59-69.
- Morita, Y., Himeno, H., Yakuwa, H., & Usui, T. (2006). Serum lipoprotein (a) level and clinical coronary stenosis progression in patients with myocardial infarction re-vascularization rate is high in patients with high-Lp (a). *Circulation Journal*, 70, 156-162.
- Morrisett, J. D. (2000). The role of lipoprotein (a) in atherosclerosis. *Current Atherosclerosis Reports*, 2, 243-250.
- Murray, C. J., & Lopez, A. D. (1997). Alternative projections of mortality and disability by cause 1990-2020: Global burden of disease study. *Lancet*, 349, 1498-1504.
- Otte, C., Marmar, C. R., Pipkin, S. S., Moos, R., Browner, W. S., & Whooley, M. A. (2004). Depression and 24-hour urinary cortisol in medical outpatients with coronary heart disease: The heart and soul study. *Biological Psychiatry*, 56, 241-247.
- Otte, C., Neylan, T. C., Pipkin, S., Browner, W. S., & Whooley, M. A. (2005). Depressive symptoms and 24-hour urinary norepinephrine excretion levels in patients with coronary disease: Findings from the heart and soul study. *American Journal of Psychiatry*, 162, 2139-2145.
- Peltier, M., Peltier, M. C. I., Sarano, M. E., Lesbre, J. P., M., Colas, J. L., & Tribouilloy, C. M. (2002). Elevated serum lipoprotein (a) level is an independent marker of severity of thoracic aortic atherosclerosis. *Chest*, 121, 1589-1594.

- Ruo, B., Rumsfeld, J. S., Pipkin, S., & Whooley, M. A. (2004). Relation between depressive symptoms and treadmill exercise capacity in the heart and soul study. *American Journal of Cardiology*, 94, 96-99.
- Schins, A., Hamulyák, K., Scherpé, S., Lousberg, R., Van-Melle, J., Crijns, H., & Honig, A. (2004). Whole blood serotonin and platelet activation in depressed post-myocardial infarction patients. *Life Science*, 76, 637-650.
- Serebruany, V. L., Glassman, A. H., Malinin, A. I., Sane, D. C., Finkel, M. S., Krishnan, R. R., Atar, D., Lekht, V., & O'Connor, C. M. (2003). Enhanced platelet/endothelial activation in depressed patients with acute coronary syndromes: Evidence from recent clinical trials. *Blood Coagulation and Fibrinolysis*, 14, 563-567.
- Sherbourne, C. D., Wells, K. B., & Sturm, R. (1997). Measuring health outcomes for depression. *Eval Health Prof*, 1, 47-64.
- Whooley, M. A. (2006). Depression and cardiovascular disease, healing the broken-hearted. *JAMA*, 295, 2874-2881.

