

مقایسه تغییرات بیلی روین در اسکیزوفرنیا و اختلال خلقی دوقطبی نوع یک

دکتر یوسف سمنانی^۱، دکتر فرزاد ناظمی^۲، دکتر محمد جواد احسانی اردکانی^۳، دکتر آیلین آذری یام^۴

Comparison of Bilirubin Level Changes in Schizophrenia and Type I Bipolar Disorder

Yousef Semnani^{*}, Farzad Nazemi², Mohammad Javad Ehsani Ardakani³, Aileen Azari Yam⁴

Abstract

Objectives: The aim of this study was to evaluate bilirubin level changes in patients with schizophrenia and other psychotic disorders. **Method:** This was a comparative cross-sectional study. Hospitalized patients of at least 20 years of age, with the primary diagnosis of psychosis, were first evaluated using Structured Clinical Interview DSM-IV for Axis I disorders (SCID-I) and 162 patients with schizophrenia and 155 patients with bipolar mood disorders entered the study. Ninety five cardiac patients who were admitted to CCU with no personal and family history of psychosis were selected as the control group. Plasma levels of total and direct bilirubin, lactate dehydrogenase (LDH), alkaline phosphatase (ALP), alanine aminotransferase (ALT), aspartate aminotransferase (AST), and prothrombin time (PT) as well as the reticulocyte count were measured for all of the subjects. Also, bilirubin levels at admission and at discharge were compared. **Results:** Distribution of age, sex and also positive and general psychopathology subscales were not significantly different in the relevant groups. Initial total bilirubin levels were higher in patients with schizophrenia ($p<0.001$) and were more associated with general psychopathology subscale rather than positive subscale. Bilirubin level was decreased in all three groups at discharge ($p<0.05$) and the rate of decrease was higher in schizophrenic group

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف بررسی چگونگی تغییرات سطح سرمه بیلی روین در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا و سایر بیماری‌های پسیکوتیک انجام شده است. **روش:** این بررسی، به صورت مقایسه‌ای-مقطعی انجام شد. بیماران بستری با تشخیص اولیه پسیکوز و سن بالای بیست سال نخست به کمک مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلالات محصور یک (SCID-I) DSM-IV از نظر روانپرشنگی ارزیابی و ۱۶۲ بیمار مبتلا به اسکیزوفرنیا و ۱۵۵ بیمار مبتلا به اختلال خلقی دوقطبی وارد بررسی شدند. ۹۵ بیمار قلبی بستری در C.C.U بدون سابقه پسیکوز در خود و خانواده نیز به عنوان گواه انتخاب گردیدند. پس از گرفتن نمونه خون بیماران، سطح بیلی روین توانای و مستقیم، شمارش ریتکولویست، لکت دیپلوروزن (LDH)، آنکالین فسفاتاز (ALP)، آلانین آمینو ترانسفرز (AST) و زمان پروترومین (PT) در هر سه گروه بررسی شد. پیش از انجام اندازه گیری‌ها و پس از طی دوره بستری، سطح بیلی روین و شدت پسیکوز بر پایه آزمون PANSS تبیین شد. هم‌چنین تفاوت سطح بیلی روین در آغاز بستری با هنگام ترجیح بررسی گردید. **یافته‌ها:** سه گروه مورد بررسی از نظر توزیع سنی و جنسی تفاوت معنی داری نداشتند. شدت علایم مثبت و عمومی در آغاز بستری در بیماران مبتلا به پسیکوز دو گروه با هم تفاوتی نداشتند. میزان بیلی روین در آغاز بستری در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا بیشتر از دیگر بیماران بود ($p<0.001$) و بیشتر تحت تأثیر علایم عمومی قرار داشت تا علایم مثبت. در هنگام ترجیح، بیلی روین در هر سه گروه کاهش یافت

¹ روانپرشنگ، استاد بار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی شهید بهشتی، تهران، خیابان شهید مدنی (نظام آباد سایبر)، بیمارستان امام حسین (ع)، مجموعه روانپرشنگی و علوم رفتاری، دوره‌گار، ۲۳، ۷۰۵۱-۲۱، (نویسنده مسئول).
² روانپرشنگ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی شهید بهشتی،
³ فوق تحصیل بیماری‌های گوارش، استاد بار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی شهید بهشتی.
⁴ E-mail: y.semmani@sbmu.ac.ir

* Corresponding author: Psychiatrist, Assistant Prof. of Shaheed Beheshti University of Medical Sciences, Behavioral Sciences Research Center, Emam Hossein Hospital, Shalheen Madani, Ave., Tehran, Iran, IR. Fax: +9821-77551023. E-mail: y.semmani@sbmu.ac.ir;
† Psychiatrist, Shaheed Beheshti University of Medical Sciences; ‡ Gastroenterologist, Assistant Prof. of Shaheed Beheshti University of Medical Sciences; § Pathologist, Behavioral Sciences Research Center, Shaheed Beheshti University of Medical Sciences.

($p<0.001$). **Conclusion:** Mild increase in serum bilirubin level is an usual finding in acute psychosis and does not require further clinical or laboratory investigation, but the difference observed between the admission and discharge bilirubin levels is higher in patients with symptoms of psychosis especially in schizophrenics (more than that expected to be caused merely by imposed stress of acute mental illness or hospitalization).

Key words: schizophrenia; psychosis; bipolar disorder; bilirubin; Gilbert's disease

[Received: 20 November 2008; Accepted: 21 February 2009]

(۰/۰۵) ولی میزان تغییر نسبت به زمان آغاز بسترسی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرینیا بیشتر از دیگر گروه‌ها بود (۰/۰۱). **نتیجه‌گیری:** به نظر می‌رسد افزایش جزئی سطح بیلی روبین در حمله حاد پسکور شایع است که نیاز به بررسی بالینی یا آزمایشگاهی بیشتر ندارد، ولی میزان این افزایش بیش از میزان مورد انتظار در اثر استرس مربوط به بیماری با بسترسی شدن است؛ بنابراین بررسی عالی آن نیاز به پژوهش بیشتری دارد.

کلیدواژه: اسکیزوفرینیا؛ پسکور؛ اختلال دوقطبی؛ بیلی روبین؛ سندروم ژیلبرت

[دریافت مقاله: ۱۳۸۷/۸/۳۰؛ پذیرش مقاله: ۱۳۸۷/۱۲/۳]

مقدمه

می‌باشند، سنو، مدا^{۱۸} و همکاران (۲۰۰۰) در پژوهش دیگری فراوانی بیشتری از سندروم ژیلبرت را در بیماران مبتلا به اسکیزوفرینیا نسبت به پسکور خلقی (۴۲٪ در برابر ۶٪) که افزایش نمودند، ولی مشخص نکردند که سطح بیلی روبین (به عنوان یک متغیر کمی) در این دو گروه چه تفاوتی دارد. بر پایه همین بررسی در طی درمان روانپزشکی، هیریلی روبینی در ۸۰٪ کاهش و در ۲۰٪ گاه کاهش و گاه افزایش داشته ولی در هیچ موردی افزایش دائم دیده نشده است. از این رو شاید بتوان گفت که در این بیماران سطح بیلی روبین به شدت بیماری روانپزشکی زمینه (عامل وضعیت)^{۱۹} بستگی دارد. بررسی دیگری نشان داد که در بیماران اسکیزوفرینیک مبتلا به سندروم ژیلبرت شدت علایم مثبت و عمومی در مقیاس نشانگان مثبت و منفی^{۲۰} (PANSS)، و نشانه‌های عوارض دارویی آتشی پسکوتیک‌ها در مقیاس PHHAS^{۲۱} نسبت به سایر بیماران مبتلا به اسکیزوفرینیا بیشتر است (می‌باشند و همکاران، ۲۰۰۲).

بیماران مبتلا به اسکیزوفرینیا با نشانگان ژیلبرت نسبت به سایر بیماران اسکیزوفرینیک بطن‌های مغزی بزرگتری در CT scan^{۲۲} (می‌باشند، سنو، ایتوگا^{۲۳}، ایناگاکی^{۲۴} و هوریگوچی^{۲۵}، ۲۰۰۱)، سوخت و ساز کمتر در شیار

بیلی روبین از تجزیه هموگلوبین آزاد شده از تخریب گلبول‌های قرمز فرسوده پدید می‌آید و توسط سلول‌های کبدی با گلوكورونات^۱ کونزوگه^۲ شده و در صفراء دفع می‌شود. غلظت بالای شکل آزاد بیلی روبین در پلاسمای نوزادان باعث آنسفالوباتی و آسیب مغزی شده و به صورت اختلال‌های حرکتی، شناختی و بادگیری بروز می‌کند (کولبرگ^۳، ۱۹۹۹).

بررسی‌ها نشان‌دهنده تغییر سطح بیلی روبین در بیماران مبتلا به اسکیزوفرینیا هستند اما چگونگی تغییرات و تفاوت میزان این تغییرات در بیماران مبتلا به اسکیزوفرینیا با سایر بیماران پسکوتیک روش نیست. نخستین بار مولر^۴، شیلر^۵ و آکنهیل^۶ (۱۹۹۱) در یک بررسی گذشته‌نگر دریافتند که سطح بیلی روبین سرم در بیماران مبتلا به اسکیزوفرینیا بالاتر از سایر بیماران روانپزشکی است و این یافته را به دلیل تغییر در سطح استروژن یا غشاء گلبول قرمز دانستند. در گزارش‌های منفرد دیگری نیز به تغییرات بیلی روبین بیماران اسکیزوفرینیک مبتلا به سندروم ژیلبرت اشاره شده است (فروند^۷، ۲۰۰۶؛ مهدی^۸ و الامیر^۹، ۱۹۹۸؛ می‌باشند، سنو^{۱۱}، ایتوگا^{۱۲}، لیجیما^{۱۳} و همکاران، ۲۰۰۰؛ پاول^{۱۴} و هنسن^{۱۵}، ۲۰۰۷؛ راموس^{۱۶}، کورتو^۷ و راموس^{۱۷}، ۲۰۰۶) [سندروم ژیلبرت یک هیریلی روبینی غیرکونزوگه خوش خیم است که بدون وجود بیماری ساختمانی کبد یا همولیز در هنگام گرسنگی یا استرس رخ می‌دهد و پس از آن بیلی روبین غیرکونزوگه به حد طبیعی برمی‌گردد. در این اختلال غلظت بیلی روبین کونزوگه طبیعی است. پاتوفیزیولوژی این بیماری به دلیل کاهش کلیرانس کبدی بیلی روبین غیرکونزوگه می‌باشد که احتمالاً ناشی از عدم کونزوگه شدن، افزایش تولید یا کاهش برداشت بیلی روبین است].

- | | |
|--|--------------|
| 1- glucoronate | 2- conjugate |
| 3- Cullberg | 4- Muller |
| 5- Schiller | 6- Ackenheil |
| 7- Freund | 8- Mahdi |
| 9- Elameer | 10- Miyaoka |
| 11- Seno | 12- Itoga |
| 13- Iijima | 14- Powell |
| 15- Hansen | 16- Ramos |
| 17- Curto | 18- Maeda |
| 19- state factor | |
| 20- Positive and Negative Syndrome Scale | |
| 21- Prins Henry Hospital Akathisia Scale | |
| 22- computerized tomography scan | |
| 23- Itoga | 24- Inagaki |
| 25- Horiguchi | |

روانپزشکی مردان و زنان بیمارستان امام حسین(ع) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی شهید بهشتی بستری شده بودند، با رضایت آگاهانه خود یا یکی از همراهان وارد ارزیابی اولیه شدند. بیماران در صورت نداشتن آمادگی لازم (اختلال شاختی واضح یا عدم تحمل انجام مصاحبه بالینی) از بررسی خارج می شدند. فرم اطلاعات اولیه بیماران شامل سن، جنس، مصرف سیگار (شورتر^{۱۹}، ۱۹۹۸؛ وان هویدونک^{۲۰}، تم^{۲۱} و شوتن^{۲۲}، ۲۰۰۱)، سابقه مصرف دو ماه اخیر فوبیاریتال (هانسن^{۲۳} و تامارلو^{۲۴}، ۱۹۹۸) و داروهای روانپزشکی (آتابوسی^{۲۵} و همکاران، ۲۰۰۷) تکمیل شد؛ پس بیماران به کمک «مصاحبه بالینی ساختاریافه برای اختلالات محور یک DSM-IV^{۲۶} (SCID-I) ارزیابی شدند. این ابزار تشخیص‌هایی بر پایه معیارهای تشخیصی DSM-IV فراهم می‌آورد (فرست^{۲۷}، اسپیتزر^{۲۸} و گیبون^{۲۹}، ۱۹۹۷) و روایی و پایابی آن مطلوب گزارش شده است (مارتین^{۳۰}، پولوک^{۳۱} و بوکشتین^{۳۲}، ۲۰۰۰؛ اسکر^{۳۳}، انسناد^{۳۴} و تورگرسن^{۳۵}، ۱۹۹۱؛ زانارینی^{۳۶}، ۲۰۰۱). این ابزار به فارسی نیز ترجمه شده و در جمعیت ایرانی روایی و پایابی آن مناسب بوده است (شریفی و همکاران، ۱۳۸۳).

برای اجرای پژوهش ۱۷۳ بیمار با تشخیص در طول عمر^{۲۷} اسکیزوفرینی و ۱۷۲ بیمار مبتلا به اختلال خلقی دوقطبی نوع یک در دو گروه جای داده شدند. پژوهشگر دیگری به کمک ابزار PANSS^{۳۸} (کای^{۳۹}، فیزبین^{۴۰} و اپلر^{۴۱}، ۱۹۸۷) که توسط بالینگر تکمیل می‌شود، شدت علایم مثبت و اختلال‌های

سینگولیت^۱ قدامی در MRS^{۳۰} (می‌یاکا و همکاران، ۲۰۰۵) و تغییراتی در کورتکس فرونتو-تمپورال، سیستم لیمیک و هسته‌های قاعده‌ای در MRI^{۳۱} (می‌یاکا و همکاران، ۲۰۰۵) دارند.

برخلاف بررسی‌های یادشده در بالا، برخی پژوهش‌ها نشان داده‌اند که بیلی روین به عنوان یک آنتی‌اسکیزوفرینی مانند سایر آنتی‌اسکیزدان‌ها در بیماران مبتلا به اسکیزوفرینی کاهش یافته و درمان یا عدم درمان بیماران، تغییری در سطح بیلی روین ایجاد نمی‌کند. به بیان دیگر یک حالت جدا از شدت بیماری (عامل صفت^{۳۲}) می‌باشد (یاوا^{۳۳}، ردی^{۳۴} و ون کامن^{۳۵}، ۲۰۰۰).

ردی، کشاوان^{۳۶} و یاوا^{۳۷} (۲۰۰۳) سطح آنتی‌اسکیزدان‌ها از جمله بیلی روین را در ۳۱ بیمار مبتلا به اسکیزوفرینی با ۱۲ بیمار مبتلا به اختلال خلقی و افراد عادی مقایسه نمود و نشان داد که سطح بیلی روین در بیماران مبتلا به اسکیزوفرینی کمتر از سایر گروه‌ها بوده و در سیر بیماری نیز مقدار آن ثابت مانده است. این یافته در پژوهش‌های دیگری نیز گزارش شده است (گارسیا-اونزوتا^{۳۸}؛ پا^{۳۹}؛ همکاران، ۲۰۰۴؛ یاوا و ردی، ۲۰۰۵).

1- cingulate	
2- Magnetic Resonance Spectroscopy	
3- Magnetic Resonance Imaging	
4- trait factor	5- Yao
6- Reddy	7- Van Kammen
8- Keshavan	9- Garcia-unzueta
10- Pac	11- biopyrrin
12- Fendri	13- Yasukawa
14- Yamaguchi	15- Shioji
16- Sugimoto	17- Yamaoka
18- sequential	19- Schwertner
20- Van Hoydonck	21- Temme
22- Schouten	23- Hansen
24- Tommarello	25- Atasoy
26- Structured Clinical Interview for DSM-IV axis I disorders	
27- First	28- Spitzer
29- Gibbon	30- Martin
31- Pollock	32- Bukstein
33- Skre	34- Onstad
35- Torgersen	36- Zanarini
37- lifetime	
38- Positive and Negative Syndrome Scale	40- Fiszbein
39- Kay	
41- Opler	

از سوی دیگر نشان داده شده که در بیماران مبتلا به اسکیزوفرینی و افسردگی، متابولیت بیلی روین (یسوپیرین^{۴۲}) در ادرار افزایش می‌باشد (می‌یاکا و همکاران، ۲۰۰۱؛ فندری^{۴۳} و همکاران، ۲۰۰۶؛ یاسو کاوا^{۴۴} و همکاران، ۲۰۰۷)، به باور برخی پژوهشگران حتی استرس‌های روانی غیرمرتبط با بیماری روانی (مانند استرس‌های شغلی و خانوادگی) نیز می‌توانند باعث این تغییرات شوند (یاماگوشی^{۴۵}، شیوجی^{۴۶}، سوگیموتو^{۴۷} و یاماکا^{۴۸}، ۲۰۰۲).

با توجه به یکسان‌بودن یافته‌های پژوهش‌های انجام شده در زمینه سطح سرمی بیلی روین بیماران پسیکوتیک، کم‌بودن حجم نمونه در بیشتر بررسی‌ها، نبود ابزار تشخیصی دقیق برای جداگردن بیماران گوناگون، نبودن گروه گواه مناسب، انجام ندادن تحلیل‌های چند متغیره و روش نبودن وابستگی بیلی روین به پسیکوز، این بررسی انجام شد.

روش

این بررسی به صورت مقطعی - مقایسه‌ای انجام شد. بیماران با تشخیص اولیه پسیکوز و با سن بیست سال و بالاتر که از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶ به صورت پی‌درپی^{۴۹} در بخش‌های

بیمارانی که در آغاز بستری سطح بیلی روین توtal بیشتر از $1/2 \text{ mg/dl}$ داشته ولی بیلی روین مستقیم و سایر نتایج آزمایشگاهی آنها طبیعی بود، سابقه مصرف فنوباریتال یا سایر داروهای روانپردازشکی دارای خطر مسمومیت کبدی در یک ماه اخیر نداشته و هنگام ترخیص بیلی روین توtal آنها کاهش یافته و به مقدار طبیعی (کمتر از $1/2 \text{ mg/dl}$) رسیده بود، به عنوان نشانگان ژیلبرت مشخص شدند.

برای مقایسه متغیرهای کمی در گروههای مستقل از آزمون تحلیل واریانس و آزمون t ، برای دو گروه وابسته از آزمون t جفتی^{۱۲} بهره گرفته شد. برای مقایسه اثرات متغیرهای گوناگون بر یک متغیر از رگرسیون چندگانه گام به گام^{۱۵} و تحلیل کوواریانس^{۱۶} و برای تعیین تفاوت فراوانی نشانگان ژیلبرت در گروههای از آزمون خنی دو^{۱۷} استفاده شد.

یافته‌ها

۱۸ بیمار مبتلا به اسکیزوفرنیا ($1/10$ ٪)، ۱۰ بیمار مبتلا به اختلال خلقی دوقطبی ($7/6$ ٪) و ۲۳ بیمار بستری در CCU (19 ٪) به علت ترخیص زودهنگام، آزمایش‌های مرحله دوم را انجام نداده و از بررسی کثار گذاشته شدند.

میانگین سنی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا $۳۴/۷$ (انحراف معیار $۸/۷$)، بیماران خلقی دوقطبی نوع یک $۳۳/۲$ (انحراف معیار $۹/۴$) و بیماران بستری در CCU $۳۲/۴$ (انحراف معیار $۷/۷$) بود. توزیع آزمودنی‌های سه گروه مورد بررسی از نظر جنس و میزان بیلی روین در جدول ۱ نشان داده شده است. در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا، هر چند سطح بیلی روین در آغاز بستری در محدوده طبیعی قرار داشت، ولی بالاتر از بیماران دوقطبی بود و آزمون بونفرونی تفاوت موجود را از نظر آماری معنی دار نشان داد ($p < 0/001$). آزمون تعقیبی بونفرونی میزان بیلی روین در بیماران دوقطبی را بیشتر از بیماران گروه گواه نشان داد ($p < 0/05$). در شکل ۱ نیز تغییرات بیلی روین در سه گروه بیماران مقایسه شده است.

عمومی بیماران را در این دو گروه می‌سنجید. PANSS ابزاری مناسب برای تعیین شدت سه گروه علایم شامل علایم مثبت (مانند توهمندی و هذیان)، منفی (مانند عاطفه کند) و آسیب‌های روانی عمومی (هم‌جون پرخاشگری و عدم همکاری) در بیماران پسیکوتیک (خلقی و غیر خلقی) می‌باشد و با توجه به گستردگی علایمی که ارزیابی می‌کند، ابزار مناسب‌تری نسبت به سایر ابزارهای مشابه می‌باشد (Lam^۱ و میچالاک^۲، ۲۰۰۵). در این ابزار هفت ویژگی برای علایم مثبت، هفت ویژگی برای علایم منفی و ۱۶ ویژگی برای علایم یا آسیب روانی عمومی در نظر گرفته شده و هر یک بر پایه شدت از یک تا هفت درجه‌بندی می‌شود. این ابزار در یک پژوهش مشابه (می‌یاکا و همکاران، ۲۰۰۰) به کار برده شده است. در بررسی حاضر، به علت نبودن علایم منفی در بیماران دوقطبی، گروه علایم منفی به کار برده نشد.

یک صد و هیجده بیمار بستری در واحد مراقبت قلبی (CCU)^۳ که در روزهای اول بستری بوده و سابقه‌ای از اختلال پسیکوتیک واضح در خود یا بستگان درجه اول نداشتند، به عنوان گروه گواه برگزیده شدند. علت انتخاب این بیماران به عنوان گروه گواه، در معرض استرس بودن آنها به علت بیماری و محیط (بخش) بود (یاماگوشی و همکاران، ۲۰۰۲). پس از گرفتن نمونه خون بیماران سطح بیلی روین توtal و مستقیم، زمان پرتورومیان^۴ (PT)، LDH^۵، AST^۶ و ALT^۷ و آلکالن فسفاتاز^۸ (ALP)، همچنین شمارش ریتکولوسیت^۹ و لام خون محیطی مورد بررسی قرار گرفت (برای رد علل دیگر هیریلی بیلی روینی). بیلی روین به وسیله اتوآمالزد Hitachi 704 و کیت تشخیصی پارس آزمون به روش دی‌کلروآنیلین^{۱۰} سنجیده شد. در این روش بیلی روین در اثر دی‌کلروآنیلین، نیتروژن خود را از دست داده و به آزویلی بیلی روین قرمز رنگ تبدیل می‌گردد و به وسیله اسپکتروفوتومتری غلظت بیلی روین توtal محاسبه می‌شود (میلر^{۱۱}، رایس-اوائز^{۱۲} و دیویس^{۱۳}، ۱۹۹۳). روش تحلیلی دستگاه توسط دو سطح ماده کنترل، تحت پایش قرار داشت.

بیماران پسیکوتیک تحت نظر درمانگران خود قرار گرفته و پس از طی دوره بستری و فروکش کردن علایم و در هنگام ترخیص دوباره بر پایه PANSS ارزیابی شده و بیلی روین توtal و مستقیم در آنها اندازه گیری می‌شد. در بیماران بخش CCU نیز پیش از ترخیص، بیلی روین توtal و مستقیم اندازه گیری گردید.


- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 1- Lam | 2- Michalak |
| 3- Cardiac Care Unit | 4- prothrombin time |
| 5- lactate dehydrogenase | 6- aspartate aminotransferase |
| 7- alanine aminotransferase | 8- alkaline phosphatase |
| 9- reticulocyte | 10- dichloroaniline |
| 11- Miller | 12- Rice-Evans |
| 13- Davies | 14- paired t test |
| 15- stepwise multiple regression | |
| 16- analysis of covariance | |
| 17- chi-square | |

یافته‌ها نشان دادند که مقدار یلی روبین در آغاز بستری در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا و اختلال خلقی دوقطبی تحت تأثیر شدت علایم عمومی ($F=38/4$, $p<0.001$) است، در حالی که علایم مثبت نقش معنی داری نداشتند. همچنین این بررسی نشان داد که در هنگام ترخیص میزان علایم مثبت در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا ($t=24$, $df=154$, $p<0.001$) و بیماران دوقطبی ($t=20$, $df=161$, $p<0.001$) نسبت به آغاز بستری کاهش معنی دار یافته است (جدول ۲).

به طور کلی میزان یلی روبین در هنگام ترخیص نسبت به آغاز بستری در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا ($t=12/2$, $df=154$, $p<0.001$) و هنگام ترخیص بیماران ($t=6/9$, $df=161$, $p<0.001$) نسبت به آغاز بستری کاهش معنی دار یافت.

در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا، ۲۳ بیمار (۵/۶) در آغاز بستری، یلی روبین بالاتر از $1/2 \text{ mg/dl}$ داشتند (۲۰ مرد و سه زن) که هنگام ترخیص به میزان طبیعی رسید (سندرم ژیلبرت)، در حالی که در بیماران دوقطبی تنها ۵ بیمار (۱/۲) مبتلا به سندرم ژیلبرت بودند. هیچ یک از بیماران بستری در CCU به سندرم ژیلبرت مبتلا نبودند.

در آغاز بستری شدت علایم عمومی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا، در گروه مبتلا به سندرم ژیلبرت بیشتر از گروه غیرمبتلا به این سندرم بود ($t=3/2$, $df=160$, $p<0.001$), ولی علایم مثبت در این دو گروه از نظر آماری تفاوت معنی داری نداشتند.



شکل ۱- مقایسه تفیرات یلی روبین در آغاز بستری و هنگام ترخیص در سه گروه بیمار (اسکیزوفرنیا، دوقطبی و بستری در CCU)

در هنگام ترخیص میزان یلی روبین در سه گروه تفاوت معنی داری نداشت (جدول ۱)، اما آزمون تعییی بونفرونی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا میزان کاهش یلی روبین را در آغاز بستری و هنگام ترخیص بیشتر از بیماران گروه گواه ($p<0.001$) و در بیماران دوقطبی بیشتر از بیماران گروه گواه ($p<0.001$) نشان داد. آزمون تحلیل کوواریانس نیز نشان داد که تغیرات یلی روبین افزون بر این که در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا بیشتر از بیماران دوقطبی است ($F=31/7$, $p<0.001$), بیشتر تحت تأثیر تفیرات علایم عمومی ($F=23/8$, $p<0.001$) قرار دارد و علایم مثبت نقش چشم گیری ندارند. همچنین رگرسیون چند متغیری تفاوت معنی داری در ۱۶ ویژگی علایم عمومی از نظر تأثیر بر روی سطح یلی روبین در دو گروه بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا و دوقطبی نشان نداد.

جدول ۱- توزیع فراوانی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا و اختلال دوقطبی نوع یک بستری در بخش‌های روانپزشکی بیمارستان امام حسین (ع) بر حسب جنس و میزان یلی روبین توتال در آغاز بستری و هنگام ترخیص

اسکیزوفرنیا	اختلال دوقطبی	نوع یک	بیماران بستری در CCU	جنس*
n=۹۵	n=۱۵۵	n=۱۶۲		
(۷۱/۶) ۶۸	(۶۴/۵) ۱۰۰	(۶۱/۷) ۱۰۰		مرد، فراوانی (%)
(۲۸/۴) ۲۷	(۳۵/۵) ۵۵	(۳۸/۳) ۶۲		زن، فراوانی (%)
(۰/۱) ۰/۴۱	(۰/۲) ۰/۴۹	(۰/۳) ۰/۶۳		سطح خونی یلی روبین توتال (mg/dl)
(۰/۱) ۰/۴۷	(۰/۱) ۰/۴۵	(۰/۱) ۰/۴۶		در آغاز بستری**, میانگین (انحراف معیار)
(۰/۱) ۰/۰۴	(۰/۱) ۰/۱۴	(۰/۱) ۰/۲۶		در هنگام ترخیص***، میانگین (انحراف معیار)
				تفاوت آغاز بستری و هنگام ترخیص****، میانگین (انحراف معیار)

* $\chi^2 = ۲/۵۸$, $df=۲$, $p<0.28$; ** $F=۳۶/۴$, $p<0.001$; *** $F=۱/۹۶$, $p<0.15$; **** $F=۳۶/۹$, $p<0.001$

جدول ۲- میانگین و انحراف معیار عالیه مثبت و نشانه‌های عمومی پسیکوز بر پایه PANSS در بیماران مبتلا به اسکیزوفرینیا ($n=162$) و اختلال دوقطبی ($n=100$) در آغاز بستری و هنگام ترخیص

عنوان	نوع بک	اختلال دوقطبی	اسکیزوفرینیا	معنی داری	سطح
علایم مثبت					
در آغاز بستری	(۶/۴) ۲۱/۲	(۴/۴) ۲۰/۶	۰/۸۹	۰/۸۹	N.S.**
در هنگام ترخیص	(۲/۷) ۱۱/۱	(۲/۹) ۱۱/۷	-۰/۸۹	-۰/۸۹	N.S.
تفاوت آغاز بستری و هنگام ترخیص	(۶/۹) ۹/۹	(۴/۹) ۸/۹	۱/۷	۱/۷	N.S.
نشانه‌های عمومی					
در آغاز بستری	(۶/۲) ۲۲/۷	(۳/۷) ۲۳/۲	-۱/۶	-۱/۶	N.S.
در هنگام ترخیص	(۳/۵) ۱۸/۹	(۳/۷) ۱۸/۲	۱/۷	۱/۷	N.S.
تفاوت آغاز بستری و هنگام ترخیص	(۶/۹) ۳/۷	(۴/۷) ۴/۹	-۱/۷	-۱/۷	N.S.

* df=۳۱۵ ; ** non-significant

والتر^۱، هورن^۲، کوشورک^۳، مولر و سترایک^۴ (۲۰۰۸) استرس را علت اصلی تغییرات بیلی روین در این بیماران به شمار آوردند و این نظریه را که بیماران مبتلا به اسکیزوفرینیا، استرس و برانگیختگی بیشتر نسبت به سایر بیماران حسن می‌کنند؛ را درست ندانسته‌اند. هر چند در این پژوهش ابزاری برای سنجش شدت استرس در بیماران بستری در CCU به کار برده نشده، بر پایه یافته‌های بدست آمده در این بررسی، علایم عمومی که تابعی از شدت استرس بوده‌اند (هامنر^۵ و همکاران، ۲۰۰۰، هامنر و همکاران، ۲۰۰۳) در بیماران مبتلا به اسکیزوفرینیا و اختلال دوقطبی در هنگام بستری تفاوت معنی داری نداشتند ولی میزان بیلی روین در بیماران مبتلا به اسکیزوفرینیا بیشتر بوده است. از این رو برخلاف نظر یاماگوشی و همکاران (۲۰۰۲) تنها استرس توجیه کننده افزایش بیلی روین در بیماران مبتلا به اسکیزوفرینی نسبت به سایر بیماران نیست، به ویژه آن که این بررسی مانند بررسی دیگری (می‌باکا و همکاران، ۲۰۰۰) نشان داد موارد هیپریلی روینی (بیلی روین بیشتر از $1/2 \text{ mg/dl}$) در بیماران مبتلا به اسکیزوفرینی بیشتر از بیماران خلقی دوقطبی است. شناسایی عوامل دیگری که در این زمینه نقش دارند، نیاز به بررسی بیشتر در ژن‌های مشترک بیماران مبتلا به اسکیزوفرینی و سندروم ژیلبرت دارد.

یافته‌های این پژوهش با بررسی ردی و همکاران (۲۰۰۳) که نشان داد سطح سرمی بیلی روین در بیماران مبتلا به اسکیزوفرینی کمتر از افراد عادی است و سطح آن نیز با درمان

بحث

یافته‌های این بررسی گویای آن هستند که هر چند میانگین سطح بیلی روین در بیماران مبتلا به اسکیزوفرینی در حمله حاد پسیکوز در دامنه طبیعی قرار دارد، ولی بیشتر از میانگین سطح بیلی روین در سایر اختلال‌های پسیکوتیک از جمله اختلال خلقی دوقطبی است و پس از کنترل پسیکوز میزان بیلی روین در هر دو گروه بیماران کاهش می‌یابد، به طوری که در زمان بهبودی علایم، سطح سرمی بیلی روین در دو گروه تفاوت معنی داری با هم ندارند.

بیلی روین سرمی از آنالیت‌هایی به شمار می‌رود که پیشنهاد شده برای تشخیص بیماری به جای استفاده از فاصله طبیعی^۶ از سیر تغیرات آن در هر فرد استفاده شود (لاکر^۷، هاگس^۸ و کارول^۹، ۲۰۰۵)؛ از این رو بررسی تغیرات آن در هر فرد حتی در صورت قرارگرفتن در محدوده طبیعی دارای اهمیت است.

تغییرات سطح سرمی بیلی روین در سیر بیماری گویای وابسته‌بودن آن به شدت بیماری است که این یافته در بررسی‌های دیگری نیز نشان داده شده است (فروند، ۲۰۰۶؛ مهدی و والامیر، ۱۹۹۸؛ می‌باکا، سنو، ایتوگا و همکاران، ۲۰۰۰؛ پاول و هنسن، ۲۰۰۷؛ راموس و همکاران، ۲۰۰۶). با این که در هر سه گروه پس از کنترل بیماری، سطح سرمی بیلی روین کاهش یافت و این یافته این فرضیه را در ذهن پدید می‌آورد که در اثر استرس و برانگیختگی بالا^{۱۰} (همان پدیده‌ای که در بیماران دچار سندروم ژیلبرت باعث تغییرات گذرا در سطح بیلی روین می‌شود) بیلی روین دچار تغییر در دامنه بهنجار شده است، ولی در بیماران پسیکوتیک این تغییرات بیشتر بودند. یاماگوشی و همکاران (۲۰۰۲)

1- reference interval

3- Hughes

5- hyperarousal

7- Horn

9- Strik

2- Lacher

4- Carroll

6- Walther

8- Koschorke

10- Hamner

- (2003). Alterations of liver function test in patients treated with antipsychotics. *Journal of Clinical Laboratory Analysis*, 17, 216-218.
- Hamner, M. B., Faldowski, R. A., Ulmer, H. G., Fruch, B. C., Huber, M. G., & Arana, G. W. (2003). Adjunctive risperidone treatment in post-traumatic stress disorder: A preliminary controlled trial of effects on comorbid psychotic symptoms. *International Clinical Psychopharmacology*, 18, 1-8.
- Hamner, M. B., Fruch, B. C., Ulmer, H. G., Huber, M. G., Twomey, T. J., & Tyson, C. (2000). Psychotic features in chronic posttraumatic stress disorder and schizophrenia: Comparative severity. *Journal of Nervous and Mental Disease*, 188, 217-221.
- Hansen, T. W., & Tommarello, S. (1998). Effect of phenobarbital on bilirubin metabolism in rat brain. *Biology of the Neonate*, 73, 106-111.
- Hatta, K., Takahashi, T., Nakamura, H., Yamashiro, H., Matszaki, I., & Asukai, N. (1999). Laboratory findings in acute schizophrenia: Relevance to medical management on emergency admission. *General Hospital Psychiatry*, 21, 220-227.
- Kay, S. R., Fiszbein, A., & Opler, L. A. (1987). The Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) for schizophrenia. *Schizophrenia Bulletin*, 13, 261-276.
- Lacher, D. A., Hughes, J. P., & Carroll, M. D. (2005). Estimate of biological variation of laboratory analytes based on the Third National Health and Nutrition Examination survey. *Clinical Chemistry*, 51, 450-452.
- Lam, R. W., & Michalak, E. E. (2005). *Assessment scales in depression, mania and anxiety*. Abingdon: Information Health Care.
- Mahdi, A. S., & Elameer, M. S. (1998). Co-occurrence of Gilbert's syndrome and psychosis. *Psychiatric Bulletin*, 22, 566-568.
- Martin, C. S., Pollock, N. K., & Bukstein, O. G. (2000). Inter-rater reliability of the SCID alcohol and substance use disorders section among adolescents. *Drug and Alcohol Dependency*, 59, 173-176.
- Miller, N. J., Rice-Evans, C., & Davies, M. J. (1993). A new method for measuring antioxidant activity. *Biochemical Society Transactions*, 21, 95S.
- Miyaoka, T., Seno, H., Itoga, M., Iijima, M., Inagaki, T., & Horiguchi, J. (2000). Schizophrenia-associated idiopathic

یا بدون آن ثابت می‌ماند، متفاوت است. به بیان دیگر در بررسی یادشده تغیرات پلی روین در سیر بیماری تغیر نکرده و به عنوان یک عامل مستقل از بیماری به شمار رفته است. در بررسی ردی (همان‌جا) بیماران مبتلا به اسکیزوفرینیا تنها با افراد سالم مقایسه شده‌اند و مشخص نشده آیا این تغیرات تنها مربوط به بیماران مبتلا به اسکیزوفرینیا است یا در سایر بیماران روانپزشکی نیز دیده می‌شوند.

به هر روی، توجه به تغیرات بیوشیمیابی سرم در سیر اختلال‌های پیکوتیک دارای اهمیت است. این بیماران گاه به اشتباه والتبه به فراوانی مورد بررسی‌های بالینی و آزمایشگاهی قرار می‌گیرند، در حالی که اغلب با کنترل بیماری، این گونه اختلال‌ها به خودی خود بهبودی می‌یابند (هاتا^۱ و همکاران، ۱۹۹۹). با شناسایی این عوامل و بررسی چگونگی ارتباط آنها با بیماری اولیه می‌توان شناخت پیشتری از آنها به دست آورد.

منابع

شریفی، ونداد؛ اسعدي، سید محمد؛ محمدی، محمد رضا؛ اینی، همایون؛ کاویانی، حسین؛ سمعانی، یوسف؛ شعبانی، امیر؛ شهربور، زهره؛ داوری آشیانی، رزیتا؛ حکیم شوستری، میرزا صدیق، عرشیا؛ جلالی رودسری، محسن (۱۳۸۲). پایابی و قابلیت اجرای نسخه فارسی مصاحبه ساختاریافته تشخیصی برای چگونگی ارتباط آنها با بیماری اولیه می‌توان شناخت پیشتری. *SCID (DSM-IV)* (فصلنامه تازه‌های علوم شناختی، سال ششم، شماره ۱ و ۲، ۱۰-۲۲).

Atasoy, N., Erdogan, A., Yalug, I., Ozturk, U., Konuk, N., & Atik, L. (2007). A review of liver function tests during treatment with atypical antipsychotic drugs: A chart review study. *Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry*, 31, 1255-1260.

Cullberg, D. C. (1999). Neonatal hyperbilirubinaemia: A vulnerability factor for mental disorder? *Acta Psychiatrica Scandinavica*, 100, 469-471.

Fendri, C., Mechri, A., Khiari, G., Othman, A., Kerkeni, A., & Gaha, L. (2006). Oxidative stress involvement in schizophrenia pathophysiology: A review. *Encephale*, 32, 244-252.

First, M., Spitzer, R., & Gibbon, M. (1997). *Structured Clinical Interview for DSM-IV axis I disorders (clinical version), SCID-I administration booklet*. Washington DC: American Psychiatric Association.

Freund, N. (2006). A psychiatric patient with elevated liver values. *Praxis*, 95, 549-550.

Garcia-Unzueta, M. T., Herran, A., Sierra-Biddle, D., Amado, J. A., Vazquez-Barquero, J. L., & Alvarez, C.

- unconjugated hyperbilirubinemia (Gilbert's syndrome). *Journal of Clinical Psychiatry*, 61, 868-871.
- Myaoka, T., Seno, H., Itoga, M., Inagaki, T., & Horiguchi, J. (2001). Structural brain changes in schizophrenia associated with idiopathic unconjugated hyperbilirubinemia (Gilbert's syndrome): A planimetric CT study. *Schizophrenia Research*, 52, 291-293.
- Myaoka, T., Seno, H., Maeda, T., Itoga, M., & Horiguchi, J. (2000). Schizophrenia-associated idiopathic unconjugated hyperbilirubinemia (Gilbert's syndrome): 3 Case reports. *Journal of Clinical Psychiatry*, 61, 299-300.
- Myaoka, T., Yasukawa, R., Mizuno, S., Sukegawa, T., Inagaki, T., & Horiguchi, J. (2003). Clinical features of schizophrenia associated with idiopathic unconjugated hyperbilirubinemia (Gilbert's syndrome). *International Journal of Psychiatry in Clinical Practice*, 7, 199-203.
- Myaoka, T., Yasukawa, R., Yasuda, H., Shimizu, M., Mizuno, S., & Sukegawa, T. (2005). Urinary excretion of biopyrrins, oxidative metabolites of bilirubin, increases in patients with psychiatric disorders. *European Neuropsychopharmacology*, 15, 249-252.
- Myaokaa, T., Yasukawaa, R., Mizunoa, S., Sukegawaa, T., Inagakia, T., & Horiguchia, J. (2005). Proton magnetic resonance spectroscopy (1H-MRS) of hippocampus, basal ganglia, and vermis of cerebellum in schizophrenia associated with idiopathic unconjugated hyperbilirubinemia (Gilbert's syndrome). *Journal of Psychiatric Research*, 39, 29-34.
- Muller, N., Schiller, P., & Ackenheil, M. (1991). Coincidence of schizophrenia and hyperbilirubinemia. *Pharmacopsychiatry*, 24, 225-228.
- Pae, C. U., Paik, I. H., Lee, C., Lee, S. J., Kim, J. J., & Lee, C. U. (2004). Decreased plasma antioxidants in schizophrenia. *Neuropsychobiology*, 50, 54-56.
- Powell, A. J., & Hansen, L. K. (2007). Gilbert's syndrome in a patient with predominantly negative symptoms of schizophrenia. *International Journal of Psychiatry in Clinical Practice*, 11, 239-241.
- Ramos, R. M., Curto, S. V., & Ramos, J. M. (2006). Gilbert's syndrome and schizophrenia. *Actas Espanolas De Psiquiatria*, 34, 206-208.
- Reddy, R., Keshavan, M., & Yao, J. K. (2003). Reduced plasma antioxidants in first-episode patients with schizophrenia. *Schizophrenia Research*, 62, 205-212.
- Schwertner, H. A. (1998). Association of smoking and low serum bilirubin antioxidant concentrations. *Atherosclerosis*, 136, 383-387.
- Skre, I., Onstad, S., & Torgersen, S. (1991). High interrater reliability for the Structured Clinical Interview for DSM-III-R Axis I (SCID-I). *Acta Psychiatrica Scandinavica*, 84, 167-173.
- Trochim, M. K. (2005). *Research methods the concise knowledge base*. Mason, USA: Thomson Corporation.
- Tsuyoshi Myaoka, T., Yasukawa, R., Takumi Mihara, T., Mizuno, S., Yasuda, H., & Sukegawa, T. (2005). Fluid-attenuated inversion-recovery MR imaging in schizophrenia associated with idiopathic unconjugated hyperbilirubinemia (Gilbert's syndrome). *European Psychiatry*, 20, 327-331.
- Van Hoydonck, P. G., Temme, E. H., & Schouten, E. G. (2001). Serum bilirubin concentration in a Belgian population: The association with smoking status and type of cigarettes. *International Journal of Epidemiology*, 30, 1465-1472.
- Walther, S., Horn, H., Koschorke, P., Muller, T. J., & Strik, W. (2008). Increased motor activity in cycloid psychosis compared to schizophrenia. *World Journal of Biological Psychiatry*, 30, 1-6.
- Yamaguchi, T., Shioji, I., Sugimoto, A., & Yamaoka, M. (2002). Psychological stress increases bilirubin metabolites in human urine. *Biochemical and Biophysical Research Communications*, 293, 517-520.
- Yao, J. K., & Reddy, R. D. (2005). Metabolic investigation in psychiatric disorders. *Molecular Neurobiology*, 31, 193-203.
- Yao, J. K., Reddy, R., & Van Kammen, D. P. (2000). Abnormal age-related changes of plasma antioxidant proteins in schizophrenia. *Psychiatry Research*, 97, 137-151.
- Yasukawa, R., Myaoka, T., Yasuda, H., Hayashida, M., Inagaki, T., & Horiguchi, J. (2007). Increased urinary excretion of biopyrrins, oxidative metabolites of bilirubin, in patients with schizophrenia. *Psychiatry Research*, 153, 203-207.
- Zanarini, F. F. (2001). Attainment and maintenance of reliability of axis I and II disorders: A longitudinal study. *Comprehensive Psychiatry*, 42, 369-374.