

مقاله پژوهشی
اصیل
Original
Article

اثربخشی رفتاردرمانی شناختی در درمان مبتلایان به چاقی

دکتر خیراله صادقی^۱، دکتر بنفشه غرابی^۱، دکتر لادن فنی^۱، دکتر سید ضیاء الدین مظہری^۲

Effectiveness of Cognitive-Behavioral Therapy in Treating Patients with Obesity

Kheirullah Sadeghi*, Banafsheh Gharraee ^a, Ladan Fata ^b, Seyed Ziaedin Mazhari ^c

Abstract

Objectives: The purpose of this study was to determine the effectiveness of cognitive-behavioral therapy in treating patients with obesity. **Method:** A single-case experimental trial of multiple-baseline type was carried out in two stages of losing and maintaining weight on four female patients with obesity. Patients with obesity in accord with Body Mass Index (BMI) responded to the Multidimensional Body-Self Relations Questionnaire (MBSRQ), Appearance Schemas Inventory (ASI), and Weight Efficacy Life-Style Questionnaire (WEL) at five stages of: baseline (pre-treatment), as well as sixth, twelfth, eighteenth, and twenty fourth sessions of treatment. Patients weighing was carried out at the beginning of each session. Data were presented using graphs and improvement rates. **Results:** Cognitive-behavioral treatment of obesity was effective in reducing weight and maintaining loss of weight and changes in body image satisfaction, personal beliefs about appearance and weight self-efficacy. **Conclusions:** Cognitive-behavioral therapy is effective in treating patients with obesity.

Key words: obesity; cognitive-behavioral therapy; weight loss

[Received: 28 July 2008; Accepted: 7 October 2009]

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی رفتاردرمانی شناختی در درمان مبتلایان به چاقی است. **روش:** یک کارآزمایی آزمایشی تک موردنی از نوع طرح خط پایه چندگانه فرآیند درمان، در دو مرحله کاهش و ابقای وزن، بر روی چهار بیمار زن چاق انجام شد. بیماران مبتلا به چاقی بر پایه شاخص توده بدن، در پنج مرحله خط پایه و جلسه‌های ششم، دوازدهم، هیجدهم و بیست و چهارم، پرسشنامه روابط چنان بعدی بدن - خود، پرسشنامه طرح واره‌های ظاهر و پرسشنامه سبک زندگی کارآمدی وزن را تکمیل نمودند. وزن کشی بیماران در آغاز هر جلسه درمان انجام می‌شد. داده‌ها به کمک رسم نمودار و محاسبه درصد بهبودی ارایه گردیدند. **یافته‌ها:** درمان شناختی رفتاری چاقی در کاهش وزن و ابقای آن مؤثر بود و به تغییراتی در رضایت از تصویر بدن، باورهای شخصی درباره ظاهر و خود کارآمدی وزن انجامید. **نتیجه‌گیری:** رفتاردرمانی شناختی در درمان مبتلایان به چاقی مؤثر است.

کلیدواژه: چاقی؛ رفتاردرمانی شناختی؛ کاهش وزن؛ ابقای وزن

[دریافت مقاله: ۱۳۸۷/۵/۷؛ پذیرش مقاله: ۱۳۸۸/۷/۱۵]

^۱ دکترای روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی کرمانشاه. کرمانشاه، خیابان عشایر، مرکز آموزشی-درمانی فارابی، گروه روانپردازی.
دورنگار: ۸۶۴۱۶۳-۸۳۱، (نویسنده مستنول).
^۲ دکترای تخصصی روانشناسی بالینی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی ایران، مرکز تحقیقات بهداشت روان و انسنتو روانپردازی تهران؛
^۳ دکترای روانشناسی بالینی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی ایران، مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی؛ متخصص تغذیه و رژیم درمانی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی ایران.

* Corresponding author: PhD. in Clinical Psychology, Kermanshah University of Medical Sciences. The Department of Psychiatry, Farabi training-therapeutic Center, Ashayer St., Kermanshah, Iran, IR. Fax: +98831-8264163. E-mail: kheirullahsadeghi@yahoo.com; ^a PhD. in Clinical Psychology, Assistant Prof. of Iran University of Medical Sciences, Mental Health Research Center, Tehran Psychiatric Institute;

^b PhD. in Clinical Psychology, Assistant Prof. of Iran University of Medical Sciences, Medical Education & Development Center;
^c Nutritionist, Associate Prof. of Iran University of Medical Sciences.

مقدمه

نشان داده‌اند. لیکن قطع دارو تقریباً به‌طور پایا افزایش دوباره وزن را در پی دارد. ۳- تغییر سبک زندگی: بازبینی یافته‌های چند کارآزمایی تصادفی شده (گروه پژوهش^{۲۲} DPP، ۲۰۰۲؛ تومیله‌تو^{۲۳} و همکاران، ۲۰۰۱؛ ولتون^{۲۴} و همکاران، ۱۹۹۸؛ پن^{۲۵} و همکاران، ۱۹۹۷؛ گروه پژوهش^{۲۶} MRFIT، ۱۹۹۰، به‌نقل از همان جا) که مداخله سبک زندگی را برای چاقی فراهم آوردن‌ند توانستند کاهش‌های کم اما به لحاظ بالینی معنی دار در وزن (۹/۱-۳/۲ کیلوگرم) پدید آورند. این مداخله‌ها عموماً در کوتاه مدت موفق، اما در ابقاء پایایی کاهش‌های وزن ناموفق بودند (به‌نقل از همان جا).

از آن‌جا که هدف تنها کاهش وزن نیست و بیشتر بررسی‌ها به ضعیف‌بودن دستاوردهای درمانی در درازمدت اشاره نموده‌اند، به تازگی رویکرد جدیدی برای تحلیل شناختی- رفتاری چاقی پدید آمده است (شافران^{۲۷} و دی‌سیلوا^{۲۸}، ۲۰۰۵). بر پایه این رویکرد، بیماران چاقی که وزن کم می‌کنند به دو دلیل در ابقاء موفقیت آمیز آن شکست می‌خورند: نخست آن‌که، آنان نه به هدف کاهش وزن دست می‌یابند و نه به مزیت‌های مورد انتظار ناشی از دستیابی به آن (هدف اولیه). دوم آن‌که، هنگامی که بیمار به هدف یا مزیت‌های لازم در زمینه ابقاء وزن پایین‌تر جدید را نادیده می‌انگارد و به جای آن عادت‌های خوردن و رفتار پیشین را از سر می‌گیرد و بدین ترتیب وزن کاسته شده دوباره بر می‌گردد (کوپر و فیربورن، ۲۰۰۱).

برپایه این تحلیل، سه موضوع اصلی در این درمان مورد توجه قرار گرفت (کوپر و فیربورن، ۲۰۰۲). نخست، کمک به بیمار در پذیرفتن کاهش وزنی که به آن دست یافته است؛ دوم، تشویق به پذیرش ثبات وزن و نه کاهش آن به عنوان هدف تشویق؛ سوم، کمک به بیمار برای فرآگیری مهارت‌های رفتاری و پاسخ‌های شناختی مورد نیاز برای کنترل

چاقی به زیادی چربی بدن یا توده بدنی بیش از حد با توجه به قد اشاره دارد که خطر ابتلا به بیماری‌های پزشکی را نزد فرد افزایش می‌دهد (مارکوس^۱، لوین^۲ و کلارچین^۳، ۲۰۰۳). روشی که به‌طور گسترده برای تعریف چاقی پذیرفته شده، شاخص توده بدن^۴ (BMI) می‌باشد که عبارت است از تقسیم وزن، بر حسب کیلوگرم بر مجدد قدر، بر حسب متر (ویلیامسون^۵، نیوتون^۶ و والدن^۷، ۲۰۰۶). سازمان جهانی بهداشت^۸ (۱۹۹۸) چاقی را به عنوان $BMI \geq 30$ تعریف کرده است.

چاقی یک مسئله مهم تندرنستی است (کوپر^۹ و فیربورن^{۱۰}، ۲۰۰۱). در ایالات متحده، ۳۴٪ جمعیت دچار اضافه‌وزن و آن‌ها مبتلا به چاقی هستند (براونل^{۱۱}، وادن^{۱۲} و فلان^{۱۳}، ۲۰۰۵). برآوردهای اضافه وزن، چاقی و چاقی مرضی (BMI ≥ 40) در ایران به ترتیب میزان‌های شیوع را (۲۸٪، ۱۰٪ و ۳/۴٪) نشان داده‌اند (بقایی، ۱۳۸۷). BMI بزرگ‌تر از ۲۵ در مردان، زنان و ساکنان شهر و روستا به ترتیب به میزان ۳۷٪، ۴۸٪ و ۴۶٪ و ۳۵٪ بود. این بررسی چاقی شکمی^{۱۴} را در ۴۳٪ زنان، ۹٪ مردان، ۲۸٪ ساکنان شهر و ۲۳٪ ساکنان روستا نشان داد. این یافته‌ها شواهد هشدار دهنده‌ای را در زمینه شیوع بسیار بالای چاقی عمومی و شکمی در ایران ارایه می‌دهند. عادات ناسالم مربوط به سبک زندگی، نقش بزرگی در پیدایش این مسئله بهداشت عمومی در جامعه‌ما دارند (دلاوری، کلیشادی، عالیخانی و علاء‌الدینی، ۱۳۸۶). از این رو می‌توان گفت که راه حل همه‌گیر چاقی نیازمند رویکردهای رفتاری و محیطی برای اصلاح رفتار خوردن و فعالیت جسمی است.

از دیدگاه بهداشت عمومی، گسترش مداخله‌های مؤثر بر درمان چاقی یک مسئله مهم به شمار می‌رود و سه گزینه بالینی مبتنی بر شواهد برای درمان وجود دارد:

۱- **درمان جراحی:** در دو کارآزمایی از این نوع (آندرسن^{۱۵} و همکاران، ۱۹۸۴؛ پروژه چاقی دانیش^{۱۶}، ۱۹۷۹، به‌نقل از پاول^{۱۷} و کالوین^{۱۸}، ۲۰۰۷)، کاهش‌های زیاد وزن، ۲۲٪ یا ۳۶٪ کیلوگرم، در دوسال پس از جراحی گزارش گردید، اما ابقاء آن برای مدت زمان پنج سال، سؤال برانگیز بود، ۲- **دارو درمانی:** یافته‌هایی به دست آمده از بررسی پایایی پنج کارآزمایی تصادفی شده (تورگرسون^{۱۹} و همکاران، ۲۰۰۴؛ هاپتمن^{۲۰} و همکاران، ۱۹۹۹؛ پایی-سانیر^{۲۱} و همکاران، ۲۰۰۶، به‌نقل از همان جا) مبنی بر این که درمان بیماران چاق به کمک داروها می‌تواند کاهش معنی دار بالینی در وزن، تقریباً ۳/۲ کیلوگرم، را در پی داشته باشد،

1- Marcus	2- Levin
3- Kalarchian	4- body mass index
5- Williamson	6- Newton
7- Walden	
8- Word Health Organization	
9- Cooper	10- Fairburn
11- Brownel	12- Wadden
13- Phelan	14- abdominal obesity
15- Andersen	16- Danish obesity project
17- Powell	18- Calvin
19- Torgerson	20- Hauptman
21- Pi-sunyer	
22- Diabetes Prevention Program	
23- Tuomilehto	24- Whelton
25- Pan	
26- Multiple Risk Factor Intervention Trial	
27- Shafran	28- de Silva

پژوهش از این جمعیت به روش در دسترس و از میان افرادی که مبتلا به چاقی بودند انتخاب شدند و سرند اولیه برای گزینش نمونه‌ای دارای معیارهای ورود انجام شد. معیارهای ورود عبارت بودند از: داشتن دست کم ۱۸ سال سن؛ حداقل تحصیلاتی در سطح دیپلم؛ BMI برابر یا بزرگ‌تر از ۳۰؛ باردارنبوتن یا عدم برنامه‌ریزی برای بارداری؛ دریافت نکردن داروهای روان‌گردان یا متأثر کننده وزن؛ نبود اختلال‌های روانی ایجاد کننده درمان‌های فوری؛ نبود اختلال‌های شخصیت؛ مبتلابودن به اختلال‌های خوردن، نداشتن استرس‌های شدید؛ دریافت نکردن هم‌زمان روان‌درمانی یا یک برنامه دیگر کاهش وزن. حجم نمونه پژوهش چهارنفر بود که پس از موافقت بیماران برای شرکت در پژوهش، درمان‌شناختی-رفتاری چاقی به گونه انفرادی بر روی آنها اجرا شد.

برای سرند اختلال‌های روانی همبود با چاقی و گردآوردن داده‌های پژوهش، ابزارهای زیر به کار گرفته شدند:

اصحابه بالینی ساختاریافته برای اختلال‌های محور I در DSM-IV^{۱۲} (SCID-I): یک اصحابه نیمه ساختاریافته برای تشخیص اختلال‌های محور I است که توسط فرست^{۱۳}، اسپیتر^{۱۴}، گیبون^{۱۵} و ویلیامز^{۱۶} (۱۹۹۷) ساخته شده است. این اصحابه برای ارزیابی اختلال‌های روانی همبود با چاقی، مانند نشانه‌های روان‌پریشی، اختلال بدشکلی بدن، افسردگی اساسی، گرایش به خودکشی و هم‌چنین اختلال‌های خوردن و کnar گذاشتن آنها به کار گرفته شد. اصحابه حاضر دارای روایی و پایابی خوبی برای تشخیص اختلال‌های روانی است (گرات-مارنات^{۱۷}).

شریفی و همکاران (۱۳۸۳) توافق تشخیصی برای بیشتر تشخیص‌های خاص و کلی را متوسط تا خوب گزارش نمودند (کاپای بالاتر از ۰/۶۰). توافق کلی (کاپای مجموع) برای تشخیص‌های فعلی ۰/۵۲ و برای کل تشخیص‌های طول عمر ۰/۵۵ بود.

- 1- addressing barriers to weight loss
- 2- increasing activity
- 3- addressing body image concerns
- 4- addressing weight goals 5- addressing primary goals
- 6- healthy eating 7- weight maintenance
- 8- single-subject experimental trial
- 9- multiple-baseline design across subjects
- 10- Barlow 11- Hersen
- 12- Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I Disorders
- 13- First 14- Spitzer
- 15- Gibbon 16- Williams
- 17- Groth-Marnat

موفقیت‌آمیز وزن. برای دستیابی به این هدف‌ها در راهنمای درمان، کوپر، فیربورن و هاوکر (۲۰۰۳) راهبردها و روش‌هایی مشخص نمودند و در چارچوب مجموعه‌ای از «مدول»‌ها، درمان را سامان دادند. این مدول‌ها عبارت‌بودند از: مدول I: آغاز درمان؛ مدول II: ثبت و ابقاء وزن؛ مدول III: پرداختن به موضع کاهش وزن؛ مدول IV: افزایش فعالیت؛ مدول V: پرداختن به نگرانی‌های تصویر بدن؛ مدول VI: پرداختن به هدف‌های وزن؛ مدول VII: پرداختن به هدف‌های اولیه؛ مدول VIII: خوردن سالم؛ مدول IX: ابقاء وزن.^۷

اگرچه ساخت نظری رفتاردرمانی شناختی برای چاقی پذیرفتی به نظر می‌رسد، در بازیبینی انجام شده، پژوهشگر به هیچ یافته‌ای درباره اثربخشی درازمدت این روش درمانی دست نیافت. هم‌چنین در جستجو بر روی پژوهش‌های انجام شده در این زمینه در ایران، پژوهشی که درباره درمان شناختی-رفتاری چاقی انجام شده باشد، دیده نشد. از سوی دیگر، از آن‌جا که در ادبیات مربوط به درمان‌های روان‌شناختی برای چاقی بیشتر به رفتاردرمانی پرداخته شده، مطرح ساختن اثربخشی رفتاردرمانی شناختی برای چاقی سرآغاز مناسبی برای سایر بررسی‌ها در این زمینه خواهد بود.

با توجه به آن‌چه بیان گردید، این پژوهش برای تعیین اثربخشی رفتاردرمانی شناختی در درمان مبتلایان به چاقی انجام شده است. فرضیه‌های پژوهش به شرح زیر بودند: فرضیه یکم: رفتاردرمانی شناختی در مرحله کاهش وزن به کاهش وزن بدن در بیماران مبتلا به چاقی منجر می‌شود. فرضیه دوم: رفتاردرمانی شناختی در مرحله ابقاء وزن به ثبات وزن بدن در بیماران مبتلا به چاقی می‌انجامد. فرضیه سوم: رفتاردرمانی شناختی در فرآیند درمان، افزایش رضایت از تصویر بدن در بیماران مبتلا به چاقی را در پی دارد. فرضیه چهارم: رفتاردرمانی شناختی در طی فرآیند درمان، کاهش باور (طرح‌واره)‌های مشخص بیماران چاق درباره ظاهر را به دنبال دارد. فرضیه پنجم: رفتاردرمانی شناختی به افزایش خودکارآمدی وزن در بیماران مبتلا به چاقی می‌انجامد.

روش

فرضیه‌های این پژوهش به کمک کارآزمایی آزمایشی تک آزمودنی^۸ از نوع طرح خط پایه چندگانه در میان چندین آزمودنی^۹ بررسی گردید (بارلو^{۱۰} و هرسن^{۱۱}، ۱۹۸۴). جامعه آماری پژوهش حاضر را زنان مراجعت کننده به کلینیک تغذیه و رژیم‌درمانی در شهر تهران تشکیل می‌دادند. آزمودنی‌های

نمونه پیش گفته در دو نوبت با فاصله دو هفته به ترتیب ۰/۷۸ برای ارزشیابی قیافه، ۰/۷۵ برای جهت گیری قیافه، ۰/۷۱ برای ارزشیابی تناسب اندام، ۰/۶۹ برای جهت گیری تناسب اندام، ۰/۸۴ برای وزن ذهنی و ۰/۸۹ برای رضایت بدنی به دست آمد که نشانه پایابی بازآزمایی رضایت بخش مقیاس است.

پرسشنامه طرح واره‌های ظاهر^۱ (ASI): کش (۱۹۹۰) این پرسشنامه را برای سنجش مفروضه‌های شناختی بنیادین مربوط به ظاهر پدید آورد. پرسشنامه ASI به ماده‌هایی توجه دارد که باورهای فرد را درباره اهمیت، معنا و اثرات ادراکی ظاهر بر زندگی اش نشان می‌دهند. کش (۱۹۹۰) بر پایه موضوع‌های اصلی مطرح در ادبیات مربوط به تصویر بدن، ماده‌ها و حوزه‌های زیر را درباره ظاهر نمونه‌برداری کردند: (الف) تمرکز توجه؛ (ب) سرمایه‌گذاری هیجانی / هویتی؛ (پ) باورهای فرد با توجه به اثرات تاریخچه و رشد؛ (ت) باورهای فرد درباره اثرات میان‌فردي کتونی و آینده؛ (ث) درون‌سازی باورهای کلیشه‌ای جامعه (همان‌جا). کش (همان‌جا) نشان داد که همسانی درونی ASI بر روی ۱۷۱ دانشجوی زن و مرد به ترتیب ۰/۸۲ و ۰/۷۹ می‌باشد. پایابی به روش بازآزمایی یک ماهه برای دانشجویان زن ۰/۷۱ بود.

در فرم فارسی ASI، که توسط پژوهشگران حاضر به فارسی برگردانده شد، ضرایب آلفای کرونباخ، بازآزمایی و دونیم‌سازی بر روی ۵۴ نفر از دانشجویان به ترتیب ۰/۷۵ و ۰/۸۲ و ۰/۷۸ به دست آمد. روایی این پرسشنامه نیز با بهره‌گیری از پرسشنامه MBSRQ محاسبه شد و همبستگی ۰/۸۰-۰/۸۸ به دست آمد. میانه ضرایب روایی پرسشنامه ASI با خرده‌مقیاس‌های ۰/۲۱-۰/۲۱ MBSRQ بود. وجود ضرایب منفی به این علت است که در نمره‌گذاری ASI به عقاید منفی شخص درباره ظاهرش، که همانند طرح واره عمل می‌کند، نمره داده می‌شود و نمره‌های بالاتر بیانگر باورهای منفی تر شخص درباره قیافه‌اش می‌باشند؛ در حالی که نمرات بالاتر در MBSRQ نشان دهنده رضایت بیشتر از تصویر بدن می‌باشند.

پرسشنامه سبک زندگی کارآمدی وزن^۲ (WEL): این پرسشنامه توسط کلارک^۳، آبرامز^۴، نیاپورا^۵، ایتون^۶ و روسی^۷ (۱۹۹۱) ساخته شد. در WEL از پاسخ‌گویان خواسته

صاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلال‌های شخصیت DSM-IV^۸ (SCID-II): یک مصاحبه تشخیصی نیمه‌ساختاریافته برای اختلال‌های شخصیت است که برای سنجش ۱۰ اختلال شخصیت محور دو DSM-IV، و هم‌چنین اختلال شخصیت افسرده و اختلال شخصیت منفعل - پرخاشگر در ضمیمه DSM-IV در سال ۱۹۹۷ تدوین شد. برای تشخیص محور II می‌تواند به صورت مقوله‌ای (وجود یا عدم وجود) یا ابعادی (با مورد توجه قراردادن شمار ملاک‌های اختلال شخصیت) به کار گرفته شود (فرست و همکاران، ۱۹۹۷). برای تعیین پایابی به روش بازآزمایی SCID توسط دو مصاحبه‌گر با فاصله زمانی دو هفته بر روی ۲۸۴ آزمودنی اجرا شد و ضرایب کاپا از ۰/۲۴ برای اختلال شخصیت وسوسی - جبری تا ۰/۷۴ برای اختلال شخصیت نمایشی در نوسان بود (باکاپای کلی ۰/۵۳) (فرست و همکاران، ۱۹۹۷). در پژوهش بختیاری (۱۳۷۹) روایی محتوایی نسخه ترجمه شده مصاحبه به وسیله سه تن از استادان روانشناسی تأیید شد و ضریب پایابی این ابزار نیز به روش بازآزمایی به فاصله یک هفته ۰/۸۷ به دست آمد.

در پژوهش حاضر، این مصاحبه برای ارزیابی اختلال‌های شخصیت همبود با چاقی، بهویژه اختلال‌های شخصیت مرزی و وسوسی - جبری و کنار گذاشتن آنها به کار گرفته شد.

شاخص توده بدن (BMI): این شاخص از تقسیم وزن (به کیلو گرم) بر مجدور قد (به متر) به دست می‌آید. وزن به کمک ترازوی پرتابل دیزیتالی آرزوم^۹ با حساسیت ۱۰۰ گرم سنجیده و قد نیز به کمک یک متر نواری غیرقابل اتساع به دقت ۰/۵ سانتی‌متر اندازه گیری شد.

پرسشنامه روابط چندبعدی بدن - خود^{۱۰} (MBSRQ): یکی از روش‌های سنجش بدگویی از تصویر بدن^{۱۱}، کاربرد پرسشنامه MBSRQ (کش، ۱۹۹۷) است. این پرسشنامه یک آزمون ۴۶ پرسشی است و برای سنجش روابط چندبعدی بدن - خود ساخته شده است. پرسش‌های آزمون، شش بعد روابط بدن - خود شامل ارزشیابی قیافه، جهت گیری قیافه، ارزشیابی تناسب اندام، جهت گیری تناسب اندام، وزن ذهنی و رضایت‌بدنی (اجزای بدن) را بر حسب مقیاس پنج درجه‌ای لیکرت از نمره یک = کاملاً مخالف تا نمره پنج = کاملاً موافق می‌سنجند. ویژگی‌های روان‌سنگی پرسشنامه MBSRQ در

برخی پژوهش‌ها مورد تأیید قرار گرفته است (همان‌جا).

در فرم فارسی این مقیاس (لوئیس، ۱۳۸۴)، ضرایب آلفای کرونباخ ماده‌های هریک از خرده‌مقیاس‌ها در مورد یک نمونه ۲۱۷ نفری از دانش‌آموزان به ترتیب ۰/۸۸، ۰/۸۳، ۰/۸۵، ۰/۸۱ و ۰/۹۱ و ۰/۹۴ گزارش گردید که نشانه همسانی درونی خوب پرسشنامه است. ضرایب همبستگی بین نمره‌های ۶۷ نفر از

- 1- structured clinical Interview for DSM- IV Personality Disorders
- 2- Arzum
- 3- Multidimensional Body-Self Relations Questionnaire
- 4- body image disparagement
- 5- Cash
- 6- Appearance Schemas Inventory
- 7- Weight Efficacy Life-Style Questionnaire
- 8- Clark
- 9- Abrams
- 10- Naura
- 11- Eaton
- 12- Rossi

ششم، دوازدهم، هیجدهم و بیست و چهارم همه پرسشنامه هایی که در مرحله خط پایه به بیماران داده شده بود، دوباره توسط آنها تکمیل گردید. بیماران در هر جلسه، پیش از شروع درمان، وزن کشی می شدند و عدد روی ترازو جلوی دیدگان آنها در نومادر وزن یادداشت می گردید.

درمان حاضر برای بیماران انتخابی با ارزیابی شناختی- رفتاری، صورت بندی شخصی مشکل و توضیح منطق، ساختار و پیامد احتمالی درمان آغاز شد. چارچوب استاندارد جلسه های بعدی شامل وزن کشی بیمار، بازبینی یادداشت ها و تکالیف خانگی، تعیین دستور کار برای باقی مانده جلسه، فرآوری مطالب دستور کار، واگذاری تکالیف خانگی، خلاصه سازی و دریافت بازخورد از بیمار بود. اجرای درمان ۱۱ ماه (۴۴ هفته) به درازا کشید و به صورت فردی اجرا شد. این درمان دارای دو مرحله بود: کاهش وزن و ابقای آن. هدف مرحله نخست هم کاهش وزن بود (مدول های I-IV) و هم پرداختن به موانع بالقوه برای پذیرش ابقاء وزن (مدل های V-VIII). مرحله یکم تا ۳۰ هفته نخست درمان (جلسه هیجدهم) ادامه یافت. هدف مرحله دوم (مدول IX) ثبات وزن و فرآگیری مهارت های ابقاء آن بود و نزدیک به ۱۴ هفته طول کشید.

همان گونه که پیشتر گفته شد، این درمان دربر گیرنده نه مدل بود که به صورت پیاپی یا به موازات هم ارایه و به شیوه ای انعطاف پذیر، متناسب با نیاز های یک بیمار خاص، به کار گرفته شدند. درمان در ۲۴ جلسه (به اضافه یک جلسه ارزیابی اولیه) با قرار دیدار قبلی انجام شد. جلسات هر هفته یک بار برای ۶ هفته اول، پس از آن هر دو هفته یک بار تا هفته ۳۸، و بالاخره دو جلسه پایانی هر سه هفته یک بار تا هفته ۴۴ تشکیل شد. مدت زمان جلسات بین ۴۵ تا ۶۰ دقیقه بود و در درمانگاه انسیتیور و اپیزشکی تهران برگزار شد. برای عینی سازی داده ها از تحلیل ترسیمی (دیداری^۲) و محاسبه درصد بهبودی (او گلز^۳، لونر^۴ و بونستیل^۵، ۲۰۰۱) بهره گرفته شد:

$$\frac{\Delta A_1 - A_1}{A_0}$$

نمره پرسشنامه مورد نظر در خط پایه، A₁ نمره همان پرسشنامه در جلسه آخر و %ΔA میزان بهبودی است.

یافته ها

در جدول ۱ برخی ویژگی های جمعیت شناختی و درمانی بیماران آورده شده است.

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| 1- General Self-Efficacy | 2- Sherer |
| 3- Adams | |
| 4- Social Validation Criterion | |
| 5- Assessment checklist | |
| 6- graphic (visual) analysis | 7- Ogles |
| 8- Lunner | 9- Bonesteel |

می شود تا اعتمادشان را در خودداری از خوردان در بیست موقعیت اغوا کننده درجه بندی کنند. ماده ها به کمک یک مقیاس ۱۰ گزینه ای درجه بندی شده اند؛ نمره های بالاتر، اعتماد بیشتر به خود را نشان می دهند. WEL بیست ماده ای پنج عامل موقعیتی را دربر می گیرد: هیجان های منفی، قابلیت دسترسی، فشار اجتماعی، ناراحتی جسمی و فعالیت های مثبت. یافته های به دست آمده از دو بررسی درمانی- بالینی جداگانه (N=۳۸۲) نشان داد که WEL نسبت به تغییرات در نمره کل و به همین ترتیب نسبت به زیر مجموعه ای از نمره های پنج عامل موقعیتی حساس است. همسانی درونی WEL نیز خوب گزارش شده است (کلارک و همکاران، ۱۹۹۱).

در فرم فارسی WEL، که توسط پژوهشگران حاضر به فارسی برگردانده شد، ضرایب آلفای کرونباخ، بازآزمایی و دونیم سازی بر روی ۵۸ نفر از دانشجویان به ترتیب ۰/۹۴ و ۰/۹۱ به دست آمد. روایی همزمان WEL به کمک پرسشنامه خود کارآمدی عمومی^۱ (GSE) (شرر^۲ و آدامز^۳، ۱۹۸۳/۰/۲۱) بود. علت پایین بودن این ضریب همبستگی این است که GSE بیشتر جنبه های عمومی تر خود کارآمدی را می سنجد و نه اختصاصاً خود کارآمدی مربوط به وزن را. همچنین، به عنوان ملاک روابط اجتماعی^۴ از یکی از هم اتفاقی ها و دوستان نزدیک آزمودنی خواسته شد تا میزان خودداری وی از خوردان در موقعیت های وسوسه انجیز را بر پایه یک مقیاس دهنقطه ای درجه بندی نماید. ضریب همبستگی بین درجه بندی اشخاص نزدیک و نمره های آزمودنی ها در پرسشنامه WEL ۰/۴۲ بود.

روش درمان مبتنی بر الگوی رفتار درمانی شناختی برای چاقی (کوپر، فیربورن و هاوکر، ۲۰۰۳) بود. پس از ارجاع بیماران از سوی متخصص تغذیه و رژیم درمانی، با محاسبه BMI، و سرنده اختلال های روانی همبود با بهره گیری از SCID I/II (فرست، اسپیترز، گیبون و ویلیامز، ۱۹۹۷)، چهار بیمار زن دچار چاقی انتخاب شدند. آن گاه برای گرفتن تاریخچه وزن، چک لیست ارزیابی^۵ اجرا، و در صورت تمایل بیماران برای شرکت در طرح درمان، رضایت نامه آگاهانه گرفته می شد. برای اجرای انفرادی درمان، برای بیمار اول یک هفته خط پایه تشکیل شد و در مرحله خط پایه پرسشنامه های MBSRQ، ASI و WEL تکمیل گردید. طبق اصول طرح های خط پایه چندگانه، در جلسه دوم بیمار اول، بیمار دوم وارد طرح درمان شد؛ به همین ترتیب، در جلسه سوم بیمار اول و جلسه دوم بیمار دوم، طرح درمان برای بیمار سوم آغاز گردید. تا این که چهار بیمار یکی پس از دیگری وارد طرح درمان شدند. هم چنین، به هنگام اجرای درمان در جلسه های

نمودارها (شکل ۱) فرضیه اول و دوم پژوهش را تأیید می‌کنند. نمره‌های بیماران در پرسشنامه روابط چندبعدی بدن- خود، پرسشنامه طرح‌واره‌های ظاهر و پرسشنامه سبک زندگی کارآمدی وزن در جدول ۳ ارایه شده است. نمره‌های پرسشنامه‌های روابط چندبعدی بدن- خود و طرح‌واره‌های ظاهر نشان داد که روش درمانی مورد نظر در افزایش رضایت از تصویر بدن و هم‌چنین کاهش باورهای منفی بیماران درباره ظاهر تا حدی مؤثر بوده است (به ترتیب با بهبودی ۲۹٪ و ۳۴٪). این یافته‌ها هر چند گویای تأییدنشدن فرضیه‌های سوم و چهارم پژوهش بود، همین نتایج هم از نظر بالینی مهم شمرده می‌شوند. و بالاخره، نمره‌های پرسشنامه سبک زندگی کارآمدی وزن نشان داد که مداخله مورد نظر در ارتقای خودکارآمدی وزن بیماران چاق تا اندازه‌ای مؤثر بود (۴۶٪ بهبودی) که گویای تأیید فرضیه پنجم پژوهش است.

جدول ۲ وزن هر یک از بیماران را پیش از آغاز مداخله و در مرحله‌های کاهش و ابقاء وزن نشان می‌دهد. میزان کاهش وزن در سه بیمار اول (۱۰٪)، دوم (۸٪) و سوم (۱۰٪) از نظر بالینی معنی‌دار بود، اما در وزن بیمار چهارم کاهش بالینی چشم‌گیری پیدید نیامد (۴٪). در کل، رفتاردرمانی شناختی برای چاقی، کاهش ۸٪ از وزن اولیه بدن را به دنبال داشت.

هم‌چنان که جدول ۲ نشان می‌دهد در جلسه‌های هیجدهم تا بیست و چهارم، غیر از بیمار سوم، تغییرات وزن سایر بیماران خارج از نوسان‌های طبیعی هفتگی نیست و در محدوده چهار کیلوگرم از مقدار میانگین (خطوط ریل^۱) قرار دارد. تماس‌های تلفنی به مدت سه ماه پس از درمان، با فاصله زمانی یک ماه، نشان‌دهنده ابقاء وزن کاسته شده بود. شکل ۱، اثربخشی نسبی مداخله رفتاردرمانی شناختی برای چاقی را در مرحله‌های کاهش و ابقاء وزن نشان می‌دهد. در مجموع داده‌های کمی و کاهش و ابقاء وزن نشان می‌دهد. در مجموع داده‌های کمی و

جدول ۱- ویژگی‌های جمعیت شناختی و درمانی بیماران*


سن	میزان تحصیلات	وضعیت تأهل	قد (متر)	وزن (کیلوگرم)	شاخص توده بدن (کیلوگرم بر مترمربع)	طبقه چاقی
۳۵	دانشجوی دکترا	متاهل	۱/۶۹	۱۱۷/۷	۴۱/۱۵	III طبقه
۲۷	دانشجوی کارشناسی ارشد	مجرد	۱/۵۴	۷۷/۹	۲۲/۸۵	I طبقه
۲۷	دیپلم	متأهل	۱/۷۰	۹۵/۴	۳۲/۱۰	I طبقه
۳۶	کارشناسی	متأهل	۱/۶۲	۹۷/۹	۳۷/۴	II طبقه

* هر چهار بیمار زن بوده‌اند

112
112

جدول ۲- مقایسه وزن بیماران (بر حسب کیلوگرم) و درصد کاهش آنها

درمان	ایمارات	ایمارات	ایمارات	ایمارات	جلسة‌های درمان	ایمارات	ایمارات	ایمارات	ایمارات	ایمارات	ایمارات
۹۳/۶	۸۵/۵	۷۳/۷	۱۰۶/۱	۱۴	۹۷/۹	۹۶/۰	۷۷/۹	۱۱۷/۷	۰		
۹۲/۹	۸۶/۲	۷۲/۷	۱۰۶/۶	۱۵	۹۶/۴	۹۵/۶	۷۵/۷	۱۱۶/۹	۱		
۹۴/۵	۸۷/۱	۷۱/۶	۱۰۵/۷	۱۶	۹۵/۰	۹۵/۱	۷۵/۵	۱۱۵/۷	۲		
۹۳/۹	۸۸/۸	۷۲/۳	۱۰۸/۰	۱۷	۹۵/۰	۹۴/۲	۷۵/۶	۱۱۴/۹	۳		
۹۳/۸	۸۶/۰	۷۱/۴	۱۰۶/۲	۱۸	۹۴/۲	۹۳/۷	۷۴/۸	۱۱۳/۹	۴		
۹۳/۰	۸۵/۶	۷۴/۰	۱۰۸/۴	۱۹	۹۴/۰	۹۲/۴	۷۳/۶	۱۱۴/۰	۵		
۹۴/۳	۸۵/۰	۷۳/۸	۱۰۶/۰	۲۰	۹۳/۳	۹۱/۶	۷۳/۵	۱۱۲/۵	۶		
۹۳/۹	۸۵/۳	۷۳/۷	۱۰۶/۲	۲۱	۹۵/۳	۹۰/۰	۷۴/۲	۱۱۲/۶	۷		
۹۴/۶	۸۴/۳	۷۳/۸	۱۰۶/۱	۲۲	۹۳/۲	۸۹/۶	۷۲/۸	۱۱۲/۶	۸		
۹۴/۰	۸۴/۱	۷۳/۹	۱۰۴/۷	۲۳	۹۲/۲	۸۹/۱	۷۳/۵	۱۱۲/۱	۹		
۹۳/۲	۸۴/۲	۷۳/۱	۱۰۴/۵	۲۴	۹۱/۷	۸۸/۳	۷۳/۴	۱۱۲/۰	۱۰		
%۵	%۱۲	%۶	%۱۱	میزان بهبودی	۹۳/۳	۸۷/۶	۷۲/۷	۱۱۰/۶	۱۱		
				بهبودی کلی	۹۲/۷	۸۶/۷	۷۴/۰	۱۰۸/۹	۱۲		
					۹۴/۷	۸۶/۲	۷۳/۲	۱۰۷/۵	۱۳		



شکل ۱- اثربخشی مداخله رفتار درمانی شناختی برای چاقی در کاهش و ابقای وزن بیماران اول تا چهارم

جدول ۳- مقایسه نمره‌های بیماران در پرسش‌نامه روابط چند بعدی بدن - خود، پرسش‌نامه طرح‌واره‌های ظاهر و پرسش‌نامه سبک زندگی کارآمدی وزن

بیماران	ابزارها	خط پایه	ششم	دوازدهم	هیجدهم	بیست و چهارم	میزان بهبودی	بهبود کلی	جلسه‌های درمان	
									%۲۹	%۲۲
اول	MBSRQ	۱۵۰	۱۵۵	۱۶۲	۱۶۶	۱۹۳	۷/۴۴	۷/۲۷	۷/۲۱	۷/۲۹
		۱۱۴	۱۴۶	۱۵۳	۱۸۱	۲۰۴	۷/۴۳	۷/۳۷	۷/۴۳	۷/۴۴
		۱۴۷	۱۵۹	۱۶۵	۱۷۷	۲۰۲	۷/۳۳	۷/۳۱	۷/۴۶	۷/۴۳
		۱۱۸	۱۲۶	۱۳۶	۱۳۰	۱۴۹	۷/۲۱	۷/۲۱	۷/۲۱	۷/۲۱
دوم	ASI	۵۷	۵۵	۴۹	۴۹	۴۵	۷/۲۱	۷/۳۴	۷/۲۱	۷/۲۹
		۴۶	۳۶	۲۹	۲۹	۲۶	۷/۴۳	۷/۴۳	۷/۴۳	۷/۴۴
		۴۹	۴۶	۴۱	۳۱	۳۱	۷/۳۷	۷/۳۳	۷/۳۳	۷/۴۴
		۵۴	۵۴	۵۲	۴۵	۳۶	۷/۴۳	۷/۴۶	۷/۴۶	۷/۴۴
سوم	WEL	۱۰۷	۱۰۷	۱۴۶	۱۵۲	۱۶۰	۷/۶۶	۷/۳۱	۷/۶۷	۷/۶۶
		۱۰۷	۱۰۹	۱۴۷	۱۴۹	۱۵۶	۷/۳۱	۷/۶۷	۷/۶۷	۷/۶۶
		۵۵	۶۱	۱۴۰	۱۶۳	۱۶۸	۷/۶۷	۷/۶۱	۷/۶۱	۷/۶۶
		۸۳	۹۱	۱۰۰	۱۰۱	۱۰۵	۷/۶۱	۷/۶۱	۷/۶۱	۷/۶۶
چهارم										

موضوع مورد توجه این است که اگرچه مفهوم وزن‌های هدف، معقول، محسوس و انسانی است، لیکن چنین هدف‌هایی با چشم‌داشت‌های بیماران همسان نیستند و نشان‌دهنده ضرورت کمک به بیماران برای پذیرش پیامدهای کاهش وزن ناچیز است.

بررسی فرضیه دوم پژوهش در زمینه اثر رفتاردرمانی شناختی بر ابقاء وزن کاسته شده، نشان داد که تغییرات وزن بیماران (به جز بیمار سوم) در داخل خطوط ریل (محدوده چهار کیلوگرم از مقدار میانگین) است و نشان از تایید فرضیه دوم و روش درمانی پیشنهادی از سوی کوپر، فیربورن و هاوکر (۲۰۰۳) دارد که در آن درمان‌گر پیش از ورود به مرحله ابقاء وزن (مدول IX)، تلاش نمود تا به موانع شناختی پذیرش ابقاء وزن (مدول‌های V-VIII) به عنوان هدفی در مرحله دو پردازد.

با توجه به این که مرحله ابقاء، بر پایه راهنمای درمان (کوپر و همکاران، ۲۰۰۳)، تنها چهارماه به درازا کشید این پرسش مطرح است که به دنبال قطع درمان چه رخ می‌دهد؟ یک یافته پایا این است که در پیشتر بیماران چاق (حدود ۸۵٪)، تقریباً نیمی از وزن کاسته شده در ضمن نخستین سال

یافته‌های این پژوهش فرضیه یکم پژوهش مبنی بر تأثیر رفتاردرمانی شناختی بر کاهش وزن را تأیید نمود. اگرچه این کاهش ناچیز وزن (۸٪ وزن اولیه بدن) تا دسترسی به وزن ایده‌آل، آن‌گونه که به وسیله بیماران اظهار شده (۳۳٪ کاهش وزن) فاصله بسیاری دارد؛ اما همین تغییرات ناچیز نیز ارزشمند دانسته شده است (بلکبورن، ۱۹۹۵). برخی بر این باورند که بسیاری از بیماری‌های مرتبط با چاقی، همچون دیابت، پرفشاری خون و هیپرلیپیدمی با کاهش‌های ناچیز ۱۰-۱۵٪ وزن بدن به طور معنی‌داری بهبود یافته‌اند (بلکبورن، ۱۹۹۵). سایر عامل‌های حمایت‌گر برای کنارگذاشتن وزن‌های ایده‌آل، شناسایی نقش عامل‌های زیستی و ارثی در تنظیم وزن بدن (بوچارد، ۱۹۹۴)، این باور که تغییرات جزیی در وزن و رفتار بهتر از تغییرات چشم‌گیر در درازمدت حفظ می‌شوند (وادن، فوستر و لتیزیا، ۱۹۹۲) و به حساب آوردن فشارهای بیش از حد فرهنگی برای دستیابی به لاغری ایده‌آل، به ویژه برای زنان، می‌باشد (براونل و وادن، ۱۹۹۱) هم‌چنین این یافته با معیاری که از سوی انتیتو پزشکی فرهنگستان ملی علوم (۱۹۹۵) برای ارزیابی برنامه‌های کترول وزن تعیین شده و موفقیت درمان را به عنوان «کاهش پنج تا ۱۰ درصدی وزن که دست کم به مدت یک سال حفظ شده باشد» دانسته است.

۱۱۴
۱۱۴

بر تغییرات تصویر بدن تأثیر داشته باشند (سارور و تامپسون^{۱۱}، ۲۰۰۲).

سن شروع چاقی نیز ممکن است یک تعیین کننده حساس تغییرات در رضایت از تصویر بدن به شمار آید. هنگامی که افراد با شروع چاقی در بزرگسالی، به وزنی که از نظر اجتماعی پذیرفتی است دست یابند، گرایش به خشنودی از ظاهرشان در آنها پدید می‌آید. این موضوع در افراد با شروع زودرس چاقی مصدق ندارد. این یافته شاید گویای آن باشد که سازه تصویر بدن در دوران پیش از نوجوانی پدید می‌آید (آدمی^{۱۲} و همکاران، ۱۹۹۸). از این رو کوپر و همکاران (۲۰۰۳) درمان تصویر بدن در طی مرحله ابقای وزن را حساس ترین سازوکار^{۱۳} برای ابقاء موفقیت‌آمیز و درازمدت وزن می‌دانند.

یافته‌های این پژوهش نشان داد که اثر درمان بر کاهش باور (طرح‌واره)‌های شخصی بیماران چاق درباره ظاهر به تغییرات کمی (٪۳۴) در چهار بیمار انجامیده است (فرضیه چهارم پژوهش). یکی از ویژگی‌های طرح‌واره‌های ظاهر، به عنوان بازنمای شناختی تصویر بدن، خودپایدارسازی^{۱۴} و مقاومت در برابر تغییر است (کش، ۱۹۹۶). از این رو، چون روند بهبود طرح‌واره‌ها دشوار و طولانی است، مقدار ناچیز تغییر می‌تواند از نظر بالینی معنی دار به شمار رود. این مقدار تغییر می‌تواند دست کم از میزان و مدت زمان فعال شدن طرح‌واره‌ها در ذهن و شدت عاطفه همبسته با آنها بکاهد (یانگک، کلوسکو^{۱۵} و ویشار، ۱۹۰۳).

فرضیه پنجم به بررسی اثر درمان در افزایش خودکارآمدی وزن بیماران پرداخت. نتایج نشان داد که مداخله مورد نظر در ارتقای خودکارآمدی تا حد متوسطی (٪۴۶) مؤثر بوده است. خودکارآمدی (بندورا^{۱۶}، ۱۹۹۷) در انسواع گوناگونی از بافت‌های درمانی از جمله سوء‌صرف مواد تأیید شده است. آبرامز و نیایورا، ۱۹۸۷، به نقل از کلارک و همکاران، ۱۹۹۱. برنیر^{۱۷} و آوارد^{۱۸} (۱۹۸۶)، به نقل از همان‌جا) خودکارآمدی

پس از درمان و بقیه آن با گذشت سه تا پنج سال پس از درمان، بازگشته یا حتی فراتر رفته‌اند (جفری^۱ و همکاران، ۲۰۰۰). در زمینه پیش‌بین‌های روان‌شناختی افزایش دوباره وزن در چاقی، دو عامل بالقوه و احتمالی شناسایی شدن: ۱- عامل شناختی (تفکر دو مقوله‌ای^۲- متغیر تاریخچه‌ای (حداکثر وزن در طول زندگی^۳) (بیرن^۴، کوپر و فیربورن، ۲۰۰۴). تفکر دو مقوله‌ای کلی قوی ترین پیش‌بین افزایش دوباره وزن بود. اشخاص دارای سبک تفکر دو مقوله‌ای ممکن است بیش از افراد دارای سبک تفکر انعطاف‌پذیر، شکست جزیی در وزن هدف را به عنوان شاهدی از شکست کلی به شمار آورند و کاهش وزنی را که به آن دست یافته‌اند ناکافی و غیر رضایت‌بخش بدانند (همان‌جا). این یافته که تفکر دو مقوله‌ای، پیش‌بین معنی‌داری برای افزایش دوباره وزن است، یانگر آن است که اصلاح این سبک تفکر می‌تواند روند افزایش دوباره وزن را کاهش دهد و ابقاء وزن را بهبود بخشد.

بررسی فرضیه سوم پژوهش مبنی بر اثر درمان در افزایش میزان رضایت از تصویر بدن نشان داد که روش مورد نظر در بهبود رضایت از تصویر بدن تا اندازه‌ای (٪۲۹) مؤثر است. بهنظر می‌رسد که زنان چاق بیش از زنان غیر چاق از تصویر بدن خود ناخشنودند، و از این رو آنها بیشتر در جستجوی کاهش وزن بر می‌آیند (روسن^۵، ۲۰۰۲). کاهش وزن ممکن است مشهورترین روش درمان تصویر بدن باشد (سارور، گراس‌بارت^۶ و دی‌دی^۷، ۲۰۰۱)، اما این روش تأثیر اندکی در زمینه بهبودی در تصویر بدن افراد چاق دارد (کوپر و همکاران، ۲۰۰۳). این موضوع که بهبودی تصویر بدن ارتباط ناچیزی با مقدار کاهش وزن دارد، با نظریه «تصویر بدن بازمانده» (کش، ۱۹۹۰)، که باور دارد برخی افراد که وزن کم کرده‌اند هنوز نارضایتی شدید از تصویر بدن را، همانند افراد دچار اضافه وزن، تجربه می‌کنند، هم‌سویی دارد.

هم‌چنین، این یافته که کاهش بیشتر وزن با بهبودی بیشتر در تصویر بدن همراه نیست، وجود یک «آستانه کاهش وزن»^۸ را مطرح می‌سازد. گاهی کاهش کم وزن ممکن است بهبودی معنی‌داری را در تصویر بدن پدید آورد، اما بهبودی‌های بیشتر ممکن است با کاهش زیاد وزن همراه نباشند. این یافته گویای آن است که عامل‌هایی غیر از وزن (یا کاهش وزن)، همچون عزت‌نفس و سبک اسناد، ممکن است

- عوامل خطر بیماری‌های غیرمسری.** کتابچه مقالات ارایه شده در اولین کنگره پیش‌گیری و درمان چاقی در ایران. انتیتو گدد و متابولیسم دانشگاه شهید بهشتی، ۴-۶ آسفند ماه ۱۳۸۶، انجمن علمی پیشگیری و درمان چاقی ایران.
- شریفی، ونداد؛ اسعدی، سیدمحمد؛ محمدی، محمد رضا؛ امینی، همایون؛ سمنانی، یوسف؛ شعبانی، امیر؛ شهریور، زهرا؛ داوری آشیانی، رزیتا؛ حکیم شوستری، میتراء؛ صدیق، ارشیا؛ جلالی روتساری، محسن (۱۳۸۳). پایابی و قابلیت اجرای نسخه فارسی مصاچه ساختاری یافته تشخیص برای SCID-DSM-IV (SCID-DSM-IV).
- فضانامه تازه‌های علوم شناختی**، سال ششم، شماره ۱ و ۲، ۱۰-۲۲.
- کوپر، زفرا؛ فیربورن، کریستوفر، جی؛ هاوک، دیبورا، آم. (۱۳۸۸). درمان شناختی-رفتاری چاقی: راهنمای عملی برای متخصصان بالینی. ترجمه دکتر خیراء... صادقی، ویراستاری دکتر بنفشه غرابی. تهران: انتشارات پایگان، چاپ اول.
- لوئیس، راندا (۱۳۸۴). آزمون‌های شخصیت. ترجمه: محمدعالی بشارت و محمد حبیب‌نژاد. تهران: نشر آریث. چاپ اول.
- Adami, G. F., Gandolfo, P., Campostano, A., Meneghelli, A., Revera, G., & Scopinaro, N. (1998). Body image and body weight in obese patients. *International Journal of Eating Disorders*, 24, 299-300.
- Bandura, A. (1997). *Self-efficacy: The exercise of control* (1st. ed.). New York: W. H. Freeman & Company.
- Barlow, D. H., & Hersen, M. (1984). *Single-case experimental designs: Strategies for studying behavior change*. Massachusetts: Allyn & Bacon.
- Blackburn, G. L. (1995). Effect of degree of weight loss on health benefits. *Obesity Research*, 3, 211s-216s.
- Bouchard, C. (Ed.) (1994). *The genetic of obesity*. Boca Raton, FL: CRC Press.
- Brownell, K. D., & Wadden, T. A. (1991). The heterogeneity of obesity: Fitting treatments to individuals. *Behavior Therapy*, 22, 155-177.
- Brownell, K. D., Wadden, T. A., & Phelan, S. (2005). Obesity: In B. J. Sadock, & V. A. Kaplan (Eds.), *Kaplan and Sadock's comprehensive textbook of psychiatry*. (8th. ed., pp. 2124-2136). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
- Byrne, S. M., Cooper, Z., & Fairburn, C. G. (2004). Psychological predictors of weight regain in obesity. *Behavior Research and Therapy*, 2, 1341-1356.
- Cash, T. F. (1990). The psychology of physical appearance: Aesthetics, attributes, and images. In T. F. Cash & T. Pruzinsky (Eds.). *Body images: Development, deviance, and change* (pp. 51-79). New York: Guilford Press.

پیش از درمان را به طور معنی‌داری با کاهش وزن همبسته دانسته‌اند. در این پژوهش نیز بیمارانی که بیشترین کاهش وزن را داشتند، از بیشترین تغییرات خود کارآمدی نیز برخوردار بودند. این یافته‌با نظریه بندورا (۱۹۹۷) که «خود کارآمدی پدید آمده در اثر تغییرات کوچک اما پایدار وزن می‌تواند دلبستگی مداوم به ابقاء تغییرات در مدت زمان طولانی‌تر را افزایش دهد» همانگ است.

در این بررسی میزان قطع درمان ۳۳٪ بود و هیچ‌یک از بیماران در جستجوی درمانی دیگر برنیامدند. این میزان افت با میزان‌های افت گزارش شده در بررسی‌های درمانی افراد چاق، که در دامنه ۲۲٪ تا ۵۰٪ نوسان داشته‌اند (کلارک و همکاران، ۱۹۹۱)، مقایسه‌پذیر است. قطع زودرس درمان می‌تواند شکلی از مقاومت به‌شمار رود (فیربورن و همکاران، ۲۰۰۳).

نبودن دوره پی‌گیری، گروه کنترل، نمونه‌های مرد مبتلا به چاقی و مبتلایان به اختلال پرخوری افراطی از محدودیت‌های این پژوهش و تعیین‌پذیری بیشتر یافته‌ها، پیشنهاد اعتبار یافته‌های پژوهش و تعیین‌پذیری بیشتر یافته‌ها، پیشنهاد می‌شود در بررسی‌های آینده، طرح حاضر با دیگر بیماران چاق با حجم نمونه بیشتر و گروه کنترل به اجرا درآید. هم‌چنین، ارزش ترکیب رویکردهای سبک زندگی، دارویی و یا جراحی برای درمان چاقی سنجیده شود.

116
116

سپاسگزاری

بدین وسیله از آقایان دکتر بهروز بیرشک، دکتر علی منتظری، دکتر حسن حمیدپور و آقای امین اسدالهی‌پور و خانم‌ها دکتر پروانه محمدخانی، عزیزه افخم ابراهیمی، هاجر پهلوانی و سایر کارکنان درمانگاه انتیتو روانپزشکی تهران که نویسنده را در اجرای پژوهش یاری نمودند، قدردانی می‌شود.

[با به اظهار نویسنده مسئول مقاله، حمایت مالی از پژوهش و تعارض منافع وجود نداشته است.]

منابع

- بقایی، مازیار (۱۳۸۷). تحلیلی آماری درباره بحران چاقی در ایران. *ماهنشمه علمی-اجتماعی/دارو درمان*، سال پنجم، شماره ۵۹، ۳۶-۳۷.
- بختیاری، مریم (۱۳۷۹). بررسی اختلال روانی در مبتلایان به اختلال بدشکلی بدن. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی‌بالینی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، انتیتو روانپزشکی تهران.
- دلاری، علی؛ کلیشادی، روبیا؛ عالیخانی، سیامک؛ علاءالدینی، فرشید (۱۳۸۶). شیوع چاقی و سبک زندگی ملی در ایران: یافته‌های اولین پژوهش ملی

- Cash, T. F. (1996). The treatment of body image disturbances. In J. K. Thompson (Ed.), *Body image, eating disorders, and obesity* (pp. 83-107). Washington, DC: American Psychological Association.
- Cash, T. F. (1997). *The body image workbook: An 8-step program for learning to like your looks*. New Harbinger: Oaklans.
- Clark, M. M., Abrams, D. B., Niaura, R. S., Eaton, C. A., & Rossi, J. S. (1991). Self-efficacy in weight management. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 59, 239-744.
- Cooper, Z., & Fairburn, C. G. (2001). A new cognitive behavioral approach to the treatment of obesity. *Behavior Research and Therapy*, 39, 499-511.
- Cooper, Z., & Fairburn, C. G. (2002). Cognitive-behavioral treatment of obesity. In T. A. Wadden & A. J. Stunkard (Eds.), *Handbook of obesity treatment* (pp. 465-479). New York: Guilford Press.
- Cooper, Z., Fairburn, C. G., & Hawker, D. M. (2003). *Cognitive behavioral treatment of obesity: A clinician's guide*. New York: Guilford Press.
- First, M. B., Gibbon, M., Spitzer, R. L., Williams, J. B. W., & Benjamin, L. (1997). Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis II Disorders (SCID-II). *Washington, DC: American Psychiatric Association*.
- First, M. B., Spitzer, R. L., Gibbon, M., & Williams, J. B. W. (1997). Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I Disorders (SCID-I), Clinical Version. *Washington, DC: American Psychiatric Association*.
- Groth-Marnat, G. (1997). *Handbook of psychological assessment* (9th. ed.). New York: John Wiley & Sons.
- Institute of Medicine of the National Academy of Sciences (1995). *Weighing the options: Criteria for evaluating weight management programs*. Washington, DC: National Academy Press.
- Jeffery, R. W., Drewnowski, A., Epstein, L. H., Stunkard, A. J., Wilson, G. T., & Wing, R. R. (2000). Long-term maintenance of weight loss: Current Status. *Health Psychology*, 19, 5-16.
- Marcus, M. D., Levine, M. D., & Kalarchian, M. A. (2003). Cognitive-behavioral interventions in the management of severe pediatric obesity. *Cognitive and Behavioral Practice*, 10, 147-156.
- Metropolitan Life Foundation (1983). 1983 Metropolitan Height and Weight Tables. *Statistical Bulletin*. 64910, 2-9.
- Ogles, B. M., Lunner, K. M., & Bonesteel, K. (2001). Clinical significance: History, application and current practice. *Clinical Review*, 21, 421-446.
- Powell, L. H., & Calvin, J. E. (2007). Effective obesity treatment. *American Psychologist*, 62, 234-246.
- Rosen, J. C. (2002). Obesity and body image. In C. G. Fairburn & K. D. Brownell (Eds.), *Eating disorders and obesity: A comprehensive handbook* (2nd. ed., pp. 399-402). New York: Guilford Press.
- Sarwer, D. B., & Thompson, J. K. (2002). Obesity and body image disturbance. In T. A. Wadden, & A. J. Stunkard (Eds.). *Handbook of obesity treatment* (pp. 447-464). New York: Guilford Press.
- Sarwer, D. B., Grossbart, T. A., & Didie, E. R. (2001). Beauty and society. In M. S. Kaminer, J. S. Dover, & K. A. Arndt (Eds.), *Atlas of cutaneous aesthetic surgery* (pp. 48-59). Philadelphia: W. B. Saunders.
- Hemisphere Publishing Cooperation (HPC).
- Shafran, R., & de Silva, P. (2005). Cognitive-behavioral models. In J. Treasure, U. Schmidt & E. Van Furth (Eds.), *The essential handbook of eating disorder* (pp. 35-52). England: John Wiley & Sons.
- Sherer, M., & Adams, C. R. (1983). Construct Validity the Self-efficacy Scale. *Psychological Report*, 55, 899-902.
- Wadden, T. A., Foster, G., & Letizia, K. A. (1992). Response of obese binge eaters to treatment by behavior therapy combined with very low calorie diet. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 60, 808-811.
- Williamson, D. A., Newton, R. L., & Walden, H. M. (2006). Obesity. In A. V. Nikcevic, A. R. Kuczmierczyk, & M. Bruch (Eds.), *Formulation and treatment in clinical health psychology* (pp. 42-60). New York: Rutledge.
- Young, J. E., Klosko, J. S., & Weishaar, M. E. (2003). *Schema therapy: A practitioner's guide*. New York: Guilford Press.