

نشانگان اختلال استرس پس از سانحه و همبودی آن با اختلال‌های دیگر در نوجوانان زلزلهزده ۱۱ تا ۱۶ ساله شهر بم

لیلا محمدی^۱، دکتر پروانه محمد خانی^۲، دکتر بهروز دولتشاهی^۳، دکتر محمود گلزاری^۴

Posttraumatic Stress Disorder Symptoms and their Comorbidity with Other Disorders in Eleven to Sixteen Years Old Adolescents in the City of Bam

Leila Mohamadi^{*}, Parvane Mohamadkhani^a, Behrooz Dolatshahi^a, Mahmud Golzari^b

Abstract

Objectives: The aim of this study was to assess the symptoms of Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) and the comorbidity of depression, anxiety, anger and dissociation with PTSD based on gender difference between two groups of earthquake-stricken boys and girls in the city of Bam and comparing it with normal adolescents in Tehran. **Method:** One thousand 11-16 year old students (300 boys and 700 girls) in the city of Bam selected using multi-step cluster sampling in two educational levels as the experimental group, and 3042 eleven to sixteen year old students from Tehran as the control group were examined. Data were gathered using Syndrome Checklist for Children (form A) and Interview form of Post Trauma Stress Scale (interview form). Data were then analyzed using correlation, independent t, chi-square (χ^2), and Kruskal Wallis. **Results:** Adolescents who had experienced the traumatic events showed higher levels of depression, anxiety, posttraumatic stress, anger and dissociation in comparison with normal adolescents ($p<0.01$). In the group with PTSD, frequency of all PTSD symptoms except anger symptoms was higher in girls than in boys. However, the frequency of pathological syndromes ($T>65$) was more evident in boys than in girls, but was non-significant. The prevalence of PTSD in the experimental group was 20%. **Conclusion:** There is a high comorbidity between symptoms of PTSD and other symptoms, which leads to a higher report of PTSD prevalence. Even though psychological vulnerability was higher in boys than in girls, it seems that gender role expectancy in the expression of emotions and the method of describing the symptoms play a role in this issue.

Key words: earthquake; posttraumatic stress disorder; comorbidity

[Received: 17 June 2009 ; Accepted: 30 November 2009]

چکیده

هدف: هدف این پژوهش بررسی نشانگان اختلال استرس پس از سانحه و همبودی افسردگی، اضطراب، خشم و تعزیزه با اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) بر اساس تفاوت جنسیتی در دو گروه نوجوانان زلزلهزده بم و پسر زلزلهزده شهر بم و مقایسه آن با نوجوانان بهنجهار شهر تهران بود. **روش:** ۱۰۰۰ دانش آموز ۱۱ تا ۱۶ ساله شهر بم (۳۰۰۰ پسر و ۷۰۰ دختر) با نمونه گیری خوشای چنانمرحله‌ای در دو مقطع تحصیلی به عنوان گروه آزمایش، و ۳۰۴۲ دانش آموز ۱۱ تا ۱۶ ساله شهر تهران به عنوان گروه ملک مورد بررسی قرار گرفتند. داده‌ها با دو اندازه سیاهه مقیاس روابط آسیب‌زا برای کودکان (فرم A) و مقیاس نشانگان استرس پس از سانحه (فرم مصاحبه) گردآوری و به روش‌های همبستگی، α مستقل، معنایور کای دو متغیره (χ^2) و کروسکال والیس تحلیل شدند. **یافته‌ها:** نوجوانانی که رویداد آسیب‌زا را تعزیزه کرده بودند، بیش از نوجوانان بهنجهار، نشانگان افسردگی، اضطراب، استرس پس آسیبی، خشم و تعزیزه را گزارش کردند ($p=0.01$). در گروه مبتلایان به PTSD دختران همه نشانه‌های PTSD را به استثنای نشانه‌های خشم، بیش از پسران گزارش کردند، اما فراوانی نشانه‌های PTSD در حد بیمارگونه ($T=65$) در پسران بیش از دختران بود، هرچند این تفاوت معنی دار نبود. فراوانی PTSD در گروه آزمایش $\chi^2=20$ بود. **نتیجه گیری:** همبودی بالای بین نشانگان اختلال استرس پس آسیبی با سایر نشانگان وجود دارد که می‌تواند منجر به گزارش بالای فراوانی اختلال استرس پس از سانحه شود. گرچه آسیب‌پذیری روانی در پسران بیش از دختران بود، ولی به نظر می‌رسد انتظارات نقش جنسیتی در ابراز هیجانات عاطفی و نحوه بیان نشانگان روانی در این مسئله نقش داشته باشد.

کلیدواژه: زلزله؛ اختلال استرس پس از سانحه؛ همبودی

[دریافت مقاله: ۱۳۸۸/۳/۲۷؛ پذیرش مقاله: ۱۳۸۸/۹/۹]

کارشناسی ارشد روانشناسی پالینی، روانارمانگری و مشاوره. تهران، اوین، بلوار دانشجو، خیابان کودکار، دانشگاه علوم بهریستی و توانبخشی. دورنگار: ۰۲۱-۵۵۸۶۵۰۵۰ (نویسنده مسئول). E-mail: l.mohamadi@yahoo.com. ^۱ دکترای روانشناسی، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم بهریستی و توانبخشی؛ ^۲ دکترای روانشناسی پالینی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهریستی و توانبخشی؛ ^۳ دکترای روانشناسی عمومی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی.

* Corresponding author: MA. in Clinical Psychology, University of Social Wafer and rehabilitation Sciences, Koodakyan St., Daneshju Blvd., Evin, Tehran, Iran, IR. Fax: +982155865050. E-mail: l.mohamadi@yahoo.com; ^b PhD. in Psychology, University of Social Wafer and rehabilitation Sciences, Psychology Department; ^c PhD. of General Psychology, Allame Tabatabayi University, Psychology Department.

مقدمه

دو دسته تقسیم می‌شوند: الف) دسته‌ای که مربوط به اجتناب^۶ و کرختی هیجانی^۷ هستند و افزون بر PTSD ممکن است در اختلال‌های ترس بیمارگونه^۸ نیز دیده شوند و ب) دسته‌ای که با افسردگی مشترک هستند که پیشتر از آنها سخن گفته شد. شاخه سوم (Cluster D) نشانه‌های معیار چهارم PTSD هستند که به نشانه‌های برانگیختگی^۹ و بیش‌برانگیختگی^{۱۰} مربوط بوده، بین PTSD و سایر اختلالات اضطرابی مشترک هستند و مواردی از آن‌ها ممکن است در ترس بیمارگونه ساده و هم‌چنین در اختلال وسواس نیز دیده شود. با وجود ارتباطی که میان رویارویی با رویداد آسیب‌زا و PTSD وجود دارد، برخی از پژوهشگران بر این باورند که آسیب‌شناسی روانی پس از رویداد آسیب‌زا منحصر به PTSD نیست (گرین^{۱۱}، ۱۹۹۱).

بنسون^{۱۲}، (۲۰۰۲)، بنقل از یاسمی و همکاران، (۱۳۸۲) نشان داد هرچه میزان آسیب جسمی در رویداد آسیب‌زا بیشتر باشد، امکان ابتلا به PTSD بیشتر می‌شود. استولارد^{۱۳}، (۱۹۹۸)، بنقل از همان‌جا) نشان داد میان سن نوجوانان و میزان آسیب‌دیدگی ناشی از رویداد آسیب‌زا با PTSD ارتباط وجود ندارد، اما میان جنسیت و تجربه‌های پیش از رویداد آسیب‌زا با PTSD رابطه وجود دارد.

چون تفاوت‌های فرهنگی می‌تواند در چگونگی بروز و شدت مشکلات روانی مؤثر باشد، تعمیم یافته‌های دیگر کشورها ممکن است با خطا برآورد همراه شود، بنابراین انجام پژوهش‌هایی در کشور، برای بررسی همه گیرشناختی، فراوانی و روش‌های پیش‌گیری و درمان اختلال‌های ناشی از بلاهای طبیعی ضروری است. اندک بودن تعداد پژوهش‌هایی که به بررسی تأثیر رویدادهای آسیب‌زا روی نوجوان پردازد، در کنار این واقعیت که کشور ما یکی از زلزله‌خیزترین کشورهای آسیایی است، انجام پژوهش برای بررسی فراوانی اختلال استرس پس آسیبی^{۱۴} و عوامل درگیر باشد آن را ضروری می‌کند. هدف این پژوهش بررسی نشانگان PTSD و بررسی همبودی^{۱۵} افسردگی، اضطراب، خشم^{۱۶} و تجزیه^{۱۷} با

در سراسر جهان هر سال بلایای طبیعی به مرگ و معلولیت میلیون‌ها تن و آسیب‌های مالی بسیار می‌انجامد. تاکنون توجه سامانه‌های بهداشتی تنها به کاهش پیامدهای جسمانی این بلایا متمرکز بوده است، حال آن‌که این حوادث منبع استرس بزرگی برای بازماندگان به شمار می‌آیند و پیامد روانی جدی و دیرپا بر جا می‌گذارند (یاسمی و همکاران، ۱۳۸۲). مردم کشورهای در حال توسعه بیشتر تحت تأثیر بلایای طبیعی قرار می‌گیرند و درصد مرگ و میر ناشی از بلاهای طبیعی و حادثه‌های صنعتی در این کشورها بیشتر است. ولی اطلاعات مربوط به اثر بلاهای طبیعی بر سلامت روان، بیشتر از کشورهای توسعه یافته بدست آمده است (وانگ^۱ و همکاران، ۲۰۰۰).

کودکان و نوجوانان به دلیل شرایط ویژه جسمانی و سنی، بیشتر از دیگر قشرهای جامعه در معرض خطر رویداد آسیب‌زا^۲، خشونت و آزار دیدگی قرار دارند و در برابر شر از کمترین پشتیبانی حقوقی، اقتصادی و اجتماعی برخوردارند. توجه به رویارویی آنها با رویدادهای آسیب‌زا و تشخیص، سنجش و ارزیابی آنها، برای درمان اختلالات رفتاری کودکان و نوجوانان اهمیت بسیار دارد، این موضوعی است که تاکنون کمتر بدان پرداخته شده است (محمدخانی، محمدی و رضایی دوگاهه، ۱۳۸۳).

همان‌طور که بررسی‌های مختلف نشان داده‌اند رویارویی با رویداد آسیب‌زا در نوجوانان، می‌تواند به اختلال‌های مختلف منجر شود که از مهم‌ترین آنها می‌توان به PTSD اشاره نمود. برخی از پژوهشگران مانند اسکورفیلد^۳، (۱۹۸۵)، بنقل از یاسمی و همکاران، (۱۳۸۲) از عاریتی بودن نشانه‌های PTSD انتقاد کرده‌اند. اگرچه نشانه‌های اختلال‌های روانی همپوشی زیادی با یکدیگر دارند، اما این شباهت معمولاً در وجود اساسی تشخیصی آنها وجود ندارد. درباره PTSD نیز این همپوشی نشانه‌ای، نسبتاً زیاد است، بنابراین در امر تشخیص مشکلاتی به وجود می‌آورد (دیویدسون^۴ و فوآ^۵، ۱۹۹۱).

دیویدسون و فوآ (۱۹۹۱) بر این باورند که PTSD در بردازند سه شاخه نشانه است: شاخه اول (Cluster B) نشانه‌های مداخله‌ای و تکراری است که در معیار دوم اختلال جای دارند و ویژه خود اختلال هستند. دومین شاخه (Cluster C) نشانه‌های معیار سوم PTSD است، که خود به

- | | |
|---|------------------|
| 1- Wang | 2- trauma |
| 3- Schorfield | 4- Davidson |
| 5- Foa | 6- avoidance |
| 7- numbness | 8- phobia |
| 9- arousal | 10- hyperarousal |
| 11- Green | 12- Benson |
| 13- Stolard | |
| 14- Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) | |
| 15- comorbidity | 16- anger |
| 17- dissociation | |

است. محمدخانی و همکاران (۱۳۸۳) پایابی^۴ خردۀ مقیاس‌های بالینی (مقدار آلفا از ۷۳٪ تا ۸۲٪) و روان‌سنگی (بیش‌پاسخی و کم‌پاسخی به ترتیب ۷۱٪ و ۵۸٪) TSCC را بالا گزارش کردند. در همین بررسی روایی همگرایی^۵ خردۀ مقیاس‌ها بین ۰/۶۸ تا ۰/۴۷ و روایی افتراقی^۶ خردۀ مقیاس‌های بالینی بین ۰/۴۸ تا ۰/۶۴ گزارش شد.

۲- مقیاس نشانگان استرس پس‌آسیبی (فرم مصاحبه)^۷ (PSS-I) (فوا، ریگز^۸، دانکو^۹ و روتام^{۱۰}، ۱۹۹۳) مصاحبه تشخیصی نیمه‌ساختاریافته‌ای است که برای تشخیص PTSD ارزیابی شدت نشانگان آن بر مبنای راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی^{۱۱} (DSM) طراحی شده است. این پرسشنامه که توسط آزمونگر تکمیل می‌شود، شامل ۱۷ گویه و سه خردۀ مقیاس تجربه مجدد^{۱۲} رویداد آسیب‌زا (پنج گویه)، اختناب (هفت گویه) و بیش‌برانگیختگی (پنج گویه) است. این پرسشنامه محدودیت سنی ندارد و ویژگی‌های روان‌سنگی مناسب آن، کاربردش را برای مقاصد بالینی و پژوهشی توجیه می‌کند. حساسیت^{۱۳} تشخیصی آن ۸۸٪، ویژگی^{۱۴} آن ۹۶٪ (همان‌جا)، پایابی بازآزمایی^{۱۵} آن به فاصله یک ماه ۷۷٪، پایابی نمره گذاری^{۱۶} آن ۹۵٪، همسانی درونی آن ۸۶٪ و هماهنگی تشخیصی آن با مصاحبه تشخیصی ساختاریافته برای DSM-IV (SCID)^{۱۷} نزدیک به ۸۶٪ گزارش شده است (بارلو^{۱۸}، ۱۹۹۳). حساسیت نسخه فارسی این مقیاس ۹۱٪، ویژگی آن ۷۸٪، و پایابی آن با روش بازآزمایی به فاصله دو هفته ۹۵٪ به دست آمده است (فوا و همکاران، ۱۹۹۳).

تجزیه و تحلیل داده‌ها با کمک SPSS-13^{۱۹} و به روش همبستگی^{۲۰} مستقل، مجدور کای دو متغیره^{۲۱} (٪) و کروسکال والیس^{۲۲} انجام شد.

- 1- Trauma Scale Checklist for Children form A (TSCC-A)
- 2- Brier
- 3- validity
- 4- reliability
- 5- convergent validity
- 6- differential validity
- 7- Post traumatic Stress Scale -Interview
- 8- Riggs
- 9- Dancu
- 10- Rothbaum
- 11- Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM)
- 12- re-experience
- 13- sensitivity
- 14- specificity
- 15- test- retest
- 16- scoring
- 17- Structural Clinical Interview for DSM-IV
- 18- Barlow
- 19- Statistical Package for the Social Science- version 13
- 20- chi square
- 21- Kruskal wallis

PTSD در نوجوانان زلزله‌زده شهر بم بر اساس تفاوت جنسیتی در دو گروه نوجوانان دختر و پسر و مقایسه آن با نوجوانان بهنگار شهر تهران بود. از آن‌جا که پیامد روانی رویارویی با بلاهای طبیعی، همواره با برخی عواملی که زمینه‌ساز بروز اختلال‌ها هستند، همراه بوده است، در این بررسی سعی شد اثر سن، جنسیت، تجارب پیشین بیمار و تجربه از دستدادن خوش‌باوندان نزدیک در نظر گرفته شود.

روش

این پژوهش به گونه یک طرح بدون مداخله و مقطعی انجام شد. جامعه آماری دربرگیرنده دانش‌آموزان دختر و پسر شهر بم در مقطع راهنمایی و دبیرستان (دامنه سنی ۱۱ تا ۱۶ سال) بود که در سال ۱۳۸۳ در شهر بم مشغول به تحصیل بودند. ملاک ورود عبارت بود از حضور در بم در زمان زلزله تا ۱۰ ماه پس از آن. تعداد این دانش‌آموزان بر پایه آمار اداره آموزش و پرورش شهر بم ۸۴۰۰ نفر (۱۵۹۰۰ نفر راهنمایی و ۷۵۰۰ نفر دبیرستانی) و به تفکیک جنسیت ۸۹۰۰ دختر و ۷۰۰۰ پسر) بود. از این تعداد با نمونه‌گیری خوش‌های چند مرحله‌ای از نواحی مختلف آموزش و پرورش شهر بم، تعداد ۱۰۴۰ نفر به عنوان گروه آزمایش انتخاب شدند. تعداد ۴۰ پرسشنامه بهدلیل معتبرنoodن (با استفاده از دو خردۀ مقیاس روایی‌سنگی بیش‌پاسخی و کم‌پاسخی) حذف شد و در نهایت ۱۰۰۰ پرسشنامه (۳۰۰ پسر و ۷۰۰ دختر) مورد تحلیل آماری قرار گرفت. پروفایل‌های نوجوانان بهنگار شهر تهران (دامنه آموز بهنگار ۱۱ تا ۱۶ ساله شهر تهران) که سیاهه مقیاس رویداد آسیب‌زا برای کودکان (فرم A)^۱ (TSCC-A) (محمدخانی و همکاران، ۱۳۸۳) روی آنها هنجاریابی شده بود، به عنوان گروه ملاک در نظر گرفته شد. میانگین سنی این گروه ۱۳/۰۶ و انحراف معیار ۱/۳۴ بود. برای رعایت اصول اخلاقی، محروم‌ماندن اطلاعات برای آزمودنی‌ها بیان و رضایت آنان برای شرکت در پژوهش جلب شد.

برای گردآوری داده‌ها از دو ابزار استفاده شد:

۱- سیاهه مقیاس رویداد آسیب‌زا برای کودکان (فرم TSCC-A)^(A) (برایر^۲ و همکاران، ۲۰۰۱) که یک ابزار خودگزارشی مربوط به PTSD و علامت‌شناسی روان‌شناختی آن و دربرگیرنده دو خردۀ مقیاس روان‌سنگی کم‌پاسخی و بیش‌پاسخی (برای سنجش روایی^۳ مقیاس) و پنج خردۀ مقیاس بالینی اضطراب، افسردگی، خشم، استرس پس‌آسیبی و تجزیه

یافته‌ها

جدول ۱- توزیع فراوانی گروه آزمایش بر حسب سن

	درصد تراکمی (%)	فراوانی (%)	سن بر حسب سال
۱۱	(۱۱) ۱۱۰	۱۱	
۲۶	(۱۵) ۱۵۰	۱۲	
۳۶	(۱۰) ۱۰۰	۱۳	
۵۳	(۱۷) ۱۶۹	۱۴	
۸۰	(۲۷) ۲۷۱	۱۵	
۱۰۰	(۲۰) ۲۰۰	۱۶	
	(۱۰۰) ۱۰۰۰	کل	

توزیع فراوانی گروه آزمایش بر حسب سن در جدول ۱ آمده است؛ میانگین سنی افراد مبتلا به PTSD و انحراف معیار آن ۱/۲ بود. نوجوانان ۱۵ ساله با ۲۷٪ از جمعیت کل نمونه، بیشترین تعداد و نوجوانان ۱۱ ساله با ۱۱٪ از جمعیت کل نمونه کمترین تعداد را دارا بودند. به دلیل نمونه گیری خوشای تصادفی و بر پایه سال تحصیلی، شاهد پراکندگی سنی نامنظمی هستیم.

نتایج کاربرد آزمون t مستقل برای مقایسه دو گروه آزمایش در خرده‌مقیاس‌های TSCC-A در جدول ۲ آورده شده است. کودکان مبتلا به PTSD بیش از کودکان بهنجهار نشانگان روانی PTSD (افسردگی، اضطراب، استرس پس‌آسیبی، خشم و تجزیه) را گزارش کردند. بنابراین این فرضیه که PTSD با سایر نشانگان همبودی دارد، در سطح ۹۹٪ تأیید شد.

جدول ۲- نتایج آزمون t مستقل برای مقایسه دو گروه آزمایش و ملاک در خرده‌مقیاس‌های TSCC-A

تجزیه	استرس پس‌آسیبی	خشم	افسردگی	اضطراب	t	نمره t
میانگین (انحراف معیار) در گروه آزمایش	(۵/۲۱) ۷/۴۶	(۵/۳۴) ۱۰/۲	(۵/۴۹) ۷/۲۴	(۵/۳۱) ۸/۱۱	(۵/۱۲) ۸/۶۸	
میانگین (انحراف معیار) در گروه ملاک	(۴/۴۶) ۴/۹۸	(۴/۹۴) ۷/۵۴	(۴/۵۸) ۵/۲۳	(۵/۰۳) ۵/۹۰	(۴/۸۶) ۵/۹۷	
	۱۴/۴۶	۱/۴۲۸	۱۱/۳	۱۱/۸۷۹	۱۵/۰۹۶	
سطح معنی‌داری	۰/۰۰۱	۰/۰۰۱	۰/۰۰۱	۰/۰۰۱	۰/۰۰۱	

جدول ۳- نتایج آزمون T مستقل برای مقایسه میانگین سه خرده‌مقیاس نشانگان استرس پس‌آسیبی در دو گروه دختر و پسر گروه آزمایش

خرده مقیاس	جنسیت	تعداد	میانگین	df	t	سطح معنی‌داری
تجربه مجدد رویداد آسیب‌زا	دختر	۶۸۳	۵/۶۷	۹۵۰	۴/۱	۰/۰۰۱
	پسر	۲۶۹	۴/۶۹			
اجتناب	دختر	۶۸۳	۷/۹۹	۹۵۰	۳/۱	۰/۰۰۱
	پسر	۲۶۹	۷/۰۱			
بیش برانگیختگی	دختر	۶۸۳	۷/۴۹	۹۵۰	۲/۶	۰/۰۰۱
	پسر	۲۶۹	۶/۲۶			

بررسی شد. کودکانی که خویشاوندان خود را از دست داده بودند ($p \leq 0.05$, $df = 889$, $\chi^2 = 61.07$)، زیر آوار مانده بودند ($p \leq 0.05$, $df = 259$, $\chi^2 = 67.09$) و پیش از زلزله تشخیص بیماری روانی ($p \leq 0.001$, $df = 329$, $\chi^2 = 133.11$) یا مصرف داروی اعصاب ($p \leq 0.001$, $df = 39$, $\chi^2 = 82.89$) داشتند، PTSD را با شدت بیشتری گزارش کردند.

بحث

یافته‌ها نشان داد، نوجوانان زلزله‌زده ۱۱–۱۶ ساله شهر بم افزون بر PTSD، نشانگان افسردگی، اضطراب، خشم و تجزیه را نیز گزارش کرده‌اند. شدت تمامی این نشانگان در نوجوانان زلزله‌زده شهر بم بیش از نوجوانان گروه ملاک شهر تهران بود. هم‌چنین شدت PTSD در نوجوانانی که از دستدادن خویشاوندان، ماندن زیر آوار، پیشینه بیماری روانی و یا مصرف داروی اعصاب را تجربه کرده بودند، بیشتر بود. فراوانی PTSD در نوجوانان زلزله‌زده شهر بم 20% به دست آمد.

دیگر بررسی‌ها نیز همبودی افسردگی (روسوس^۱، گنجیان^۲ و اشتاینبرگ^۳، ۲۰۰۵؛ گرین، ۱۹۹۱) و اضطراب (گرین، ۱۹۹۱) را با PTSD تأیید کرده‌اند. یافته‌های گرین (۱۹۹۱) نشان داد فراوان ترین نشانه همراه با PTSD ابتدا اضطراب و سپس افسردگی است، ولی در این پژوهش تجزیه فراوان ترین نشانه همراه با PTSD بود. این یافته با بررسی اشیگلر^۴ و گورنمونت^۵ (۱۹۹۸) هم خوان است. بر همین اساس به نظر می‌رسد یکی از علتهای فراوانی بالای PTSD در جمعیت تجربه کننده رویداد آسیب‌زا، همبودی سایر نشانگان با این اختلال است، برخی از پژوهشگران (مثلًاً اسکورفیلد، ۱۹۸۵؛ به نقل از یاسمی و همکاران، ۱۳۸۲) علت این امر را عاریتی بودن نشانگان PTSD با سایر اختلالات روانی می‌دانند. درباره فراوانی PTSD در جمعیت تجربه کننده رویداد آسیب‌زا، آمارهای مختلف وجود دارد: 68% (دژکام، ۱۹۹۰)، 51% (کرمی، ۱۳۷۳)، 77% (فارلان^۶ و پاپایی، ۱۹۹۲)، 20% (رافائل^۷ و پاپایی، ۱۹۸۶؛ به نقل از یاسمی و همکاران، ۱۳۸۲)، 23% (شاران^۸، ۱۹۹۰) و در مورد زلزله بم آمارهای $51/9\%$ (فرهودیان و

جدول ۴- تابع آزمون مستقل برای مقایسه میانگین نمرات خردۀ مقیاس‌های TSCC-A در دو گروه دختر و پسر مبتلا به PTSD (۲۲۴ دختر و ۲۷۵ پسر)

نیازگان	اضطراب	دختر	پسر	اعضاد	میانگین (انحراف معیار)	سطح	T	معنی‌داری
					(۴/۹) ۹/۶۰		۹/۲۲	۰/۰۱
					(۴/۸) ۶/۵۳			
					(۵/۴) ۸/۷۱		۵/۶۴	۰/۰۱
					(۵/۸) ۶/۷۲			
					(۵/۵) ۷/۵۱		۲/۴۹	۰/۰۱
					(۵/۳) ۶/۵۹			
					(۵/۲) ۱۰/۹۳		۸/۷۱	۰/۰۱
					(۴/۹) ۷/۸۹			
					(۵/۲) ۷/۸۶		۳/۸۴	۰/۰۱
					(۵/۱۱) ۶/۵۱			

برای بررسی تفاوت جنسیتی در نمره‌های خردۀ مقیاس‌های PSS-I در گروه آزمایش از آزمون t مستقل استفاده شد (جدول ۳). شدت تجربه مجدد رویداد آسیب‌زا، اجتناب و بیش‌برانگیختگی در دانش‌آموزان دختر بیش از دانش‌آموزان پسر بود.

برای مقایسه نمرات خردۀ مقیاس‌های TSCC-A در دو گروه دختر و پسر مبتلا به PTSD از آزمون t مستقل استفاده شد: شدت نشانه‌ها در هر چند خردۀ مقیاس در دانش‌آموزان دختر بیش از دانش‌آموزان پسر بود (جدول ۴).

فراوانی درصدی اضطراب، افسردگی، خشم، استرس پس‌آسیبی و تجزیه به ترتیب در دانش‌آموزان دختر مبتلا به PTSD $13/3$ ، $9/6$ ، $12/6$ ، $13/3$ و در دانش‌آموزان پسر مبتلا به PTSD 20 ، $19/8$ ، $21/6$ ، $24/3$ و $22/6$ بود. مقایسه این یافته‌ها در دو گروه دختر و پسر با استفاده از آزمون χ^2 دو متغیره نشان داد فراوانی درصدی دانش‌آموزان پسری که نشانگان PTSD را در حد بیمارگونه ($T \geq 65$) گزارش کردند، بیش از دانش‌آموزان دختر بود ($p \leq 0.05$, $df = 1$, $\chi^2 = 2/32$).

% نوجوانان مبتلا به PTSD از دستدادن خویشاوندان، 26% ماندن زیر آوار، 33% سابقه بیماری روانی و 4% سابقه مصرف داروی اعصاب پیش از وقوع زلزله را تجربه کرده بودند. ارتباط میان شدت PTSD (از روی نمره کل آزمون ۲۷۵) با این چهار عامل، به روش آماری کروسکال والیس (PSS-I

- 1- Roussos
- 2- Goenjian
- 3- Steinberg
- 4- Speigler
- 5- Guerenmont
- 6- Farlan
- 7- Papay
- 8- Rafael
- 9- Sharan

در تشخیص PTSD، بر حضور یکی از نیشانه‌های ذهنی تجربه مجدد رویداد آسیب‌زا تأکید شود. همبلن^۳ (۲۰۰۶) بیان می‌کند که میزان درگیری با رویداد آسیب‌زا عامل تعیین کننده شدت آسیب‌زاوی است، اما پژوهش حاضر نشان داد که نوجوانانی که خویشاوندان تزدیک خود را از دست داده بودند، نسبت به نوجوانانی که این تجربه را نداشتند، تنها در نیشانگان افسردگی نمره بیشتری داشتند و نه در نیشانگان استرس پس‌آسیبی. هم‌چنان نوجوانانی که زیر آوار ماندن را تجربه کرده بودند، بیش از نوجوانانی که مبتلا به PTSD بودند ولی این تجربه را نداشتند، نیشانگان تجزیه، خشم و افسردگی را گزارش کردند. این پژوهش نشان داد که: نیشانگان همراه با رویداد آسیب‌زا از جمله افسردگی و تجزیه، همبودی بالایی با PTSD دارند. این یافته همسو با پژوهشی است که نشان داد دانش‌آموزانی که از پیش زمینه افسردگی و نشخوار فکری داشتند، بیشتر مستعد باشند به PTSD بودند (لونیگان^۴، شانون^۵، فینچ^۶، دوثرتی^۷ و تایلر^۸، ۱۹۹۱).

بررسی استولارد (۱۹۹۸) به نقل از یاسمی و همکاران، (۱۳۸۲) این موضوع را تأیید می‌کند که شخصیت، تجارب پیش از زلزله و جنسیت باشد PTSD رابطه دارد. هرچند رابطه PTSD با جنسیت به توضیح بیشتری نیاز دارد؛ یافته‌ها نیشان داد دانش‌آموزان دختر مبتلا به PTSD در سه خردۀ مقیاس PSS-I (تجربه مجدد رویداد آسیب‌زا، اجتناب و پیش‌برانگیختگی) و نیشانگان روانی پس از رویداد آسیب‌زا (افسردگی، اضطراب، استرس پس‌آسیبی و تجزیه) نمرات بالاتری نسبت به پسران داشتند. در ظاهر به نظر می‌رسد این یافته با یافته‌هایی که PTSD و اختلال افسردگی را در دختران پیش از پسران نیشان داده است (همبلن، ۲۰۰۶)، نیشانگان خشم را در پسران پیش از دختران گزارش کرده است (کریک^۹ و گروپتیر^{۱۰}، ۱۹۹۵) و دختران را پیش از پسران مستعد PTSD گزارش کرده است (استولارد، ۱۹۹۸؛ به نقل از یاسمی و همکاران، ۱۳۸۲) همسو است. اما در واقع این طور نیست، زیرا زمانی که فراوانی نیشانگان روانی پس از رویداد آسیب‌زا که در حد بیمارگونه باشد (و نه تنها میانگین نمرات) در دو جنس بررسی شد، مشاهده شد که پسران پیش از دختران همه

همکاران، (۱۳۸۶)، ۵۸٪ (راد گودرزی و همکاران، ۱۳۸۶) و ۶۶٪ (نوربالا، عیوضی و پاشامیشی، ۱۳۸۶) گزارش شده است. در بیشتر این بررسی‌ها مصاحبه روانپزشکی صورت نگرفته است و تشخیص از روی نمرات پرسشنامه‌ها، بدون توجه به سطح عملکرد آزمودنی و بدون تفکیک نیشانگان روانی همراه با PTSD انجام گرفته است.

یافته‌های این پژوهش، عاریتی بودن علایم PTSD را تأیید کرد. زمانی که فراوانی PTSD با استفاده از ملاک‌های DSM IV-TR برآورد شد، فراوانی ۷۰٪، و هنگامی که هر یک از نیشانگان همراه با آن جداگانه بررسی شد، فراوانی ۲۰٪ به دست آمد. در واقع یافته‌های بررسی حاضر، اعتبار یافته‌های PTSD پژوهش‌های پیشین را که فراوانی بسیار بالایی برای گزارش کرده‌اند، زیر سؤال می‌برد و یکی از علتهای فراوانی بالای PTSD در آن پژوهش‌ها را در نظر نگرفتن همبودی نیشانه‌های دیگر اختلال‌ها با PTSD می‌داند. از سوی دیگر به نظر می‌رسد مشکل اصلی در نوع دسته‌بندی DSM IV-TR از نیشانه‌های PTSD است، زیرا در آن جا دو مین شاخه نیشانه‌ها، که نیشانه‌های اجتنابی و کرختی هیجانی را دربرمی‌گیرد، نیشانه‌هایی را مدنظر قرار داده است که هم با افسردگی و هم با ترس بیمارگونه همپوشی دارد. نیشانه‌های اجتناب هم در PTSD و هم در ترس بیمارگونه مشاهده می‌شود و کرختی هیجانی نیز از نیشانه‌های شاخص اختلال افسردگی است (کینگ^۱، کینگ^۲ و لسکین^۲، ۱۹۹۸). بنابراین به نظر می‌رسد افزایش افسردگی به خودی خود می‌تواند به سه راه مایه بالا رفتن فراوانی گزارش شده از PTSD شود: ۱- زمانی که افسردگی به هر دلیلی (مانند از دست دادن وابستگان، از دست دادن امکانات رفاهی پیشین، سردرگمی و نابسامانی، خانه‌به‌دوشی و...) افزایش یابد، احتمال افزایش گزارش نیشانه‌های کرختی هیجانی و بنابراین احتمال افزایش تشخیص PTSD بیشتر می‌شود. ۲- افسردگی به کاهش عملکرد روزانه فرد، که یک عامل اساسی در تشخیص PTSD است، می‌انجامد و فرد ارزیابی کننده کمتر به تحلیل این موضوع می‌پردازد که این کاهش عملکرد به افسردگی مربوط است یا PTSD. ۳- در بی‌فعالیتی پس از زلزله و افسردگی ناشی از سوگ عزیزان، فرد دچار کاهش انرژی و ناتوانی مقابله با افکار مزاحم می‌شود و همین موضوع نخستین شاخه نیشانه‌های اختلال PTSD را تحت تأثیر قرار داده، باعث افزایش گزارش PTSD می‌شود. بنابراین بسیار مهم است که

1- King
3- Hamblen
5- Shannon
7- Daugherty
9- Crick
2- Leskin
4- Lonigan
6- Finch
8- Taylor
10- Grotpteter

منابع

- فرهودیان، علی؛ شریفی، ونداد؛ رحیمی موقر، آفرین؛ راد گودرزی، رضا؛ محمدی، محمدرضا؛ یونسیان، مسعود؛ یاسمی، محمد تقی (۱۳۸۶). برسی شیوه اختلال استرس پس از سانحه و علایم آن در بازماندگان زلزله. مقاله ارایه شده در اولین همایش اختلال استرس پس از حادثه. بسیج جامعه پژوهشی و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، ۲۸ بهمن ماه.
- کرمی، صغیری (۱۳۷۳). برسی وضعیت اختلالات رفتاری، اختلال پس از ضربه (PTSD) در کودکان و نوجوانان دختر و پسر در مقاطع سنی ۹-۱۶ ساله مناطق زلزله زده پس از ۳ سال در مقایسه با مناطق غیرزلزله زده. پایان نامه دکترای روانپژوهی، انتیتو روانپژوهی تهران، دانشگاه علوم پژوهشی ایران.
- راد گودرزی، رضا؛ رحیمی موقر، آفرین؛ فرهودیان، علی؛ شریفی، ونداد؛ محمدی، محمدرضا؛ یونسیان، مسعود؛ یاسمی، محمد تقی (۱۳۸۶). عوامل پیش‌بینی‌کننده اختلال استرس پس از ترورها در بازماندگان زلزله بهم، مقاله ارایه شده در اولین همایش اختلال استرس پس از حادثه. بسیج جامعه پژوهشی و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، ۲۸ بهمن ماه.
- محمدخانی، پروانه؛ محمدی، محمدرضا؛ رضایی دوگاهه، ابراهیم (۱۳۸۳). هنجار یابی آزمون فهرست نشانگان روانی ضربه فرم A (TSCC-A) در دختران و پسران ۱۱-۱۶ ساله تهران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پژوهشی، ۶۰-۸۶.
- نوریلا، احمدعلی؛ عبوری، علیرضا؛ پاشا مینمی، علی (۱۳۸۶). برسی مقایسه‌ای شیوه اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) ۱۸ ماه بعد از زلزله بهم در دو شهر بهم و کوهان. مقاله ارایه شده در اولین همایش اختلال استرس پس از حادثه. بسیج جامعه پژوهشی و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، ۲۸ بهمن ماه.
- یاسمی، محمد تقی؛ میرابازاده، آرش؛ سردارپور؛ شاهرخ، شاه محمدی، داود؛ باقری، عباس؛ لایقی، هوشمند (۱۳۸۲). بهداشت روانی در جریان بلایای طبیعی. تهران: انتشارات وزارت کشور، ۱۸-۴۵.
- Barlow, D. (1993). *Clinical handbook of psychological disorders* (3rd. ed.). New York: Guilford Press, 259-263.
- Brier, J., Johnson, K., Bissada, A., Damon, L., Crouch, G., Eliana, H., Hanson, R., & Ernst, V. (2001). The trauma symptom checklist for young children (TSCYC): Reliability and association with abuse exposure in a multi-site study. *American Journal of Child Abuse and Neglect*, 25, 1001-1014.
- Crick, R., & Grotpeter, K. (1995). Relational aggression, gender and social-psychological adjustment. *American Journal of Child Development*, 66, 710-722.
- Davidson, D., & Foa, E. (1991). Treatment PTSD in traumatized people. *American Journal of Psychiatry*, 10, 38-41.
- نshanگان از جمله افسردگی، اضطراب، استرس پس آسیبی، خشم و تعزیز را گزارش کرده‌اند. اگرچه این تفاوت معنی‌دار نبود، اما دست کم نشان داد که دختران بیش از پسران تشخیص PTSD نمی‌گیرند. درواقع عاملی که سبب می‌شود فراوانی PTSD در دختران بیش از پسران برآورد شود، به الگوهای قالبی نقش‌های جنسیتی مربوط است. راینز^۱ و همکاران (۱۹۸۴) این موضوع را این گونه تحلیل می‌کنند که اجتماعی‌بودن جنسیت، نه تنها به فراوانی بیماری، بلکه به ابراز آن کمک می‌کند. میزان فراوانی انواع اختلال‌های رفتاری میان زن و مرد یکسان نیست. مردان در راستای نگرش قالبی نقش جنسیتی، که زنان را به درون‌سازی ناراحتی و مردان را به برونو سازی آن سوق می‌دهد، بیشتر اختلال‌هایی چون سوءصرف الکل و مواد و اختلال شخصیت ضداجتماعی را برونو سازی می‌کنند، درحالی که زنان اختلال‌های عاطفی، ترس بیمار گونه، وسوس و وحشت‌زدگی را که بیشتر مشکلات درونی سازی کردن هستند، نشان می‌دهند. برای جنس مرد کمک‌خواستن و ابراز کردن هیجان‌ها بسیار دشوار است، زیرا می‌پندرد انجام این کار به معنی پذیرفتن ضعف است که این عزت نفس آنان را تهدید می‌کند (استدمن^۲، يول^۳ و اسمیت^۴، ۲۰۰۵).
- کمترین تعداد دانش آموزان پسر نسبت به دانش آموزان دختر از محدودیت‌های این پژوهش بود که در تحلیل یافته‌های مربوط به تفاوت‌های جنسیتی تأثیر می‌گذاشت. گرددآوری داده‌ها پس از گذشت ۱۰ ماه از وقوع زلزله از دیگر محدودیت‌های پژوهش حاضر بود، و پیشنهاد می‌شود بررسی‌های آتی با گذشت زمان کوتاه‌تری به گرددآوری داده‌ها بپردازند. هم‌چنین پیشنهاد می‌شود در دوره‌های زمانی یک ساله و دو ساله بی‌گیری به عمل آید تا مقایسه نتایج در فاصله‌های زمانی مختلف امکان‌پذیر شود. در پایان برای رفع محدودیت سنی ۱۱ تا ۱۶ سال نمونه‌های این پژوهش پیشنهاد می‌شود بررسی‌های مشابه در مورد کودکان زیر ۱۱ سال نیز انجام شود.
- سپاسگزاری**
- از همه دانش آموزانی که در این پژوهش شرکت کردند، هم‌چنین از مسئولان و کارکنان اداره آموزش و پرورش و مدرسه‌های شهر بهم صمیمانه قدردانی می‌شود.
- [با اظهار نویسنده مسئول مقاله، حمایت مالی از پژوهش و تعارض منافع وجود نداشته است.]

- Farlan, A., & Papay, P. (1992). Multiple diagnostic in post traumatic stress disorders in the victims of a natural disaster. *American Journal of Nervous and Mental Disorder*, 180, 498-504.
- Foa, E., Riggs, D., Dancu, C., & Rothbaum, B. (1993). Reliability and validity of a brief instrument for assessing post-traumatic stress disorder. *England Journal of Traumatic Stress*, 6, 454-473.
- Green, L. (1991). Evaluation the effects of disasters. *American Journal of Psychological Assessment*, 41, 538-540.
- Hamblen, J. (2006). *PTSD in children and adolescents*. Available on: <http://www.ncptsd.va.gov/ncmain/information>
- King, D., King, L., & Leskin, G. (1998). Confirmatory factor analysis of the clinician-administered PTSD scale. *American Journal of Psychological Assessment*, 10, 90-96.
- Lonigan, C., Shannon, M., Finch, A., Daugherty, T., & Taylor, C. (1991). Children's reactions to a natural disaster: symptom severity and degree of exposure. *American Journal of Advances in Behavior and Therapy*, 13, 135-154.
- Robins, C., Helzer, J., Weissman, M., Orvaschel, H., Gruenberg, E., Burke, J., & Regier, D. (1984). Life time prevalence of specific psychiatric disorders, *Journal of Three Sites Archives of General Psychiatry*, 41, 949-958.
- Roussos, A., Goenjian, A., & Steinberg, A. (2005). Post traumatic stress and depressive reactions among children and adolescents after the 1999 earthquake in Ano Liosina, Greece. *American Journal of Psychiatry*, 162, 530-537.
- Sharan, P. (1990). Preliminary report of psychiatric disorders in survivors of a severe earthquake. *American Journal of psychiatry*, 153, 554-558.
- Spiegler, M., & Gueremont, D. (1998). *Contemporary behavior therapy*, New York: ITP, 269-271
- Stedman, R., Yule, W., & Smith, P. (2005). Acute stress disorder and post traumatic stress disorder in children and adolescent involved in assault or motor vehicle accident. *American Journal of Psychiatry*, 162, 1381-1383.
- Wang, X., Gao, L., Shinfuku, N., Zhang, H., Zhao, C., & Shen, Y. (2000). Longitudinal study of earthquake-related PTSD in a randomly selected community sample in north of China. *American Journal of Psychiatric Association*, 157, 1260-1266.