

مقاله‌ی پژوهشی

کیفیت زندگی در جمعیت ۱۵ تا ۶۴ ساله‌ی استان کردستان

خلاصه

مقدوم: کیفیت زندگی از فاکتورهای مهم در ارزیابی مشکلات سلامت در جوامع مختلف می‌باشد.

روش کار: این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی، ۷۰۰ نفر از جمعیت ۱۵-۶۴ ساله‌ی استان کردستان را در سال ۱۳۸۶ به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب و توسط پرسشنامه‌ی کیفیت زندگی یورووهیس بررسی نموده است. تحلیل اطلاعات توسط نرم افزار SPSS و آزمون‌های تی مستقل، ANOVA، همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه انجام شده است.

یافته‌ها: در این مطالعه کیفیت زندگی در مردان به طور معنی‌داری بهتر از زنان ($P=0.001$)، و در مناطق روستایی بهتر از مناطق شهری بود ($P=0.01$). افراد دارای فعالیت ورزشی بیشتر کیفیت زندگی بهتری داشتند ($P=0.002$). کیفیت زندگی در افراد سیگاری پایین‌تر بود ($P<0.05$). کیفیت زندگی با افزایش سن، بدتر ($r=-0.197$ و $P<0.001$) ولی با افزایش وزن ($r=0.095$ و $P=0.01$) و قد بهتر ($F=0.193$ و $P=0.001$) می‌شد. افراد بی‌سواد کیفیت زندگی پایین‌تر ($F=13/246$) و افراد دارای درآمد بیشتر کیفیت زندگی بالاتری داشتند ($F=13/814$ و $P<0.001$).

نتیجه‌گیری: در جمعیت بزرگسال استان کردستان کیفیت زندگی در زنان به طور بارزی پائین‌تر است و با افزایش سن، عدم فعالیت ورزشی و مصرف سیگار کیفیت زندگی مشخصاً کاهش می‌یابد.

واژه‌های کلیدی: ایران، زنان، سن، کیفیت زندگی، مردان

پی‌نوشت:

این مطالعه پس از تایید کمیته‌ی پژوهشی دانشکده علوم پزشکی کردستان انجام شده و با منافع شخصی نویسنده‌گان ارتباطی نداشته است. در انجام این پژوهش هیچ‌گونه حمایت مالی از نهادهای دولتی و غیردولتی دریافت نشده است. از تمام همکاران گروه پیش‌گیری و مبارزه با بیماری‌های شهرستان‌های استان کردستان، سرکار خانم سیران نیلی و خانم دکتر رستمی گوران و کارشناسان محترم معاونت پژوهشی دانشگاه تشکر می‌شود.

نرگس شمس‌علی‌زاده
استادیار گروه روان‌پزشکی دانشگاه علوم
پزشکی کردستان

* بهزاد محسن پور
متخصص عفونی، دانشگاه علوم پزشکی
کردستان

ابراهیم قادری
دستیار اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی
شیراز

فرزین رضاعی
استادیار روان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی
کردستان

علیresa دلاوری
استادیار غدد، مرکز تحقیقات غدد و
متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران

* مؤلف مسئول:
ایران، سندج، بیمارستان توحید
تلفن: ۰۸۷۱۳۲۸۵۹۹۰
behzadmohsenpour@yahoo.com

تاریخ وصول: ۱۳۸۸/۱۱/۱۲
تاریخ تایید: ۱۳۸۸/۱۲/۱۹

Original Article

Quality of life in 15-64 years old people in Kurdistan province, western part of Iran

Abstract

Introduction: Quality of life is one of the important factors in evaluating health problems in different societies.

Materials and Methods: In this descriptive-analytic study 700 individuals aged 15 to 64, were selected through the random sampling method in Kurdistan, western part of Iran, in 2007 and their quality of life was evaluated by Euro His questionnaire. Data was analyzed by SPSS software using independent t, ANOVA, Pearson correlation and multi-variable regression tests.

Results: In this study, quality of life in men was significantly better than women ($P=0.001$), and in rural regions was better than urban regions ($P=0.01$). People with more exercise activities had better quality of life ($P=0.002$), while the smokers ($P<0.05$) and also the elder people had worse quality of life ($P<0.001$, $r=-0.197$); the heavier ($P=0.01$, $r=0.095$) and the taller ones had better quality of life ($P<0.001$, $r=0.193$). Uneducated people had lower quality of life ($P<0.001$, $F=13.246$), while more income was leading to higher quality of life ($P<0.001$, $F=13.814$).

Conclusion: Between adults of Kurdistan, western part of Iran, quality of life was worse significantly in women, elder people, people with lack of exercise and with smoking habit.

Keywords: Age, Females, Iran, Males, Quality of life

Narges Shams Alizadeh

Assistant professor of psychiatry,
Kurdistan University of Medical Sciences

**Behzad Mohsenpour*

Specialist in infectious diseases,
Kurdistan University of Medical Sciences

Ebrahim Ghaderi

Resident of epidemiology, Shiraz
University of Medical Sciences

Farzin Razaei

Assistant professor of psychiatry,
Kurdistan University of medical Sciences

Ali Reza Delavari

Assistant professor of
endocrinology, Endocrine
Research Center, Tehran
University of Medical Sciences

***Corresponding Author:**

Touhid Hospital, Sanandaj, Iran
behzadmohsenpour@yahoo.com

Tel: +988713285990

Received: Feb. 01, 2010

Accepted: Mar. 10, 2010

Acknowledgement:

This study was reviewed and approved by the research committee of Kurdistan University of Medical Sciences. No grant has supported the present study and the authors had no conflict of interest with the results. The authors thank all of the members of health services of Kurdistan province, especially Mrs. Siran Nili and Dr. Rostami Gurani, and employees of vice chancellor for research of Kurdistan University of medical Sciences.

Vancouver referencing:

Shams Alizadeh N, Mohsenpour B, Ghaderi E, Razaei F, Delavari A. *Quality of life in 15-64 years old people in Kurdistan province, western part of Iran*. Journal of Fundamentals of Mental Health 2010; 12(1): 448-56.

تهیه نموده است. این پرسشنامه به ۲۹ زبان ترجمه شده و در ۳۲ مرکز در دنیا به صورت گستردۀ مورد استفاده قرار گرفته است (۹). از آن جا که بررسی‌هایی که چندین شاخص سلامتی را در نظر می‌گیرند نیاز به اندکس‌های کوتاه دارند، پرسشنامه‌ی ۸ سئوالی EUROHIS-QOL تهیه گردیده است (۸). در این مطالعه، پرسشنامه‌ی مذکور ترجمه و روایی محتوایی و پایایی آن مورد بررسی قرار گرفت و سپس کیفیت زندگی در جمعیت ۱۵-۶۴ ساله‌ی استان کردستان با استفاده از آن مطالعه گردید.

روش کار

این مطالعه از نوع مقطعی بوده و جامعه‌ی آماری آن را جمعیت ۱۵ تا ۶۴ ساله‌ی استان کردستان در سال ۱۳۸۶ تشکیل می‌دادند. با توجه به انجام مقدماتی مطالعه در ۳۰ نفر، میانگین نمره‌ی کیفیت زندگی ۲۶/۰۶ و واریانس ۲۳/۹ به دست آمده و حجم نمونه با دقت ۲ نمره و ۰۱ برابر ۵ درصد برابر ۵۵۷ محاسبه گردید که در این مطالعه ۷۰۰ نفر بررسی شدند. روش نمونه‌گیری به صورت طبقه‌بندی (طبقات شامل شهرها و روستاهای) و در داخل طبقات به صورت خوش‌های بود. از اولین رقم کدپستی که مربوط به تقسیم‌بندی شهر است استفاده و نمونه‌گیری در داخل آن با روش تصادفی انجام گرفت. با استفاده از فهرست خانواری شهری و روستایی به صورت تصادفی سرخوشه‌ها تعیین و نقشه‌ی هر خوش به توجه به مشخصات جغرافیایی همراه با آدرس و محدوده‌ی آن مشخص شد. محل دقیق سرخوشه نیز همراه با آدرس بر روی نقشه، معین گردید. نشانی پستی سرخوشه‌ها از بانک اطلاعات کدهای پستی شرکت پست جمهوری اسلامی ایران استخراج شد.

قابل ذکر است که تمام این فعالیت‌ها توسط مرکز مدیریت بیماری‌های کشور و جهت اجرای نظام مراقبت عوامل خطر غیرواگیر انجام گرفت. بررسی از سرخوشه‌ها آغاز و گروه بررسی از سمت راست حرکت نموده و اعضای واحد شرایط خانوارها در پنج گروه سنی ۱۵-۲۴، ۲۵-۳۴، ۳۵-۴۴، ۴۵-۵۴ و ۵۵-۶۴ سال بررسی شدند و دقت شد تا در هر گروه

مقدمه

کیفیت زندگی عبارت است از برداشت افراد از موقعیت‌شان در زندگی که با توجه به زمینه‌ی فرهنگ و سیستم ارزشی که در آن زندگی می‌کنند و در ارتباط با اهداف و انتظارها و استانداردهای فرد می‌باشد (۱). تعریف سازمان بهداشت جهانی از سلامت به صورت رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی، نه فقط فقدان بیماری و معلولیت باعث گشترش توجه از بیماری به عملکرد و سایر جنبه‌های مثبت سلامتی شده است (۲، ۳).

کیفیت زندگی را می‌توان به عنوان یک ابزار عملیاتی برای سنجش سلامتی و رفاه کلی در نظر گرفت و در حال حاضر از آن به عنوان یک شاخص کلیدی که باید به صورت معمول در پژوهش‌های بهداشتی در نظر گرفته شود، یاد می‌کنند (۴، ۳). هم‌چنین در حال حاضر بحث کیفیت زندگی یکی از نگرانی‌های عمده‌ی سیاست‌مداران و متخصصان بهداشت عمومی بوده و به عنوان شاخصی برای اندازه‌گیری وضعیت سلامت در تحقیقاتی بهداشت عمومی و پژوهشی شناخته شده و به کار می‌رود (۶، ۵). استفاده از پرسشنامه‌های کوتاه بررسی کیفیت زندگی به صورت یک ابزار اقتصادی درآمده و این ابزار نه فقط برای پایش‌های بهداشتی، بلکه برای غربال‌گری در مطالعه‌های بالینی نیز می‌تواند کاربرد داشته باشد. یکی از این پرسشنامه‌ها، پرسشنامه‌ی کیفیت زندگی یوروویس ۸ سئوالی^۱ است که از تلخیص WHOQOL-BREF تهیه شده است. این پرسشنامه در چند کشور اروپایی استفاده شده و در مطالعات از روانی هم‌گرا و متمایز‌کننده‌ی^۲ قابل قبولی برخوردار بوده است (۷-۹).

تا کنون در ایران کیفیت زندگی به صورت گستردۀ و در جمعیت عمومی بررسی نشده و بررسی‌های محدود نیز با پرسشنامه‌های قدیمی و با تعداد سوالات بسیار زیاد صورت گرفته است. در حالی که سازمان بهداشت جهانی به منظور تهیه‌ی یک ابزار بین‌المللی کیفیت زندگی و به جهت تعهد به رویکرد جامع بهداشتی پرسشنامه‌ی WHOQOL-BREF را با جمع‌آوری سوالات از ۱۵ مرکز و فرهنگ مختلف در جهان

^۱EuroHIS-QOL 8-item

^۲Discriminate and Convergent Validity

شده در ۱۰ کشور مختلف نشان داده شده است که این پرسشنامه از پایایی هم‌گرا و متمایز‌کننده‌ی قابل قبولی برخوردار است (۸). در مطالعه‌ی حاضر نیز به منظور تعیین پایایی پرسشنامه، پرسشنامه‌ی مذکور در اختیار ۳۰ نفر قرار گرفت که آلفای کرونباخ آن برابر ۰/۷۵ به دست آمد و روابی محتوایی آن نیز به تایید ۴ نفر روان‌پژوهشک رسید. بعد از جمع‌آوری داده‌ها، تحلیل آن‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی ۱۱/۵ و آزمون‌های آماری لازم انجام شد. جهت مقایسه‌ی نمره‌ی کیفیت زندگی بر حسب متغیرهای مستقل اسمی از آزمون‌های آماری تی مستقل، آنالیز واریانس و برای بررسی همبستگی دو عامل کمی از ضریب همبستگی پرسون و جهت بررسی از نظر مخدوش‌کننده‌ها از رگرسیون چندگانه استفاده شد. انجام مصاحبه با رضایت کامل فرد و رازداری کامل انجام شد.

جدول ۱- پرسشنامه Euro His ترجمه شده به فارسی

کیفیت زندگی شما چطور است؟				
	خوب	متوسط	بد	خوب
چقدر از سلامتی تان راضی هستید؟	خوب	متوسط	بد	خوب
خوبی راضی	خوب	متوسط	بد	خوب
آیا برای زندگی روزمره انرژی کافی دارید؟	خوب	متوسط	بد	خوب
اصلاً	خوب	متوسط	بد	خوب
چقدر از توانایی تان برای انجام کارهای روزمره راضی هستید؟	خوب	متوسط	بد	خوب
خوبی راضی	خوب	متوسط	بد	خوب
چقدر از خودتان رضایت دارید؟	خوب	متوسط	بد	خوب
خوبی راضی	خوب	متوسط	بد	خوب
چقدر از روابط‌تان با دیگران راضی هستید؟	خوب	متوسط	بد	خوب
خوبی راضی	خوب	متوسط	بد	خوب
آیا پول کافی برای برآوردن نیازهای تان دارد؟	خوب	متوسط	بد	خوب
اصلاً	خوب	متوسط	بد	خوب
چقدر از شرایط محل سکونت تان راضی هستید؟	خوب	متوسط	بد	خوب
خوبی راضی	خوب	متوسط	بد	خوب

نتایج

در این مطالعه ۷۰۰ نفر شرکت داشتند که ۲ نفر از مطالعه حذف شدند. این مطالعه شامل ۳۵۲ نفر (۴/۵۰٪) مرد و ۳۴۶ نفر (۶/۴۹٪) زن بود. بیشترین فراوانی آزمودنی‌ها از نظر سطح

سنی، ۱۴۰ نفر (۷۰ نفر زن و ۷۰ نفر مرد) مورد پرسش قرار گیرند. از هر خانواده بیش از یک نفر برای هر گروه سنی-جنسی انتخاب نمی‌شد و اگر در خانواری بیش از یک فرد برای یک خانه‌ی جدول وجود داشت، از بین آن‌ها فردی انتخاب می‌گردید که روز و ماه تولدش به روز آمارگیری نزدیک‌تر بود. در صورت عدم حضور فرد واجد شرایط در محل، مجدداً به آن مکان مراجعه می‌شد و در صورتی که پس از یک بار مراجعه امکان مصاحبه وجود نداشت، فرد یا افراد دیگری از یک خانوار جدید جایگزین می‌شدند. کار بررسی فقط در بعد از ظهرها و روزهای تعطیل انجام و قبل از انجام مصاحبه از افراد اجازه گرفته می‌شد.

پرسشنامه‌ی مورد استفاده در این مطالعه پرسشنامه‌ی ۸ سوالی یورووهیس بود (۸). ابتدا پرسشنامه‌ی توسط روان‌پژوهشک از انگلیسی به فارسی ترجمه و سپس توسط کارشناس زبان انگلیسی از فارسی به انگلیسی بازگردانده شد. با مقایسه‌ی دو متن انگلیسی به دست آمده، اصلاحات لازم در ترجمه صورت پذیرفت و متن نهایی فارسی تهیه گردید.

جهت جمع‌آوری اطلاعات ابتدا در جلسه‌ی توجیهی، پرسشگران توسط مجری با پرسشنامه‌ی کیفیت زندگی هم‌زمان با سایر آشنا شدند. سپس پرسشنامه‌ی کیفیت زندگی هم‌زمان با این پرسشنامه‌های طرح بررسی عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر در اختیار جمعیت هدف قرار گرفت. پرسشنامه‌ها از طریق مصاحبه‌ی پرسشگر با افراد مورد مطالعه تکمیل و شفاف‌سازی لازم در مورد سوال‌ها انجام شد تا این که در مورد ساختار پرسشنامه یا سایر جنبه‌های سوال‌ها هیچ نقطه‌ی ابهامی برای شرکت کننده‌ها وجود نداشته باشد. فرد می‌بایست پاسخ خود را بر اساس وضعیت دوهفته‌ی اخیر بیان می‌نمود.

پرسشنامه از ۸ سوال تشکیل شده است که پاسخ‌ها ۵ گزینه‌ی خوبی ناراضی، ناراضی، متوسط، راضی و خوبی راضی را در بر می‌گیرند. متن پرسشنامه در جدول (۱) آمده است.

نمره‌دهی به صورت خوبی راضی = کاملاً (نمره‌ی ۵) تا خوبی ناراضی = اصلاً (نمره‌ی صفر) بود. بدیهی است که نمره‌های بالاتر نشانه‌ی کیفیت زندگی بالاتر است. در پژوهش‌های انجام

میانگین نمره‌ی کل کیفیت زندگی $28/18 \pm 4/6$ بود (جدول ۳). این میانگین در مردان $28/78 \pm 4/3$ و در زنان $27/57 \pm 4/8$ گزارش گردید ($P=0/001$).

تفاوت معنی‌داری بین افراد دارای فعالیت ورزشی یا تفریحی باشد زیاد، با دیگر افراد وجود داشت (تفصیل در جدول ۴) و میانگین نمره‌ی آن‌ها بیشتر از گروه بدون فعالیت بود. میانگین نمره‌ی کیفیت زندگی در افراد شهری بود $27/82 \pm 4/4$ و روستایی $28/66 \pm 4/8$ بود ($P=0/01$).

همبستگی معنی‌داری بین کیفیت زندگی با وزن ($r=0/095$) و قد ($r=0/193$) ($P<0/001$) وجود داشت به نحوی که افراد با وزن و قد بالاتر کیفیت زندگی بالاتر داشتند. میانگین کیفیت زندگی در افراد سیگاری پایین‌تر از افراد غیرسیگاری بود ($P=0/03$). افراد بی‌سواد دارای نمره‌ی کیفیت زندگی پایین‌تری از گروه‌های دیگر بودند ($F=13/246$, $P<0/001$, $F=13/814$, $P<0/001$) (جدول ۴). همچنین میانگین نمره‌ی کیفیت زندگی با افزایش درآمد افزایش داشت ($P=0/001$).

رابطه‌ی معنی‌داری بین نمره‌ی کیفیت زندگی و شاخص توده‌ی بدنی مشاهده نشد. همبستگی بین سن و کیفیت زندگی معنی‌دار بود و با افزایش سن، نمره‌ی کیفیت زندگی کاهش نشان می‌داد ($r=-0/197$, $P<0/001$).

همچنین همبستگی مثبتی بین دفعات مصرف میوه (تفصیل در جدول ۵) و سبزی ($F=0/150$, $P<0/001$) با کیفیت زندگی مشاهده شد. افراد مبتلا به پرفشاری خون، میانگین نمره‌ی کیفیت زندگی پایین‌تری نسبت به افراد بدون ابتلا به آن داشتند ($P<0/001$).

در تحلیل رگرسیون متغیرهای سن، جنس، محل سکونت، شاخص توده‌ی بدنی، درآمد، سطح سواد، مصرف سیگار و ابتلا به فشار خون وارد شدند ولی همان طور که در جدول ۶ آمده است، متغیرهای شاخص توده‌ی بدنی، سطح سواد و محل سکونت از مدل خارج شدند ($R^2 = 0/11$). در تحلیل مقادیر باقی‌مانده و پیش‌بینی کننده، نرمال بوده و رابطه‌ای نداشتند. بر این اساس درآمد زیر ۲۰۰ هزار تومان، جنسیت

جدول ۲- مشخصات جمعیت‌شناختی جمعیت ۱۵-۶۵ ساله‌ی

مورد مطالعه در استان کردستان

مشخصات	درصد	فراوانی	درصد
جنسیت			
مرد	۵۰/۴	۳۵۲	۴۹/۶
زن		۳۴۶	
سطح سواد			
بی‌سواد	۳۲/۷	۲۲۸	۲۹/۷
ابتدا		۲۰۷	۳۰
راهنمایی و متوسطه		۲۱۰	۷/۶
دیپلم و بالاتر		۵۳	
خانه‌دار	۴۱/۴	۲۸۹	۲/۶
کارمند دولتی یا خصوصی		۱۸	
آزاد	۲۷/۱	۱۸۹	۰/۰۴
شغل		۳۰	۴
دانش‌آموز و دانشجو		۲۸	۱۱/۳
بی‌کار		۷۹	۹/۳
بازنشسته		۶۵	
سایر موارد			
درآمد			
هزار تومان و کمتر	۸۱/۱	۵۶۶	۱۶/۲
۷۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان		۱۱۳	۰/۶
هزار تومان و بالاتر		۴	۰/۰۲
پاسخ نداده		۱۵	
قومیت			
کرد	۹۴/۷	۶۶۱	۵/۳
غیرکرد		۳۷	
محل سکونت			
شهری	۵۰/۴	۳۵۲	۴۹/۶
روستایی		۳۴۶	
فعالیت ورزشی			
بلی	۱۴/۶	۱۰۲	۸۵/۴
خیر		۵۹۶	
سابقه‌ی مصرف			
بلی	۱۵/۹	۱۱۱	۸۴/۱
خیر		۵۸۷	

تحصیلات با افراد بی‌سواد با تعداد ۲۲۸ نفر (۳۲/۷٪) بود. بیشترین شغل، خانه‌دار با تعداد ۲۸۹ نفر (۴۱/۴٪) و بعد از آن شغل آزاد بود. ۶۶۱ نفر (۹۴/۷٪) از آزمودنی‌ها قومیت گرد داشتند.

در این مطالعه ۱۰۲ نفر (۱۴/۶٪) دارای فعالیت شدید ورزشی یا تفریحی بودند. تعداد ۱۱۱ نفر (۱۵/۹٪) سابقه‌ی حال حاضر نیز سیگار مصرف می‌کردند و ۵۸ نفر (۸/۳٪) سیگار را ترک کرده بودند (جدول ۲). میانگین شاخص مصرف سیگار داشتند که از این افراد ۱۰۱ نفر (۹۱٪) در توده‌ی بدنی برابر $25/9 \pm 4/8$ بود. میانه‌ی بیشتر سوال‌ها ۴

جدول ۳- میانگین، انحراف معیار، میانه و چو لوگی پاسخ‌های سوال‌ها پرسش‌نامه در جمعیت ۱۵-۶۴ ساله‌ی استان کردستان

سوال	نمره کل	میانگین	انحراف معیار	میانه	چو لوگی
کیفیت زندگی شما چطور است؟	۲/۳۱	۰/۷۹	۳	-۰/۱۱	-۰/۱۱
چقدر از سلامتی تان راضی هستید؟	۳/۶۸	۰/۹۲	۴	-۰/۶۵	-۰/۶۵
آیا برای زندگی روزمره انرژی کافی دارید؟	۳/۵۳	۰/۹۵	۴	-۰/۳۴	-۰/۳۴
چقدر از توانایی تان برای انجام کارهای روزمره راضی هستید؟	۳/۵۸	۰/۸۴	۴	-۰/۶۶	-۰/۶۶
چقدر از خودتان رضایت دارید؟	۳/۶۴	۰/۹۱	۴	-۰/۴۵	-۰/۴۵
چقدر از روابط تان با دیگران راضی هستید؟	۴/۰۸	۰/۶۹	۴	-۰/۸۲	-۰/۸۲
آیا پول کافی برای برآوردن نیازهای تان دارید؟	۲/۷۹	۱/۰۳	۳	۰/۲۴	۰/۲۴
چقدر از شرایط محل سکونت تان راضی هستید؟	۳/۵۶	۰/۹۷	۴	-۰/۵	-۰/۵
نمره کل	۲۸/۱۸	۴/۶۳	۲۸	-۰/۲۵	-۰/۲۵

مطالعه‌ی دیگر نیز بین زن و مرد تفاوت‌هایی از نظر کیفیت زندگی وجود داشته است و زن‌ها دارای کیفیت زندگی پایین‌تر بوده‌اند (۲۱-۱۸). ممکن است محدود بودن فعالیت فیزیکی زنان در بیرون از خانه، حساسیت بیشتر زنان در رویارویی با رویدادهای ناگوار و سایر عوامل اجتماعی فرهنگی مرتبط با جنسیت در جوامع مختلف روی کیفیت زندگی دو جنس تاثیرهای متفاوتی داشته باشند (۱۷).

در این مطالعه با افزایش سن، نمره‌ی کیفیت زندگی کاهش یافت ($P<0.001$). در مطالعه‌های دیگر نیز افزایش سن با کاهش کیفیت زندگی رابطه داشته است (۱۴، ۱۶، ۱۸) و به نظر می‌رسد افزایش سن تاثیرهای روانی و جسمی وسیعی بر روی فرد داشته باشد. از آنجا که با افزایش سن احتمال ابتلا به بیماری‌ها و ناتوانی‌ها نیز افزایش می‌یابد، توجه به عوامل حمایتی و توانمندسازی افراد مسن جهت ارتقای کیفیت زندگی آنان اهمیت دارد و باید سیاست‌های پیشگیرانه و درمانی برای حفظ سطح بهداشت سالمندان افزایش یابد (۱۷).

مونث، غیرسیگاری بودن و عدم ابتلا به پرفشاری خون برابر صفر و درآمد بالای ۲۰۱ هزار تومان، جنسیت مذکور، سیگاری بودن و ابتلا به پرفشاری خون برابر یک (۱) فرض شدند و فرمول زیر به دست آمد:

$$\begin{aligned} & -(\text{ابتلا به پرفشاری خون} \times 1/28) = \text{نمره کیفیت زندگی} \\ & + (\text{درآمد} \times 2/35) - (\text{سن} \times 0/048) - (\text{صرف سیگار} \times 1/09) \\ & + (\text{جنس} \times 1/43) + 29/2 \end{aligned}$$

بحث و نتیجه‌گیری

در طی دو دهه‌ی گذشته کیفیت زندگی یکی از مهم‌ترین موضوعات تحقیق‌های بالینی بوده است.

در این مطالعه، کیفیت زندگی در مردان بالاتر از زنان بود (۰/۰۰۱). در مکزیک بین دو جنس تفاوت معنی‌داری وجود نداشت و در مطالعات مارتين فرناندز و بهمنی و زکی نیز بین دو جنس تفاوتی مشاهده نشد، ولی در مطالعه‌های وحدانی‌نیا، پورکاخکی، آلبورکردی و نجاتی نیز کیفیت زندگی بین دو جنسیت متفاوت بوده است (۱۰-۱۷). در چند

جدول ۴- مقایسه‌ی نمره‌ی کیفیت زندگی بر حسب وضعیت‌های مختلف در جمعیت ۱۵-۶۴ ساله‌ی استان کردستان

P	df	T	انحراف معیار	میانگین	تعداد	مشخصات
۰/۰۰۱	۶۹۶	۳/۴۶۵	۴/۳	۲۸/۷۸	۳۵۲	جنسیت
			۴/۸	۲۷/۵۷	۳۴۶	زن
۰/۰۰۲	۶۹۶	۳/۱۶۲	۴/۲	۲۹/۵۱	۱۰۲	فعالیت ورزشی
			۴/۶	۲۷/۹۵	۵۹۶	
۰/۰۱	۶۹۶	۲/۳۷	۴/۴	۲۷/۸۲	۳۵۲	سکونت
			۴/۸	۲۸/۶۶	۳۴۶	
۰/۰۳	۶۹۶	۲/۰۹۸	۴/۴	۲۷/۳۳	۱۱۱	سابقه‌ی مصرف سیگار
			۴/۶	۲۸/۳۴	۵۸۷	

* معنی‌داری

جدول ۵- مقایسه‌ی نمره‌ی کیفیت زندگی در گروه‌های با سطح سواد و درآمد متفاوت در جمعیت ۱۵-۶۴ ساله‌ی استان کردستان

P	F	میانگین مرتعات	Df	مجموع مرتعات	کیفیت زندگی	متغیر
<0.001*	۱۳/۲۴۶	۲۷۰/۲۹۳	۳	۸۱۰/۸۷۸	بین گروهی	سطح سواد
		۲۰/۴۰۵	۶۹۴	۱۴۱۶۱/۰۹۳	داخل گروهی	
			۶۹۷	۱۴۹۲۰/۳۷۹	مجموع	
<0.001*	۱۳/۸۱۴	۲۸۱/۲۲۳	۳	۸۴۳/۶۶۸	بین گروهی	درآمد
		۲۰/۳۵۸	۶۹۴	۱۴۱۲۸/۳۰۴	داخل گروهی	
			۶۹۷	۱۴۹۷۱/۹۷۱	مجموع	

ارتقای کیفیت زندگی یک جامعه بوده و با توجه به تاثیر مستقیم ورزش در سلامتی، گسترش فرهنگ ورزش در جامعه باید به عنوان یکی از اصلی‌ترین فعالیت‌های آموزشی بهداشتی در نظر گرفته شود.

میانگین نمره‌ی کیفیت زندگی در افراد سیگاری پایین‌تر از افراد طبیعی بود ($P<0.05$). در مطالعه‌ای که توسط پورکاخکی و همکاران در بیماران دیابتی انجام شد، رابطه‌ی معنی‌داری بین کیفیت زندگی و جنسیت و میزان تحصیلات مشاهده گردید (۱۵). در مطالعه‌ی ویدرین^۲ مصرف سیگار سبب کاهش کیفیت زندگی در افراد مبتلا به ایدز شده بود (۲۸). در مطالعه‌ای در دانمارک مشخص شد که مصرف سیگار، فعالیت کم، چاقی و مصرف الكل زیاد تاثیر منفی روی کیفیت زندگی داشته است (۲۹) ولی در مطالعه‌ی گراهام^۳ بین مصرف سیگار و کیفیت زندگی رابطه‌ای وجود نداشت (۱۰). در مطالعه‌ی حاضر بین شاخص توده‌ی بدنی و کیفیت زندگی در رابطه‌ی معنی‌داری مشاهده نشد، ولی در مطالعه‌ی گراهام در مکریک رابطه‌ی منفی بین این دو وجود داشته است و با افزایش شاخص توده‌ی بدنی کیفیت زندگی کاهش می‌یافته است (۱۰).

کیفیت زندگی در افراد ساکن در شهر پایین‌تر از افراد ساکن در روستا بود ($P=0.01$) که می‌تواند ناشی از بالاتر بودن تنش و فشارهای روانی و یا فعالیت جسمانی کمتر در مردم شهرنشین باشد. هم‌چنین کیفیت زندگی در افراد کم درآمد پایین‌تر بود ($P<0.001$). بدیهی است که مشکلات اقتصادی، رفاه کلی فرد را تحت تاثیر قرار داده و کیفیت زندگی نیز به عنوان

در این مطالعه میانگین نمره‌ی کیفیت زندگی در افراد دارای سطح تحصیلات کمتر از پنجم ابتدایی پایین‌تر از بقیه بود ($P<0.001$). در مطالعه‌ی نبئی این تفاوت وجود نداشت (۲۲). ولی در مطالعات دیگر دیده شده که افزایش سطح تحصیلات اثر مثبتی روی کیفیت زندگی داشته است. این یافته‌ها نشان می‌دهند که تحصیلات به عنوان یک نقطه‌ی مثبت در برخورداری از یک زندگی سالم و باکیفیت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است (۲۳، ۱۴).

جدول ۶- نتیجه‌ی تحلیل عوامل موثر بر نمره‌ی کیفیت زندگی با رگرسیون چند متغیره

معنی‌داری	t	Unstandardized Coefficients		مدل
		Std. Error	B	
.0001<	53/42	.0/54	29/2	Constant
.0001<	-3/77	.0/01	-0/048	سن
.0001<	-4/24	.0/35	2/35	درآمد
.002	-2/25	.0/48	-1/09	مصرف سیگار
.003	-2/16	.0/59	-1/28	پرفشاری خون
.0001<	4/06	.0/35	1/43	جنسیت

در مطالعه‌ی ما هم‌چنین کیفیت زندگی افراد دارای فعالیت شدید ورزشی یا تفریحی بالاتر از افراد دیگر بود ($P=0.002$). در مطالعات دیگری نیز فعالیت فیزیکی با سطح بالای کیفیت زندگی همراه بوده است (۲۵، ۲۶). در مطالعه‌ی وون مکنسن^۱ نیز ورزش به عنوان عامل بهبود مشکلات روانی در بیماران مبتلا به هموفیلی ذکر شده است (۲۶). در مطالعه‌ی یکه‌فلاح تمرين‌های ورزشی، نمره‌ی کیفیت زندگی را در بیماران آسمی افزایش داد (۲۷). پس ورزش یکی از عوامل مهم در

²Vidrine³Graham¹Von Mackensen

مدل حذف گردیده است. از محدودیت‌های طرح می‌توان به حذف بررسی برخی از متغیرهای مورد نظر به دلیل الزام به کاهش حجم سوال‌ها اشاره نمود. زیرا طرح همزمان با طرح کشوری بررسی عوامل خطر غیرواگیر صورت پذیرفت و در صورت اختصاص سوال‌ها بیشتر به کیفیت زندگی احتمال می‌رفت که به دلیل طولانی بودن سوال‌ها و خستگی، پذیرش افراد کاهش یابد.

در این مطالعه کیفیت زندگی در زنان پایین‌تر از مردان بود و لازم است عوامل موثر بر کاهش کیفیت زندگی در زنان مورد بررسی بیشتری قرار گیرد و در جهت رفع این عوامل منفی برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شود. هم‌چنین با توجه به پایین بودن کیفیت زندگی در افراد مسن، این قشر باید مورد توجه بیشتری قرار بگیرند. به دلیل ارتباط ورزش و تنفسی کم و مصرف سیگار با کیفیت زندگی پایین، لازم است این مسئله نیز مورد توجه بیشتری در جامعه قرار گیرد و برنامه‌ریزی‌های لازم در جهت تصحیح این عوامل در جامعه و ارتقای کیفیت زندگی صورت گیرد.

شاخص سلامت و رفاه کلی تحت تاثیر آن قرار می‌گیرد. در مطالعه‌ی زکی نیز وضعیت اقتصادی اجتماعی در کیفیت زندگی موثر بوده و در مطالعه‌ی وحدانی‌نیا نیز افراد شاغل کیفیت زندگی بالاتری نسبت افراد غیرشاغل داشتند (۱۴، ۱۳). در مطالعه‌ی ما افرادی که از تغذیه‌ی مناسب برخوردار نبودند و میوه و سبزی کمتری مصرف می‌کردند کیفیت زندگی پایین‌تری داشتند ($P < 0.001$) که این نیز می‌تواند ناشی از تاثیر تغذیه‌ی نامناسب بر سلامتی و یا بازتاب مشکلات اقتصادی در این گونه افراد باشد.

در تحلیل رگرسیون با تطبیق عوامل مختلف، جنس مرد ۱/۴۳ نمره، درآمد بالا ۲/۳۵ نمره، هر سال سن ۰/۰۴۸ نمره، سیگاری بودن ۱/۰۹ نمره و ابتلا به پرفساری خون ۱/۲۸ نمره در میانگین نمره‌ی کیفیت زندگی تاثیر داشتند. علت این که برخی عوامل در تحلیل رگرسیون تاثیری نداشتند، می‌تواند مربوط به وجود ارتباط آن‌ها با دیگر عواملی باشد که در مدل وارد شده و تاثیر خود را از این طریق نشان داده‌اند. مثلاً سطح سواد می‌تواند با افزایش درآمد همراه باشد و لذا سطح سواد در

References

1. Guyatt GH, Feeny DH, Patrick DKL. Measuring health related quality of life. Ann Intern Med 1993; 118: 622-9.
2. Kaplan H, Sadock B. Kaplan and Sadock's synopsis of psychiatry behavioral science clinical psychiatry. 10th ed. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins; 2007: 12.
3. Kaplan H, Sadock B. Kaplan and Sadock's comprehensive textbook of psychiatry. 9th ed. Philadelohia: Lippincott Williams and Wilkins; 2009: 2947.
4. Power M. Developing common instruct for quality of life. In: Nosikov A, Gudex C. (editors). EUROHIS: Developing common instruct for health surveys. 1st ed. Portland: IOS; 2003: 145-64.
5. Gill TM, Feinstein AR. A critical appraisal of the quality of quality-of-life measurements. JAMA 1994; 272(8): 619-26.
6. Guggenmos I. Quality of life. In: Hoziman I. (editor). Quality of life and health. Berlin: Black Well Wisenchaft; 1995: 350.
7. Smith GT, McCarthy DM, Anderson KG. On the sins of short-form development. Psychol Assess 2000; 12: 102-11.
8. Schmidt S, Mühlau H, Power M. The EUROHIS-QOL 8-item index: Psychometric results of a cross-cultural field study. Eur J Pub Health 2006; 16(4): 420-8.
9. World Health Organization. Program on mental health. WHO QOL-Brief- Introduction, Administer scoring and generic verc of the assessment field trial. 1999: 1-14.
10. Graham JE, Stoebner-May DG, Ostir GV, Al Snih S, Peek MK, Markides K, et al. Health related quality of life in older Mexican Americans with diabetes: A cross-sectional study. Health Qual Life Outcomes 2007; 5: 39.
11. Martin-Fernandez J, Gomez-Gascon T, Beamud-Lagos M, Cortes-Rubio JA, Alberquilla-Menendez-Asenjo A. Professional quality of life and organizational changes: A five-year observational study in primary care. BMC Health Serv Res 2007; 7: 101.

12. Bahmani B, Tamadoni M, Asgari M. [Quality of life and its relation to religion attitude in students of south unite of Azad University in Tehran]. *Teb va Tazkieh* 2004; 53: 32-44. (Persian)
13. Zaki MA. [Quality of life and its relationship with self-esteem in male and female student of Isfahan University]. *Iranian journal of psychiatry and clinical psychology* 2008; 13(4): 416-9.
14. Vahdani-Nia M, Goshtasebi A, Montazeri A, Maftoun F. [Health-related quality of life and elderly population in Iran: A population-based study]. *Payesh* 2005; 4(2): 113-20.
15. Darvishpour Kakhki A, Etaati Z, Mirsaedi M, Masjedi MR, Velayati AA. [Quality of life of TB patients referred to Mahshid Daneshvari Hospital in 2005]. *Iranian journal of infectious diseases and tropical medicine* 2006; 11(32): 49-56.
16. Albou Kordi M, Ramezani MA, Arizi F. A study on the quality of life among elderly Shahinshahr area of Isfahan province in year 2004. *Sci Med J* 2007; 51(4): 701-7.
17. Nejati V, Ashayeri H. Health related quality of life in elderly in Kashan. *Iranian journal of psychiatry and clinical psychology* 2008; 14(1): 56-61.
18. Kranciuakite D, Rastenyte D, Jureniene K. Evaluation of the quality of life in the population of Kaunas city using the SF-12 questionnaire. *Medicina* 2007; 43(6): 501-7.
19. Tsai SY, Chi LY, Lee CH, Chou P. Health-related quality of life as a predictor of mortality among community-dwelling older persons. *Eur J Epidemiol* 2007; 22(1): 19-26.
20. Knurowski T, Lacic D, Van Dijk JP, Geckova AM, Tobiasz-Adamczyk B, Van den Heuvel WJ. Survey of health status and quality of life of the elderly in Poland and Croatia. *Croat Med J* 2004; 45(6): 750-6.
21. Yun YH, Kim SH, Lee KM, Park SM, Kim YM. Age, sex, and co-morbidities were considered in comparing reference data for health-related quality of life in the general and cancer populations. *J Clin Epidemiol* 2007; 60(11): 1164-75.
22. Nabaie B, Kheiltash A, Montazeri M, Sedaghat M, Meysamie A. [The comparison of quality of life in patients with leukemia and lymphoma]. *Journal of Tehran University of Medical Sciences* 2005; 63(5): 399-404. (Persian)
23. Meek S. Contribution of education to health and life satisfaction in older adults mediated by negative effect. *J Age Health* 2001; 13: 92-119.
24. Klein BE, Klein R, Moss SE. Self-rated health and diabetes of long duration. The Wisconsin epidemiologic study of diabetic retinopathy. *Diabetes Care* 1998; 21: 236-40.
25. De Rekeneire N, Resnick HE, Schwartz AV, Shorr RI, Kuller LH, Simonsick EM, et al. Diabetes is associated with subclinical functional limitation in nondisabled older individuals: The health, aging, and body composition study. *Diabetes Care* 2003; 26: 3257-63.
26. Von Mackensen S. Quality of life and sports activities in patients with haemophilia. *Hemophilia* 2007; 13(2): 38-43.
27. Yeke Fallah L. [The effect of physical exercise on the pulmonary function and quality of life in asthmatic patients]. *Journal of Sabzevar Faculty of Medical Sciences* 2006; 12(4): 14-9. (Persian)
28. Vidrine DJ, Arduino RC, Gritz ER. The effects of smoking abstinence on symptom burden and quality of life among persons living with HIV/AIDS. *AIDS Patient Care STDS* 2007; 21(9): 659-66.
29. Bronnum-Hansen H, Juel K, Davidsen M, Sorensen J. Impact of selected risk factors on quality-adjusted life expectancy in Denmark. *Scand J Public Health* 2007; 35(5): 510-5.