

میکرومورفولوژی روانه های گل فشان ناپگ

تاریخ دریافت مقاله: ۸۹/۱/۲۹

تاریخ پذیرش مقاله: ۸۹/۲/۳۰

دکتر احمد عباس نژاد (دانش کده علوم، بخش زمین شناسی، دانش گاه شهید باهنر کرمان)
دکتر حسین نگارش* (دانش بار دانش کده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دانش گاه سیستان و بلوچستان)

چکیده

گل فشان ناپگ که یکی از معروف ترین و دیدنی ترین گل فشان های ایران است در غرب بندر چابهار و ۱۷ کیلومتری جنوب غربی روستای کهیر قرار دارد. اگر جه مشخصات کلی این گل فشان توسط پژوهش گران متعدد مورد بررسی قرار گرفته است ولی تاکنون یکی از پدیده های جالب آن که عبارت است از تنوع شدید در میکرومورفولوژی روانه های سطح آن مطالعه نشده است. در این مقاله ، پس از معرفی اجمالی گل فشان ، ابتدا گل خروجی از نظر ترکیب هیدروشیمیایی و کانی شناختی مطالعه گردیده و سپس هفت نوع سطح دارای میکرومورفولوژی مختلف شناسائی و با ارائه تصویر تشریح گردیده اند. نحوه تشکیل و موقعیت مکانی و سنی آن ها نیز مورد بررسی قرار گرفته و در پایان به ارتباط تشکیل و تکامل آن ها با اصول زیر بنایی ژئومورفولوژی پرداخته خواهد شد.

واژه های کلیدی


گل فشان ، ناپگ ، چابهار ، میکرومورفولوژی

پرتاب جامع علوم انسانی

*نویسنده رابط h_negaresh@yahoo.com

مقدمه

گل فشنان ناپگ در کفه رسی و خشک ساحلی (Dry Clay Playa) غرب بندر چابهار و ۱۷ کیلومتری جنوب غربی روستای کهیر واقع شده است (شکل ۱). مختصات جغرافیایی آن ۵۶°۱۰' طول شرقی و ۲۸°۱۰' عرض شمالی می باشد. اگر چه اسیند (Snead,1970,p509) ارتفاع این گل فشنان را از سطح زمین و از سطح دریا به ترتیب ۷۲ و ۱۰۲ متر اعلام نموده، ولی نگارش و خسروی در سال ۱۳۸۲ (Khosravi,2008,p59 Negarest & GPS) ارتفاع این گل فشنان را توسط GPS از سطح دریا ۳۹ متر و از زمین های مسطح پیرامون ۲۴ متر اندازه گیری کرده اند، اما با توجه به فعالیت های زیاد سال اخیر، ارتفاع گل فشنان در آذر ماه سال ۱۳۸۸ به ۳۷ متر از سطح زمین رسیده است.



شکل ۱: موقعیت جغرافیایی گل فشنان ناپگ در جلگه ساحلی دریای عمان

قطر مخروط اصلی و بزرگ آن حدود ۸۰۰ متر و وسعت آن حدود ۴۰ تا ۵۰ هکتار است . لذا یکی از وسیع ترین گل فشنان های ساحلی ایران محسوب می شود . روانه های قدیمی گل فشنان ناپگ حدود ۳۰۰-۵۰۰ متر به اطراف پخش شده اند و به صورت حداقل ۷-۱۵ لایه پوست پیازی یکدیگر را

پوشانده اند (نگارش و یغفوری، ۱۳۷۶، ۲۹). ضخامت لایه ها $0/5-2$ متر است. روانه های گلی جدید تنها حدود ۱۰۰ متر از دهانه دور شده اند و به علت رنگ خاکستری تیره نسبت به روانه های قدیمی قابل شناسائی می باشد.

میزان گل خروجی از این گل فشان کاملاً متغیر است. براساس شواهد، گاهی صدها و یا هزاران متر مکعب گل از آن خارج می گردد و در موقعی نیز فعالیت آن کاملاً قطع می شود. همراه با گل ها قطعه سنگ هایی با ابعاد تقریبی ۲۵ سانتی متر نیز بیرون رانده شده که به نظر می رسد لایه های ماسه سنگی و آهکی دیواره مجرما باشند. دمای گل 30° درجه سانتی گراد است که نزدیک به دمای هوای اطراف می باشد.

این گل فشان در حال حاضر فعال بوده و گل خاکستری رنگ خروجی با تشکیل حباب و ترکیدن آن هم راه است (شکل ۲).



شکل ۲: تصویری از حباب های گازمتان خروجی از گل فشان ناپگ

آهنگ فعالیت گل فشن ناپگ یک نواخت نیست ، به طوری که فعالیت آن قطع می شود ، گاهی تنها حباب از گلی که جاری نیست خارج می گردد و در مواردی روانه های گل تا مسافت چند ده متر دور می شود. در مواردی فعالیت آن انفجاری بوده و می توان قطعات پرتاب شده را در اطراف رویت نمود . عادی ترین فعالیت آن خروج اندک گل هم راه با حباب های گاز است . جنس گاز بر اساس مشتعل شدن آن متان در نظر گرفته می شود.

مورفولوژی کلی گل فشن ناپگ به صورت یک مخروط بزرگ شیب دار است که در قسمت میانی آن بخشی از زمین به صورت نیم دایره به سمت پایین سقوط کرده و در وسط این بخش گبدهی ساخته شده که دارای دهانه (کراتر) رخنه دار است. روانه های گلی از رخنه این دهانه خارج می گردند . قطر و عمقی دهانه به ترتیب حدود ۱۰ متر و ۲-۳ متر است . به نظر می رسد تشکیل دهانه ناشی از یک انفجار شدید بوده است. وسیع و کم شیب بودن حاشیه بیرونی گل فشن و پرشیب و کوچک بودن گبدهی میانی آن حاکی از این است که در مراحل اولیه فعالیت خود گل رقیق تر و بیشتری را بیرون می زده است و در حال حاضر گل آن غلیظ شده و مقدار آن نیز کاهش یافته است.

نه تنها خود گل فشن ناپگ به عنوان یک پدیده نادر ژئوتوریستی برای بازدید کنندگان عام و متخصص جالب است (نگارش، ۱۳۸۵، ۶۷)، بلکه تغییر در میکرو مورفولوژی سطح آن هم بسیار جالب بنظر می رسد. بازدید کننده مشاهده می کند که از محلی که وارد سطوح شیب دار مخروط گل فشن می شود ابتدا سطح صاف بوده و راه رفتن روی آن بدون مشکل و به آسانی صورت می گیرد ، ولی در بخش های میانی مخروط وارد سطوحی می شود که به تدریج ناصاف می گردد . به طوری که در مرحله اول عبور از آن ها سخت و دشوار بوده و شکاف های عمیق و سطوح تیز بین آن ها راه رفتن را مشکل می سازد . مجدداً با ادامه مسیر و نزدیک شدن به دهانه، آن ها بتدریج به سطوح صاف تبدیل می گردند و زبانه های تازه خشک شده و کاملاً صاف نمایان می شوند. لذا توجیه علمی این تغییرات به اندازه توجیه علمی ایجاد و فعالیت گل فشن جالب است . پس یکی از پدیده های جالب مربوط به این گل فشن مورد بحث این مقاله مورفولوژی سطحی روانه های سطحی آن است که از حاشیه به سمت مرکز آن تغییر می کند و نمونه های متنوع و جالبی از میکرومورفولوژی را به نمایش می گذارد که تا کنون توجیهی در مورد آن ها ارائه نشده است .

ابزار و روش

در این مطالعه، سطوح مختلف روانه های گلی گل فشن از قدیمی ترین تا جدید ترین در صحرا مورد بازدید و مطالعه قرار گرفته و سن نسبی (قدیم و جدید بودن) آن ها تعیین گردید. هم چنان ترکیب شیمیایی گل و آب آن و نیز ترکیب کانی شناختی آن با استفاده از دستگاه XRD تعیین گردید و یک مدل هفت مرحله ای برای تکوین مورفولوژی سطح روانه ها ارائه شده است.

مشخصات گل های خروجی

مشخصات گل بر میزان گسترش، ضخامت و میکرو مورفولوژی روانه های خروجی تأثیر به سزانی دارد که در اینجا مورد بررسی قرار می گیرد. گل های خروجی از دهانه گل فشن ناپگ حاوی گاز متان می باشند. این گاز که ظاهرآ در عمق به صورت محلول در گل بوده و نیروی اصلی رانش گل به سطح زمین است، در نزدیکی سطح زمین که فشار کاهش می یابد به صورت فاز مستقل (جباب) در آمده و خارج می گردد.

مقدار آب آن تاحدی متغیر بوده و ممکن است به نحوی به تغذیه لایه های آبدار زیرین ارتباط داشته باشد، ولی بر اساس مشاهدات انجام شده در سالیان متتمادی از آن، مقدار آب آن در حد ۲۰-۳۰ درصد بر آورد می گردد. در جدول ۱ مقدار بعضی از عناصر موجود در آب گل فشن نشان داده شده است. و فور سدیم حاکی از شور بودن آن است که می تواند ناشی از منشاء آن از آب دریا و یا تماس با لایه های سرشار از نمک باشد. و فورسدیم موجب انتشار رس های گل می شود که کمک به چسبندگی و دیر خشک شدن آن می کنند.

جدول ۱: مقادیر عناصر معدنی موجود در آب خروجی از گل فشن ناپگ بر حسب ppm

نوع عناصر	Na سدیم	K پتاسیم	Li لیتیم	Mg مینزیم	Ca کلسیم	Pb سرب	Fe آهن
غلظت بر حسب ppm	۲۵۰	۲۰/۵	۵	۴۶	۶۸	۰/۷	۲/۷

مأخذ: آزمایشگاه شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

با توجه به چسبندگی گل و نرم بودن آن می توان انتظار داشت که به لحاظ کانی شناختی به طور عمده از رس تشکیل شده باشد و آنالیز نمونه ای از گل با اشعه ایکس در بخش زمین شناسی

دانش گاه شهید باهنر کرمان حاکی از این است که به طور عمده از رس ایلیت تشکیل شده است. ولی علاوه بر آن آهک (مکیت)، مونتموریلونیت (Montmorillonit)، کوارتز و به مقدار ناچیز کانی های دیگر نیز در آن وجود دارد.

گل خروجی به علت ریز دانه بودن، چسبندگی و وفور املاح بسیار کند خشک می شود و یک زیانه با ضخامت مثلاً $0/5$ متر ممکن است چند ماه طول بکشد تا کاملاً خشک گردد. این خصوصیت بر سرعت تشکیل ترک های سطح آن ها تأثیر دارد. به عبارت دیگر، از آن جا که میزان انقباض ناشی از خشک شدن $20-30$ درصد است و به تبع خشک شدن، تشکیل ترک ها به صورت تدریجی و در طی چند سال پیش می رود، لذا ترک ها چندین هفته پس از توقف روانه شروع به ظاهر شدن کرده و تا چند سال پس از آن در حال افزایش و عمیق شدن می باشند.

انواع میکرومورفولوژی سطح روانه ها و نحوه تشکیل آن ها

به طور کلی در این گل فشن در سطح روانه های مرطوب و تازه تا دورترین و قدیمی ترین آن ها هفت نوع میکرومورفولوژی تشخیص داده شد که عبارتند از:

- ۱- روانه های تازه و مرطوب : تازه ترین روانه های خروجی از دهانه گل فشن که مرطوب و تیره بوده و سطح آن ها صاف و مواج است در این گروه قرار می گیرد (شکل ۳).



شکل ۳: مورفولوژی سطح روانه های تازه و مرطوب (نوع ۱)

-۲- روانه های تازه خشک شده : روانه هایی که روزها تا چند هفته قبل خارج گردیده و در حال حاضر تنها لایه نازک سطحی آن ها خشک شده در این گروه قرار می گیرند . سطح آن ها صاف و مواد ولی به علت خشک بودن سفید است و از آن جا که خشک شدگی تنها در سطح صورت گرفته آن ها قادر ترک های سطحی می باشند (شکل ۴).



شکل ۴: مورفولوژی سطح روانه های تازه خشک شده (نوع ۲) در قسمت میانی تصویر (محدوده X)

۳- روانه های نیمه خشک : روانه هایی که چند هفته تا چند ماه قبل خارج گردیده اند در این گروه قرار می گیرند . در آن ها میزان از دست دادن رطوبت بیشتر است و لایه خشک شده سطحی ضخیم تر می باشد . به همین دلیل ترک هائی در سطح آن ها ایجاد شده اند که با گذشت زمان عمیق ، عریض و زیاد خواهند شد . سطح این روانه ها هم صاف ، سفید ، و مواج است ، ولی تفاوت آن ها با روانه های مرحله قبل وجود ترک ها است (شکل ۵) .



شکل ۵ : مورفولوژی سطح روانه های نیمه خشک (نوع ۳) مه با تن روش و تعداد اندازی ترک مشخص می شود .

۴- روانه های خشک : براساس شواهد میدانی، این روانه ها چندین ماه تا چند سال سن دارند. لذا زمان کافی برای خشک شدن داشته اند. به تبع آن و به علت از دست دادن شدید آب ، ترک های فراوان و گاه عمیقی در آن ها ایجاد شده است . سطح آن ها ناصاف و دارای شکاف های کم عرض تا عریض و بسیار عمیق (تا کف لایه) است (شکل ۶).



شکل ۶ : مورفولوژی روانه های خشک (نوع ۴) که با وفور ترک های ریز و درشت و عمیق همراه است .

۵- روانه های خشک کمی فرسوده: این روانه ها چندین سال عمر دارند و سطوح بین ترک های آن ها توسط باران در حال فرسایش شدید بوده و مواد حاصله به داخل شیارهای باز عمیق ایجاد شده و در مرحله قبل انتقال یافته اند. لذا آن ها به صورت سطوح ناصاف و خشن احاطه شده توسط ترک ها در آمده اند. خشن ترین سطوح میکرومورفولوژی گل فشن به این گروه تعلق دارند، به طوری که راه رفتن روی آن ها بسیار مشکل است (زمردیان، ۱۳۸۱، ۱۸۱) و بلحاظ موقعیتی در قسمت های میانی مخروط (نه نزدیک دهانه و نه در حاشیه بیرونی آن) به چشم می خورند (شکل ۷).



شکل ۷: مورفولوژی روانه های خشک کمی فرسوده (نوع ۵) که به علت فرسایش کم سطح روانه ها سطح زبر و خشنی ایجاد شده است

۶- روانه های خشک فرسوده: با ادامه فرسایش پشتنه های تیز، ترک های حاشیه آن ها پرشده و به علت کاهش اختلاف ارتفاع آن ها، فرسایش پشتنه ها کاهش یافته و آن ها به صورت سطوح گرد احاطه شده توسط شیارهایی که تا نزدیکی سطح پر شده اند بچشم می خورند (شکل ۸).



شکل ۸: موفولوژی روانه های خشک فرسوده (نوع ۶) که در آن پشتنه به صورت گرد در آمده و ترک ها نسبتاً پرشده اند

این سطوح قدیمی تر از سطوح قبلی بوده و بنظر می رسد چند ده سال سن دارند . همانگونه که در شکل ۸ مشخص است ، از این مرحله به بعد محصولات هوازدگی فرسایش پیدا نکرده و در سطح روانه ها باقی می مانند . لذا تشکیل خاک در سطح روانه ها شروع می شود و به علت تشکیل بلور های گچ در زیر خاک (افق گچ) ، سطح روانه ها به صورت پف کرده در می آید .

۷- روانه های خشک هموار شده : با گذشت زمان ، سطوح مرحله ۶ هموارتر می شوند . بدین ترتیب که پسته های گرد و کم ارتفاع به آرامی فرسایش یافته و سطوح گود متعلق به شیارهای اطراف را پرتر و هم وارتر می سازند ، به طوری که در نهایت اختلاف ارتفاع آن ها ناچیز شده و دیگر پسته ها و ترک ها قابل تشخیص نمی باشند (شکل ۹) .



شکل ۹ : تصویری از سطح روانه های خشک هموار شده (نوع ۷) که در سطح آن میکرومورفولوژی سطحی

به صورت کاملاً هموار دیده می شود

به نظر می رسد ده ها تا هزاران سال وقت لازم است تا روانه ها به این مرحله از میکرومورفولوژی سطحی برسند. این سطوح بیرونی ترین، قدیمی ترین و کم شیب ترین سطوح گل فشان ناپگ را تشکیل می دهند. شکل ۱۰ تصویری است که در آن روانه های مراحل ۴ و ۵ دیده می شوند.



شکل ۱۰ : تصویری از مرز روانه های نوع ۴ (بخش عقب تصویر) که هنوز فرسایش نیافته اند و روانه های نوع ۵ (قسمت جلوی تصویر) که کمی فرسوده شده و محصول فرسایش وارد ترک ها شده است
جدول ۲ مراحل تکوین میکرومورفولوژیکی، خصوصیات و ویژگی روانه های گلی در گل فشن ناپگ را نشان می دهد.

پرستال جامع علوم انسانی

جدول ۲- مراحل تکوین میکرومورفولوژیکی روانه های گلی در گل فشنان ناپگ

ردیف	نام مرحله	دقت	موقعیت	در حال خروج	سین	تفصیلی	میزان خشک شدن	وضع ترکها	فرسایش	وضع سطح روانه ها	تصویف گلی
۱	روانه های نازه خارج شده مرطوب و تیره	صف و سفید و تیره	مرطوب	در حال خروج	در حال خروج	ددخانه و زبانه جدید	ددخانه و زبانه جدید	فاقد	فاقد	صف و سفید و تیره	روانه های نازه خارج شده مرطوب و تیره
۲	روانه های صاف و مواج نازه خشک شده فاقد شکستگی و سفیدترگ	صف و سفید و تیره	فقط فشر نازک در سطح خشک شده است	چند روز در هفته	چند روز در هفته	روانه های قدیمی تر تزدیک دهانه	روانه های قدیمی تر تزدیک دهانه	فاقد	فاقد	صف و سفید و تیره	روانه های صاف و مواج نازه خشک شده فاقد شکستگی و سفیدترگ
۳	روانه صاف و مواج سفید دارای ترک	صف ، سفید و تیره	تا عمق متوسط (خشک شده است موسسه)	چند هفته تا چند ماه	چند هفته تا چند ماه	روانه های قدیمی تر تزدیک دهانه	روانه های قدیمی تر تزدیک دهانه	فاقد	فاقد	صف ، سفید و تیره	روانه های صاف و مواج سفید دارای ترک
۴	روانه های صاف با شکستگی های ضخیم و عمیق فراوان و عمیق	ناصف و دارای ترک های زیاد کم عمق نازه عمیق	عیوب عمیق و تارک عمیق و فراوان	کاملاً خشک شده	چند ماه تا چند سال	روانه های قدیمی تر تزدیک دهانه	روانه های قدیمی تر تزدیک دهانه	فاقد	ناجیر	ناصف و دارای ترک های زیاد کم عمق نازه عمیق	روانه های صاف با شکستگی های ضخیم و عمیق فراوان و عمیق
۵	روانه های به شدت ناصاف به شدت ناصاف	نسبتاً ناصاف	عیوب عمیق و تارک عمیق و (پوشیده)	کاملاً خشک شده	چند ده سال	روانه های قدیمی تر تزدیک دهانه	روانه های قدیمی تر تزدیک دهانه	فاقد	کم	صف	روانه های به شدت ناصاف به شدت ناصاف
۶	روانه های قدیمی نسبتاً ناصاف به صورت پشتہ های تیز و گرد و گودی های کم عمیق و تشکیل خاک	نمایندگان	عیوب عمیق و تارک عمیق و (پوشیده)	کاملاً خشک شده	چند ده هزار سال	روانه های قدیمی تر تزدیک دهانه	روانه های قدیمی تر تزدیک دهانه	فاقد	منوسط	صف	روانه های قدیمی نسبتاً ناصاف به صورت پشتہ های تیز و گرد و گودی های کم عمیق و تشکیل خاک
۷	قدیمی ترین روانه ها که سطحشان کاملاً صاف و هموار شده است	نمایندگان	ساقیه مخروط سطوح قدیمی دور ترین سطوح مخروط	روانه خشک فرسوده	(روانه خشک فرسوده) هموار شده	روانه های قدیمی تر تزدیک دهانه	روانه های قدیمی تر تزدیک دهانه	فاقد	کامل (بینظیل به سطح همراه)	صف	قدیمی ترین روانه ها که سطحشان کاملاً صاف و هموار شده است

مأخذ: نگارندهان

نتیجه گیری

با توجه به آن چه که در مورد روانه های گل فشان ناپگ ذکر شد ، میکرومورفولوژی آن ها براساس خواص گل ها سن روانه ها و شرایط آب و هوائی منطقه قابل توجیه می باشد. خواص گل ها از طریق میزان آب ، سرعت خشک شدن، میزان انقباض، بعداد و سرعت تشکیل ترک ها و میزان فرسایش توسط آب باران بر میکرومورفولوژی آن ها تأثیر می گذارد. سن آن ها بر تشکیل و بعداد ترک ها و میزان پرشدن و هم وار شدگی آن ها تأثیر دارد. در عین حال ، بنظر می رسد تشکیل این تنوع جالب از انواع میکرومورفولوژی در سطح روانه های گل تنها در این آب و هوا که خشک است صورت می گیرد . در واقع در آب و هوای مرطوب ، گل ها قبل از خشک شدن به راحتی فرسایش یافته و امکان ایجاد این انواع میکرومورفولوژی فراهم خواهد شد. لذا میکرومورفولوژی روانه های گلی ناپگ به خوبی کاربرد اصل سه تایی دیویس ، یعنی ساخت ، فرایند و زمان رانشان می دهند . در اینجا مشخصات گل به منزله ساخت است . تشکیل ترک ها و فرسایش و پرشدن آن ها فرایند را نشان می دهد و همان گونه که ملاحظه شد از تأثیر فرایند (تشکیل ترک ها و فرسایش پشتہ ها) بر روی ساخت مورد نظر (روانه گلی) در طی زمان ، مورفولوژی های متعددی ظاهر می گردند . از این رو می توان گفت که این روانه ها نمایش گر اصل سه تایی دیویس در مقیاس کوچک می باشند . در عین حال آن ها بیان گر چرخه فرسایش در مقیاس ریز هم هستند . مرحله ظهور ترک های عمیق اوج ایجاد ناهم واری در سطح روانه ها است که با فرسایش سطوح بین آن ها و پرشدن ترک ها سطح هم وار جدیدی ایجاد می شود.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی

منابع و مأخذ

- زمردیان، محمد جعفر، ۱۳۸۱، زئومورفولوژی ایران(فرایند های ساختمانی و دینامیک های درونی) (۱) چاپ اول ، دانش گاه فردوسی مشهد، ۲۸۱.
- نگارش، حسین و حسین یغفوری، ۱۳۶۷، طرح پژوهشی مطالعه گل فشنان های بلوچستان جنوبی، معاونت پژوهشی دانش گاه سیستان و بلوچستان، ص ۵۸.
- نگارش، حسین ، ۱۳۸۵ ، جاذبه های طبیعی گردش گری(اکو توریسم) در استان سیستان و بلوچستان، مجله فضای جغرافیایی، شماره ۱۶، ص ۵۳-۸۴.
- Negaresh, Hossein, 2008, Mud volcanoes in Sistan & Baluchestan Province, Makran Coast,SE Iran, Bulletin of the Geological Society of Malaysia, No.54, pp1-7.
- Negaresh, Hossein, Khosravi, Mahmood, 2008, The Geomorphic and Morphometric Characteristics of Napag Mud Volcano in the South Eastern of Iran, Journal of Humanities the University of Isfahan, Vol.30.No.2,pp51-68.
- Snead, Rodman, 1970, Physical Geography of the Makran Coastal plain of Iran, University of New Mexico, Albuquerque. p509.

