



بیماری سل و راههای پیش‌گیری آن

مقدمه

این بیماری که نیمی از مردم ! به آن مبتلا می‌گرددند عوامل مختلفی دارد که بعضی ریشه اجتماعی و اقتصادی دارند

بیماری دچار می‌شوند . بسیاری از افراد بدون این که خود متوجه باشند به این بیماری مبتلا شده و بهبود می‌یابند !

میکرب این بیماری به اسم باسیل «کخ»⁽¹⁾ معروف است در مدت نیم قرن اخیر مرگ و میر این بیماری بطریز فاحش کاهش یافته است و حتی امروزه در برخی از کشورها آسایشگاههای مسلولین یکی بعد از دیگری تطبیل می‌شود . روش‌های جدید درمان ، بویژه داروهای جدید ، دوران بیماری را خیلی کوتاه کرده است . سابقاً این بیماری در

سل یکی از قدیمی ترین بیماریهایی است که شناخته شده است مطالعاتی که بررسی تغییرات استخوانی اجسام مویانی شده مصری ، بعمل آمده است نشان میدهد که در دوهزار سال قبل از میلاد مسیح ؛ این بیماری وجود داشته است .

«بقراط» راجع به این بیماری شرحی نوشته است . «جالینوس» که در سده دوم میلادی میزسته یادآور شده است که احتمالاً این بیماری مسی است .

پیش از نصف افراد بشرط طول عمر خود با این

(1) koch

است . مخصوصاً که میکرب این بیماری ماهها میتواند در محيط خارج زنده بماند . پس از آنکه میکرب وارد ریه شد در آنجاشروع به تکثیر مینماید ولی قوای دفاعی بدن فوراً برای اذین بردن آن بسیع میشود و خیلی زود دور میکرب ها حصار میکشد و آنها را در داخل یک دیوار ضخیم زندانی میکند و در نتیجه آثار بیماری اذین میرود و این ابتلای اولیه معمولاً بدون علامت شروع و ختم میشود . ولی اگر انسان دچار فرقغذائی شود و یا در شرایط نامتناسب بهداشتی قرار گیرد ، بدن وی ضعیف شده و این میکرب ها خط محاصره را میشکنند و شروع به فعالیت و تکثیر مینمایند و در نتیجه سل ریوی ایجاد میگردد .

مقاآمت بدن :

مقاآمت بدن در مقابل این بیماری به دو عامل بستگی دارد یکی وضع جسمانی و دیگری مدت تماس با این بیماری .

بدن رنجور ؟ خستگی مزمن ، غذای ناکافی ؟ بیماریهای ضعیف کننده ، خانه های تنگ و پر جمعیت ، سطح زندگی پائین تراز معقول ، دفاع بدن را کم میکند و در نتیجه میکرب برای خود جای پا باز میکند . از طرف دیگر مدت تماس طولانی با این بیماری و باشد و کثرت حمله میکریها ممکن است یک شخص سالم را نیز مبتلا نماید .

در مورد زن و شوهری که یکی از آنان مبتلا به این بیماری شود دیگری را نیز ممکن است بشرح فوق بیمار نماید .

کودکان مخصوصاً استعداد زیادی به

جوانان کشتمیداد و این مطلب از نظر اقتصادی و اجتماعی تأسیف آور بود در صورتی که امر و زمزگ و میر جوانان از این بیماری خیلی کم است و در سالمندان نیز اگر در معالجه غفلت نشود کشنده نیست .

علت اصلی بیماری :

درست است که این بیماری بواسیله با سیل «کخ» ایجاد میشود ولی در حقیقت یک ریشه اقتصادی و اجتماعی دارد بدین معنی که این میکرب در زمینه های مساعد رشد میکند .

فرقغذائی ، بدی مسکن . و بدی شرایط کاری : بهترین زمینه برای ایجاد این بیماری فراهم میکند بویژه اگر فرقغذائی همراه با زندگانی و یا کار در نقاط تاریک باشد .

ابن بیماری معمولاً ریهها را آلوده میکند ولی سایر اعضاء مانند کلیه ها ، غدد لیفاوی ، پوست ؛ استخوان ؛ و مفاصل نیز ممکن است مورد حمله قرار گیرند .

راه سرایت بیماری :

سل گاهی ممکن است بواسیله شیر و یا محصولات شیری که خوب نجوشیده ؛ و یا پاستوریزه نشده باشد بسانان سرایت نماید . ولی در هر صورت سل ریوی بواسیله سرفه و یا عطسه و یا اخلاط سینه بیماری که جلو دهان و بینی خود را نمیگیرد و یا خلط سینه خود را بین مهابا در همه جا پخش میکند ، به شخص سالم سرایت ننماید . همچنین این بیماری از راه بوسه و یا استعمال بشقاب و قاشق و استکان بیمار ، ممکن است سرایت نماید ولی راه عمدۀ سرایت ؟ سرفه و بیرون ریختن اخلاط سینه

چند دستور ساده برای جلوگیری از بیماری :

۱- هرسال یکبار باید تحت معاینه دقیق قرار گرفت و در اشخاص بالغ از ریه‌ها پرتو نگاری بعمل آورد. ولی در کودکان اگر علائم بیماری موجود نباشد احتیاج به عکس برداری از ریه‌ها نیست. ذیرا سل ثانوی پس از بلوغ در ریه‌ها ظاهر می‌شود.

عکس برداری از ریه‌ها خیلی مهم است زیرا قبل از اینکه علائم بیماری از قبیل تب و بی‌اشتها و سرفه ظاهر شود کشف و معالجه می‌گردد.

۲- سرفه و سرمه خوردنگی و برنشیت اگر در ظرف دو سه هفته خوب نشود؛ اگر شما دائماً خسته و بی‌قرار هستید، اگر وزن بدن شما کم می‌شود؛ اگر دردی در ناحیه سینه دارید، اگر شب‌ها تب و یا عرق می‌کنید، و اگر در خلط سینه شما، رگه خون است؛ جهت معاینه به پزشک مراجعه نمایید.

۳- مقاومت بدن خود را همیشه با استراحت مرتب؛ غذای متعادل و دوری از اضطراب و دلهزه حفظ کنید.

۴- شیر و محصولات شیری پاستوریزه مصرف کنید و یا دست کم شیر مصرفی خود را بجوشانید.

۵- از کسانی که جلو عطسه و سرفه خود را با دستمال نمی‌گیرند فاصله بگیرید.

۶- پیش از هر غذا دست‌های خود را با آب و صابون بشوئید و همچنین پس از تماس با اشیاء مشکوک دست‌های خود را با آب و صابون بشوئید.

۷- پیش از ازدواج، زن و شوهر آینده باید از

این بیماری دارند بنابراین باید آنان را از تماس با مسلولین بر حذر داشت.

علائم بیماری :

نشانه‌های این بیماری غالباً عبارت است از سرفه، تب، عرق‌شبانه؛ کم شدن وزن و خونریزی از ریه‌ها. خونریزی در اوایل بیماری به ندرت اتفاق می‌افتد و اگر خونریزی ظاهر شود دلیل بر پیشرفت بیماری است ناگفته نماند که بی‌اشتها ؛ تب خفیف؛ و کم شدن وزن؛ دلیل کافی برای ابتلاء به بیماری نیست چه این قبیل آثار و علائم در کسالت‌های دیگر نیز دیده می‌شود ولی بهر حال در این قبیل موارد «پرتو نگاری» ریه‌ها مطلب را روشن خواهد کرد. ابتلاء به سل در هرسن اتفاق می‌افتد و بر عکس اغلب بیماریهای مسری، در کودکان کوچک حتی دو ماهه نیز دیده می‌شود.

پیش‌گیری :

اساس جلوگیری از سل عبارت است از مراعات بهداشت، نگاهداری سلامت بدن؛ داشتن خواب و استراحت مرتب؛ غذای کافی و راحتی فکر، و در عین حال باید از تماس بی‌جهت با مسلول و میکروب سل خودداری نمود.

اگر کسی در اوایل متوجه بیماری باشد خیلی زود درمان خواهد شد. مخصوصاً با راههای درمانی و جراحی جدید درست مانند آتش‌کبریتی است که بایک پف، و حتی خود به خود خاموش می‌شود در صورتی که اگر این آتش کوچک در محیط مناسب شعله ور شود باید اداره آتش نشانی و مانشین‌های بزرگ آب باش بکارافتد.

میشود و علت این امر هم کار کردن در شرایط غیر بهداشتی (مثل بعضی کارخانه های فرشابافی) است.

درمان :

این بیماری امروزه کاملاً درمان پذیراست و داروهای اختصاصی قوی در اختیار هست که میتواند بیماری را کاملاً ریشه کن سازد و از آنجاییکه غالباً این بیماری مزمن است معالجه آن طولانی بوده و گاهی یکی دو سال طول می کشد بنابراین از طول درمان نباید خسته و نا امید شد.

بیمار باید خلط سینه خود را در خلط دان یا یک ظرف سر پوشیده خالی کند و در داخل آن داروهای ضد عفونی کننده بربیزد که باعث انتشار بیماری به اطراف ایان نگردد و اگر خلط سینه را در دستمال پارچه ای و یا کاغذی خالی نمود باید آن را بسو زاند ۱۱ هوای آزاد واستراحت در معالجه این بیماری از شرایط اساسی است. اگر با معالجات داروئی؛ بیماری بهبود نیابد با عمل جراحی میتوان کانون بیماری را برداشت و بیمار را معالجه کرد امروزه با تکنیک های عالی و جراحی و انتقال خون، ویهوشی و پرستاری خوب، خطر جانی در اعمال جراحی ریه بسیار کم است.

لحاظ سل مورد معاينه قرار گیرند.

۸- درست است که سل ارثی نیست ولی در بعضی از خانواده ها ممکن است بیشتر دیده شود بنابراین اگر در خانواده شما کسی مبتلا به سل باشد موقع معاينه سالیانه؛ این مطلب را به پزشك خود اطلاع دهید.

۹- درست است که تماس و مصاحبت آنطوری که بعضی ها فکر می کنند بسرعت باعث سرایت نمیشود معهذا صلاح است که برای حصول اطمینان در این قبیل موارد مورد معاينه پزشك قرار گرفت.

امروزه با پیشرفت سریع بهداشت و مایه کوبی بر ضد سل و معالجات سریع و مؤثر، مرگ و میر از سل بسیار کم شده است بطوری که امروزه در اغلب کشورها این بیماری از لحاظ مرگ و میر در دیگر قرار گرفته است در صورتیکه در اوایل قرن حاضر در دیگر قرار اول قرار داشت و امید قاطع هست در آینده نزدیک این بیماری همراه فقر و جهل بکلی از بن برود.

بیماری سل در سایر اندامها:

این بیماری در سایر اندامها مهم نبوده و چندان قابل ذکر نیست ولی در کشور ما سل غدد لنفاوی؛ که با اسم «خنازیبر» معروف است نسبتاً زیاد دیده

حُقْيَقَةٌ

سلام بر آن جان سعادتمدی که حق بوید وازنگاپوی خویشن حقیقت جوید

از همه مردم پرهیز کارتر کسی است که حق را بر نفع وضر رخویش بگوید

«حضرت محمد ص»