

بررسی علل مرگ و میر بر حسب سن در تهران بزرگ به روش تجزیه عاملی

دکتر حجت‌الله سیف‌اللهی

پیشگفتار:

از آنجا که واقعه نوت در سننهای متفاوت افراد یک جامعه از اهمیت خاصی برخوردار است و آگاهی از شاخصها و میزانهای مربوط به آن برای برنامه‌ریزان کشور ضرورتی انکار ناپذیر است، بدین جهت برای رسیدن به همبستگیهای بین سن و بیماریهای افراد، جدول بیماری‌ها و سن مربوط به شهر تهران در سالهای مختلف با روش علمی تجزیه عاملی ارتباطها * تحلیل شده که امیدوارم مورد استفاده مسؤولان ذیربطری قرار گیرد.

چکیده:

از تجزیه جدول سن و بیماری دو دوره پنج ساله ۶۵ تا ۶۹ و نیز جدولهای سالهای ۶۷، ۶۸، ۶۹، به طور جداگانه و تجزیه جدول منشکل از ۳ جدول مربوط به این سه سال تبعه‌های زیر بدست آمده است:

۱. سالهای ۶۵ تا ۶۹: مرگ و میرهای ناشی از بیماریهای کودکان، تصادفها، مسمومیت و خودکشی بیشتر در سال ۱۳۶۵ اتفاق افتاده است. این بررسی نشان می‌دهد که تلفات ناشی از بیماری سرطان در این سال نسبت به سالهای دیگر بیشتر بوده است. تلفات ناشی از بیماریهای دستگاه گردش خون بیشتر در سالهای ۶۸ و ۶۹ رخ داده است. مرگ و میر ناشی از بیماریهای اعصاب، خون و دستگاه سازنده آن، دستگاه تنفس، کلیوی و دستگاه ادرار، در سال ۱۳۶۶ نسبت به سایر سالها زیادتر بوده است.
۲. سال ۱۳۶۷: در این سال تلفات کودکان کمتر از یکسال به دلیل بیماریهای نوزادان جلب توجه می‌کند. بیماریهای اعصاب، انواع سرطانها، مسمومیت و همچنین تصادفها و خودکشی به ترتیب سبب مرگ افراد ۲۵ تا ۵۴ ساله و ۱۵ تا ۲۴ ساله شده است. بیماریهای دستگاه گردش خون نیز بیشتر افراد ۵۵ سال به بالا را از بین برده است.
۳. سال ۱۳۶۸: بیماریهای کودکان، خون و دستگاه سازنده آن سبب مرگ افراد کمتر از یک سال شده است. بیماریهای سرطان و اعصاب، مرگ گروههای سنی ۳۵ سال به بالا را موجب شده است. تصادفات، خودکشی و مسمومیت نیز سبب مرگ اشخاص ۱۵ تا ۲۴ ساله شده است.
۴. سال ۱۳۶۹: بیماریهای کودکان، دستگاه گردش خون، اعصاب، انواع سرطانها، تصادفها، خودکشی و مسمومیتهایه ترتیب موجب فوت افراد کمتر از یکسال، ۳۵ تا ۶۵ سال، ۱۵ تا ۱۹ سال شده است.

تجزیه جدول شماره ۱

این جدول ۱۶ سطر (بیماریها) و ۵ ستون (مربوط به سالهای ۶۵ تا ۶۹) دارد. بیماریها

عبارتند از: عفونی و انگلی، سرطانها، آرژی و تنفسی‌ای، خون و دستگاه سازنده آن، اعصاب، دستگاه گردش خون، دستگاه تنفسی، دستگاه گوارش، کلیه و دستگاه ادرار، ناهنجاریهای مادرزادی، بیماریهای کودکان، مسمومیت، خودکشی و تصادفها.

نتیجه تجزیه:

دو محور اول و دوم ماند^۱، به ترتیب ۹۲ و ۵ (رویهم ۹۷ درصد) از ماند کل را ارائه می‌کند و ما مطالعه خود را روی این دو محور انجام می‌دهیم.

الف. محور اول: دو گروه از بیماری‌ها که با این محور همبستگی زیادی داشته و در دو طرف آن قرار دارند.

گروه ۱- مرگ و میر ناشی از بیماریهای کودکان، مسمومیت، خودکشی و تصادفها بیشتر در سال ۶۵ اتفاق افتاده است. این بررسی نشان می‌دهد که تلفات ناشی از بیماری سرطان در این سال نسبت به سالهای دیگر بیشتر بوده است.

گروه ۲- تلفات ناشی از بیماریهای دستگاه گردش خون بیشتر در سال ۶۹ و ۷۰ رخ داده است.

ب. محور دوم: در جهت مشتب آن (دربالا) تلفات ناشی از بیماریهای اعصاب، خون و دستگاه سازنده آن، دستگاه تنفسی، کلیه و دستگاه ادرار و ناهنجاریهای مادرزادی در سال ۱۳۶۶ نسبت به بقیه سالها بیشتر بوده است.

توجه:

جرم بیماریهای دستگاه گردش خون ۰/۳۷، خودکشی، تصادفها و مسمومیت ۰/۱۹، سرطانها ۰/۱۰ و بیماریهای کودکان ۰/۰۹۱ است. این بیماریها و تصادفات بزرگترین

عامل تلفات در دوره ۵ ساله ۶۵ تا ۶۹ در شهر تهران بوده است. اما جرم هر یک از این ۵ سال تقریباً مساوی است و نشان می‌دهد که در شهر تهران تعداد تلفات ناشی از بیماری‌های مختلف در این پنج سال مساوی بوده است. از طرف دیگر به طوری که در تجزیه عامل جدول شماره ۱ ملاحظه می‌کنیم تفاوت‌هایی در محل قرار گرفتن سالها وجود دارد و این نشان می‌دهد که در این سالها تلفات در نتیجه بیماری‌های متفاوتی بوده است.

تجزیه جدول شماره ۲ (بیماریها و گروههای سنی در سال ۶۹)
این جدول ۱۶ سطر (بیماریها، ر.ک. به بحث جدول شماره ۱) و ۱۱ ستون (گروههای سنی) دارد.

گروههای سنی: کمتراز یکسال، ۱ تا ۴ ساله، ۵ تا ۹ ساله، ۱۰ تا ۱۴ ساله، ۱۵ تا ۱۹ ساله، ۲۰ تا ۲۴ ساله، ۲۵ تا ۳۴ ساله، ۳۵ تا ۴۴ ساله، ۴۵ تا ۵۴ ساله، ۵۵ تا ۶۴ ساله و ۶۵ ساله به بالا.

نتیجه تجزیه

دو محور اول و دوم به ترتیب ۷۶ و ۱۹ درصد (رویهم ۹۵ درصد) از ماندگل جدول را ارائه می‌دهد و کافی است که ما صفحه این دو محور را بررسی کنیم.

۱. محور اول: در جهت مثبت این محور بیماری‌های کودکان همراه با گروه سنی کمتراز یک سال دیده می‌شود. درجهت منفی آن بیماری‌های دستگاه گردش خون، اعصاب و سرطانها با گروههای سنی ۳۵ سال به بالا قرار دارند.

۲. محور دوم: در جهت منفی این محور تلفات ناشی از سوانح، مسمومیت و خودکشی در گروههای سنی ۵ تا ۲۴ ساله دیده می‌شود. بهویژه، از نزدیک بودن دونقطه

۱۵ تا ۱۹ ساله ها با خودگشی، سوانع و مسمومیت نتیجه می گیریم که این عاملهای مرگ و میر، بیشتر مربوط به گروه سنی ۱۵ تا ۱۹ سال هستند.

گروههای سنی کمتر از یک سال دارای جرم ۰/۵، ۶۵ سال به بالا جرم ۰/۱۱ و ۵۵ تا ۶۴ سال دارای جرم ۰/۱ هستند. همچنین جرم بیماریهای دستگاه گردش خون ۰/۴۳، بیماریهای کودکان ۰/۱۴ و مسمومیت، خودگشی و تصادلهای ۰/۱۰۴ است.

تجزیه جدول شماره ۳

جدول تجزیه شده مربوط به ۱۶ بیماری (سطرهای جدول) و ۱۱ گروه سنی (ستونهای جدول) سال ۱۳۶۸ شهر تهران است. مشخصه های سطرهای و ستونها همانها بی هستند که در جدول های شماره ۱ و ۲ آمده است.

هدف: تعیین ارتباط میان سن و بیماریها

نتیجه تجزیه دو محور اول و دوم ماند، که به ترتیب ۶۷/۵ و ۲۹ درصد (در کل ۹۶/۵ درصد) از ماندکل جدول را نشان می دهد، به قرار زیر است:

۱. محور اول: درجهت مثبت این محور، بیماریهای کودکان، خون و دستگاه سازنده آن را همراه با گروه سنی کمتر از یک سال می بینیم. درجهت منفی آن، بیماریهای سرطان و اعصاب همراه با گروههای سنی ۳۵ سال به بالا دیده می شوند. محور اول نشان می دهد که در سال ۱۳۶۸ بیماریهای خون و دستگاه سازنده آن، بیشتر افراد کمتر از یک سال و امراض سرطانی و اعصاب بیشتر افراد مسن را از بین برده اند.
۲. محور دوم: درجهت مثبت این محور گروههای سنی ۵ تا ۲۴ سال به ویژه ۱۵ تا ۲۴ سال را همراه با خودگشی، مسمومیت و تصادلهای می بینیم. این عاملها بیشتر سبب مرگ ۱۵ تا ۲۴ ساله ها شده اند.

توجه:

بیماریهای دستگاه گردش خون، مسمومیت، خودکشی و تصادفها و بیماریهای کودکان به ترتیب دارای جرم ۰/۱۵، ۰/۱۲ و ۰/۰ است و میان گروههای سنی، کمتر از یکسال نسبت به بقیه، جرم بیشتری دارند.

تجزیه جدول شماره ۴

این جدول ۱۶ سطر (بیماریها) و ۱۱ ستون (گروههای سنی) دارد و مربوط به مرگ و میر افراد در سال ۱۳۶۷ است. در اینجا نیز مانند جدولهای شماره ۲ یا ۳، سطرها و ستونها همانها هستند که پیشتر آمده است. هدف نیز همانند جدولهای قبل است.

نتیجه تجزیه:

دو محور اول و دوم ماند به ترتیب ۷۹ و ۱۹ درصد (رویهم ۹۸ درصد) از ماند کل جدول را ارائه می‌دهد. برای تبیجه گرفتن از این جدول کافی است که صفحه این دو محور را بررسی کنیم.

۱. محور اول: در جهت مثبت محور، کودکان کمتر از یکسال را با بیماریهای کودکان مشاهده می‌کنیم. در جهت منفی محور بیماریهای اعصاب و سرطانها را می‌بینیم که بیشتر سبب مرگ و میر افراد ۲۵ تا ۵۴ سال شده‌اند.

۲. محور دوم: درجهت مثبت محور، افراد ۵ تا ۲۴ ساله را همراه با مسمومیت، خودکشی و تصادفها مشاهده می‌کنیم. این محور نشان می‌دهد که این عاملها باعث مرگ و میر افراد کم سن، بهویژه از ۱۵ تا ۲۴ سال شده‌اند. در جهت منفی محور، بیماریهای دستگاه گردش خون قرار دارند که بیشتر افراد ۵۵ سال به بالا را از بین برده‌اند.

توجه:

جرم بیماریهای دستگاه گردش خون $0/36$ ، جرم خودکشی، تصادفات و مسمومیت $0/16$ و جرم بیماریهای کودکان $14/0$ است. این سه بیماری بیشترین تلفات انسانی را در این سال موجب شده‌اند.

گروههای سنی کمتر از یکسال و 25 تا 54 سال، نسبت به بقیه، جرم بیشتری داشته‌اند. به طوری که تجزیه جدول سن و بیماریها در سالهای 67 تا 69 در شهر تهران نشان می‌دهد مرگ و میر در این سه سال از حیث سن و بیماریهای تفاوتی نداشته است.

تجزیه مجموعه جدولها:

این جدول از زیرهم قراردادن سه جدول مربوط به سالهای 67 تا 69 (سن و بیماریها) در شهر تهران به دست آمده است. این جدول شامل 33 سطر (گروههای سنی) و 16 ستون (بیماریها) می‌باشد.

هدف: مقایسه علتهای مرگ و میر در تهران طی 3 سال (67 تا 69) است.

نتیجه تجزیه:

دو محور اول و دوم ماند به ترتیب 70 و 26 (در مجموع 96 درصد) ماند از ماند کل جدول را نشان می‌دهد. بنابراین برای نتیجه گیری از این جدول کافی است که صفحه دو محور 1 و 2 را مطالعه کنیم.

۱. محور اول: در جهت مثبت این محور (در ربع اول صفحه 1×2) کودکان کمتر از یکسال را در سالهای 67 تا 69 همراه با بیماریهای کودکان می‌بینیم.

۲. محور دوم: در جهت مثبت آن (ربع دوم صفحه ۱×۲) بیماریهای سرطان و دستگاه گردش خون را مشاهده می‌کنیم که بیشتر سبب مرگ و میر افراد ۴۵ تا ۶۴ سال در سالهای ۶۸ و ۶۹ شده‌اند. در جهت منفی محور (ربع سوم) دو گروه جدا از هم دیده می‌شوند: گروه اول، تصادفها و مسمومیتها قرار دارند که بیشتر سبب تلفات افراد ۱۵ تا ۲۴ ساله در سالهای ۶۷ و ۶۸، ۱۵ تا ۱۹ ساله در سال ۶۹ و کودکان ۱ تا ۴ ساله در این سه سال از حیث مرگ و میر تلفات چندانی وجود نداشته است.

تبصره: در اینجا مانند سایر جاها بیماریهای دستگاه گردش خون (با جرم ۴۲٪)، و مسمومیت، خودکشی و تصادفها (با جرم ۱۶٪) بالاترین تلفات را سبب شده‌اند. افراد کمتر از یکسال (با جرم ۰/۰۸)، ۲۵ تا ۵۴ ساله با جرمی تقریباً برابر ۰/۰۴۵، در هر سه سال بالاترین تلفات و افراد ۱ تا ۱۴ ساله با جرم ۰/۰۰۴، در هر سه سال، کمترین تلفات را داشته‌اند.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی

تجزیه عاملی جدول شماره ۱ بیماریها در سالهای ۶۵ تا ۶۹ در تهران

محور دوم	ناهنجاریهای مادرزادی
$t_2 = 5\%$	بیماریهای کلیه و دستگاه ادرار
۱۳۶۶	بیماریهای تنفسی
۱۳۶۷	بیماریهای خون و دستگاه سازنده آن
۱۳۶۸	بیماریهای اعصاب
$t_1 = 92\%$	بیماریهای دستگاه گردش خون
۱۳۶۹	سوانح، مسمومیت سرطانها و خودکشی بیماریهای نوزادان
۱۳۶۵	

جذول شماره ۲


ଗାନ୍ଧି ଜୀବନରେ କାହାରେ ଦାତାତତ୍ତ୍ଵ ଲାଭ କରିଛି ଏହାରେ ମୁଖ୍ୟମିତି ଆପଣଙ୍କ ଦାତାତତ୍ତ୍ଵରେ ଅନୁଭବ କରିଛି ।

توضیح اینکه در سنتون جمع رفم کمتر از یکماده در سنتون کمتر از یکسال منظور گردیده است.

تجزیه عاملی جدول شماره ۲ بیماری و سن در تهران در سال ۱۳۶۹

محور دوم $t_2 = /24/5$	
از ۱ تا ۴ سال سن	بیماریهای عفونی و انگلی
از ۱۰ تا ۱۴ سال	بیماریهای دستگاه تنفسی
از ۱۵ سال تا ۱۹ سال سن	سوانح، مسمومیت و خودکشی
از ۱۵ سال تا ۹ سال	بیماریهای کلیه و دستگاه ادرار
از ۲۰ سال تا ۲۴ سال سن	بیماریهای گردش خون
از ۲۵ تا ۳۴ سال سن	ناهنجاريهای مادرزادی
از ۳۵ تا ۴۴ ساله	بیماریهای دستگاه گوارش
از ۴۵ تا ۵۴ ساله اعصاب	بیماریهای نوزادان
از ۵۵ تا ۶۴ سال سن	
۶۵ سال به بالا سرطان و سایر تومرها	

تجزیه عاملی جدول شماره ۲ بیماری و سن در تهران در سال ۱۳۶۹
بادر نظر گرفتن جمعیت گروههای سنی



جدول شماره ۳

تغیفات شهیر تبران بحسب طبقه‌بندی پیش‌المحلی پیمارها و گروههای سنی در سال ۱۳۹۸

توضیح اینکه در سلون جمع رقم کمتر از یکماه در ستوں کمتر از یکسال منظور گردیده است.

تجزیه عاملی جدول شماره ۳ بیماری و سن تهران در سال ۱۳۶۸

		$t_2 = 29\%$
	محور دوم	
سوانح، مسمومیت و خودکشی		
از ۱۵ تا ۱۹ سال سن		بیماریهای عفونی و انگلی
از ۲۰ تا ۲۴ سال سن		بیماریهای دستگاه تنفسی
۱ تا ۴ سال سن		محور اول $t_1 = 67/5\%$
۲۵ تا ۳۴ سال سن		کمتر از یکسال
بیماریهای دستگاه گوارشی		بیماریهای نوزادان
بیماریهای دستگاه گردش خون		کمتر از یکماه سن
بیماریهای کلیه و دستگاه ادرار		بیماریهای خون و دستگاه سازنده آن
از ۳۵ تا ۴۴ سال		
از ۴۵ تا ۵۴ سال سن سرطان		
از ۵۵ تا ۶۵ سال سن اعصاب		
۶۵ سال سن به بالا		

دوفول شماره ۴
تلاشات شهر تهران بررسی پاچاندی بین‌المللی بیماریها و گروههای سنی در سال ۱۳۶۷

کروه	علال مرگ	کهتر از ۵۰ سال	کهتر از ۴۰ سال	کهتر از ۳۰ سال	کهتر از ۲۰ سال	کهتر از ۱۰ سال	کهتر از ۰ سال	کهتر از ۵۰ سال	کهتر از ۴۰ سال	کهتر از ۳۰ سال	کهتر از ۲۰ سال	کهتر از ۱۰ سال	کهتر از ۰ سال	کهتر از ۵۰ سال	کهتر از ۴۰ سال	کهتر از ۳۰ سال	کهتر از ۲۰ سال	کهتر از ۱۰ سال	کهتر از ۰ سال	
۱۳۶۷	بیماریهای علقومنی و انتقامی	۷۵۷	۱۶۰	۳۰	۵	۲	۰	۵۷	۱۶۰	۳۰	۵	۲	۰	۵۷	۱۶۰	۳۰	۵	۲	۰	
۱۳۶۶	سرطان و سایر تومورها	۵۷۰	۱۰۳	۲۹۰	۵۷	۲۰	۵	۵۷	۱۰۳	۲۹۰	۵۷	۲۰	۵	۵۷	۱۰۳	۲۹۰	۵۷	۲۰	۵	۰
۱۳۶۵	آگزیزی و بیماریهای تنفسی	۳۲۸	۶۱	۶۱	۲۲	۱۱	۱	۳۲۶	۶۱	۶۱	۲۲	۱۱	۱	۳۲۶	۶۱	۶۱	۲۲	۱۱	۱	۰
۱۳۶۴	بیماریهای خون و دستگاه سازندگان	۲۸۷	۲۲	۲۱	۱۰	۱۱	۱	۲۸۵	۲۲	۲۱	۱۰	۱۱	۱	۲۸۵	۲۲	۲۱	۱۰	۱۱	۱	۰
۱۳۶۳	بیماریهای خون و دماغی	۲۸۷	۲۲	۲۱	۱۰	۱۱	۱	۲۸۵	۲۲	۲۱	۱۰	۱۱	۱	۲۸۵	۲۲	۲۱	۱۰	۱۱	۱	۰
۱۳۶۲	بیماریهای اعصاب	۲۸۷	۲۲	۲۱	۱۰	۱۱	۱	۲۸۵	۲۲	۲۱	۱۰	۱۱	۱	۲۸۵	۲۲	۲۱	۱۰	۱۱	۱	۰
۱۳۶۱	بیماریهای تنفسی	۲۸۷	۲۲	۲۱	۱۰	۱۱	۱	۲۸۵	۲۲	۲۱	۱۰	۱۱	۱	۲۸۵	۲۲	۲۱	۱۰	۱۱	۱	۰
۱۳۶۰	بیماریهای دستگاه گوارشی	۲۸۷	۲۲	۲۱	۱۰	۱۱	۱	۲۸۵	۲۲	۲۱	۱۰	۱۱	۱	۲۸۵	۲۲	۲۱	۱۰	۱۱	۱	۰
۱۳۵۹	بیماریهای ادرار	۲۸۷	۲۲	۲۱	۱۰	۱۱	۱	۲۸۵	۲۲	۲۱	۱۰	۱۱	۱	۲۸۵	۲۲	۲۱	۱۰	۱۱	۱	۰
۱۳۵۸	بیماریهای کلیوی - دستگاه ادرار	۲۸۷	۲۲	۲۱	۱۰	۱۱	۱	۲۸۵	۲۲	۲۱	۱۰	۱۱	۱	۲۸۵	۲۲	۲۱	۱۰	۱۱	۱	۰
۱۳۵۷	بیماریهای کلیوی و صیغه فعل نولد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۳۵۶	عوارض حافظه ای و صیغه فعل نولد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۳۵۵	دوایزدهم	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۳۵۴	سیزدهم	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۳۵۳	چاردهم	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۳۵۲	پانزدهم	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۳۵۱	شانزدهم	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۳۵۰	سوانح، مسمو و بیت، خودکشی	۲۹۰	۵۲۰	۷۶۶	۳۲۷	۹۲۷	۱۱۷	۷۳۳	۳۲۷	۹۲۷	۱۱۷	۷۳۳	۳۲۷	۹۲۷	۱۱۷	۷۳۳	۳۲۷	۹۲۷	۱۱۷	۷۳۳
۱۳۴۹	توضیح اینکه در ستون جمع رقم کمتر از یکماه در ستون کمتر از یکسال منظور گردیده است.	۲۸۷	۲۲۲	۴۲۷	۱۳۱	۳۱۱	۲۲۲	۵۲۳	۲۲۲	۴۲۷	۱۳۱	۳۱۱	۲۲۲	۵۲۳	۲۲۲	۴۲۷	۱۳۱	۳۱۱	۲۲۲	۴۲۷

تجزیه عامل جدول شماره ۴ بیماری و سن در سال ۱۳۶۲ در تهران



تحیز به جدول شماره‌های ۲، ۳، ۴ بیماریها و سن در سالهای ۶۷ تا ۶۹ در تهران

<p>محور دوم</p> <p>۶۹ تا ۶۴ ساله سال ۵۵ ۴۵ تا ۵۴ ساله در سال ۶۸ سرطانها ۶۹ تا ۶۴ ساله در سال ۶۹ ۶۹ تا ۵۴ ساله در سال ۴۵ بیماریهای اعصاب بیماریهای دستگاه گردش خون ۴۵ تا ۵۴ ساله در سال ۶۹</p> <p>۶۹ تا ۳۴ ساله در سال ۲۵ ۶۹ تا ۲۴ ساله در سال ۲۰ ۶۸ تا ۳۴ ساله تا سال ۲۵ ۶۷ تا ۲۴ ساله در سال ۲۰ ۶۹ تا ۱۹ ساله در سال ۱۵ ۶۸ تا ۱۹ ساله در سال ۱۵ ۶۷ تا ۱۹ ساله در سال ۱۵ ۶۸ تا ۲۴ ساله در سال ۲۰ سوانح، مسمومیت و خودکشی ۱ تا ۴ ساله در سال ۱۰ ۶۷ تا ۱۴ ساله در سال ۱۰ ۶۹ تا ۱۴ ساله در سال ۱۰ ۶۸ تا ۹ ساله در سال ۵ ۶۹ تا ۹ ساله در سال ۵ ۶۸ تا ۹ ساله در سال ۵</p>	<p>٪۲=٪۲۶</p> <p>بیماریهای نوزادان بیماریهای دستگاه گوارش مرگ و میر کمتر از یکساله‌ها در سال ۶۷ مرگ و میر کمتر از یکساله‌ها در سال ۶۸ مرگ و میر کمتر از یکساله‌ها در سال ۶۹</p> <p>بیماریهای خون و دستگاه تنفسی دستگاه سازنده آن</p> <p>غفوونی و انگلی ۱ تا ۴ ساله در سال ۶۸</p> <p>۱ تا ۴ ساله در سال ۶۹</p>
---	---

ضمیمه:

خلاصه‌ای از روش تجزیه عاملی ارتباطها

در این روش تحقیق هر نوع موضوع مورد مطالعه آماری، به صورت جدولهای در می‌آید (دارای چند سطر به نام الفا و چند ستون به نام صفت یا متغیر). سپس عددی‌های هر سطر با هر ستون به مجموع آن سطر با ستون تقسیم می‌شود تا نیمرخ هر سطر و نیمرخ هر ستون به دست آید. و نیز از تقسیم مجموع هر سطر و هر ستون بر جمع کل جدول، جرم هر سطر و جرم هر ستون تعیین می‌شود. پس ما به تعداد سطر و ستون جدول نقطه‌ها (نیمرخها)ی جرم دار خواهیم داشت. مجموعه نیمرخهای سطرها و مجموعه نیمرخهای ستونها را به ترتیب سجاپی سطرها و سجاپی ستونها نامیم. هر نیمرخ سطري نقطه‌ای از فضای بعد ۱-*cardj* و هر نیمرخ ستولی لیز نقطه‌ای از فضای بعد ۱-*I, cardJ* است.

(*cardJ, cardI*) به ترتیب مجموعه سطرها، مجموعه ستونها، تعداد عنصرهای سطري و تعداد عنصرهای ستولی است. مرکز تقل ۱ هر یک از این دو گروه نقطه تعیین می‌شود. برای تعیین فضاهای بهینه (فضاهایی که تاحد امکان بعد آنها کم و در عین حال معتبر باشد) محورهای اصلی ماند از این مرکز تقل رسماً شود (براساس روش حداقل کردن مربعهای فاصله از زیر فضاهای). این محورها برای هر دو سجاپی (دو گروه نقطه) مذکور بکی است. ماند ۲ دو محور متناظر در دو سجاپی نیز مساوی است. بدین وسیله تکه‌گاه دو سجاپی مشخص می‌شود و بعد این دوراباهم متنطبق می‌سانند تا دو گروه نقطه در صلحه‌های مختلف هامیلی در کثار هم قرار گیرند. این محورها پک دستگاه مختصات متعادل بهنجار تشکیل می‌دهند (دو به دو برهم همودند و واحد اندازه گیری آنها با واحد اندازه گیری فضای محيط مساوی است). سپس هاملهای هر نقطه از هر محور، جرم هر نقطه، برخة تسبیح ۳ هر نقطه در تشکیل هر محور، و مربع کسینوس زاویه هر نقطه ۴ از هر محور (دو تای آخر دو پارامتر مهم ۵ برای تعیین نقطه‌های قابل مطالعه در روی هر محورند)، و همچنین برخه تسبیح، هر نقطه در ماند کل حساب می‌شود. سپس نقطه‌های سطري و نقطه‌های ستونی در روی صلحه‌های به دست آمده از دویه دوی محورها با گرد خود تصویر می‌شوند. نقطه‌های قابل بررسی در روی محورها و صلحه‌های مختلف را با توجه به پارامترهای مهمی که پیش از این از آنها گفته تمیین می‌کیم. بعد آنها را روی صلحه‌های محورها مشخص می‌کیم. بدین وسیله، گروههای مختلف، و گروههای نقاط موافق را روی محورها و صلحه‌های حاصل از آنها مطالعه می‌کیم و به دلایل تمايز و همبستگی افراد و متغیرها پس می‌بریم. سرانجام از بررسی‌های خود بر هر محور و صلحه درباره موضوع مورد بررسی تیجه گیری کلی را به دست می‌آوریم. چنانکه دهدیم این روش نقاطی را که در فضاهایی با بعد سیار بزرگ و خارج از تصور ما قرار دارند، با از دست دادن مقدار کمی از آگاهیهای جدول، در فضایی قابل دید قرار می‌دهد تا بتوانیم آنها را مطالعه و نتیجه گیری کنیم.

منابع:

1. J.P. ET F. BENZECRI. 1980, Pratique de l'analyse des donnees. Analyse des correspondances Dunod Paris.
2. J.P. FENELON-Benzecri, 1973 Analyse factorielle des correspondences (Programme Version TABET-1).
۳. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (معاونت امور پژوهشی)، دفتر بررسی و تحلیل اطلاعات آماری سالهای ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰ و ۱۳۷۱.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی

پانوشتها:

۱. مرکز ثقل هر یک از دو سحابی عبارت است از میانگین موزون نیمرخهای سطرها و میانگین موزون نیمرخهای ستونها. در واقع نیمرخ سطر کناره و نیمرخ ستون کناره به ترتیب مرکز ثقل نیمرخهای سطرها و نیمرخهای ستونها است.
۲. ماند هر نیمرخ نسبت به مرکز ثقل خود، حاصل ضرب جرم آن نیمرخ در مربع فاصله آن از مرکز ثقل خود است.

$$\text{CTR}_\alpha(i) = f_i F_\alpha(i) / \lambda_\alpha$$

که در آن :

$$f_i = \text{جرم نقطه } i$$

$$F_\alpha(i) = \text{مختص} \alpha \text{ ام نقطه } i$$

$$\lambda_\alpha = \text{ماند محور } \alpha$$

$$\sum \{ f_i F_\alpha(i) (iEI) \} = \lambda_\alpha$$

$$\text{COR}_\alpha(i) = \cos \theta_\alpha(i) = \frac{F_\alpha'(i) / \sum F_\alpha'(i)}{\lambda_\alpha}$$

که در آن :

$$\theta(i) = \text{زاویه ای است که نقطه } i \text{ ام با محور } \alpha \text{ می سازد}$$

و Σ = تعداد محورهای عاملی

۵. نقاطی را برای بررسی روی محور برمی گزینیم که $\text{CTR}(i)$ آن از CTR متوسط بزرگتر یا با آن مساوی باشد و $\text{COR}(i)$ آن نیز لاقل مساوی $0/3$ باشد.

$$\text{CTR} = \frac{1000}{\text{تعداد سطرهای تعداد ستونها}}$$

- * برای مطالعه بیشتر، ر.ک.: تحلیل داده‌ها، تألیف پروفسور بن ذکری، ترجمه حجت‌الله سیف‌اللهی، سال ۱۳۷۲، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.