

ارزیابی WC, WHR, BMI و درصد چربی بدن در بانوان مقاضی تحصیل

در رشتۀ تربیت بدنی دانشگاه پیام نور

دکتر آذر آقایاری^{*}، دکتر حبیب هنری^۲، مucchomه بابایی مبارکه^۳

تاریخ دریافت: ۱۳۹۱/۵/۱۰، تاریخ تصویب: ۱۳۹۱/۶/۲۰

چکیده

پژوهش حاضر به منظور ارزیابی شاخص‌های پیکر سنجی شامل WC, WHR, BMI و درصد چربی بدن در بانوان مقاضی تحصیل در رشتۀ تربیت بدنی دانشگاه پیام نور انجام گرفت.

جامعه آماری این تحقیق را ۱۸۰۰ نفر از بانوان مقاضی ورود به مقطع کارشناسی رشتۀ تربیت بدنی دانشگاه پیام نور تشکیل می‌دهند که از این تعداد ۶۶۴ نفر به صورت تصادفی برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. بر اساس یافته‌های پژوهش، برای آزمودنی‌های مورد مطالعه WHR برابر $23/08 \pm 3/56$ کیلو گرم بر متر مربع، BMI برابر $0/7 \pm 0/07$ ، WC برابر $77/54 \pm 9/69$ سانتی متر و میزان درصد چربی بدن برابر $32/87 \pm 7/12$ % به دست آمد. تجزیه و تحلیل یافته‌ها نشان داد ارزیابی مربوط به WHR, BMI و درصد چربی بدن در بین بانوان ۱۹-۵۴ ساله که به عنوان شاخص‌های پیشگو در مطالعات اپیدمیولوژیکی و سوت وسازی و نیز بروز بیماریهای مرتبط با چاقی مطرح‌اند، در مقایسه با نمونه‌های خارجی همخوانی دارد. این تشابه احتمالاً به دلیل وجود سطح تحصیلات، اهمیت دادن به ترکیب بدن و داشتن فعالیت ورزشی، اطلاع از خطرهای ناشی از چاقی و کم تحرکی می‌باشد. مقایسه اطلاعات به دست آمده از آزمودنی‌ها با هنجارهای متداول نشان داد که آزمودنی‌ها از نظر درصد چربی بدن در طبقه بالای متوسط قرار گرفته و نوعاً مشکلی از بابت تندرستی نداشته‌اند. از نظر BMI در طبقه قابل قبول و در دامنه کمتر از حد طبیعی قرار گرفته‌اند. از نظر شاخص WHR در طبقه با میزان خطر کم قرار گرفته اند و خطری آنان را تهدید نمی‌کند. بطور کلی نتایج نشان داد که آزمودنی‌ها از نظر ترکیب بدنی و شاخص آن دچار مشکلی خاص نبوده و خطرهای وابسته به بهداشت آنان را تهدید نمی‌کند.

وازگان‌کلیدی: شاخص توده بدنی، نسبت دور کمریه دور باسن، اندازه دور کمر، درصد چربی بدن، بانوان، دانشگاه پیام نور.

Key words: Body mass index (BMI), Waist to hip ratio (WHR), Waist circumference (WC), Body fat percentage, women, payame noor university

Email: dr.aghayari@gmail.com

۱. استادیار دانشگاه پیام نور

۲. استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

۳. کارشناس ارشد تربیت بدنی

مقدمه

ارتفاعی سطح بهداشت تن و روان و پیشگیری و یا درمان بسیاری از بیماری ها، به ویژه بیماری های قلبی-عروقی(CVD)، سرطان ها، دیابت نوع دوم، پوکی استخوان، ضعف عمومی، تنگی نفس و به طور کلی کاهش علل همه مرگ و میرها هستند (Corbin,2008 و Maaroos,2001).

در بیشتر مطالعات اپیدمیولوژیکی از شاخص های پیکر سنجی^۱ مانند شاخص توده بدنی(BMI)^۷، نسبت دور کمر به دور باسن(WHR)^۸ اندازه دور کمر(WC)^۹ و به تازگی نسبت دور کمر به قد(WHtR)^{۱۰} برای ارزیابی توزیع چربی در بدن استفاده می کنند.

BMI بالا با بیماری های آندوکرین و تغذیه ای، متابولیک، قلبی، سرطان کولون، سیستم تنفسی و مرگ های ناگهانی مرتبط می باشد و بطور کلی یکی از چندین علل مهم مرگ و میر در سنین میانسالی است (Bjorge,2008 و Munsch,2005).

شواهد نشان می دهد که فعالیت منظم و وزن مطلوب می تواند خطر بیماریهای قلبی عروقی را کاهش دهد(Gang,2004) و افرادی که دارای فعالیت بدنی بیشتری هستند در مقابل افرادی که فعالیت بدنی چندانی نداشتند دارای مقادیر پایین تری از BMI و WHR میباشند(Tanuja,2004). پوکی استخوان و نقرس با افزایش سن در افراد چاق زیاد می شود (Raguso,2005)، با افزایش BMI، خطر افزایش سرطان کولون و رکتوم بیشتر می شود (Jennifer Lin,2004).

سازمان بهداشت جهانی (WHO 1998)^{۱۱} BMI را به عنوان معیار مناسبی برای طبقه بندی وزن پیشنهاد کرده که پذیرش بین المللی را به همراه داشته است. BMI معیار خوبی برای ارزیابی ترکیب بدنی است (Corbin,2008 و Maaroos,2001).

BMI از شاخص های پیکر سنجی می باشد که با هدف کشف ارتباط بین چاقی و بیماری های مختلف استفاده می شود. BMI همبستگی بالایی با خطرهای تهدید کننده

3.Cardiovascular Disease

4.Type 2 diabetes

5.Osteoporosis

6.Anthropometrics parameters

7.Body Mass Index

8.Waist – to – Hip Ratio

9.Waist Circumference

10.Waist to Height Ratio

11. World Health Organization (WHO)

زندگی ماشینی و دسترسی به امکانات و فناوری های نوین، بیشترانسانها را به سوی یک زندگی بی حرک رهنمون می سازد و این عدم تحرك، با افزایش خطربرای ابتلاء به عارضه چاقی همراه است. افزایش شیوع چاقی^۱ در سرتاسر جهان در حالتی صورت می گیرد که هزینه ای انرژی برای کار و نیازهای ضروری روزانه به علت مدرنیزه شدن زندگی به صورت تدریجی کاهش می یابد (آقا علی نژاد، ۱۳۸۴). زمینه ساز بسیاری از مرگ و میرهای جامعه بشری است و هر ساله هزینه هنگفتی را بر دولت ها و مردم تحمل می کند. این هزینه ها عبارتنداز: هزینه های مستقیم که صرف مراقبت های بهداشتی از آنها می شود، هزینه های غیر مستقیم شامل کاهش باز دهی اقتصادی به وسیله افراد، و هزینه های نامحسوس که به صورت بازتاب اجتماعی چاقی و بیماری های ناشی از آن که منجر به عدم احساس سلامتی و شادابی یا مرگ زودرس می شود و بر کیفیت زندگی افراد بشر تاثیر دارد. رواج کم تحركی و افزایش چاقی، خطر کم توانی را در سنین بالا افزایش می دهد(Hassinen,2005)، فعالیت بدنی و افزایش ظرفیتهای عملکردی باعث بهبود کیفیت زندگی و افزایش قابلیت یک زندگی مستقل می شود(۱۴). افزایش چاقی با افزایش خطر بیماری های عروق کرونری(CHD) همراه است، در حالی که افزایش میزان فعالیت بدنی با کاهش این بیماری همراه می باشد(Tricia,2006).

پدیده های مختلفی در زندگی ممکن است افراد را مستعد بروز علایم افسردگی نمایند. از جمله اینکه ممکن است اضافه وزن و یا چاقی تحت شرایط خاصی باعث بروز علایم افسردگی در افراد شود و گاهی خود افسردگی، اضافه وزن و چاقی به همراه می آورد(آقا علی نژاد، ۱۳۸۴). هرچه فرد بر حسب شاخص توده بدنی از وزن و شرایط بدنی خود ناراضی باشد از اعتماد به نفس پایین تر و افسردگی بالاتری برخوردار است(Nazrat,2005).

وضعیت جسمانی و ترکیب بدنی تحت تاثیر عوامل مختلف محیطی و وراثتی نظیر آب و هوا، فصول سال، ارتفاع محل زندگی، وضعیت تغذیه ای و باورهای فرهنگی، سن، فعالیت بدنی، جنس، محل تولد و نژاد قرار می گیرد (Wu.D,2003 و Wandell,2004) ترکیب بدن دلالت بر نسبت درصدی از وزن بدن است که شامل بافت چربی و بافت بدون چربی می باشد (Heyward,2004) و Pettifor,2005). ترکیب بدنی مناسب از عوامل اصلی

1. obesity

2.Coronary Heart Disease

مشخص شده است که اندازه دورکمر^۱ و دور باسن^۲ و نسبت دور کمر به باسن به صورت تنگاتنگی با مقدار چربی شکمی (خطناک ترین نوع چاقی) مرتبط است. لذا می‌تواند به عنوان معیارهای مفید، ساده و حساس در ارزیابی چاقی و توزیع نا مناسب چربی در بدن مورد استفاده قرار گیرند (معصومی، ۱۳۸۴). چاقی شکمی که با افزایش WHR و WC اندازه گیری می‌شود، به عنوان عامل خطرزای قوی در بروز بیماری قلبی-عروقی و دیابت نوع دوم شناخته شده است(Azizi,2005).

تکیک های آنتروپومتریک مانند اندازه گیری چربی زیر پوستی، محیط و قطر اندام ها با تخمین ترکیب بدن به دلیل ارزانی، نیاز به فضای کم و اجرای آسان آنها عمومیت زیادی دارند. اگر چه روش اندازه گیری ضخامت چربی زیر پوست ممکن است مشکل تر باشد اما برآوردمens از چاقی بدن نسبت به آنچه که بر پایه قد و وزن و محیط یا قطر اندام ها به دست می‌آید ارائه می‌کند(Mike,2006).

عارض ناشی از چاقی هر ساله، هزینه های اجتماعی و مالی مانند مراقبتهای بهداشتی، ناتوانی ها و معلولیت ها، مرگ زودرس و کاهش بهره وری را بر جوامع بشری تحمیل می‌کند. بنابراین، ارزیابی وضعیت چاقی در جوامع مختلف براساس معیارهای موجود در هر جامعه می‌تواند در شناسایی، درمان و پیشگیری از چاقی مؤثر باشد و هزینه های یادشده را کاهش دهد. بانوان به دلیل ویژگیهای ساختاری، نقش محوری در خانواده و تغییراتی که در طول سال های زندگی در آنان ایجاد می‌شود، به مراتب به ورزش و آmadگی جسمانی نیازمندتر هستند بر این اساس با توجه به اهمیت رشته تربیت بدنی ضروریست که استانداردهای لازم مانند ارزیابی WC,WHR,BMI و درصد چربی بدن که از عوامل مهم ارزیابی ترکیب بدنی هستند جهت متقاضیان ورود به این رشته تهیه شود. سادگی اندازه گیری این متغیرها و توانایی بالای آن ها در پیشگویی عوامل تهدید کننده سلامتی، اهمیت پژوهش حاضر را نشان می‌دهد. محاسبه شاخصها و تنظیم جدول های آماری به منظور توصیف وضعیت شرکت کنندگان در هر یک از آزمودنی ها اجزاء خواهد داد تا در تحقیقات بعدی بتوان مقایسه ای را بین آزمون شوندگان ایرانی و افراد مشابه دیگر که در سایر نقاط جهان از آنها نورم گرفته شده است برقرار کرد و سطح آmadگی های جسمانی آنها را برای مقاصد برنامه ریزی ارزیابی کرد. سالیان دراز است که مریان ورزش و دبیران تربیت بدنی برای ارزیابی شاگردان خود از نورم های مختلفی که در ارتباط با آmadگی های عمومی

سلامتی مانند دیابت نوع دوم، مقاومت انسولینی^۳، اختلال در سوخت و ساز چربی، پر فشار خونی، بیماری های قلبی وعروقی، نقرس، التهاب استخوان و مفاصل^۴، بیماری کیسه صفرا و سندرم کم تهویه ای^۵ دارد (Corbin,2008).

WHR می‌تواند مؤثترین عامل پیشگو در بروز بیماری های قلبی- عروقی باشد (Dalton,2003). WHR قوی ترین پیشگو کننده بیماری های قلبی - عروقی در زنان است تا مردان، و فعالیت بدنی تأثیر زیادی بر WHR دارد (Antonia,2001).

WHR بالای ۰/۸۵ در زنان و بیشتر از ۱ در مردان با اختلالات متابولیسم لیپید- لیپوپروتئین و اختلال در هموستان انسولین - گلوگر همراه است (Savage,2002). معیارهای دیگری نیز مطرح شده است که بیش از ۰/۸ و دور کمر بیش از ۹۰ سانتی متر در زنان (Topol,2002) و همچنین دور کمر بیش از ۴۰ اینچ در مردان و بیش از ۳۵ اینچ در زنان (Gaziano,2001) به عنوان شاخصی از افزایش ریسک بیماری قلبی- عروقی در نظر گرفته شده است. اندازه دور کمر بیش از ۱۰۰ سانتی متر در هر دو گروه زنان و مردان (بدون ارتباط با BMI) می‌تواند بیانگر آستنانه ای از اختلالات متابولیکی باشد که در آن بیماری عروق کرونر دیده می‌شود(savage,2002). براساس نتایج سایر پژوهشها سنگ صفرا در ۳۰٪ افراد چاق تولید می‌شود، اما ۱۰٪ افراد غیر چاق را مبتلا می‌کند، همچنین سلطان کولون و رکتوم و پروستات در مردان چاق و سلطان رحم و پستان در زنان چاق شایع تراست(Raguso,2005,Ozeelik,2006). چاقی، مخصوصاً چاقی شکمی یک فاکتور مهم و خطرزا در دیابت نوع دوم می‌باشد. فاکتورهای دیگر شامل سن، زمینه ژنتیکی و نژادی است(Adrienne,2003). در دختران چاق که آزادسازی و افزایش آندرودژن ها از غدد آدرنال و آزادسازی استروژن از بافت چربی بیشتری باشد منجر به بیماری تخمدان پلی کیستیک^۶ کیستیک^۷ با شاخص های نازایی، هیرسوتیسم^۸، چاقی و آمنوره^۹ یا اولیگومنوره^{۱۰} می‌شود(Whyte,2006).

محاسبه شاخص های توزیع چربی در بدن^{۱۱} مثل شاخص توده بدنی یکی از پر کاربردترین معیارهای تشخیص، ارزیابی و درمان اضافه وزن یا چاقی در بالغین است. به علاوه

-
- 1.Insulin resistance
 - 2.osteoarthritis
 - 3.Hypoventilation
 - 4.poly cystic ovarian
 5. Hirsutism
 6. Amenorrhea
 - 7.Oligomenorrhea
 8. Body fat distribution indices


9.Waist circumference

10.Hip circumference


آماری همبستگی پیرسون برای تعیین وجود یا عدم وجود ارتباط بین متغیرهای پژوهش استفاده شد.

نتایج و یافته های پژوهش

پیش شرط مورد نظر برای تعیین ارزیابی شاخص های پیکر سنجی افراد، طبیعی بودن توزیع هر کدام از این متغیرهاست. آزمون کلموگروف- اسمیرنوف^۱ یک آزمون ناپارامتری^۲ است که فرض طبیعی بودن اعداد را آزمون میکند. مقدار P مربوط به متغیرها نشان داد به استثنای درصد چربی بدن هیچکدام از شاخص های پیکر سنجی در سطح معنا دار خطای ۵ درصد از توزیع طبیعی، انحراف ندارند($p > 0.05$). ترسیم بافت نگارهای فراوانی شاخص های پیکر سنجی نیز گوای توزیع طبیعی این متغیرها بود(شکل های ۱، ۲، ۳، ۴).



نمودار ۱- بافت نگار توزیع فراوانی BMI بانوان ۵۴-۱۹ ساله ای متقاضی تحصیل در رشته تربیتبدنی



نمودار ۲- بافت نگار توزیع فراوانی WHR بانوان ۵۴-۱۹ ساله ای متقاضی تحصیل در رشته تربیتبدنی

جسمانی در خارج از کشور تهیه شده است استفاده می کنند این تحقیق موجب شد تا نورم های استاندارد تدوین و برای جامعه داوطلب دانشگاه پیام نور آزمایش گردد.

نورم های حاصله در چهار چوب ویژگی های محیطی، نژادی و فرهنگی کشور تهیه می شود لذا می توان با اطمینان بیشتر برای ارزیابی آمادگی عمومی جسمانی جامعه مورد نظر به کار گرفت.

روش شناسی تحقیق

آزمودنی ها

جامعه آماری این تحقیق را ۱۸۰۰ نفر از بانوان متقاضی ورود به مقطع کارشناسی رشته تربیتبدنی دانشگاه پیام نور تشکیل می دهند که از این تعداد ۶۶۴ نفر به صورت تصادفی برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات موردنیاز،^۴ شهرکشور یعنی تهران، مشهد، رشت، شیراز که امکانات برگزاری آزمون را داشتند، انتخاب شدند. روش تحقیق حاضر با توجه به ماهیت موضوع از نوع توصیفی و همبستگی است که به شکل میدانی و با کمک نرم افزار spss.v.12 انجام شده است.

ابزارها و روش های جمع آوری اطلاعات

پس از اندازه گیری قد و وزن آزمودنی ها ، از تقسیم وزن(کیلوگرم) بر قد به توان ۲ (متر) BMI محاسبه شد. برای اندازه گیری دور کمر ، محیط شکم در محدوده ناف و برای اندازه گیری دور باسن، پهن ترین قسمت باسن با متر نواری اندازه گیری شد. سپس با تقسیم اندازه دور کمر بر اندازه دور باسن WHR به دست آمد. برای اندازه گیری ضخامت چربی زیرپوستی سه سر بازو، چهارسران و فوق خاصره، از فرمول عمومی جکسون و پولاک برای زنان استفاده شد.

$$Db=1/0994921-(0/0009929 \times SUM)+(0/0000023 \times (SUM)^2)-(0/0001392 \times AGE)$$

حاصل این فرمول چگالی بدن است پس از محاسبه چگالی کل وزن، درصد چربی بدن به طریق زیربه دست می آید.

$$\% BF = (495/Db)-450$$


A: چین عضله سه سر، B: چین عضله چهارسر، C: چین عضله فوق خاصره، SUM: مجموع سه نقطه به میلی متر، Db: چگالی بدن، AGE: سن به سال و %BF: درصد چربی بدن است (شفیع زاده ۱۳۸۴).

روش های آماری

برای توصیف اطلاعات جمع آوری شده از روش های آمار توصیفی در قالب جدول، شکل و نمودارهای مختلف و از روش

1.Kolmogrov-smirnov test


2.Nonparametric



نمودار ۴- بافت نگار توزیع طبیعی فراوانی BF بانوان

۱۹-۵۴ ساله‌ی متقاضی تحصیل در رشته تربیت بدنی

از این رو پیش شرط مورد نظر در مورد طبیعی بودن متغیرها تأمین بود. بر همین اساس ، از منحنی توزیع طبیعی برای ارزیابی شاخص‌های مورد نظر استفاده شد(جدول ۱).



نمودار ۳- بافت نگار توزیع فراوانی WC بانوان ۱۹-۵۴

ساله‌ی متقاضی تحصیل در رشته تربیت بدنی

جدول (۱) ارزیابی قد، وزن، WC، WHR، BMI و درصد چربی بدن بانوان ۱۹-۵۴ ساله‌ی متقاضی تحصیل در رشته تربیت بدنی

%BF	WC (cm)	WHR	BMI (Kg/m ²)	وزن (Kg)	قد (cm)	رتبه درصدی
۱۶/۰۱	۶۴	۰/۶۸	۱۷/۹۷	۴۷/۲۷	۱۵۴	۵
۲۰/۶۲	۶۵	۰/۷۰	۱۹/۱۲	۴۹/۶۰	۱۵۵	۱۰
۲۲/۹۶	۶۷	۰/۷۲	۱۹/۶۲	۵۱	۱۵۷	۱۵
۲۴/۸۹	۶۹	۰/۷۳	۲۰/۰۶	۵۲/۸	۱۵۸	۲۰
۲۶/۵۴	۷۰	۰/۷۳	۲۰/۶۹	۵۴/۹۲	۱۵۹	۲۵
۲۷/۷۲	۷۱	۰/۷۴	۲۱/۲۵	۵۶	۱۶۰	۳۰
۲۸/۹۶	۷۳	۰/۷۵	۲۱/۶۲	۵۷	۱۶۱	۳۵
۳۰/۲۱	۷۴	۰/۷۶	۲۱/۹۴	۵۸	۱۶۱	۴۰
۳۱/۵۰	۷۵/۹۵	۰/۷۷	۲۲/۳۷	۵۹/۱	۱۶۲	۴۵
۳۲/۲۳	۷۷/۲۵	۰/۷۸	۲۲/۷۹	۶۰	۱۶۳	۵۰
۳۳/۲۶	۷۹	۰/۸۰	۲۳/۱۴	۶۱/۶	۱۶۳	۵۵
۳۴/۴۵	۸۰	۰/۸۱	۲۳/۵۱	۶۳	۱۶۴	۶۰
۳۵/۴۸	۸۱	۰/۸۲	۲۳/۹۹	۶۴	۱۶۵	۶۵
۳۶/۴۷	۸۲/۷	۰/۸۴	۲۴/۵۱	۶۵/۴۵	۱۶۵	۷۰
۳۷/۱۵	۸۴/۲۵	۰/۸۵	۲۵/۰۹	۶۷	۱۶۶	۷۵
۳۸/۲۸	۸۶	۰/۸۶	۲۵/۷۱	۶۸/۱	۱۶۷	۸۰
۳۹/۳۵	۸۸/۳۵	۰/۸۷	۲۶/۶۰	۷۰	۱۶۸	۸۵
۴۰/۳۶	۹۰	۰/۸۸	۲۷/۳۵	۷۴	۱۷۰	۹۰
۴۱/۰۸	۹۴/۲۲	۰/۹۰	۲۹/۰۳	۷۸/۳۷	۱۷۲	۹۵
۵۱/۰۱	۱۰۵	۱/۳۳	۵۰/۴۰	۵۴	۱۸۱	۱۰۰
۳۲/۸۷	۷۷/۵۴	۰/۷	۲۳/۰۸	۶۱/۱۳	۱۶۲/۳۶	میانگین
۷/۱۲	۹/۶۹	۰/۰۷	۳/۵۶	۱۱/۹۹	۵/۹۸	انحراف استاندارد

۲۴/۶۵±۳/۸۱، ۲۳/۶۳±۲/۹۶، ۲۴/۵۹±۲/۷۴، ۲۲/۸۶±۳/۵۹
به دست آمد (جدول ۲).

میانگین BMI برای رده های سنی پنجم گانه ۱۹-۲۴، ۲۹-۳۴، ۳۰-۳۴ و چهل سال به بالای بانوان متقاضی ۳۵-۳۹ تحصیل در رشته تربیت بدنی به ترتیب ۲۱/۴۹±۳/۰۹.

جدول (۲) توصیف فراوانی درصدی BMI (Kg/m²) بانوان ۱۹-۵۴ ساله‌ی متقاضی

تحصیل در رشته تربیت بدنی در رده های سنی مختلف

رده سنی					رتبه درصدی
>۴۰	۳۹-۳۵	۳۰-۳۴	۲۵-۲۹	۱۹-۲۴	
۲۰/۲۵۳۸	۱۹/۱۹۵۳	۱۹/۲۶۵۳	۱۵/۹۷۷۱	۱۵/۸۹۳۹	۱
۲۰/۴۹۳۶	۱۹/۷۸۳۵	۲۰/۰۰۳۱	۱۷/۶۱۰۴	۱۷/۸۶۲	۵
۲۱/۵۲۰۷	۲۱/۰۷۸۷	۲۰/۴۷۹۳	۱۹/۰۰۵۶	۱۸/۲۷۲۷	۱۰
۲۱/۰۹۹۹	۲۱/۸۶۹۰	۲۱/۳۵۲۶	۱۹/۸۳۲۵	۱۸/۹	۱۵
۲۲/۲۳۲۰	۲۲/۱۰۶۰	۲۱/۵۸۳۸	۲۰/۱۵۸۵	۱۹/۴۲۰۱	۲۰
۲۲/۲۲۳۲	۲۲/۳۶۴۸	۲۱/۹۵۴۰	۲۰/۸۶۱۱	۱۹/۷۰۶۲	۲۵
۲۳/۴۲۷۳	۲۲/۸۱۹۲	۲۲/۲۱۴۵	۲۱/۶۴۱۹	۲۰/۰۲۸۸	۳۰
۲۳/۵۱۱	۲۲/۹۰۹۱	۲۳/۰۷	۲۱/۹۶۲۵	۲۰/۶۱۷۱	۳۵
۲۳/۷۴۸۳	۲۳/۳۶۶۷	۲۳/۴۵۴۳	۲۲/۳۶۲	۲۰/۸۵۸۶	۴۰
۲۳/۸۳۲۵	۲۳/۵۵۷۱	۲۳/۷۲۴۷	۲۲/۶۱۰۹	۲۱/۳۳۵۳	۴۵
۲۵/۰۰۰۸	۲۴/۱۸۶۷	۲۴/۱۹۱۷	۲۲/۸۶۲۴	۲۱/۶۰۴۱	۵۰
۲۶/۲۳۳۰	۲۴/۵۴۷۰	۲۴/۴۸۷۷	۲۳/۱۴۷۳	۲۱/۸۷۰۲	۵۵
۲۶/۳۹۷۲	۲۴/۷۶۲۱	۲۵/۰۸۱۸	۲۳/۵۱۶۴	۲۲/۴۸۷۳	۶۰
۲۶/۸۲۴۹	۲۵/۲۲۶۲	۲۵/۵۸۸۶	۲۴/۰۲۱۳	۲۲/۹۴۰۹	۶۵
۲۷/۰۲۹۱	۲۵/۶۶۰۱	۲۶/۰۱۱۹	۲۴/۴۷	۲۳/۴۶۵۳	۷۰
۲۷/۴۱۷۸	۲۶/۱۸۷۸	۲۶/۴۹۱۸	۲۵/۰۹۶۷	۲۳/۹۲۹۲	۷۵
۲۷/۸۶۶۸	۲۶/۶۸۲۰	۲۶/۷۸۸۴	۲۵/۷۱۳۵	۲۴/۶۴۰۸	۸۰
۲۸/۳۵۴۱	۲۷/۶۴	۲۷/۲۶۱۴	۲۶/۴۷۶۳	۲۰/۱۱۶۲	۸۵
۲۸/۹۹۳۴	۲۹/۰۳۱۸	۲۷/۹۶۳۹	۲۷/۲۱۷۲	۲۶/۵۶۶۷	۹۰
۳۰/۸۳۶۹	۳۰/۰۵۲۳	۲۹/۶۴۰۵	۲۹/۲۴۳۹	۲۷/۷۸۱۶	۹۵
۳۳/۸۳۴۰	۳۰/۱۲۰۵	۳۲/۳۸۸۴	۳۱/۵۸۰۵	۳۸/۷۶۸۴	۹۹
۳۳/۸۳۴۰	۳۰/۱۲۰۵	۳۲/۳۸۸۴	۳۲/۸۸۹۲	۵۰/۴۰۵۴	۱۰۰
۲۴/۶	۲۳/۶۳	۲۴/۵۹	۲۲/۸۶	۲۱/۴۹۴۶	میانگین
۳/۰۸	۲/۹۶	۲/۷۴	۳/۵۹	۳/۰۹۲	انحراف استاندارد

تحصیل در رشته تربیت بدنی به ترتیب ۰/۷۹±۰/۰۷، ۰/۰۱±۰/۰۱، ۰/۰۸±۰/۰۸، ۰/۱۵±۰/۰۸، ۰/۷۸±۰/۰۶، ۰/۸۲±۰/۰۶ به دست آمد (جدول ۳).

مقادیر BMI به دست آمده بر اساس طبقه بندی سازمان بهداشت جهانی در محدوده افراد با وزن طبیعی قرار می‌گیرند.

میانگین WHR برای رده های سنی پنجم گانه ۱۹-۲۴، ۲۹-۳۴، ۳۰-۳۴ و چهل سال به بالای بانوان متقاضی ۳۵-۳۹.

جدول (۳) توصیف فراوانی در صدی WHR بانوان ۱۹-۵۴ ساله‌ی متقاضی
تحصیل در رشته تربیت بدنی در رده‌های سنی مختلف

رده سنی					رتبه در صدی
>۴۰	۳۹-۳۵	۳۰-۳۴	۲۵-۲۹	۱۹-۲۴	
۰/۷۲۴۳	۰/۱۷۶۳	۰/۶۷۱۴	۰/۶۴۴۲	۰/۶۴۲۵	۱
۰/۷۲۴۳	۰/۲۰۴۶	۰/۶۷۹۴	۰/۶۸۱۳	۰/۶۹۲۵	۵
۰/۷۳۴۴	۰/۷۰۴۵	۰/۷۰۸۳	۰/۶۹۹۰	۰/۷۰۴۳	۱۰
۰/۷۵۶۲	۰/۷۲۱۲	۰/۷۳۲۲	۰/۷۱۱۱	۰/۷۱۳۳	۱۵
۰/۷۶۰۷	۰/۷۲۶۶	۰/۷۵۴۲	۰/۷۲۶۳	۰/۷۲۶۶	۲۰
۰/۷۶۴۹	۰/۷۳۶۳	۰/۷۷۰۲	۰/۷۳۵۴	۰/۷۳۶۸	۲۵
۰/۷۷۱۳	۰/۷۵۳۵	۰/۷۷۸۷	۰/۷۴۵۷	۰/۷۴۴۵	۳۰
۰/۷۸۶۴	۰/۷۵۶۳	۰/۷۸۹۹	۰/۷۵	۰/۷۵۱۸	۳۵
۰/۸۰۲	۰/۷۷۶	۰/۷۹۶۷	۰/۷۵۰۳	۰/۷۶۳	۴۰
۰/۸۱۵۲	۰/۷۸۱۷	۰/۸۰۴۳	۰/۷۵۹۳	۰/۷۷۲۷	۴۵
۰/۸۳۷	۰/۷۹۹۴	۰/۸۱۷۳	۰/۷۷	۰/۷۸۵۷	۵۰
۰/۸۵۵۸	۰/۸۱۹۶	۰/۸۲۰۲	۰/۷۷۷۸	۰/۸۰۰۹	۵۵
۰/۸۵۵۸	۰/۸۳۲۹	۰/۸۳۷۲	۰/۷۸۷۲	۰/۸۱۹۰	۶۰
۰/۸۵۵۸	۰/۸۴۷۸	۰/۸۴۳۰	۰/۸۰۸۴	۰/۸۲۶۶	۶۵
۰/۸۶۳۶	۰/۸۶۶۷	۰/۸۵۷۲	۰/۸۱۷۳	۰/۸۴۲۷	۷۰
۰/۸۸۵۳	۰/۸۷۶۷	۰/۸۵۷۴	۰/۸۳۹۳	۰/۸۵۲۶	۷۵
۰/۸۹۴۳	۰/۸۷۸۳	۰/۸۷۱۳	۰/۸۴۵۲	۰/۸۶۰۴	۸۰
۰/۸۹۷۸	۰/۸۸	۰/۸۷۸۹	۰/۸۷۷۴	۰/۸۷۲۲	۸۵
۰/۹۳۰۷	۰/۹۱۳	۰/۸۸۲	۰/۸۸۷۲	۰/۸۸۲۶	۹۰
۰/۹۴۵۹	۰/۹۳۱۹	۰/۸۹۵۷	۰/۸۹۹۲	۰/۹۰۹۳	۹۵
۰/۹۴۵۹	۰/۹۳۳۳	۰/۹۰۴۳	۱/۳۳۸	۰/۹۵۰۴	۹۹
۰/۹۴۵۹	۰/۹۳۳۳	۰/۹۰۴۳	۱/۳۳۸	۰/۹۵۹۵	۱۰۰
۰/۸۲۸۳	۰/۷۸	۰/۸	۰/۷۸	۰/۷۹	میانگین
۰/۰۶	۰/۱۵	۰/۰۱	۰/۰۸	۰/۰۷	انحراف استاندارد

یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد که میانگین WHR بانوان ۱۹-۵۴ ساله‌ی متقاضی تحصیل در رشته تربیت بدنی $\pm 0/۰۸$ می باشد.

**جدول (۴) توصیف فراوانی در صدی WC (سانتی متر) بانوان ۵۴-۱۹ ساله‌ی متقاضی
تحصیل در رشته تربیت بدنی در رده‌های سنی مختلف**

رده سنی					درصدی	رتبه
>۴۰	۳۹-۳۵	۳۰-۲۴	۲۵-۲۹	۱۹-۲۴		
۶۱	۶۵	۶۴	۵۶	۵۶/۵۶	۱	
۶۱	۶۵/۴	۶۵/۴	۶۴	۶۱/۴	۵	
۶۵/۴	۶۸/۲	۶۸/۲	۶۵/۵	۶۴	۱۰	
۷۲/۵۵	۷۰	۷۰/۷۵	۶۷	۶۶	۱۵	
۷۶/۴	۷۰	۷۳/۸	۶۹	۶۷	۲۰	
۷۷/۷۵	۷۱	۷۴	۷۰/۳۷۵	۶۸	۲۵	
۷۸/۲	۷۱/۲	۷۶/۴	۷۱	۷۰	۳۰	
۷۸/۹	۷۲/۴	۷۸/۹	۷۳	۷۱	۳۵	
۷۹/۶	۷۳/۶	۸۰	۷۴	۷۳	۴۰	
۸۰/۳	۷۵/۶	۸۱	۷۴/۷۵	۷۴	۴۵	
۸۱	۷۹	۸۲	۷۶	۷۵	۵۰	
۸۳/۱	۸۰	۸۴/۷	۷۷/۶۲۵	۷۶	۵۵	
۸۶	۸۰/۴	۸۵	۷۹	۷۸	۶۰	
۸۹	۸۲/۲	۸۷	۷۹/۷۵	۷۹/۶	۶۵	
۸۹	۸۳/۸	۸۷	۸۱	۸۱	۷۰	
۹۱/۵	۸۵	۸۸/۵	۸۴	۸۴	۷۵	
۹۵/۶	۸۶	۸۹/۶	۸۶	۸۴/۴	۸۰	
۱۰۱/۲	۸۰/۶	۹۰	۸۸/۷۵	۸۶	۸۵	
۱۰۳/۸	۹۶/۲	۹۲/۱	۹۴	۸۹	۹۰	
۱۰۵	۹۷/۸	۹۴/۶۵	۹۵/۸۷	۹۰/۶	۹۵	
۱۰۵	۹۸	۹۵	۱۰۱	۹۹/۷۶	۹۹	
۱۰۵	۹۸	۹۵	۱۰۱	۱۰۲	۱۰۰	
۸۲/۴۵۸۳	۷۸/۶۳۶۴	۸۱/۵	۷۷/۴۷۸۷	۷۵/۵۷۹۴	میانگین	
۱۱/۱۳	۹/۵۹	۸/۶۳	۹/۸۲	۹/۱۵	انحراف استاندارد	

میانگین درصد چربی بدن برای رده‌های سنی پنج گانه ۱۹-۲۴، ۲۵-۲۹، ۳۰-۳۴، ۳۵-۳۹ و چهل سال به بالای بانوان متقاضی تحصیل در رشته تربیت بدنی به ترتیب $91 \pm 6/59.34/51 \pm 6/90.32 \pm 7/62 \pm 7$ و $35/91 \pm 6/59.34/51 \pm 6/90.32 \pm 7/62 \pm 7$ به دست آمد (جدول ۶).

جدول ۵- همبستگی بین شاخص‌های پیکری مورد مطالعه در پژوهش حاضر را نشان می‌دهد.

میانگین به دست آمده در پژوهش حاضر بر اساس طبقه بندی سازمان بهداشت جهانی در محدوده مناسب قرار داشت.

میانگین WC برای رده‌های سنی پنج گانه ۱۹-۲۴، ۲۵، ۳۰-۳۴، ۳۵-۳۹ و چهل سال به بالای بانوان متقاضی تحصیل در رشته تربیت بدنی به ترتیب $9/15 \pm 7/88.63 \pm 9/59$ و $77/47 \pm 9/82$ ، $81/5 \pm 8/83$ ، $75/57 \pm 7/83 \pm 9/59$ و $82/45 \pm 11/13$ سانتی متر به دست آمد (جدول ۴).

جدول(۵) ضریب همبستگی بین شاخص‌های پیکرسنجی

	%BF	WC	WHR	BMI
BMI	***/۵۱۸	***/۶۸	***/۲۶	۱
WHR	*/۱۳۸	***/۶۷۱	۱	
WC	***/۳۵۸	۱		
%BF	۱			

** ضریب همبستگی در سطح خطای ۱ درصد معنی دار است. * ضریب همبستگی در سطح خطای ۵ درصد معنی دار است.

جدول(۶) توصیف فراوانی در صدقه‌بندی بدن با نوام ۱۹-۵۴ ساله متقاضی

تحصیل در رشته تربیت بدنی در رده‌های سنی مختلف

رده سنی					رتبه در صدی
>۴۰	۳۹-۳۵	۳۰-۳۴	۲۵-۲۹	۱۹-۲۴	
۲۲/۸۹۸۷	۲۳/۳۱۶	۱۹/۶۶۰۵	۱۵/۵۸۸۵	۱۵/۶۷۳	۱
۲۴/۶۲۰۵	۲۴/۹۵۹۶	۲۲/۷۰۹۶	۲۱/۳۰۹	۱۷/۵۷۸۴	۵
۲۶/۸۴۱۲	۲۶/۱۱۷۲	۲۳/۷۵۶۱	۲۵/۰۸۶۲	۲۱/۰۰۶۷	۱۰
۲۹/۴۱۴۲	۲۶/۷۴۹۴	۲۶/۳۷۸۳	۲۶/۹۹۲۹	۲۲/۹۲۲۵	۱۵
۲۹/۶۶۲۱	۲۸/۴۹۳۱	۲۹/۲۴۳۶	۲۷/۹۲۹۹	۲۴/۰۰۹۹	۲۰
۳۰/۶۶۸۶	۲۹/۹۳۶۸	۳۱/۱۳۹۹	۲۸/۷۵۸	۲۴/۹۰۶۶	۲۵
۳۱/۰۹۵۱	۳۰/۶۹۰۴	۳۲/۷۱۶۹	۳۰/۱۰۶۳	۲۶/۷۸۸۳	۳۰
۳۱/۸۹۱۲	۳۱/۵۵۷۴	۳۳/۱۴۸۶	۳۱/۱۱۵۵	۲۷/۴۰۱۰	۳۵
۳۴/۷۲۴۵	۳۲/۹۰۰۴	۳۳/۴۰۳۸	۳۱/۹۰۱۷	۲۸/۸۳۸۱	۴۰
۳۵/۲۰۶۸	۳۳/۹۴۰۷	۳۴/۰۳۸۳	۳۲/۰۹۹۵	۳۰/۲۲۳۱	۴۵
۳۷/۵۶۱۸	۳۵/۱۲۳۲	۳۴/۹۸۷۲	۳۳/۶۶۹۶	۳۱/۸۷۰۳	۵۰
۳۹/۳۴۷۸	۳۵/۸۳۴۶	۳۵/۹۲۱۹	۳۴/۸۵۴۹	۳۲/۸۰۳۷	۵۵
۳۹/۶۳۵۶	۳۶/۲۸۳۹	۳۷/۷۹۸۳	۳۵/۹۰۶۳	۳۳/۷۳۸۲	۶۰
۴۰/۱۱۰۵	۳۶/۷۲۸۰	۳۸/۲۶۷۶	۳۶/۶۹۷۲	۳۴/۸۹۲۶	۶۵
۴۰/۳۱۳۹	۳۷/۱۱۱۱	۳۹/۶۲۶۷	۳۷/۴۶۰۵	۳۶/۲۹۲۵	۷۰
۴۱/۱۴۳۷	۳۸/۲۶۳۷	۴۰/۲۱۴۸	۳۸/۳۰۰۱	۳۶/۷۹۶۹	۷۵
۴۲/۷۱۷۴	۳۸/۷۶۹۹	۴۰/۹۳۶۹	۳۹/۷۶۹۲	۳۸/۰۳۲	۸۰
۴۳/۲۸۴۳	۴۱/۴۱۱۸	۴۱/۴۸۷	۴۱/۱۲۱۷	۳۹/۱۸۱۶	۸۵
۴۴/۰۰۲۴	۴۲/۰۶۹۸	۴۲/۸۸۵۲	۴۱/۸۹۵۹	۴۰/۵۳۳۴	۹۰
۴۸/۲۴۸۶	۴۴/۲۸۷۵	۴۴/۳۰۵۷	۴۴/۳۸۳۱	۴۲/۷۸۶۵	۹۵
۵۱/۰۱۹۴	۴۸/۱۸۴۵	۴۵/۳۰۷۳	۴۶/۲۳۵۳	۴۵/۳۶۰۹	۹۹
۵۱/۰۱۹۴	۴۸/۱۸۴۵	۴۵/۳۰۷۳	۴۶/۶۵۱۴	۴۶/۸۷۸۴	۱۰۰
۳۸/۵۵	۳۵/۴۱	۳۵/۹۱	۳۴/۵۱	۳۲/۰۷	میانگین
۵/۷۵	۶/۲۶	۶/۰۹	۶/۹	۳۲/۷۶	انحراف استاندارد

بحث و نتیجه گیری

ترتیب 78 ± 0.15 , 79 ± 0.08 , 80 ± 0.01 , 78 ± 0.06 , 82 ± 0.06 به دست آمد. لاتی - کاسکی⁸ (۲۰۰۰) میانگین WHR زنان 25.64 ± 0.7 ساله‌ی فنلاندی را 79 ± 0.7 ولینسر و همکاران⁹ (۱۹۹۸) میانگین WHR زنان 50 ± 0.5 ساله‌ی سوئدی سوئدی را 11.67 ± 0.08 و هنجار WHR زنان 38 ± 0.5 ساله‌ی سوئدی را 10.05 ± 0.07 به دست آوردند. پاکاد و همکاران (۲۰۰۰) میانگین WHR زنان 35.64 ± 0.35 ساله‌ی سوئیسی منطقه‌ی ود - فریتورگ را 78 ± 0.07 , منطقه‌ی تیسینو را 91 ± 0.08 , و جزایر سیسلیل را 81 ± 0.08 گزارش کردند. همچنین هرگنس (۱۹۹۹) میانگین WHR زنان آلمانی 39 ± 0.05 در زنان 39 ± 0.05 و تانک (۲۰۰۸) در زنان 39 ± 0.05 ساله‌ی آلمانی هنگاران¹ (۲۰۰۵) میانگین WHR برای زنان هلندی را 0.81 ± 0.07 و اونات¹⁰ (۱۹۹۹) نیز میانگین WHR زنان ترک 25 ± 0.07 ساله را 0.82 ± 0.07 گزارش کردند. یافته های پژوهش گویای این نکته است که ارزیابی WHR بانوان متقارضی تحصیل در دانشگاه پیام نور اختلاف چندانی با نمونه های خارجی ندارد. به هر حال این نکته را نباید از نظر دور داشت که شاخص های پیکرسنچی از جمله WHR تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله سن، جنس، قوم و نژاد، آب و هوا، فرهنگ و تغذیه قرار دارند. بنابراین وجود اختلاف در WHR بین انسان ها در مناطق مختلف طبیعی می باشد. با توجه به این که نمونه های پژوهش حاضر را بانوان 54.5 ± 19 ساله‌ی متقارضی تحصیل در رشته تربیت بدنی تشکیل می دادند، متناسب بودن WHR را می توان به میزان تحصیلات، علاقه به رشته تربیت بدنی و اهمیت به ترکیب بدن نسبت داد.

WC-۳: میانگین WC برای رده های سنی پنج گانه $24-29$, $25-34$, $30-39$, $35-44$ و چهل سال به بالای بانوان متقارضی تحصیل در رشته تربیت بدنی به ترتیب 15.15 ± 1.13 , 11.13 ± 0.95 , 8.2 ± 0.82 , 7.57 ± 0.77 و 6.2 ± 0.82 سانتی متر به دست آمد. نقطه بحرانی WC را هان و همکاران¹¹ (۱۹۹۹) در زنان هلندی 88 ± 13 سانتی متر، اونات و همکاران (۱۹۹۹) در زنان ترک 88 ± 13 سانتی متر، هان (۱۹۹۵) در زنان هلندی 59 ± 20 ساله برابر 80.3 ± 10.9 سانتی متر، هرگنس (۱۹۹۹) در زنان آلمانی 8.8 ± 1.0 ساله برابر 39 ± 1.0 سانتی متر و تانک و همکاران (۲۰۰۸) در زنان آلمانی 39 ± 5 ساله 8.4 ± 2.5 ، پاکاد (۲۰۰۰) در زنان سوئیسی 64 ± 4

۱- BMI: میانگین BMI برای رده های سنی پنج گانه $24-29$, $25-34$, $30-39$, $35-44$ و چهل سال به بالای بانوان متقارضی تحصیل در رشته تربیت بدنی به ترتیب 24.59 ± 2.74 , 22.86 ± 3.59 , 21.49 ± 3.09 , 23.63 ± 2.96 کیلو گرم بر متر مربع به دست آمد. دو ال و همکاران¹ (۲۰۰۵) هنجار WHR دختران نوجوان 21.69 ± 3.37 کیلو گرم بر متر مربع به دست آوردند. همچنین میانگین BMI زنان آلمانی 20.55 ± 0.5 در زنان 39 ± 4.2 کیلو گرم بر متر مربع، پاکاد³ (۲۰۰۰) ساله‌ی هلندی 25 ± 2.5 کیلو گرم بر متر مربع، دو ال و همکاران¹ (۲۰۰۵) در زنان 35.64 ± 3.5 ساله‌ی منطقه‌ی ود - فریتورگ⁴ 24.6 ± 2.6 کیلو گرم بر متر مربع، منطقه‌ی تیسینو⁵ 26.5 ± 2.6 کیلو گرم بر متر مربع و منطقه‌ی جزایر سیسلیل 28 ± 2.8 کیلو گرم بر متر مربع گزارش کردند.

در پژوهش دیگری میانگین BMI زنان کانادایی و آمریکایی 18.5 ± 1.8 کیلو گرم بر متر مربع، زنان آسیای دور 22.9 ± 1.8 کیلو گرم بر متر مربع، زنان اسکاتلندي 24.5 ± 1.8 کیلو گرم بر متر مربع 20.25 ± 1.8 کیلو گرم بر متر مربع به دست آمد. هرگنس و همکاران⁶ (۱۹۹۹) در زنان آلمانی 39 ± 4.5 ساله میانگین BMI 24.5 ± 3.9 کیلو گرم بر متر مربع و تانک و همکاران⁷ (۲۰۰۸) در زنان آلمانی 39 ± 4.5 ساله میانگین BMI 27.4 ± 4.0 کیلو گرم بر متر مربع گزارش کردند. یافته های پژوهش گویای این نکته است که ارزیابی BMI بانوان متقارضی تحصیل در دانشگاه پیام نور اختلاف چندانی با نمونه های خارجی ندارد. هر چند پژوهشگران خارجی این میانگین را برای دامنه های سنی بزرگ محاسبه کرده اند، با این حال چون BMI از هر دو متغیر قد و وزن تأثیر می پذیرد، برای روشن شدن موضوع نیاز به انجام پژوهش های بیشتر، احساس می شود. بنابراین استفاده از یک نقطه بحرانی عمومی از BMI برای تعیین چاقی و خطرات مرتبط با آن ممکن است با محدودیت هایی همراه باشد.

۲-WHR: میانگین WHR برای رده های سنی پنج گانه $24-29$, $25-34$, $30-39$, $35-44$ و چهل سال به بالای بانوان متقارضی تحصیل در رشته تربیت بدنی به

-
1. Du.L et al
 2. Han, T.etal
 3. Paccaud, F. v et al
 4. Vaud-Fritourg
 5. Ticino
 6. Hergence, G et al
 - 7.Tank et al

8. Lahti Koski. M et al

9. Linsser L, G. et al

10. Onat, A. V. et al

11. Han , S.C. et al 2001

منابع

- ۱- آقاطلی نژاد، حمید و رضا قراخانلو(۱۳۸۴). هنجاریابی **BMI.WHR.WC** و درصد چربی بدن در جامعه ایرانی و ارتباط آن با عوامل خطرزای قلبی-عروقی، طرح پژوهشی پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.
- ۲- شفیع زاده، محسن(۱۳۸۴)، کاربرد سنجش و ارزشیابی در تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران: بامداد کتاب.
- ۳- معصومی، معصومی و معلی، بهیمه مرادی و همکاران(۱۳۸۴)، اثر باز توانی قلبی بر شاخص های توده بدنی و توزیع چربی بدن در مبتلایان به بیماری عروق کرونر، مجله پژوهشی حکیم، شماره ۱۰(۳).
- 4- Adrienne,E.Hardman and david J.stensel(2003),"physical activity and health",London and New york.Routlege.page:100-101.
- 5- Antonia Trichopoulou, Charalambos Gniardellis, Areti Lagiou, Vassiliki Benetou, Androniki Naska and Dimitrios Trichopoulos (2001), Physical activity and energy intake selectivity predict the waist-to-hip ratio in men but not women. American Journal of Clinical Nutrition. Vol.74, No.5, 574-578.
- 6-Azizi, F., Esmailzadeh, A., Mirmiran, P., Ainy, E(2005), Is there an independent association between waist to hip ratio and cardiovascular risk factors in overweight and obese woman? Int. J. Cardio. Volume 101, Issue, 11 May. Page 39-46.
- 7-Bjorge, Tone.Anders Engeland et al (2008), Body mass index in Adolescence in relation to cause-specific mortality: a follow-up of 230000 Norwegian adolescent, American Journal of epidemiology, vol.168, number1.pp30-37.
- 8-Corbin Charles B, Gregory J.Welk, William R. Corbin, Karen A. Welk (2008), "Concepts of fitness and wellness", New York, the MacDraw-Hill Companies, Section 5.
- 9-Dalton, M, Cameron, A. J, Zimmet, P. Z, Shaw, D, Jolley, D. W, Dunstan. Wellborn, T. A (2003), Waist circumference, waist to hip and body mass index and their correlation with cardiovascular disease risk factors in Australian adults. Int. J. Med. Vol (254): 555.
- 10-Du.L. Toit, R. E. Vanter, and J. R. Potgieter (2005), The relationship between cardio respiratory fitness, body composition and physical self-perception of Adolescent Girls. Journal of Human Movement studies. 48: 353-64.
- 11-Gang Hu, Jaakko Tuomilehto, Karri Silventoinen, Noel Barengoc and Pekka Jousilahti (2004), Joint effects of physical activity, body mass index, waist circumference and waist-to-hip ratio with the risk of cardiovascular diseases

۳۵- سالهای منطقه‌ی و د فریتورگ ۷۹/۶ ۵ سانتی متر، منطقه‌ی تیسینو ۹۵/۱۶ ۹۵ سانتی متر و جزایر سیسیل ۸۴/۳ سانتی متر به دست آوردند. لاتی کاسکی و همکاران (۲۰۰۰) نیز میانگین WC زنان ۲۵-۶۴ ۲۵ ساله فنلاندی را در سال ۸۱±۱۱/۴ ۷۹/۸±۱۱/۴ برابر با ۱۹۹۲ در سال ۱۹۸۷ برابر با ۱۹۹۷ برابر با ۸۱/۵±۱۲/۴ و دو ال و ۷۲/۲۷±۷/۲۵ همکاران (۲۰۰۵) در دختران نوجوان را ۲۰۰۰ سانتی متر به دست آوردند. با مقایسه‌ی ارزیابی حاصل از یافته های این پژوهش مشخص می شود که در مقایسه با راهنمای کلی اندازه دور کمر بزرگ‌سالان ، زنان مورد مطالعه در گروه افراد با دور کمر طبیعی قرار می گیرند. میانگین WC طبق نظر سازمان بهداشت جهانی سال ۲۰۰۰ از نقطه بحرانی زنان کانادایی ، امریکایی ، آسیای دور ، اسکاتلندي و انگلستان پایین تر است. مقایسه‌ی میانگین WC به دست آمده در پژوهش حاضر با میانگین WC در کشورهای دیگر حاکی از مناسب بودن میزان WC در جامعه مورد پژوهش بود. میزان تحصیلات ، علاقه به رشته تربیت بدنی و اهمیت به ترکیب بدن را می تواند یکی از عوامل مناسب بودن WC باشد.

۴- درصد چربی بدن

میانگین درصد چربی بدن برای رده های سنی پنج گانه ۲۴-۱۹ ، ۲۵-۲۹ ، ۳۰-۳۴ ، ۳۵-۳۹ و چهل سال به بالای بانوان ۳۲/۰۷±۷/۶۲ متقاضی تحصیل در رشته تربیت بدنی به ترتیب ۳۸/۵۵±۵/۷۵ ، ۳۵/۴۱±۶/۲۶ ، ۳۵/۹۱±۶/۵۹ ، ۳۴/۵۱±۶/۹۰ درصد به دست آمد. دو ال و همکاران (۲۰۰۵) میانگین درصد چربی بدن در دختران نوجوان ۲۸/۳۷±۸/۷۳٪ هی و همکاران (۲۰۰۱) در زنان هنگ کنگی ۲۰-۳۰ ساله را ۷/۳۲ در رشته تربیت بدنی به ترتیب ۳۱-۴۰ ، ۴۱-۵۰٪ ۳۲/۶٪ ۳۶/۶٪ ۴۱-۵۰٪ ۲۹/۵٪ ۵۱ ساله را ۲۸/۵٪ و بالای ۶ سال درصد، سوری جر و همکاران (۲۰۰۴) در زنان جنوب شرقی اسپانیا درصد چربی بدن را ۳۰/۷±۳/۴٪ و تیلور (۲۰۰۸) در زنان سفید پوست نیوزلند ۳۶/۸±۸/۴٪ گزارش کردند. دلیل عدمدهی تفاوت های مشاهده شده در میزان درصد چربی بدن در پژوهش های انجام شده می تواند مربوط به نقاط اندازه گیری شده و فرمول مورد استفاده برای برآورد درصد چربی بدن باشد. مقایسه‌ی ارزیابی حاصل از یافته های این پژوهش و هنجارهای خارجی درصد چربی بدن نشان می دهد که تقریباً اکثر بانوان ۱۹-۵۴ ساله ای متقاضی تحصیل در رشته تربیت بدنی در محدوده نسبتاً بالاتر از حد طبیعی قرار دارند.

-
1. He, M et al
 2. Soriguer, F et al
 3. Taylor et al

- (2005).Body dissatisfaction, self-esteem, and overweight among inner-city Hispanic children and adolescent, *Journal of Adolescent Health*, 36,267-270.
- 27-Nina Karneheda, Per Tyneliusa, Berit L Heitmana and Finn Rasmussen (2006), Physical activity, diet and gene-environment interactions in relation to body mass index and waist circumference: The Swedish Young Male Twins Study. *Public Health Nutrition* 9:851-858.
- 28-Neovius M,Linne Y,Rossner S(2005).BMI,waist-circumference and waist-hip-ratio as diagnostic tests for fatness in adolescents.*Int J Obese Relate Metab Discord.*vol.29(2):163-169.
- 29-Onat, A. V., Sansoy and O. Uysal(1999), Waist circumference and waist to hip ratio in Turkish adults, Inter relation with other risk factors and association with cardiovascular disease. *Int. J. Cardio.* 70(1): 43-50.
- 30-Otabe, S. K. Clement, C. Dina, V. Peloux, B. Guy-Grand, P. Froguel and F.Vasseur (2000), A genetic variation in the 5 flanking region of the UCP3 gene is associated with body mass index in human's interaction with physical activity.
- 31-Ozeelik O&et al (2006), Effect of eight weeks of exercise training&orlistant therapy on body composition &maximal exercise capacity in obese females. *Public Health* 120. 76-82.
- 32-Paccaud, F. v., schluter - Fasmeyer, V., weittis bach and P. Bovet (2000), Dyslipidemia and abdominal obesity and assessment in there general populations. *J. Clin. Epidemiology.* Apr, 53(4): 393-400.
- 33-Pettifor, bonnie (2005),"physical best activity guide", second edition/NASPE.National Association for Sport and Physical Education. Canada Human Kinetics.
- 34-Raguso C.A&et al (2005), A3-year longitudinal study on body composition change in elderly: role of physical exercise, clinical nutrition.27oct, Elsevier.
- 35-Rahmani-nia Farhad and Nader Rahnama (2004), Is there a relationship between the Height-weight table, standard formulae and body composition assessment in the estimation of optimal Body weight. *Cell. Mol. Biol. Lett.* Vol., PP: 105-108.
- 36-Richardson, L.P, Garrison, M.M, Drangsholt, M.Mancl, L&Leresch, L. (2006).Association between depressive symptoms and obesity during puberty. *General Hospital Psychiatry*, 28,313-320.
- 37-Savage PD.Lee M, Harvey BJ, et al (2002), weight Reduction in the cardiac rehabilitation setting.J cardopulm Rehabil: 22(3):154-160.
- 38-Soar C, Vasoconcelos F.A, Assis MA (2004), waist-hip ratio and waist circumference associated with body mass index in a study with school children, Cad saude publica, 2004, 20(6):1609-1616.
- among middle-aged Finnish men and women .*European Heart Journal.*25 (24):2212-2219.
- 12-Gaziano M, Manson JE, RidkerPM (2001), primary and secondary prevention of coronary heart disease. In: Braun Wald E zips Medicine.6th edition, vol.2, 1047.
- 13-Han, T. S, E. M. Van Leer, J. C. Seidell and M. E. J. Lean. (1995). Waist circumference action levels in the identification of cardiovascular risk factors, prevalence study in a random sample. *BMJ*, 311:1401-5.
- 14-Hardman. AE and Stensel. JD (2004), *Physical Activity and Health: The evidence explained.* Rutledge, London.
- 15-Hassinen, Maija; Pirjo, Komulainen, etal (2005),"Associations of Body Composition and Physical Activity with Balance and Walking Ability in the Elderly", *Journal of physical activity& Health*, vol.2, lss.3.
- 16-He, M., Tan, K.C. Li ET.Kung, A. w(2001)," Body fat determination by dual energy X-ray absorptiometry and its relation to body mass index and waist circumference in Hong Kong chins". *Journal: Int. J. obese. Relate. Me tab. Discord.* 25(5): 748-52.
- 17-Hergence, G. H., Schulte, G(1999), Assmann and Von Eckardste Association of obesity markers, insulin and sex hormones with HDL - cholesterol levels in Turkish and German individuals *Atherosclerosis*, 145:147-59.
- 18- Heyward H.V and Wagner DR (2004), Applied body composition assessment (2 nd Ed). Champaign, IL: Human Kinetics.
- 19-Jennifer, Lin. Shumin, M et al(2004),"Body mass index and risk of colorectal cancer in women (United States)", *Cancer Causes and control.vol.15*581-589.
- 20-Kyle U.G, Y.Shutz and C Pilchard (2003),"Body composition interpretation: contribution of the fat-free mass index and body fat mass index. *Journal of Nutrition* .No.19.
- 21-Lahti Koski. M, P. Pietren and E. vartianinen (2000), Trends in waist to hip ratio on its determinates in adults in Finland from 1987 to 1997. *Am. J. Clin. Nutr.* 72(6): 1436-1444.
- 22-Maaroos J and Lander A. (2001). Anthropometric indices and physical fitness in university under graduates with different physical activity. *Anthropol. Anz.* 59:157-163.
- 23-Mike, Martino (2006), bioelectrical impedance and body composition assessment, *Teaching elementary physical education* 1 July 2006.
- 24-Mirmiran, P., Esmailzadeh, A., Azizi, F (2004), Detection of cardiovascular risk factors by anthropometric measures in Tehranian adults. Receiver operating characteristic (ROC) cure analysis. *Euro. J. Clin. Nutr.* Aug; 58(8): 1110-8.
- 25-Munsch,S.Beglinger,C.(2005)Obesity and binge eating disorder,Switzerland:Karger.pp:53.
- 26-Nazrat, M.Mirza, D, Yanovski, J.A

Stampfer, Walter C Willett, and Alberto Ascherio(2004),Physical activity and risk of coronary heart disease in India. International Journal of Epidemiology.33 (4):759-767.

43-Taylor et al (2008), www.ajcn.org by on december1, The American Journal of clinical Nutrition.

44-Topol EJ (2002).Text book of cardiovascular Medicine .2nd ed Lippincott William Wilkins; 41-75.

45-Tricia Y.Li,;Jamal S.Rana,;JoAnn E.Manson et al (2006)"Obesity as compared with physical activity in predicting risk of coronary heart disease in women", American heart association,Inc.113:499-506.

39-Soriguer, F; G.Rojo-Martinez at el (2004),"Prevalence of obesity in south-east Spain and relation with social and health factors", European Journal of Epidemiology.vol.19, 33-40.

40- Srdic B, stokic E, Pozovic A (2003). Relations between parameters which define quantity and distribution of adipose tissue.56 (5-6):232-236.

41-Tank, Jens et al (2008), Influences of gender on the interaction between sympathetic nerve traffic and central adiposity. Journal of the endocrine society september9, 2008 as doi: 10-1210/jc.2007-2820.

42-Tanuja Rastogi, Mario Vaz, Donna Spiegelman, K Srinath Reddy, AV Bharathi, Meir J

