

## مقایسه‌ی نشخوار فکری و مکانیسم‌های دفاعی در افراد مبتلا به اختلال افسردگی اساسی و اختلال وسوسی-جبری با افراد غیر مبتلا

تاریخ پذیرش: ۹۳/۶/۲

تاریخ دریافت: ۹۲/۱۰/۲۲

آذر سراج خرمی\*، جهانگیر کرمی\*\*، خدامراد مؤمنی\*\*\*

### چکیده

مقدمه: هدف پژوهش، مقایسه‌ی نشخوار فکری و مکانیسم‌های دفاعی در افراد مبتلا به اختلال افسردگی اساسی و اختلال وسوسی-جبری با افراد غیرمبتلا بود.

روشن: پژوهش حاضر توصیفی از نوع پس رویدادی بود. نمونه شامل ۳۰ نفر مبتلا به اختلال افسردگی (زن)، ۳۰ نفر مبتلا به اختلال وسوسی-جبری (زن ۱۶ و مرد ۱۵) و ۶۰ نفر افراد غیرمبتلا (زن ۴۵ و مرد ۱۵) بود. نمونه‌ی بالینی با روش نمونه‌گیری هدفمند و نمونه‌ی غیرمبتلا به صورت هدفمند و با روش غربالگری با استفاده از پرسشنامه MMPI، انتخاب شدند. ابزارهای به کارگرفته شده شامل پرسشنامه‌ی نشخوار فکری، پرسشنامه‌ی مکانیسم‌های دفاعی و پرسشنامه‌ی ۷۱ سؤالی MMPI بود. جهت تحلیل داده‌ها از تحلیل واریانس چندمتغیره استفاده شد.

یافته‌ها: نتایج نشان داد میزان استفاده از نشخوار فکری در گروه غیرمبتلا بود. میزان استفاده از سبک دفاعی رشدنایافته در گروه‌های مبتلا بیشتر از گروه غیرمبتلا و میزان استفاده از سبک روان‌آرده نیز در مبتلایان به افسردگی بیشتر از گروه وسوسی و غیرمبتلا بود. علاوه بر آن نتایج نشان داد که بین سه گروه در مکانیسم‌های دفاعی فرافکنی، نارازنده‌سازی، گذاره عمل، بدنی-سازی، خیال‌پردازی اوتیستیک، لایه‌سازی، پرخاشگری منفعانه، جایه‌جایی، مجازاسازی، فرونشانی، والايش، شوخ‌طبعی، پیشاپیش‌نگری، دیگردوستی کاذب و ابطال، تفاوت وجود دارد.

نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های پژوهش، نشخوار فکری و مکانیسم‌های دفاعی نقش مهمی در اختلال‌های افسردگی اساسی و وسوسی-جبری دارند. تلاش در راستای کاهش به کارگیری نشخوار فکری و سبک‌های دفاعی رشدنایافته و روان‌آرده می‌تواند گامی مهم جهت ارتقای سلامت روانی بیماران باشد.

واژه‌های کلیدی: نشخوار فکری، مکانیسم‌های دفاعی، اختلال افسردگی اساسی، اختلال وسوسی-جبری

مقاله حاضر برگرفته از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه رازی کرمانشاه می‌باشد.

azarsarraj@yahoo.com

\* نویسنده مسئول: کارشناس ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

j.karami@razi.ac.ir

\*\* دانشیار، گروه روانشناسی عمومی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

khmomeni2000@yahoo.com

\*\*\* دانشیار، گروه روانشناسی عمومی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

**مقدمه**

شناختی سهم بسزایی در تشديد و تداوم اختلال‌های خلقی و اضطرابی بر عهده داشته و این موضوع نشان‌دهنده اهمیت آن در فرایند درمان می‌باشد.

یکی دیگر از مهم‌ترین مفاهیمی که در نظام روان‌تحلیل-گری جهت تبیین عملکرد دفاعی دستگاه روانی در برابر اضطراب و تبیدگی معرفی شده است، مکانیسم‌های دفاعی<sup>۸</sup> می‌باشد که فروید<sup>۹</sup> آنها را به عنوان عملیات ذهنی که افکار و احساسات دردنگ را از حوزه آگاهی دور نگه می‌دارد، توصیف کرد[۸]. بنا به تعریف آنا فروید<sup>۱۰</sup> مکانیسم‌های دفاعی راهها و شیوه‌هایی هستند که من با کمک آنها اضطراب و رنجش را پس زده و رفتار تکانشی و غریزی را کنترل می‌کند؛ او همچنین علائم روان‌آزره را پیامد استفاده‌ی مستمر و عادتی از شکل خاصی از دفاع می‌داند [۹]. مکانیسم‌های دفاعی در DSM-IV-TR به عنوان فرایندهای روان‌شناختی خودکاری تعریف می‌شود که افراد را در مقابل اضطراب و آگاهی از استرس‌ Zahāhی درونی و بیرونی حفظ می‌کنند؛ این مکانیسم‌ها واسطه‌ی بین واکنش فرد به تعارض‌های هیجانی و عوامل تنفس‌زای درونی و بیرونی هستند[۱۰]. مکانیسم‌های دفاعی گرچه تدبیری ناهشیار جهت کنترل اضطراب می‌باشند، اما به واسطه ماهیت خودفریبی<sup>۱۱</sup> که دارند، بعض مکانیسم‌های ناپاخته‌ای می‌باشند که عملاً با رفتار سازگارانه ناهمانگی دارند و این در رفتار و سلوک افراد مبتلا به اختلال‌های خلقی و اضطرابی منعکس می‌گردد. شناخت این موارد و تبیین مناسب آنها دستاویزی را برای درمان‌گران فراهم می‌آورد تا ضمن شناسایی این مکانیسم‌های خودفریبی و ناهشیار، به آنها یاری رسانند که از مکانیسم‌های سازگارانه مقابله همانند مقابله مسئله‌مدار<sup>۱۲</sup> و در کنار آن مقابله هیجان‌مدار<sup>۱۳</sup> بهره گرفته شود[۱۱].

نتایج پژوهش وال، ارتل، بون، زورووسکی و کوردون[۱۲] بر روی نمونه‌های غیربالینی نشان داد که گرایش به نشخوار فکری به طور مثبتی با شدت علائم وسوسی و بویژه با نشخوار وسوسی حتی بعد از کنترل افسردگی همبسته بود.

اختلال افسردگی اساسی<sup>۱</sup> و اختلال وسوسی- جبری<sup>۲</sup> دو اختلال روانی به شمار می‌روند که عوامل مؤثر بر بروز و تداوم آنها به خوبی شناخته نشده‌اند[۱] این اختلال‌ها با علائمی که به همراه دارند، مشکل قابل ملاحظه‌ای در روند معمولی و طبیعی زندگی، کارکرد شغلی، فعالیت‌های معمول اجتماعی یا روابط فرد ایجاد می‌کنند[۲].

عوامل مختلفی در بروز اختلال‌های خلقی و اضطرابی تأثیر دارند که یکی از مهم‌ترین این عوامل، نشخوار فکری<sup>۳</sup> است. این نوع تفکر در برخی اختلال‌های هیجانی نظیر افسردگی، وسوس فکری- عملی، اضطراب فراغیر<sup>۴</sup> و اختلال استرس پس از سانحه<sup>۵</sup> مشاهده می‌شود[۳]. مدل‌ها و تعریف‌های زیادی از نشخوار فکری ارائه شده است که نیرومندترین نظریه در این مورد، نظریه‌ی سبک‌های پاسخ نالن- هاک‌سما<sup>۶</sup> می‌باشد[۴]. در این نظریه نشخوار فکری به عنوان تفکر تکرارشونده درباره علائم افسردگی، علل احتمالی و پیامدهای این علائم تعریف شده است[۵] که شدت و سیر افسردگی، پیامد نوع ارزیابی فرد از علائم افسردگی خود است؛ علاوه بر این، نشخوار فکری، افسردگی را به واسطه تفکر منفی، حل مسئله ناکارآمد، تداخل با رفتار هدفمند و کاهش حمایت اجتماعی تشید و تداوم می‌بخشد[۶]. نشخوار فکری در اختلال وسوس نیز، شامل افکاری است که به طور پایان‌نایذیر مرور می‌شوند و به نالمیدی درباره آینده و ارزیابی‌های منفی درباره خود منجر می‌شود[۷].

یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که نشخوار فکری برای افراد ایجاد می‌نماید، جداسازی آنها از واقعیت و فاصله گرفتن از اینجا و اکنون<sup>۸</sup> می‌باشد که روی پردازش آنها تأثیر منفی به جا می‌گذارد؛ شناسایی این سازه و کمک به بیماران در پیدا کردن بینش نسبت به اینکه به جای گذشته در حال و اینجا زندگی کنند، فرایند واقعیت‌سنجی و درک کامل‌تر از وضعیت فعلی خود و اطرافیان را تسريع می‌بخشد. این سازه

1-Major Depression Disorder

2-Obsessive- Compulsive Disorder

3-thinking rumination

4-General Anxiety Disorder

5- Post Traumatic Stress Disorder

6-Nolen Hoeksema

7- here and now

8- defence mechanisms

9- Freud

10- Anna Freud

11- self deception

12- problem-centered coping

13- emotion-centered coping

نشخوار فکری و دفاع‌ها ممکن است مشخصه‌ی تعداد زیادی از بیماری‌های روانی باشد و مدیریت آنها ممکن است نقشی ویژه در درمان‌های حمایت‌کننده داشته باشد. با توجه به مطالب ذکر شده و همچنین به دلیل شیوع بالای اختلال‌های خلقی و اضطرابی و تأثیری که این اختلال‌ها بر عملکرد افراد دارند و همچنین به علت اندک بودن مطالعات جهت شناسایی عوامل روان‌شناختی دخیل در شروع و تداوم هریک از اختلال‌های مذکور و یافته‌های متفاوت و متناقض به دست آمده و با توجه به اینکه تاکنون در هیچ پژوهشی به بررسی رابطه‌ی بین نشخوار فکری و مکانیسم‌های دفاعی پرداخته نشده است، مسأله‌ی اصلی پژوهش حاضر این است که آیا نشخوار فکری و مکانیسم‌های دفاعی در افراد مبتلا به اختلال افسردگی اساسی، وسوسی-جبری و افراد غیرمبتلا با یکدیگر تفاوت دارند؟ این پژوهش در صدد آن است که علاوه بر مقایسه‌ی این گروه‌ها، با شناسایی میزان به کارگیری نشخوار فکری و تعیین مکانیسم‌هایی که افراد افسرده و وسوسی به کارمند، گامی مقدماتی در فرایند طرح‌ریزی چارچوب درمان برای بیماران برداشته شود. همچنین هدف دیگر انجام این پژوهش، تعیین سهم هریک از متغیرهای مذکور در بروز و تداوم افسردگی و وسوس است.

### روش

**طرح پژوهش:** طرح پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی از نوع علی- مقایسه‌ای است.

**آزمودنی‌ها:** جامعه‌ی آماری این پژوهش را کلیه‌ی افراد ساکن در شهر دزفول که توسط روانپزشک و بر اساس ملاک‌های تشخیصی DSM-IV-TR و مصاحبه‌های تشخیصی ساخت‌یافته از جمله SCID واجد ملاک‌های تشخیصی اختلال افسردگی اساسی و وسوسی-جبری بودند، به عنوان جامعه‌ی بالینی و همچنین کلیه‌ی فرهنگیان شاغل در این شهر به تعداد ۷۷۹ نفر (۴۱۹ زن و ۳۶۰ مرد) به عنوان جامعه‌ی غیرمبتلا، تشکیل دادند. حجم نمونه را تعداد ۱۲۰ نفر تشکیل می‌دادند که شامل ۳۰ نفر در هر یک از گروه‌های بالینی افسرده (۳۰ زن و ۱۵ مرد) زن و ۱۴ مرد) و ۶۰ نفر در گروه غیرمبتلا (۴۵ زن و ۱۵ مرد) بود. در گروه بالینی افراد مبتلا به اختلال افسردگی اساسی

یوک، کیم، سو و لی<sup>[۱]</sup> در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر سطوح بالاتری از نشخوار را نسبت به گروه کنترل گزارش دادند؛ اگرچه این بیماران سطوح پایین‌تری از نشخوار را نسبت به مبتلایان به افسردگی اساسی داشتند. منصوری، فرنام، بخشی‌پور روتسی و محمودعلیلو<sup>[۱۴]</sup> در یک پژوهش توصیفی- تحلیلی مقطعی به این نتیجه رسیدند که نشخوار فکری هم در جمعیت‌های بالینی و هم در جمعیت‌های غیربالینی اتفاق می‌افتد و موقع آن محدود به یک اختلال خاص نیست. وان و اولسون<sup>[۱۵]</sup> در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که ارتباط و تداعی بین نشخوار و علائم افسردگی توسط سبک دفاعی نارس اداره می‌شود. باقری- نژاد، صالحی و طباطبایی<sup>[۱۶]</sup> در پژوهشی به منظور بررسی رابطه‌ی بین نشخوار فکری و افسردگی به این نتیجه دست یافتند که نشخوار فکری می‌تواند میزان افسردگی را حتی پس از کنترل میزان اضطراب پیش‌بینی کند. نتایج پژوهش خسروی، مهرابی و عزیزی مقدم<sup>[۱۷]</sup> نیز نشان داد که تفاوت معناداری بین سه گروه افسرده، وسوسی-جبری و افراد غیر مبتلا در نمره‌ی کل نشخوار فکری و خرد مقیاس‌هایش وجود دارد.

شعبانپور، ظهیرالدین، جان‌بزرگی و قائلی<sup>[۱۸]</sup> در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که هر دو گروه مبتلا به وسوس و وحشتزدگی بیشتر از سبک‌های رشدنایافته و کمتر از سبک‌های رشدیافته در مقایسه با گروه غیرمبتلا استفاده از کرده بودند؛ همچنین هیچ تفاوت معناداری در استفاده از سبک روان‌آزده بین دو گروه مشاهده نشد. افضلی، آشتیانی و آزادفلاح<sup>[۱۹]</sup> در پژوهشی به این نتیجه دست یافتند که مشخصه‌ی اصلی الگوی دفاعی مبتلایان به اختلال وسوسی-جبری در مقایسه با گروه بهنچار در استفاده‌ی زیاد آنها از مکانیسم‌های دفاعی گذار به عمل، تشكل واکنشی و ابطال است.

با توجه به اینکه نشخوار فکری به عنوان مهم‌ترین مؤلفه‌ی افسردگی شناخته شده است<sup>[۲۰]</sup> و از طرف دیگر با توجه به اینکه هر اختلال روانی با مکانیسم‌های دفاعی خاصی مشخص می‌شود<sup>[۲۱]</sup>، لذا استفاده‌ی بیش از حد از

1-Yook,Kim,Suh,Lee

2-Kwon & Olson

آکسفورد محاسبه شد. اعتبار سازه از طریق تحلیل عاملی به روش واریماکس انجام شد، روایی افتراقی از طریق همسانی درونی اجرای آزمون روی گروه افسرده (بالینی) و گروه غیربالینی بررسی شد. همسانی درونی آزمون با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شد و پایایی پرسشنامه از طریق ضریب بازآزمایی به دست آمد. ضریب اعتبار همزمان با آزمون بک ۰/۵۱ و با مقیاس شادمانی آکسفورد ۰/۵۳ به دست آمد که هردو از لحاظ آماری معنادار بودند. همچنین نتایج نشان داد که این پرسشنامه از ثبات درونی بسیار خوبی با ضریب آلفای کرونباخ ۰/۹۲ بروخوردار است. همچنین، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده در این پژوهش، ۰/۹۶ است.

۳- پرسشنامه سبک‌های دفاعی<sup>(۳)</sup> (DSQ-40): این پرسشنامه بر اساس الگوی سلسله مراتبی دفاع‌ها توسط اندروز و همکاران در سال ۱۹۹۳ تدوین گردید که شامل ۴۰ سؤال در مقیاس ۹ درجه‌ای لیکرت (از کاملاً موافق تا کاملاً مخالف) است و امکانیسم دفاعی را در سه سطح سبک رشد یافته (فرونشانی، والايش، شوخ‌طبعی و پیش‌پیش‌نگری)، سبک روان‌آزده‌هار (دیگردوستی کاذب، تشکل واکنشی، عقلانی‌سازی، ابطال) و سبک رشدنا‌یافته (دلیل‌تراشی، فرافکنی، انکار، همه‌کارتونی، نارازنده‌سازی، گذار به عمل، بدنسازی، خیال‌پردازی اوتیستیک، لايه‌سازی، پرخاشگری منفعلانه، جابه‌جایی و مجزا‌سازی) شامل می‌شوند [۲۲]. پرسشنامه‌ی مکانیسم‌های دفاعی در ایران توسط حیدری نسب مورد بررسی و هنجاریابی قرار گرفت. اعتبار پرسشنامه‌ی مکانیسم‌های دفاعی از طریق روش بازآزمایی و نیز محاسبه آلفای کرونباخ انجام شده است. ضریب اعتبار و آلفا در گروه‌های مطالعه به تفکیک در دانش‌آموزان و دانشجویان و جنسیت گروه نمونه‌گیری و نیز سبک‌های دفاعی نشان می‌دهد که بالاترین آلفای کلی در مردان دانشجو (۰/۸۱) و پایین‌ترین آلفای کل در دانش‌آموزان دختر (۰/۶۹) مشاهده می‌شود. در سبک‌های دفاعی، بالاترین آلفا مربوط به سبک رشدنا‌یافته (۰/۷۲) و کمترین مربوط به سبک روان‌آزده‌هار (۰/۵۰) می‌باشد. بر اساس این، بالاترین آلفای کرونباخ محاسبه شده بین دو نیمه‌ی آزمون مربوط به مردان دانشجو و کمترین به سبک روان‌آزده‌هار

و وسوسی- جبری با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند (غیرتصادفی) انتخاب شدند؛ در گروه غیرمتلا نیز با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند (غیرتصادفی) فرهنگیانی بدون هیچ‌گونه سابقه بیماری روانی در نظر گرفته شدند که علاوه بر پرسشنامه‌های نشخوار فکری و مکانیسم‌های دفاعی، پرسشنامه‌ی MMPI نیز به منظور غربالگری بر روی آنها اجرا گردید؛ ملاک‌های ورود به پژوهش در گروه متلا عبارت بود از: رضایت آزمودنی‌ها، محدوده سنی ۱۸ تا ۶۵ سال و همچنین افراد مبتلا در شروع مداخلات درمانی باشند. ملاک خروج شامل داشتن بیماری روانی همراه بود. معیار ورود افراد غیرمتلا شامل عدم سابقه‌ی ابتلا به اختلال‌های روان‌پزشکی/روان‌شناختی، کسب نمره‌ی ۶۹ و پایین‌تر از آن در پرسشنامه‌ی MMPI. (افرادی که در هریک از مقیاس‌های این پرسشنامه نمره‌ی بالاتر از ۶۹ کسب کردند، از نمونه‌ی افراد هنجار حذف گردیدند) بود.

## ابزار

۱- تشخیص بالینی: بر اساس مصاحبه تشخیصی با هریک از مراجعین توسط روانپزشکان و روانشناسان با توجه به ملاک‌های تشخیصی DSM-IV-TR و مصاحبه‌های تشخیصی ساخت‌یافته (مثل SCID) بود.

۲- پرسشنامه نشخوار فکری<sup>(۱)</sup>: این پرسشنامه توسط یوسفی در سال ۱۳۸۴ ساخته شد. مقیاس نشخوار فکری پنج خرده مقیاس دارد که عبارتند از: سردرگری‌بیانی، سرزنش خود، نشخوار فکری علامت‌مدار، درون‌نگری و نشخوار فکری درباره نتایج افسرده‌گی. این پرسشنامه ۳۹ سؤال دارد و هر آزمودنی به سؤالات با یک مقیاس چهار درجه‌ای لیکرت (به هیچ وجه، تا حدودی، بیشتر اوقات، تقریباً همیشه) در مورد تجربه افکار یا احساسات خود در دو هفته گذشته پاسخ می‌دهد که هر کدام از یک تا چهار درجه‌بندی می‌شود و نمره هر فرد با جمع این امتیازات به دست می‌آید؛ هرچه فرد این افکار را بیشتر تجربه کند، نمره بیشتری می‌گیرد.

یوسفی [۲۲] به منظور بررسی پایایی، اعتبار و هنجاریابی پرسشنامه نشخوار فکری، نفر از دانشجویان دانشگاه اصفهان را به طور تصادفی انتخاب و پرسشنامه نشخوار فکری افسرده‌ساز را اجرا کرد. اعتبار همزمان این آزمون از طریق اجرای آن با آزمون افسرده‌گی بک و آزمون شادمانی

2- Defense Style Questionnaire(DSQ40)

1- Thinking Rumination Questionnaire

افسردگی و وسوس شناخته شده بودند، تقاضای همکاری با پژوهشگر و پرکردن پرسشنامه‌ها شد. به آنها این اطمینان داده شد که شرکت در پژوهش هیچ‌گونه ضرر و زیانی را متوجه آنها نخواهد کرد، اطلاعات استخراج شده به صورت محرمانه باقی می‌ماند و به منظور حفظ اسرار شخصی و عدم تجاوز به حریم خصوصی افراد، نتایج حاصل از پژوهش در سطح کلی گروه‌ها گزارش می‌شود. درنهایت از بین تمامی بیمارانی که از شرکت در پژوهش رضایت داشتند، ۳۰ بیمار افسرده و ۳۰ بیمار وسوسی انتخاب شد. درمورد فرهنگیان نیز به عنوان گروه کنترل، علاوه بر پرسشنامه‌های نشخوار فکری و مکانیسم‌های دفاعی، پرسشنامه‌ی MMPI به منظور غربالگری بررسی آنها اجرا گردید و افراد غیرمتبلای که نمره‌ی پایین‌تر از ۶۹ را در پرسشنامه‌ی MMPI به دست آورده‌اند، جزو نمونه قرار گرفتند. در نتیجه به منظور جلوگیری از ریزش پرسشنامه‌ها و تکمیل نشدن تعداد لازم برای نمونه‌ی غیرمتبلای، این پرسشنامه به جای ۶۰ نفر، روی ۹۲ نفر از فرهنگیان بالاستفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند صورت گرفت که طی مرحله‌ی پرکردن پرسشنامه، ۳۲ نفر به دلیل کسب نمره‌ی بیشتر از ۶۹ از نمونه افراد غیرمتbla حذف گردیدند. برای تحلیل داده‌ها از روش تحلیل واریانس چندمتغیره و برای تشخیص تفاوت در گروه‌ها از آزمون پیگیری شفه استفاده گردید.

### یافته‌ها

ویژگی‌های جمعیت شناختی نمونه در جدول ۱ ذکر شده است.

در جدول ۲، شاخص‌های توصیفی متغیرهای نشخوار فکری و سبک‌های دفاعی در سه گروه افسرده، وسوسی و غیر مبتلا مشاهده می‌شود.

قبل از استفاده از آزمون پارامتریک تحلیل کوواریانس چندمتغیره جهت رعایت فرض‌های آن، ابتدا مفروضه‌های همسانی واریانس‌ها و همچنین مفروضه همگنی ماتریس‌های واریانس-کوواریانس با استفاده از آزمون ام‌باکس و بارتلت بررسی شد. بر اساس آزمون ام‌باکس که برای هیچ‌یک از متغیرها معنی‌دار نبوده است، شرط همگنی ماتریس‌های واریانس-کوواریانس به درستی رعایت شده است (Box=۴/۵۷۲، F=۰/۷۳۱، P<۰/۶۲). همچنین بر

مربوط می‌شود و این موضوع حاکی از این است که همبستگی‌های مربوط به دوبار اجرای پرسشنامه در گروه‌های مورد مطالعه معنادار (p<۰/۰۱) هستند و بر اساس این یافته‌ها مشخص گردید پرسشنامه‌ی مکانیسم‌های دفاعی در گروه‌های مورد مطالعه از اعتبار مناسبی برخوردار است. آلفای کرونباخ به دست‌آمده در این پژوهش، ۰/۸۴ است.

۴- پرسشنامه MMPI<sup>۱</sup>: در این پژوهش از فرم ۷۱ سؤالی پرسشنامه شخصیتی MMPI استفاده گردید. این پرسشنامه توسط ابوالفتحی مورد بررسی و هنجاریابی قرار گرفت. در بررسی روایی سازه آزمون، ضریب همبستگی بین نمرات دانش‌آموزان در این پرسشنامه با پرسشنامه شخصیتی وودورث و مقیاس شکایات جسمانی (SO) پرسشنامه شخصیتی-R SCL90-R محاسبه و برای مقیاس‌های بالینی خودبیمارانگاری، افسرده‌گی، هیستری، انحراف جامعه سنتیزی، پارانویا، پسیکاستنی، اسکیزوفرنی و مانی به ترتیب ضرایب ۰/۸۰، ۰/۷۰، ۰/۸۶، ۰/۷۷، ۰/۷۹، ۰/۸۸ و ۰/۸۲ و ۰/۷۲ به دست آمد که ضرایب به دست‌آمده معنی‌دار بودند. در بررسی پایایی آزمون از روش‌های بازآزمایی، تنصیف، کودر-ریچاردسون ۲۰ و ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. ضریب پایایی حاصل به روش بازآزمایی برای مقیاس‌های خودبیمارانگاری، افسرده‌گی، هیستری، انحراف، جامعه سنتیزی، پارانویا، پسیکاستنی، اسکیزوفرنی و مانی به ترتیب ۰/۷۴، ۰/۷۳، ۰/۷۷، ۰/۷۵، ۰/۷۹، ۰/۸۳ و ۰/۸۴ و ۰/۷۶ به دست آمد که ضرایب به دست آمده در سطح a=۰/۰۰۱ معنی‌دار بودند. ضریب پایایی کل آزمون به روش تنصیف ۰/۹۴ و به روش کودر-ریچاردسون و آلفای کرونباخ ۰/۹۱ به دست آمد. کلیه‌ی ضرایب حاصل مثبت و معنی‌دار بودند. ضریب پایایی آلفای کرونباخ در این پژوهش نیز، ۰/۶۵ به دست آمده است.

**روند اجرای پژوهش:** به منظور جمع‌آوری داده‌ها پس از اخذ مجوز از بیمارستان گنجویان و اداره کل آموزش-وپرورش شهر دزفول و پس از اعلام آمادگی روانپزشکان و فرهنگیان جهت همکاری، با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند(غیرتصادفی) از بیمارانی که بنا به تشخیص روانپزشک با استفاده از مصاحبه‌های تشخیصی، مبتلا به

1- Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI)

اوتبستیک ۰/۰۷، لایه‌سازی ۰/۰۸، پرخاشگری منفعانه ۰/۶۶، جابه‌جایی ۰/۲۱، مجزا‌سازی ۰/۷۳، فرونشانی ۰/۶۱، والايش ۰/۰۹، شوخ‌طبعی ۰/۷۹، پیشاپیش‌نگری ۰/۰۶- دیگر دوستی کاذب ۰/۰۸، تشكل‌واکنشی ۰/۳۷، عقلانی- سازی ۰/۱۸، ابطال ۰/۸۸) می‌باشد. نتایج نشان داد که برای تمامی مکانیسم‌های دفاعی و نشخوار فکری، واریانس در گروه‌ها تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند.

اساس معنی‌داری آزمون بارتلت همبستگی بین متغیرهای وابسته در حد کافی است ( $P<0/000$ ,  $X_2=3673/167$ ).

همچنین سطح معناداری آزمون لون در مؤلفه‌های نشخوار فکری به ترتیب برابر با (سردرگربیانی ۰/۲۲، سرزنش خود ۰/۰۹، نشخوار فکری علامت مدار ۰/۰۷، درون‌نگری ۰/۰۸- نشخوار فکری درباره نتایج افسردگی ۰/۷۰) و در مکانیسم‌های دفاعی به ترتیب برابر با (دلیل تراشی ۰/۳، فرافکنی ۰/۲۰، انکار ۰/۰۹، همه‌کارتوانی ۰/۰۶، نازرنده سازی ۰/۷۵، گذار به عمل ۰/۰۹، بدنسازی ۰/۱۵، خیال‌پردازی ۰/۷۵)

جدول ۱) ویژگی‌های جمعیت شناختی نمونه

كل		گروه غیر مبتلا		گروه وسوسی		گروه افسردگی		متغیر
درصد	فراوانی	درصد	فراوانی	درصد	فراوانی	درصد	فراوانی	
۷۵/۸	۹۱	۷۵	۴۵	۵۳/۳	۱۶	۱۰۰	۳۰	جنسیت
۲۴/۲	۲۹	۲۵	۱۵	۴۶/۷	۱۴	۰	۰	
۸/۳	۱۰	۱۵	۹	۳/۳	۱	۲۰	۶	
۴۵/۸	۵۵	۷۰	۴۲	۲۳/۳	۷	۰	۰	
۱۱/۷	۱۴	۱۱/۷	۷	۱۰	۳	۱۳/۳	۴	تحصیلات
۱۷/۵	۲۱	۳/۳	۲	۳۰	۹	۳۳/۳	۱۰	
۱۶/۷	۲۰	۰	۰	۳۳/۳	۱۰	۳۳/۳	۱۰	
۲۵	۳۰	۱۱/۷	۷	۳۳/۳	۱۰	۴۳/۳	۱۳	
۷۵	۹۰	۸۸/۳	۵۳	۶۶/۷	۲۰	۵۶/۷	۱۷	وضعیت تأهل

جدول ۲) میانگین و انحراف استاندارد نشخوار فکری و سبک‌های دفاعی در گروه‌ها

گروه غیر مبتلا		گروه وسوسی		گروه افسردگی		متغیر
انحراف استاندارد	میانگین	انحراف استاندارد	میانگین	انحراف استاندارد	میانگین	
۲۲/۵۵	۷۴/۲۳	۲۱/۹۶	۱۰۱/۰۶	۲۴/۰۰۶	۱۱۰/۶۰	نشخوار فکری
۹/۲۵	۴۹/۲۸	۱۱/۵۶	۴۴/۲۳	۹/۱۱	۴۹/۱۶	سبک دفاعی رشدیافتہ
۲۲/۴۶	۱۰۴/۵۳	۲۲/۲۱	۱۳۶/۸۳	۱۶/۹۰	۱۴۸/۶۰	سبک دفاعی رشد نایافتہ
۸/۸۷	۴۶/۲۱	۹/۷۰	۴۷/۱۶	۶/۷۳	۵۳/۵۶	سبک روان‌آزده

جدول ۳) نتایج تحلیل واریانس درون گروهی چند راهه برای بررسی تفاوت میانگین‌های نشخوار فکری و مکانیسم‌های دفاعی

سطح معناداری	خطا df	فرضیه df	F	مقدار	نام آزمون	اثر
.۰/۰۰۱	۱۸۴	۵۰	۶/۲۷	۱/۲۶	اثر پیلاجی	گروه
.۰/۰۰۱	۱۸۲	۵۰	۶/۸۸	۰/۱۲	لامبدای ویلکز	
.۰/۰۰۱	۱۸۰	۵۰	۷/۵۱	۴/۱۷	اثرهاینینگ	
.۰/۰۰۱	۹۲	۲۵	۱۱/۶۸	۳/۱۷	بزرگترین ریشه روی	

میزان ارزش لامبدا ویلکز (۰/۱۲) همان مقدار ضریب عدم تعیین است، به عبارت دیگر اندازه اثر گروه بر نشخوار فکری و مکانیسم‌های دفاعی ۰/۸۸ می‌باشد

همان‌گونه که در جدول ۳ مشاهده می‌شود، میزان F برابر با ۶/۸۸ و لامبدا ویلکز دارای ارزش ۰/۱۲ معنادار است؛ یعنی بین نشخوار فکری و مکانیسم‌های دفاعی در افراد افسرده، وسوسی و غیرمتلا تفاوت معنی‌داری وجود دارد.

جدول ۴) نتایج تحلیل واریانس بین‌گروهی برای بررسی تفاوت میانگین‌های نشخوار فکری و مکانیسم‌های دفاعی در سه گروه

متغیر وابسته	F	Df	سطح معناداری	مجذور اتا
سردرگربیانی	۲۵/۰۵*	۲	۰/۰۰۱	۰/۳۰
سرزنش خود	۶۲/۹۳*	۲	۰/۰۰۱	۰/۵۱
نشخوار فکری علامت‌مدار	۲۶/۳۱*	۲	۰/۰۰۱	۰/۳۱
درون نگری	۳/۶۱*	۲	۰/۰۰۱	۰/۰۵
نشخوار فکری در باره نتایج افسردگی	۲۷/۷۲*	۲	۰/۰۰۱	۰/۳۲
دلیل تراشی	۴۱	۲	۰/۴۱	۰/۰۱
فرافکنی	۶۱/۶۰*	۲	۰/۰۰۱	۰/۵۱
انکار	۱/۰۹	۲	۰/۳۳	۰/۰۱
همه کارتوانی	۲/۲۲	۲	۰/۱۱	۰/۰۳
نالرزندۀ سازی	۱۴/۸۲*	۲	۰/۰۰۱	۰/۲۰
گذار به عمل	۱۷/۰۷*	۲	۰/۰۰۱	۰/۲۲
بدنی سازی	۷/۲۳*	۲	۰/۰۰۱	۰/۱۱
خیال‌پردازی اوتیستیک	۱۹/۲۳*	۲	۰/۰۰۱	۰/۲۴
لایه سازی	۵۱/۳۳*	۲	۰/۰۰۱	۰/۴۶
پرخاشگری منفعانه	۱۸/۰۱*	۲	۰/۰۰۱	۰/۲۳
جابه‌جایی	۴/۴۸**	۲	۰/۰۱	۰/۰۷
جزاسازی	۱۶/۰۰۱*	۲	۰/۰۰۱	۰/۲۱
فرونشانی	۴/۱۳**	۲	۰/۰۱	۰/۰۶
والایشن	۳/۲۷***	۲	۰/۰۴	۰/۰۵
شوخ طبیعی	۳/۰۸***	۲	۰/۰۴	۰/۰۵
پیشاپیش نگری	۸/۸۴*	۲	۰/۰۰۱	۰/۱۳
دگر دوستی کاذب	۱۰/۱۶*	۲	۰/۰۰۱	۰/۱۴
تشکل واکنشی	۰/۰۵	۲	۰/۹۴	۰/۰۰۱
عقلانی سازی	۲/۶۳	۲	۰/۰۷	۰/۰۴
ابطال	۱۴/۷۷*	۲	۰/۰۰۱	۰/۲۰

\* P<0/001 , \*\* P<0/01 , \*\*\* P<0/05

مکانیسم‌های دفاعی نیز به‌غیر از مکانیسم‌های دلیل‌تراشی، انکار، همه‌کارتوانی، تشکل‌واکنشی و عقلانی‌سازی در سایر مکانیسم‌های دفاعی بین سه گروه تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج در جدول ۴ ذکر شده است.

با توجه به نتایج به دست‌آمده‌از آزمون تحلیل واریانس چند راهه برای بررسی تک‌تک خردمندی‌های نشخوار فکری و مکانیسم‌های دفاعی از آزمون تحلیل واریانس بین‌گروهی استفاده شد که نتایج نشان داد. تمامی خردمندی‌های نشخوار فکری در سه گروه تفاوت معناداری دارند؛ در مورد

جدول ۵) نتایج آزمون شفه برای تشخیص تفاوت سبک‌های دفاعی و نشخوار فکری در گروه‌ها

سبک‌های دفاعی	گروه‌ها	تفاوت میانگین‌ها	خطای استاندارد	سطح معناداری
سبک‌های رشدنا‌یافته	گروه افسرده - گروه وسوسی	۱۱/۷۶	۵/۴۶	۰/۱۰
	گروه افسرده - گروه غیرمبلا	۴۴/۰۶*	۴/۷۳	۰/۰۰۱
	گروه وسوسی - گروه غیرمبلا	۳۲/۳۰*	۴/۷۳	۰/۰۰۱
سبک‌های روان‌آزده	گروه افسرده - گروه وسوسی	۶/۴۰**	۲/۲۲	۰/۰۱
	گروه افسرده - گروه غیرمبلا	۷/۳۵*	۱/۹۲	۰/۰۰۱
	گروه وسوسی - گروه غیرمبلا	۰/۹۵	۱/۹۲	۰/۸۸
نشخوار فکری	گروه افسرده - گروه وسوسی	۹/۵۳	۵/۱۶	۰/۱۸
	گروه افسرده - گروه غیرمبلا	۳۶/۳۶*	۴/۴۷	۰/۰۰۱
	گروه وسوسی - گروه غیرمبلا	۲۶/۸۳*	۴/۴۷	۰/۰۰۱

\* P &lt; .001 , \*\* P &lt; .01

دارد. از سوی دیگر، نتایج به دست‌آمده با نتایج پژوهش منصوری و همکاران [۱۴]، در تضاد است؛ آنها در پژوهش خود به این نتیجه دست یافته‌ند که نشخوار فکری هم در جمعیت‌های بالینی و هم در جمعیت‌های غیربالینی اتفاق می‌افتد و وجود قوع آن محدود به یک اختلال خاص نیست.

مطالعات صورت گرفته بر اساس مدل‌های شناختی افسردگی، نقش سبک‌های شناختی منفی و نشخوار فکری را به عنوان عوامل خطرساز افسردگی مشخص کرده‌اند [۲۴]. افراد افسرده از تحریف‌های شناختی از جمله تعمیم مفرط، انتزاع گزینشی، مسئولیت مفرط، خودارجاعی‌های افراطی و فاجعه-آمیزکردن استفاده می‌نمایند که مطابق با نظریه‌ی سبک پاسخ‌نالن‌ها کسم، این‌گونه تحریفات شناختی باعث افزایش آگاهی فرد از مشکلاتش می‌شود و همزمان باعث می‌گردد که فرد از ارائه‌ی راه حل مناسب برای این مشکلات عاجز باشد و از تعییر آنها احساس نالامیدی کند و در نتیجه منجر به حفظ چرخه‌ی افسردگی گردد. اختلال‌های هیجانی با باورهای منفی درباره هیجانات افسردگی همراه است. از آنجا که در افسردگی افراد درباره‌ی نشخوار فکری و افسردگی باور منفی دارند و فکر می‌کنند افسردگی برای آنها موضوعات خطرناکی را به همراه دارد ترس از افسردگی و قوع مجدد، عاملی مهم در آشفتگی هیجانی است. افراد مستعد افسردگی غالب به علائم

برای تشخیص تفاوت در گروه‌ها در سبک‌های دفاعی و نشخوار فکری کل از آزمون پیگیری شفه استفاده شد. بر این اساس، میانگین کلی سبک‌های دفاعی رشد نیافته در گروه‌های افسرده و وسوسی تفاوت معناداری ندارند اما در گروه افسرده و غیرمبلا و در گروه وسوسی و غیرمبلا تفاوت معنادار است. در سبک‌های روان‌آزده نیز در دو گروه افسرده و وسوسی تفاوت‌ها معنادار است و در گروه افسرده و گروه غیرمبلا نیز در این سبک‌ها تفاوت معنادار می‌باشد اما در گروه وسوسی و غیرمبلا تفاوت‌ها معنادار نیست. هم‌چنان، در زمینه‌ی میزان استفاده از نشخوار فکری در گروه‌ها نتایج نشان داد بین گروه افسرده و وسوسی در نشخوار فکری تفاوت معناداری وجود ندارد اما بین گروه افسرده و غیرمبلا و گروه وسوسی و غیرمبلا تفاوت معناداری وجود دارد (P < .001). نتایج در جدول ۵ نشان داده شده‌است.

### بحث

نتایج پژوهش نشان داد نمره‌ی کل نشخوار فکری در افراد مبتلا به اختلال افسردگی اساسی و اختلال وسوسی- جبری بیشتر از افراد غیرمبلا است. این نتایج با نتایج پژوهش خسروی و همکاران [۱۷]، وان- واولسون [۱۵] و یوک و همکاران [۱۳] همسو می‌باشد. آنها در تحقیقات خود نشان دادند که تفاوت معناداری بین گروه‌های مورد بررسی در نمره‌ی کل نشخوار فکری و خرد مقیاس‌های این متغیر وجود

مشخصه‌ی هر دو اختلال، نشخوار فکری است. از آنجایی که این دو اختلال رابطه‌ای دوطرفه دارند و اختلال‌های همزمان محسوب می‌شوند، بنابراین مرزی میان آنها وجود ندارد که نشان بدهد نشخوار فکری در کدام یک از این دو اختلال بیشتر مشاهده می‌شود و تفاوت نشخوار فکری در این دو اختلال از لحاظ آماری معنادار نمی‌باشد.

در زمینه‌ی مکانیسم‌های دفاعی نیز، نتایج نشان داد غیر از مکانیسم‌های دلیل تراشی، انکار، همه‌کارتوانی، تشکل واکنشی و عقلانی‌سازی در سایر مکانیسم‌های دفاعی بین سه گروه تفاوت معناداری وجود دارد. این یافته با نتایج پژوهش افضلی، آشتیانی و آزادفلاح [۱۹] همسو می‌باشد. همچنین نتایج پژوهش حاضر در مورد سبک‌های دفاعی که ۲۰ مکانیسم مورد استفاده را دربرمی‌گیرند، نشان داد که میانگین کلی سبک‌های دفاعی رشد نایافته در گروههای افسرده و وسوسی تفاوت معنادار ندارند اما در گروه افسرده و غیرمبتلا و در گروه وسوسی و غیرمبتلا تفاوت معنادار است. این یافته با نتایج پژوهش‌های اوریل و کاگیل [۲۷] و شعبانپور و همکاران [۱۸] همسو می‌باشد؛ در سبک‌های روان‌آزده نیز در دو گروه افسرده و گروه غیرمبتلا نیز در این سبک‌ها تفاوت معنادار است، اما در گروه غیرمبتلا و وسوسی تفاوت‌ها معنادار نیست. در پژوهش‌های پیشین در زمینه سبک روان‌آزده اشاره‌ای نشده است، اما شعبانپور و همکاران [۱۸] در قسمتی از نتایج پژوهش خود ذکر کردند که تفاوت معناداری بین دو گروه وسوسی و غیرمبتلا در استفاده از سبک روان‌آزده پیدا نشد و این یافته همسو با نتیجه پژوهش حاضر در زمینه سبک روان‌آزده می‌باشد. به‌طورکلی در زمینه‌ی کاربرد زیاد مکانیسم‌های دفاعی توسط بیماران می‌توان چنین تبیین کرد که ثابتی در مراحل پیش-جنسي، به عنوان نمونه شخصیت دهانی که مستعد افسرددگی و شخصیت مقعدی که زمینه‌ساز وسوسی است، موجبات بهره‌گیری زیاد از مکانیسم‌های دفاعی رشد نایافته را فراهم می‌آورد. لذا تفاوت کلی آنها با

و نشانه‌های اولیه‌ی افسرددگی حساسیت بیش از اندازه دارند و تمایل دارند تا علائم را به طور منفی و به عنوان علائم عود یا جریان غیر طبیعی تعبیر و تفسیر کنند؛ چنین تمایلی می‌تواند الگوهای نشخوار فکری، نظارت بر خود و اجتناب را به عنوان راهبردهای مقابله‌ای ناسازگار فعال کند و بنابراین نشانگان شناختی توجهی را تغذیه و به افسرددگی و اضطراب کمک کند. با توجه به اینکه افسرددگی زیرمجموعه‌ی اختلال‌های خلقی محسوب می‌شود و یکی از ویژگی‌های تشخیصی آن، خلق پایین است و خلق پایین افکار منفی را فرا می‌خواند، نشخوار فکری در افسردها بیشتر از افراد بهنجار مشاهده می‌شود. این افکار منفی بدون هدف در ذهن می‌چرخدند و فرد افسرده از آنجا که انگیزه عمل و توانایی حل مسأله را از دست می‌دهد به صورت منفعلانه به نشخوار فکری می‌پردازد.

نشخوار فکری در بیماری وسوس نیز، شامل افکاری هستند که به طور پایان ناپذیر مرور می‌شوند و به نامیدی درباره‌ی آینده و ارزیابی‌های منفی درباره‌ی خود منجر می‌شود. یکی از ویژگی‌های برخی از بیماران وسوسی این است که نمی‌توانند توجه خود را از علائم ادراک شده برجسته برجیزند و در واقع قادر نیستند جلوی افکار ناخوانده مزاحم را به طور مؤثر بگیرند [۲۵]. بر این اساس، نشخوار فکری یکی از ویژگی‌های شناختی بیماران وسوسی محسوب می‌شود که به صورت جر و بحث‌های درونی بی‌پایان با خود است که برخی اوقات در مورد مسائل جزئی و پیش‌پالتفاذه و گاهی درباره یک مسأله‌ی فلسفی لایحل بروز می‌کند [۲۶] علاوه بر این، نتایج به دست آمده نشان داد که بین دو گروه افسرده و وسوسی در میزان استفاده از نشخوار فکری تفاوت معناداری وجود ندارد. نتیجه‌ی به دست آمده با یافته‌های پژوهش خسروری و همکاران [۱۷] و منصوری و همکاران [۱۴] همسو می‌باشد. در توجیه این یافته می‌توان بیان کرد که بیماران وسوسی آمادگی ابتلا به افسرددگی را دارند، بیماران افسرده نیز مستعد ابتلا به وسوسه‌های فکری هستند و از ویژگی‌های

های آینده می‌تواند بررسی پیشایندها و پیامدهای افسردگی و وسواس از طریق مدل‌یابی معادلات ساختاری باشد. همچنین با توجه به ماهیت شناختی این فرایندهای مشترک، پیشنهاد می‌شود با مداخله نمودن در نشخوارفکری و مکانیسم‌های دفاعی این جمعیت، از طریق رویکردهای شناختی، میزان اثربخشی آنها را بررسی نمود. همچنین از نگاه کاربردی، می‌توان آموزش‌هایی شناختی-رفتاری را در سطح پیشگیرانه برای افراد غیرمتلا در مدارس و سایر نهادهای اجتماعی به کار برد. ضمناً پیشنهاد می‌گردد که این پژوهش بر روی نمونه‌های بالینی غیر از افسردگی و وسواس نیز اجرا گردد.

در پایان تأکید می‌شود که با توجه به اینکه نمونه‌ی بالینی پژوهش فقط بیماران افسرده و وسواسی و نمونه‌ی غیرمتلا فقط جامعه‌ی فرهنگیان را دربرمی‌گرفت، برای تعیین نتایج به سایر جوامع باید با احتیاط برخورد شود. از دیگر محدودیت‌های پژوهش حاضر می‌توان به تک‌جنسیتی بودن نمونه‌ی مبتلایان به افسردگی اشاره کرد که برای تعیین نتایج مربوط به این گروه به بیماران مرد باید جانب احتیاط را رعایت کرده؛ لذا توصیه می‌گردد که در پژوهش‌های آتی این محدودیت‌ها درنظر گرفته شود.

### تشکر و قدردانی

از جناب آقای فرشاد لوافپور، خانم سمیه کهریزی، کلیه‌ی کارمندان محترم بخش اعصاب و روان بیمارستان گنجویان شهر دزفول و بیماران و فرهنگیان منتخب تشکر و قدردانی به عمل می‌آید.

### منابع

- 1- Erickson S, Feldman S, Steiner H. Defense reactions and Coping strategies in normal adolescents. Child psychiat hum dev. 1996; (28):45-56.
- 2- Sadock BJ, Kaplan H. Kaplan & Sadock's Synopsis of Psychiatry. Rezaei F, editor. Tehran: Arjmand; 2007. [Persian].
- 3- Papageorgiou C, Wells A. Nature and consequences of rumination, depressive rumination: Nature, theory and treatment. West Sussex: John Wiley and Sons Ltd. Isfahan: Kavoshyar-jangal; 2012. P. 1-20. [Persian].

گروه بهنچار کاملاً منطقی می‌نماید. دفاع‌های مانند پرخاشگری منفعانه که سبک رشدنایافته را تشکیل می‌دهند، بزرگسالان را در کنارآمدن پهنه با واقعیت ناتوان می‌سازند؛ افرادی که به این دفاع‌ها متولّ می‌شوند، معمولاً رشدنایافته و غیرقابل دسترس می‌نمایند که این توضیحات مؤید یافته‌های پژوهش حاضر درباره کاربرد بیشتر این سبک دفاعی در بیماران مبتلا نسبت به افراد غیرمتلا می‌باشد. برای مثال، افراد افسرده برای رویارویی با احساسات و واکنش‌های ناخودآگاه نسبت به موقعیت‌های نمادین نوین که بر پایه‌ی آنها رویدادهای پیشین زندگی مانند اختلال در روابط اولیه کودک و اضطراب ناشی از آن است، سبک‌های دفاعی رشدنایافته را به کار می‌برند.

همچنین در توجیه این یافته که سبک روان آزده در برخی گروه‌ها از جمله افسرده و وسواس تفاوت دارد و در گروه وسواسی و غیرمتلا تفاوتی ندارد، می‌توان بیان کرد که سبک روان آزده در همه‌ی افراد شایع است؛ این دفاع‌ها مثل جایه‌جایی، مجزاسازی و تشکل واکنشی، در کوتاه‌مدت مفید بوده اما در بلندمدت منجر به مشکلاتی در روابط، شغل و کامیابی از زندگی می‌گردد.

یافته‌های پژوهش مؤید آن است که افراد مبتلا به افسردگی و وسواسی-جبری، در مقایسه با افراد غیرمتلا از نشخوارفکری و مکانیسم‌های رشدنایافته-ی بیشتری استفاده می‌کنند. به علاوه، با توجه به این که بین دو گروه مبتلا به افسردگی و وسواس در این دو متغیر اختلاف معناداری وجود ندارد، می‌توان با احتیاط نشخوارفکری و مکانیسم‌های رشد نایافته را از عوامل مشترک در بروز اختلالات روانی محسوب کرد؛ ضمن این‌که پژوهش‌های گذشته نیز از این یافته و نتیجه‌گیری حمایت می‌کنند. به عبارت دیگر، این دو متغیر را می‌توان عوامل خطرسازی قلمداد کرد که می‌تواند روند ابتلا به افسردگی و وسواس را تسریع کند. با این حال با توجه به ماهیت پژوهش نمی‌توان یک رابطه علیٰ را از این نتایج استبطان نمود. به همین دلیل پیشنهاد برای پژوهش-

- mechanisms in Iranian patients suffering from obsessive compulsive or panic disorders versus normal controls using persian version of defense style Questionnaire-40. *Iran J Psychol.* 2012; (7):31-5.
- 19- Afzali MH, FathiAshtiani A, Azadfallah P. The Study of defense styles & mechanisms in patients with obsessive-compulsive disorder, generalized anxiety disorder& social phobia disorder. *J Clin Psychol.* 2009; (1):79-93.
- 20- Papageorgiou C, Wells A. Metacognitive beliefs about rumination in recurrent major depression. *Cog and Behav Practice.* 2004; (8):160-4.
- 21- Bond M, Perry JC. Long- Term changes in defense styles with psychodynamic psychotherapy for Depressive, Anxiety and Personality disorders. *AM J Psychiat.* 2004; (161):1665- 71.
- 22- Yousefi Z, Bahrami F, Mehrabi H. Rumination: beginning and continuous of depression. *J Behav Sci.* 2008; (2):67-73.
- 23- Andrews G, Singh M, Bond M. The Defense Style Questionnaire. *J nerv ment.* 1993; (181):246-56.
- 24- Roelofs J, Huibers M, Peeters F, Arntz A. Effects of neuroticism on depression and anxiety: Rumination as a possible mediator. *J Pers Indiv Differ.* 2008; (44):847-65.
- 25- Cavangh MJ. Attention training and hypochondriaces; Preliminary results of a controlled trial. *proc world cong behav cogn thera.* Zurich; 2001.
- 26- Lindy SGA, Pavel GA. Nikkhah MR, Avadis Y, editors. Threatment and recognizing psychotic disorders of adults in clinical psychology. Tehran: Sokhan; 2000. [Persian].
- 27- Evern C, Cagil D. Relationship between defense style, alexithymia and personality in alcohol dependent inpatients. *compr psychiat.* 2012; (6):860-7.
- 4- Smith JM, Alloy LB. A roadmap to rumination: A review of the definition, conceptualization of this multifaceted construct. *J Clin Psychol Rev.* 2009; (29):116-28.
- 5- Muris P, Fokke M, Kwik D. The Ruminative response style in adolescents: An Examination of Its Specific Link to Symptoms of Depression. *J Cog theraphy res.* 2009; (33):21-32.
- 6- Nolen- Hoeksema S, Wisco EB, Lyubomirsky S. Rethinking rumination. *J Perspect Psychol Sci.* 2008; (3):400-24.
- 7- Clark D. Cognitive Behavioral Therapy for OCD. Izadi R, Abedi MR, editors. Isfahan: Kavoshyan-jangal; 2004. [Persian].
- 8- Drapeau M, Thompson K, Petraglia J, Thygesen KL, Lecours S. Defense Mechanisms and Gender: An examination of Two Models of Defenssive Functioning Derived from the Defense Style Questionnaire. *Int J Psychol Thera.* 2011; (11):149-55.
- 9- MohammadpourYazdi AR, Birashk B, Fata L, Dejkam M. Case-control study of defense styles and state-trait anxiety among college students with general anxiety disorder. *J Fundament health.* 2009; (11):7-14.
- 10- American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 5th ed. Arlington: American Psychiatric; 2013.
- 11- Cramer P. Defense mechanisms in psychology today. *J Am psychol.* 4 th ed. washington, DC: American psyciatric press. 2000; (55):637- 46.
- 12- Wahl K, Ertle A, Bohne A, Zurowski B, Kordon A. Relations between a ruminative thinking style and obsessive-compulsive symptoms in non-clinical samples. *J Anxiety, Stress, Coping.* 2011; (2): 217- 25.
- 13- Yook KY, Kim KH, Suh SY, Lee KS. Intolerance of uncertainty, worry, and rumination in major depressive disorder and generalized anxiety disorder. *J Anxiety Disord.* 2010; (24):623-28.
- 14- Mansoury A, Farnam A, BakhsipourRodsari A, NahmodAllou M. Comparing thinking rumination between patients that suffering major depression disorder,obsessive-compulsive disorder, generalized anxiety disorder with normal persons. *J Sabzevar Med Sci.* 2010; (3):189- 95.
- 15- Kwon P, Olson ML. Rumination and depressive symptoms: Moderatig role of defense style immaturity. *J Pers indiv Differ.* 2007; (43):715- 24.
- 16- Bagherinezhad M, Salehifadardi J, Tabatabaei M. The Relationship between thinking rumination and depression in Iranian students. *J Psychol Mashhad uni.* 2010; (11):21-38.
- 17- Khosravi M, Mehrabi HA, Azizimoghadam M. A comparative study of obsessive-rumination component on obsessive-compulsive and depressive patients. *J Semnan Uni Med Sci.* 2008; (10):65-72.
- 18- Shabanpour R, Zahiroddin AR, Janbozorgi M, Ghaeli P. Assessment of defense styles and

## Comparing Thinking Rumination and Defense Mechanisms in Patients Suffering from Major Depression and Obsessive-Compulsive Disorders with Normal Individuals

Sarraj-Khorrami, A. \*M.A., Karami, J. Ph.D., Momeni, Kh.M. Ph.D.

### Abstract

**Introduction:** The purpose of this research was to compare thinking rumination and defence mechanisms in individuals suffering from major depression disorder and obsessive compulsive disorder with normal persons.

**Method:** The descriptive research was acausal-comparison kind. The sample included 30 clinical depressed people (women), 30 clinical obsessive ones (16 women, 14 men), and 60 unaffected people (45 women, 15 men). The clinical sample was selected by purposive sampling method and normal sample was selected with purposive form and by screening method using MMPI questionnaire. The used instruments included thinking rumination questionnaire (RQ), defence mechanisms questionnaire (DSQ40) and MMPI 71 question questionnaire. For data analysis, the multivariate variance analysis (MANOVA) was used.

**Results:** The results showed that the amount of thinking rumination in depressed and compulsive group was more than the normal group ( $p<0/001$ ). The amount of using immature defence style in affected groups was more than normal group ( $0/001$ ) and the amount of using neurotic style in depressed people was also more than the compulsive ( $P<0/01$ ) and normal group ( $p<0/001$ ). Besides, the results showed that there is a significant difference among the three groups in Projection, Devaluation, Acting out, Somatization, Autistic fantasy, Splitting, Passive aggression, Displacement, Isolation, Suppression, Sublimation, Humor, Anticipation, Pseudo-altruism and Denial mechanisms ( $P<0/01$ ).

**Conclusion:** On the basis of research findings, thinking rumination and defence mechanisms have an important role in temperamental and anxiously disorders. The effort for reduction using thinking rumination and immature and neurotic styles, can be an important step to promote the patients' mental health.

**Keywords:** Thinking Rumination, Defence Mechanisms, Major Depression Disorder, Obsessive-Compulsive Disorder

---

\* Correspondence E-mail:  
azarsarraj@yahoo.com