

مقاله پژوهشی اصلی

تأثیر صرف مزمن هیستامین بر یادگیری وابسته به وضعیت لیتیوم در موش‌های کوچک آزمایشگاهی

دکتر محمد رضا زرین دست

گروه فارماکولوژی، دانشکده پزشکی و مرکز ملی مطالعات اعیاد، دانشگاه علوم پزشکی تهران

لیلا پارسايی^۱

گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی

شمس الدین احمدی

گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه کردستان

هدف: در این مطالعه تأثیر حساسیت‌زایی هیستامین بر یادگیری وابسته به وضعیت لیتیوم مورد بررسی قرار گرفت. **روش:** برای ارزیابی حافظه موش‌های بالغ نر نژاد NMRI، از روش اجتنابی غیرفعال پایین‌آمدن از سکو استفاده شد. **یافته‌ها:** تزریق داخل صفاقی لیتیوم (۱۰ mg/kg) پس از آموزش، باعث تخریب حافظه در روز آزمون شد و تزریق لیتیوم قبل از آزمون، از تخریب حافظه جلوگیری کرد ($p < 0.01$). با تزریق ۲۰ میکروگرم هیستامین در سه روز متوالی به هر موش و به دنبال آن پنج روز قطع دارو حساسیت‌زایی ایجاد شد. برگشت حافظه تخریب‌شده به وسیله لیتیوم، در موش‌های حساس‌شده با هیستامین بهتر از موش‌های حساس‌نشده صورت گرفت ($p < 0.01$). از طرف دیگر تزریق مکرر (سه روز تزریق، پنج روز قطع) پیریلامین، آنتاگونیست کیرنده H1 (۴۰ میکروگرم در هر موش) و رانیتیدین، آنتاگونیست کیرنده H2 (۶/۲۵ و ۱۲/۵ میکروگرم در هر موش) از بازگشت حافظه تخریب‌شده جلوگیری کرد. **نتیجه‌گیری:** حساسیت‌زایی با هیستامین بر حافظه تخریب‌شده به وسیله لیتیوم اثر می‌گذارد. بنابراین به نظر می‌رسد که اثر یون لیتیوم بر حافظه در روش اجتنابی غیرفعال توسط مسیرهای سینکلتی کیرنده هیستامین میانجی‌گری می‌شود.

کلیویازمهای لیتیوم، کیرنده هیستامین، حساسیت‌زایی، پیریلامین، رانیتیدین

که در بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی و تک‌قطبی درمان شده با لیتیوم، تخریب حافظه مشاهده می‌شود (آنانت^۲، قدیریان و انگلسمن، ۱۹۸۷). ولی تعدادی از مطالعات، تخریب حافظه ناشی از صرف لیتیوم را رد کرده‌اند. اگرچه تحقیقات نشان داده‌اند که لیتیوم می‌تواند مسیرهای انتقال پیام را در چندین ناحیه از مغز موش بزرگ آزمایشگاهی تنظیم کند و عملکرد چندین سیستم نوروترانسمیتری را تغییر دهد (مانجی^۳، پوتر^۴ و لونکس^۵، ۱۹۹۵)، اما سازوکار مشخصی برای تأثیر این دارو ثابت نشده است.

مقدمه

لیتیوم یکی از داروهایی است که در درمان اختلالات دوقطبی استفاده می‌شود و به علاوه می‌تواند اثرات داروهای ضدافسردگی را تقویت کند (برین^۶ و همکاران، ۱۹۸۴؛ نیرنبرگ^۷، پرایس^۸، چارنی^۹ و هیننگر^{۱۰}، ۱۹۹۰). نشان داده شده است که لیتیوم می‌تواند اثرات مضری بر حافظه بگذارد (انگلسمن^{۱۱}، قدیریان و گروف^{۱۲}، ۱۹۹۲)؛ مثلاً حافظه کلامی^{۱۳} را مختل کند (پاچت^{۱۴} و ویسینفسکی^{۱۵}، ۲۰۰۳). علاوه بر این، مطالعات دیگر نشان داده‌اند

- 2- Prien
- 4- Price
- 6- Heninger
- 8- Grof
- 10- Pachet
- 12- Ananth
- 14- Potter

- 3- Nierenberg
- 5- Charney
- 7- Engelmann
- 9- verbal memory
- 11- Wisniewski
- 13- Manji
- 15- Lenox

۱ - نشانی تناس: تهران، پاسداران، میدان هروی، خیابان مکران جنوبی، پلاک ۱۶، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال (ساختمان مرکزی)

Email: leila_parsaei@yahoo.com

دکتر محمد رضا زرین دست و همکاران

در این مطالعه به وسیله روش اجتنابی غیرفعال داخل بطنی هیستامین بر بادگیری وابسته به وضعیت لیتیوم در موش‌های سوری بررسی شد.

روش

این مطالعه از نوع تجربی بود و روی موش‌های سوری نر از نژاد NMRI در محدوده وزنی ۱۸-۲۲ گرم انجام شد. از هر حیوان فقط یک بار استفاده شد. در ابتدا حیوان با استفاده از دستگاه استریوتاکسی^{۲۸} جراحی و کانول گذاری شد. این دستگاه دو بازو دارد که با استفاده از آنها می‌توان سر موش را در حین بیهوشی ثابت نگه داشت و با استفاده از مختصات سه بعدی و با حرکت دستگاه در سه جهت یک کانول تزریق را بآب دقت ۱/۱ میلی‌متر در محل معینی (بر اساس مختصات فضایی محل مورد نظر) کار گذاشت (ملک محمدی، خلیلزاده، فضلی تبایی و زرین دست، ۱۳۸۵).

برای سنجش حافظه از دستگاه اجتنابی غیرفعال^{۲۹} پایین آمدن از سکو استفاده شد (ملک محمدی و همکاران، ۱۳۸۵؛ زرین دست، فضلی تبایی، احمدی و یحیوی، ۱۳۸۴؛ زرین دست، نورایی و رسولی، ۱۳۸۵). این دستگاه شامل یک جعبه چوبی به ابعاد ۳۰×۳۰×۳۰ سانتی‌متر می‌باشد. کف دستگاه از ۲۹ میلی‌فولادی به قطر ۰/۳ سانتی‌متر تشکیل شده که به فاصله یک سانتی‌متر از یکدیگر قرار گرفته‌اند. در قسمت میانی کف دستگاه (روی میله‌های فلزی) یک سکوی مکعبی چوبی به ابعاد ۴×۶×۴ سانتی‌متر گذاشته شده است. در جلسه آموزش، حیوان روی سکوی مکعبی دستگاه

هیستامین در حضور لیتیوم به طور محسوس باعث تحریک ذخیره‌ای اینوزیتول ۱-فسفات در قطعات بافتی حاوی اینوزیتول چندین ناحیه مغز خوکجه هندی می‌شود (دانوم^۱، داونس^۲ و یانگ^۳، ۱۹۸۴؛ کلارو^۴، آربونز^۵، گارسیا^۶ و پیکاتوست^۷، ۱۹۸۶).

هیستامین یک آمین بیوژن است که به وسیله هیستیدین دکربوکسیلاز در تعداد کمی از نورون‌های موجود در هسته‌های توپر و مامیلاری^۸ هیپوتالاموس از L-هیستیدین ساخته می‌شود (آتروالد^۹، کوچارسکی^{۱۰}، ویلیامز^{۱۱} و کورتسکی^{۱۲}، ۱۹۸۴؛ پانولا^{۱۳}، پیرولا^{۱۴}، اوینز^{۱۵} و آیراکسینز^{۱۶}، ۱۹۸۹). این نورون‌ها به وسیله رشته‌های واپران به همه نواحی سیستم عصبی مرکزی متصل می‌شوند (ابناگاکی^{۱۷} و همکاران، ۱۹۹۸؛ اونسودرا^{۱۸}، یاما تو دانی^{۱۹} و اتابابه^{۲۰} و وادا^{۲۱}، ۱۹۹۴). هیستامین بنا فعال کردن گیرنده‌های خاصی عملکرد فیزیولوژیکی خود را انجام می‌دهد. این گیرنده‌ها شامل گیرنده‌های پس‌سیناپسی H1، H2 و یک اتورسپتور پیش‌سیناپسی و گیرنده H3 می‌باشد که آزادسازی و سنتز هیستامین را تنظیم می‌کنند (هیل^{۲۲} و همکاران، ۱۹۹۷). هیستامین همچنین بر حافظه و بادگیری تأثیر دارد (آلواز^{۲۳}، روات^{۲۴} و بانزان^{۲۵}، ۲۰۰۱؛ آلواز و روات، ۲۰۰۲؛ جیووانینی^{۲۶} و همکاران، ۲۰۰۳)، البته نقش این نوروترانسミتر تنظیمی در اکتساب و ذخیره‌سازی اطلاعات مشخص شده ولی در مجموع نتایج ضد و نقیض زیادی به دست آمده است. گزارش شده است که هیستامین شرطی‌سازی را در روش اجتنابی فعال تسهیل (کامی^{۲۷}، اکومورا^{۲۸} و تاساکا^{۲۹}، ۱۹۹۳) و یا مهار می‌کند (آلواز و بانزان، ۱۹۹۶). علاوه بر این، تزریق آنتاگونیست گیرنده H1، عملکرد روش ماز شعاعی را تخریب می‌کند (ناگا^{۳۰}، سوگیموتو^{۳۱}، نیشیگا^{۳۲}، فوجی^{۳۳} و کامی، ۲۰۰۱) و عملکرد روش ماز آبی را بهبود می‌بخشد (هاسنورل^{۳۴} و همکاران، ۲۰۰۱). علت این تناقضات واضح نیست ولی ممکن است به دو سازوکار متفاوت مربوط باشد؛ یکی اثر مستقیم از طریق تنظیم شکل پذیری سیناپسی هیپوکامپ بر نواحی مغزی مربوط به حافظه (هاس^{۳۵} و پانولا، ۲۰۰۳) و دیگری اثر غیرمستقیم از طریق تنظیم سیستم تقویت مغز بر ذخیره حافظه (هیوستون^{۳۶}، واگنر^{۳۷} و هاسنورل، ۱۹۹۷). مطالعه قبلی ما نشان داد که بین لیتیوم و هیستامین یک وابستگی به وضعیت متقابل وجود دارد (زرین دست، فضلی تبایی، خلیلزاده، فرهمن‌فر و یحیوی، ۱۳۸۶).

- 1- Daum
- 2- Downes
- 3- Young
- 4- Claro
- 5- Arbones
- 6- Garcia
- 7- Picatoste
- 8- tuberomammillary nucleus
- 9- Unterwald
- 10- Kucharski
- 11- Williams
- 12- Kornetsky
- 13- Panula
- 14- Pirlola
- 15- Auvinen
- 16- Airaksinen
- 17- Inagaki
- 18- Onodera
- 19- Yamatodani
- 20- Watanabe
- 21- Wada
- 22- Hill
- 23- Alvarez
- 24- Ruarte
- 25- Banzan
- 26- Giovannini
- 27- Kamei
- 28- Okumura
- 29- Tasaka
- 30- Taga
- 31- Sugimoto
- 32- Nishiga
- 33- Fujii
- 34- Hasenohrl
- 35- Hass
- 36- Huston
- 37- Wagner
- 38- Stereotaxic apparatus
- 39- passive avoidance apparatus

- 2- Downes
- 4- Claro
- 6- Garcia
- 8- tuberomammillary nucleus
- 10- Kucharski
- 12- Kornetsky
- 14- Pirlola
- 16- Airaksinen
- 18- Onodera
- 20- Watanabe
- 22- Hill
- 24- Ruarte
- 26- Giovannini
- 28- Okumura
- 30- Taga
- 32- Nishiga
- 34- Hasenohrl
- 36- Huston
- 38- Stereotaxic apparatus

به یک گروه از حیوانات به عنوان شاهد، بلافاصله پس از آموزش، سالین و به سه گروه دیگر بلافاصله پس از آموزش مقادیر مختلف لیتیوم (۱۰، ۵ و mg/kg ۲۰) تزریق شد.

آزمایش دوم اثر تزریق مقادیر مختلف لیتیوم را قبل از آزمون بر حافظه تحریب شده به وسیله تزریق لیتیوم بعد از آموزش (mg/kg ۱۰) مورد مطالعه قرار داد. در این آزمایش، به یک گروه از حیوانات پس از آموزش و قبل از آزمون سالین (به عنوان شاهد) تزریق شد، بقیه گروه‌ها در روز اول بلافاصله پس از آموزش، لیتیوم (۱۰mg/kg) و در روز دوم (جلسه آزمون) ۴۵ دقیقه قبل از آزمون، لیتیوم (۲/۵، ۱۰، ۵ و ۲۰ mg/kg) دریافت کردند.

آزمایش سوم بازگشت حافظه با مقادیر کمتر لیتیوم را در موش‌های حساس نشده و حساس شده با هیستامین مورد مطالعه قرار داد. در این آزمایش، به یک گروه از حیوانات پس از آموزش و قبل از آزمون سالین تزریق گردید و برای این که حساسیت ناشی از هیستامین مشخص شود، به یک گروه از حیوانات به مدت سه روز و روزی یک بار سالین (۲۰ میکرولیتر برای هر موش) و به سه گروه دیگر هیستامین (۲۰ میکروگرم برای هر موش) تزریق شد. به دنبال آن پنج روز دارو قطع شد. روز نهم به یک گروه حساس نشده و سه گروه حساس شده با هیستامین، بلافاصله پس از آموزش لیتیوم (۱۰ mg/kg) تزریق گردید. ۴۵ دقیقه قبل از آزمون به گروه شاهد سالین و به بقیه گروه‌ها مقادیر مختلف لیتیوم (۲/۵، ۱۰/۲۵ و ۵ mg/kg) تزریق شد.

آزمایش چهارم در روش اجتنابی غیرفعال اثر تزریقات مکرر داخل بطنی (حساسیت زایی) آنتاگونیست‌های گیرنده هیستامین را بر حافظه بررسی کرد. به یک گروه از حیوانات پس از آموزش و قبل از آزمون سالین تزریق شد. دو گروه دیگر از حیوانات پس از آموزش، لیتیوم (۱۰ mg/kg) دریافت کردند و در روز آزمون ۴۵ دقیقه قبل از آزمون به یک گروه سالین و به گروه دیگر لیتیوم (۱۰ mg/kg) تزریق شد. شش گروه از حیوانات با مقادیر مختلف پیریلامین (۱۰، ۲۰ و ۴۰ μg/mouse) و مقادیر متفاوت رانیتیدین

ارزیابی حافظه قرار گرفت و مدت زمان توقف موش روی سکو (قبل از پایین آمدن) ثبت شد. بلافاصله بعد از پایین آمدن موش از مکعب چوبی و قرار گرفتن چهار پای حیوان روی میله‌های فولادی به مدت ۱۵ ثانیه شوک الکتریکی (جریان مستقیم ۴۵ ولت، ۰/۵ آمپر و ۱ هرتز) از طریق یک محرک (گرس S44، وست وارنیک، آر آی، ساخت آمریکا)^۱ به میله‌های فولادی و در نتیجه به حیوان وارد شد (هیراماتسو^۲، ساساکی^۳ و کامیاما^۴، ۱۹۹۵).

۲۴ ساعت بعد از آموزش، آزمون با فرآیندی مشابه انجام گردید، با این تفاوت که در این روز شوکی وارد نیامد. مدت زمان توقف موش روی سکو به عنوان باقیماندن حافظه موش اندازه گیری شد. حداقل زمان توقف موش روی سکو ۳۰۰ ثانیه بود. در واقع مدت تأخیر^۵ در پایین آمدن از تخته چوبی به عنوان معیار حافظه به کار رفت و مدت تأخیر ۳۰۰ ثانیه به معنای کامل بودن و باقیماندن حافظه موش بود. برای هر موشی که روی میله‌ها یا سکو پرش‌های مکرر انجام می‌داد زمان ۳۰۰ ثانیه در نظر گرفته شد. تمام آزمایش‌های جلسه آزمون از ساعت هشت صبح تا دو بعدازظهر انجام شد.

داروها و روش آزمایش

در این آزمایش از لیتیوم کلراید (مرک، آلمان)^۶ هیستامین دی‌هیدروکلراید^۷، پیریلامین مالتات^۸ (آتاگونیست گیرنده H1) و رانیتیدین هیدروکلراید^۹ (آتاگونیست گیرنده H2) استفاده شد (کیمیدارو، ایران). تمام داروها قبل از آزمایش در سالین استریل ۰/۹ درصد حل شد. هیستامین، پیریلامین و رانیتیدین از طریق تزریق داخل بطنی مغز^{۱۰} (ICV) در طی حساسیت زایی و لیتیوم کلراید از طریق داخل صفاقی^{۱۱} (IP) بلافاصله بعد از آموزش و ۴۵ دقیقه قبل از آزمون تزریق شد. به حیوانات گروه شاهد در طی حساسیت زایی و جلسه آموزش و آزمون، سالین تزریق گردید. حجم داروها در تزریق IP ۱۰ ml/kg و در تزریق ICV ۲ μL/mouse بود.

آزمایش‌ها

آزمایش اول روش اجتنابی غیرفعال در اثر تزریق لیتیوم را پس از آموزش بر حافظه مورد بررسی قرار داد. به این صورت که

1- Grass S44, West Wamick, RI, USA

2- Hiramatsu

4- Kameyama

6- Merck – Germany

8- pyrilamine maleate

10- intracerebroventricular

3- Sasaki

5- latency


7- histamine dihydrochloride

9- ranitidine hydrochloride


11- intraperitoneal

دکتر محمد رضا زرین دست و همکاران

آزمون من-ویتنی نشان داد که 10 mg/kg لیتیوم باعث برگرداندن حافظه تخریب شده به وسیله تزریق پس از آموزش لیتیوم می‌شود (شکل ۲).



شکل ۱- اثرات تزریق لیتیوم پس از آموزش بر حافظه وابسته به وضعیت: هر ستون نمایانگر میانه و چارک داده‌های مربوطه به ۱۰ حیوان است. $10/05^* < p < 10/00^{***}$ در مقایسه با گروه سالین سالین.



شکل ۲- اثر تزریق قبل از آزمون مقداری مختلف لیتیوم بر حافظه تخریب شده به وسیله تزریق لیتیوم (10 mg/kg) پس از آموزش. هر ستون نمایانگر میانه و چارک داده‌های مربوط به ۱۰ حیوان است. $10/01^{***} < p < 10/00^{***}$ در مقایسه با گروه سالین - سالین؛ $10/01^{**} < p < 10/00^{***}$ در مقایسه با گروه لیتیوم - سالین.

1- Kruskal-Wallis
3- Holmes Bonferroni

2- Mann-Whitney, U-test

(۱۲/۵ و $12/25 \mu\text{g}/\text{mouse}$) حساس شدند. به همه این شش گروه، بلا فاصله پس از آموزش و همچنین در روز آزمون، ۴۵ دقیقه قبل از آزمون لیتیوم (10 mg/kg) تزریق گردید.


برای هر گروه آزمایشی، زمان توقف روی سکو به صورت میانه و چارک یادداشت گردید. به علت نقاوت‌های بسیاری که در پاسخ‌های یادگیری حیوانات و همچنین ظرفیت فراگیری هر حیوان وجود دارد، داده‌ها به وسیله آنالیز واریانس برای داده‌های غیرپارامتریک (کروسکال-والیس^۱) و به دنبال آن با روش من-ویتنی^۲ برای بررسی جفت گروه‌ها مقایسه شد. پس از آن برای مقایسه جفت گروه‌ها به تعداد دفعات استفاده از آزمون از ضرب تصحیح هولمز-بونفونی^۳ استفاده گردید. در تمام ارزیابی‌های آماری، حداقل $0/005 < p < 0/001$ معیار معنی دار بودن مقایسه‌بين گروه‌ها در نظر گرفته شد.

یافته‌ها

۱- اگر تزریق لیتیوم پس از آموزش بر حافظه نتایج آزمایش اول نشان داد که تزریق لیتیوم پس از آموزش، عملکرد حافظه را تخریب می‌کند [$H(3)=20/32 < p < 0/001$] آزمون من-ویتنی نشان داد که 10 mg/kg لیتیوم باعث تخریب حافظه می‌گردد (شکل ۱).

۲- اگر تزریق لیتیوم قبل از آزمون بر حافظه در روش اجتنابی غیرفعال در آزمایش دوم تزریق قبل از آزمون مقداری متفاوت لیتیوم (5 و 10 mg/kg) تخریب حافظه ایجاد شده به وسیله تزریق لیتیوم پس از آموزش را بهبود بخشید [$H(4)=19/31 < p < 0/01$]. آزمون من-ویتنی نشان داد که 10 mg/kg لیتیوم باعث برگرداندن حافظه تخریب شده به وسیله تزریق پس از آموزش لیتیوم می‌شود (شکل ۲).

۲- اگر تزریق لیتیوم قبل از آزمون بر حافظه در روش اجتنابی غیرفعال در آزمایش دوم تزریق قبل از آزمون مقداری متفاوت لیتیوم (5 و 10 mg/kg) تخریب حافظه ایجاد شده به وسیله تزریق لیتیوم پس از آموزش را بهبود بخشید [$H(4)=19/31 < p < 0/01$].




شکل ۲- تأثیر تزریق لیتیوم قبل از آزمون بر بازگشت حافظه در موش‌هایی که سه روز در طول حساسیت‌زایی پیریلامین یا رانیتیدین دریافت کردند. هر متون نمایانگر میانه و چهار کد داده‌های مربوط به ۱۰ حیوان است. $^{**} < 0.01$ در مقایسه با گروه لیتیوم سالین؛ $^{**} < 0.01$ در مقایسه با گروه لیتیوم سالین؛ $^{**} < 0.01$ در مقایسه با گروه لیتیوم-لیتیوم

بحث

یادگیری وابسته به وضعیت پدیده‌ای است که در آن بازیابی اطلاعات به دست آمده تنها زمانی ممکن می‌شود که موجود در همان محیط و شرایط فیزیولوژیکی قرار گیرد که در طی مرحله به دست آوردن آن اطلاعات قرار داشته است (شولز^۱، ۲۰۰۰؛ شولز، سوسنیک^۲، ایگو^۳، هایدرلیو^۴ و آهیسار^۵، ۲۰۰۰). یک نمونه از این داروها اپوئیدها هستند که موجب یادگیری وابسته به وضعیت می‌شوند.

زرین دست و همکاران (۲۰۰۵) در تحقیقات اخیر خود نشان دادند که لیتیوم و هیستامین می‌توانند پدیده بازگشت وابسته به وضعیت را الفا و بین هیستامین و لیتیوم وابستگی به وضعیت متقابل ایجاد کنند. همچنین این گروه گزارش کردند که حساسیت‌زایی با مورفین بر تخریب حافظه به وسیله مورفین تأثیر ممی‌گذارد که احتمالاً گیرنده‌های دوبامینی در این تأثیر نقش دارند (زرین دست و



شکل ۳- تأثیر تزریق لیتیوم قبل از آزمون بر بازگشت حافظه در موش‌های حساس‌شده و حساس‌نشده با هیستامین. هر متون نمایانگر میانه و چهار کد داده‌های مربوط به ۱۰ حیوان است. $^{**} < 0.01$ در مقایسه با گروه سالین - سالین؛ $^{**} < 0.01$ در مقایسه با گروه لیتیوم - لیتیوم

۳- تأثیر حساسیت‌زایی هیستامین بر بازگشت حافظه توسط لیتیوم آزمایش نشان داد که تخریب حافظه ناشی از تزریق لیتیوم (۱۰ mg/kg) پس از آموزش به‌طور محسوس باعث برگشت حافظه در موش‌هایی می‌شود که قبل از سه روز متوالی روزی یک بار هیستامین ۲۰ میکرو گرم برای هر موش دریافت کرده بودند (در مقایسه با موش‌هایی که به همین روش سالین گرفته بودند) < 0.01 در مقایسه با آنتاگونوست‌های گیرنده هیستامین (H₁) (شکل ۳).

۴- تأثیر حساسیت‌زایی با آنتاگونوست‌های گیرنده هیستامین بر بازگشت حافظه به‌وسیله لیتیوم آزمایش چهارم نشان داد که بازگشت حافظه به‌وسیله لیتیوم در موش‌هایی که به مدت سه روز در طول حساسیت‌زایی پیریلامین یا رانیتیدین دریافت کردند مختل می‌شود [۰.۰۰۱ < ۰.۰۰۲] آزمون من-ویتی نشان داد در موش‌هایی که ۴۰ µg/mouse آزمون و ۶/۲۵ یا ۱۲/۵ µg/mouse رانیتیدین دریافت کردند، بازگشت حافظه به‌وسیله لیتیوم (۱۰ mg/kg) کاهش می‌یابد (شکل ۴).

دکتر محمدرضا زرین دست و همکاران

بعدی چند نوع دارو یا هورمون کاهش یابد (برای مرور بیشتر به مک گو^۱ و ایز کردو^۲، ۲۰۰۰ مراجعته شود). بنابراین این احتمال وجود دارد که تزریق لیتیوم بعد از آموزش در مطالعه اخیر، سیستم های تنظیم کننده حافظه را تحت تأثیر قرار دهد، ولی برای روشن شدن دقیق سازو کارها به آزمایش های بیشتری نیاز می باشد.

داده های حاضر نشان داد که تزریق مقادیر کمتر لیتیوم قبل از آزمون، حافظه تخریب شده ناشی از تزریق لیتیوم پس از آموزش را به حیواناتی که هیستامین (۲۰ میکرو گرم در هر موش) به صورت تزریق مکرر دریافت کرده بودند بر می گرداند. این یافته نشان می دهد که تزریق مکرر هیستامین ممکن است باعث حساسیت زایی رفتاری شود (دآلیدا^۳ و ایز کردو، ۱۹۸۶). پیشنهاد شده است که هیستامین فرآیندهای حافظه را تسهیل می کند. این که آیا این مسأله در نتایج به دست آمده از مطالعه حاضر دخیل می باشد یا نه، به بررسی بیشتری نیاز دارد. داده های حاضر همچنین نشان می دهد که تزریق مکرر (سه روز تزریق، پنج روز قطع) پریلامین آنتاگونیست گیرنده H1 و رانیتیدین آنتاگونیست گیرنده H2، پاسخ لیتیوم را در بر گرداندن حافظه کاهش می دهد. این نتایج مطرح می کند که احتمالاً هر دو گیرنده های H1 و H2 در حساسیت زایی رفتاری ناشی از هیستامین نقش دارند. از آنجا که هیستامین باعث آزادسازی دوپامین می شود، یک پیشنهاد این است که پاسخ القا شده به وسیله تزریق مکرر هیستامین از طریق گیرنده های دوپامینی میانجیگری می شود. برای روشن شدن سازو کارهای دقیق مورد بحث به آزمایش های بیشتری نیاز می باشد.

دریافت مقاله: ۱۳۸۵/۸/۱۳؛ پذیرش مقاله: ۱۳۸۶/۶/۲۱

رضایوف، ۲۰۰۴). همین طور نشان داده شده است که تزریق مکرر آپومورفین، آنتاگونیست گیرنده دوپامین، موجب حساسیت زایی بر یادگیری وابسته به وضعیت هیستامین می شود که این عمل از طریق گیرنده های D2 دوپامینی به وسیله روش اجتنابی غیرفعال پایین آمدن از سکو صورت می گیرد (ملک محمدی و همکاران، ۱۳۸۵).

این احتمال وجود دارد که هیستامین مانند دوپامین بعضی نوروترانسمیترها را آزاد کند (سوبرامانیان^۱ و مولدر^۲، ۱۹۷۷؛ شلیکر^۳، فینک^۴، دتزner^۵ و گوتز^۶، ۱۹۹۳)

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که تزریق لیتیوم پس از آموزش، بازگشت حافظه اجتنابی غیرفعال را در روز آزمون تخریب می کند. مشخص شده است که این دارو بر حافظه اثراتی منفی دارد، به عنوان مثال می تواند حافظه کلامی را مختلف کند (آنات و همکاران، ۱۹۸۷؛ انجلسمن و همکاران، ۱۹۹۲؛ پاکت و ویستیوسکی، ۲۰۰۳). داده های حاضر نشان داد که تخریب حافظه ناشی از تزریق لیتیوم پس از آموزش به وسیله تزریق مجدد آن قبل از آزمون بر گردانده می شود. تزریق قبل از آموزش یک دارو به جای تأثیر مستقیم بر فرآیندهای ذخیره حافظه ممکن است عملکرد حیوان را به وسیله اثر بر میزان حساسیت حیوان به شوک یا میزان هوشیاری افزایش دهد (کاستلانو^۷، سستاری^۸ و سیامی^۹، ۲۰۰۱). بنابراین در این مطالعه لیتیوم بعد از آموزش به کار برده شد تا از اثرات تزریق قبل از آموزش دارو بر عملکرد حیوانات جلوگیری شده باشد.

مهار آنزیم اینوزیتول منوفسفاتاز و اثر روی cAMP (مورک^{۱۰} و گیسلر^{۱۱}، ۱۹۸۷؛ نیومن^{۱۲} و بلماکر^{۱۳}، ۱۹۸۷؛ نیومن، بن - زیبو^{۱۴} و لرر^{۱۵}، ۱۹۹۱؛ مورک و گیسلر، ۱۹۹۵) یا G پروتئین (آویسار^{۱۶}، شریبر^{۱۷}، دانون^{۱۸} و بلماکر، ۱۹۸۸؛ مانجی و همکاران، ۱۹۹۵؛ فریدمن^{۱۹} و وانگ^{۲۰}، ۱۹۹۶) به عنوان سازو کار دخیل در اثر لیتیوم پیشنهاد شده است. بعضی از محققان پیشنهاد کرده اند که تخریب حافظه ناشی از درمان دارویی سازو کارهای مرکزی حافظه را بلوکه می کند و به نظر می رسد بر گشت ناپذیر باشد. تخریب حافظه به وسیله روش هایی که بر سیستم های تنظیم کننده حافظه اثر می گذارد (شوک الکتریکی تشنج زا، تزریق محیطی β -اندورفین و تزریق مهار کننده های پروتئین کیناز وابسته به کلسیم / کالmodولین نوع II به داخل آمیگدال) می تواند با تزریق های

- 1- Subramanian
- 3- Seehlicker
- 5- Detzner
- 7- Castellano
- 9- Ciamei
- 11- Geistler
- 13- Belmaker
- 15- Lerer
- 17- Schreiber
- 19- Friedman
- 21- McGaugh
- 23- De Almeida

- 2- Mulder
- 4- Fink
- 6- Gothen
- 8- Cestari
- 10- Mork
- 12- Newman
- 14- Ben-Zeev
- 16- Avissar
- 18- Danon
- 20- Wang
- 22- Izquierdo

منابع

- زرین دست، م. ر.، فضلی تبایی، س.، احمدی، ش.، و یحیوی، س. ح. (۱۳۸۴). اثر لیتیوم بر حافظه وابسته به وضعیت مورفین در روش اجتنابی غیرفعال در موش سوری. *فصلنامه تازه‌های علوم شناختی*, ۲۷(۳)، ۲۴-۱۶.
- زرین دست، م. ر.، نورآبی، ن.، و رسولی، ا. (۱۳۸۵). تداخل اثر مورفین و نیکوتین بر حافظه موش‌های سوری حساس شده با نیکوتین. *فصلنامه تازه‌های علوم شناختی*, ۲۹(۱)، ۸-۱.
- ملک‌محمدی، ن.، خلیل‌زاده، آ.، فضلی تبایی، س.، و زرین دست، م. ر. (۱۳۸۵). اثر حسامیت‌زایی مورفین یا آپومورفین بر یادگیری وابسته به وضعیت هیستامین. *فصلنامه تازه‌های علوم شناختی*, ۳۱(۳)، ۱۰-۱.

Alvarez, E. O., & Banzan, A. M. (1996). Hippocampus and learning: Possible role of histamine receptors. *Medicina (Aires)*, 56, 155-160.

Alvarez, E. O., & Ruarte, M. B., (2002). Histaminergic neurons of the ventral hippocampus and the baso-lateral amygdale of the rat: Functional interaction on memory and learning mechanisms. *Behavioural Brain Research* 128, 81-90.

Alvarez, E. O., Ruarte, M. B., & Banzan, A. M. (2001). Histaminergic systems of the limbic complex on learning and motivation. *Behavioural Brain Research*, 124, 195-202.

Ananth, J., Ghadirian, A. M., & Engelsmann, F. (1987). Lithium and memory: A review. *Canadian Journal of Psychiatry*, 32, 312-316.

Avissar, S., Schreiber, G., Danon, A., & Belmaker, R. H. (1988). Lithium inhibits adrenergic and cholinergic increases in GTP binding in rat cortex. *Nature*, 331, 440-442.

Castellano, C., Cestari, V., & Ciamei, A. (2001). NMDA receptors and learning and memory processes. *Current Drug Targets*, 2, 273-283.

Claro, E., Arbones, L., Garcia, A., & Picatoste, F. (1986). Phosphoinositide hydrolysis mediated by histamine H1-receptors in rat brain cortex. *European Journal of Pharmacology*, 123, 187-196.

Daum, P. R., Downes, C. P., & Young, J. M. (1984). Histamine stimulation of inositol 1-phosphate accumulation in lithium-treated slices from regions of guinea pig brain. *Journal of Neurochemistry*, 43, 25-32.

De Almeida, M. A., Izquierdo, I. (1986). Memory facilitation by histamine. *Archives in Internationales de Pharmacodynamie et de Therapie*, 283, 193-198.

Engelsmann, F., Ghadirian, A. M., Grof, P. (1992). Lithium treatment and memory assessment: Methodology. *Neuropsychobiology*, 26, 113-119.

Friedman, E., & Wang, H. Y. (1996). Receptor-mediated activation of G proteins is increased in postmortem

brains of bipolar affective disorder subjects. *Journal of Neurochemistry*, 67, 1145-1152.

Giovannini, M. G., Efoudebe, M., Passani, M. B., Baldi, E., Bucherelli, C., Giachi, F., Corradetti, R., & Blandina, P. (2003). Improvement in fear memory by histamine-elicited ERK2 activation in hippocampal CA3 cells. *Journal of Neuroscience: The Official Journal of the Society for Neuroscience*, 23, 9016-9023.

Haas, H., Panula, P. (2003). The role of histamine and the tuberomamillary nucleus in the nervous system. *Nature Reviews of Neuroscience*, 4, 121-130.

Hasenohrl, R. U., Kuhlen, A., Frisch, C., Galosi, R., Brandao, M. L., & Huston, J. P. (2001). Comparison of intra-accumbens injection of histamine with histamine H1-receptor antagonist chlorpheniramine in effects on reinforcement and memory parameters. *Behavioural Brain Research*, 124, 203-211.

Hill, S. J., Ganellin, C. R., Timmerman, H., Schwartz, J. C., Shankely, N. P., Young, J. M., Schunack, W., Levi, R., & Haas, H. L. (1997). International Union of Pharmacology. XIII. Classification of histamine receptors. *Pharmacological Reviews*, 49, 253-278.

Hiramatsu, M., Sasaki, M., & Kameyama, T. (1995). Effect of dynorphin A-(1-13) on carbon monoxide-induced delayed amnesia in mice studied in a step-down type passive avoidance task. *European Journal of Pharmacology*, 282, 185-191.

Huston, J. P., Wagner, U., & Hasenohrl, R. U. (1997). The tuberomamillary nucleus projections in the control of learning, memory and reinforcement processes: Evidence for an inhibitory role. *Behavioural Brain Research*, 83, 97-105.

Inagaki, N., Yamatodani, A., Ando-Yamamoto, M., Tohyama, M., Watanabe, T., & Wada, H. (1998). Organization of histaminergic fibers in the rat brain. *Journal of Comparative Neurology*, 273, 283-300.

Kamei, C., Okumura, Y., & Tasaka, K. (1993). Influence of histamine depletion on learning and memory recollection in rats. *Psychopharmacology*, 111, 376-382.

دکتر محمد رضا زرین دست و همکاران

- Manji, H. K., Potter, W. Z., & Lenox, R. H. (1995). Signal transduction pathways. Molecular targets for lithium's actions. *Archives of General Psychiatry*, 52, 531-543.
- McGaugh, J. L., & Izquierdo, I. (2000). The contribution of pharmacology to research on the mechanisms of memory formation. *Trends in Pharmacological Science*, 21, 208-210.
- Mork, A., & Geisler, A. (1987). Mode of action of lithium on the catalytic unit of adenylate cyclase from rat brain. *Pharmacology & Toxicology*, 60, 241-248.
- Mork, A., & Geisler, A. (1995). Effects of chronic lithium treatment on agonist-enhanced extracellular concentrations of cyclic AMP in the dorsal hippocampus of freely moving rats. *Journal of Neurochemistry*, 65, 134-139.
- Newman, M. E., & Belmaker, R. H. (1987). Effects of lithium in vitro and ex vivo on components of the adenylate cyclase system in membranes from the cerebral cortex of the rat. *Neuropharmacology*, 26, 211-217.
- Newman, M. E., Ben-Zeev, A., & Lerer, B. (1991). Chloramphetamine did not prevent the effects of chronic antidepressants on 5-hydroxytryptamine inhibition of forskolin-stimulated adenylate cyclase in rat hippocampus. *European Journal of Pharmacology*, 207, 209-213.
- Nierenberg, A. A., Price, L. H., Charney, D. S., & Heninger, G. R. (1990). After lithium augmentation: A retrospective follow-up of patients with antidepressant-refractory depression. *Journal of affective disorders*, 18, 167-175.
- Onodera, K., Yamatodani, A., Watanabe, T., & Wada, H. (1994). Neuropharmacology of the histaminergic neuron system in the brain and its relationship with behavioral disorders. *Progress in Neurobiology*, 42, 685-702.
- Pachet, A. K., Wisniewski, A. M. (2003). The effects of lithium on cognition: An updated review. *Psychopharmacology (Berl)*, 170, 225-234.
- Panula, P., Pirvola, U., Auvinen, S., & Airaksinen, M. S. (1989). Histamine-immunoreactive nerve fibers in the rat brain. *Neuroscience*, 28, 585-610.
- Prien, R. F., Kupfer, D. J., Mansky, P. A., Small, J. G., Tuason, V. B., Voss, C. B., & Johson, W. E. (1984). Drug therapy in the prevention of recurrences in unipolar and bipolar affective disorders. Report of the NIMH collaborative study group comparing lithium carbonate, imipramine, and a lithium carbonate-imipramine combination. *Archives in General Psychiatry*, 41, 1096-1104.
- Schlicker, E., Fink, K., Detzner, M., & Goether, M. (1993). Histamine inhibits dopamine release in the mouse striatum presynaptic H3 receptors. *Journal of Neural Transmission, General section*, 93, 1-10.
- Shulz, D. E. (2000). Memories of memories: The endless alteration of the engram. *Neuron*, 28, 25-29.
- Shulz, D. E., Sosnik, R., Ego, V., Haidrliu, S., & Ahissar, E. (2000). A neuronal analogue of state-dependent learning. *Nature*, 403, 549-553.
- Subramanian, N., & Mulder, A. H. (1977). Modulation by histamine of the efflux of radiolabeled catecholamines from rat brain slices. *European Journal of Pharmacology*, 43, 143-152.
- Taga, C., Sugimoto, Y., Nishiga, M., Fujii, Y., & Kamei, C. (2001). Effects of vasopressin on histamine H(1) receptor antagonist-induced spatial memory deficits in rats. *European Journal of Pharmacology*, 423, 167-170.
- Unterwald, E. M., Kucharski, L. T., Williams, J. E., & Kornetsky, C. (1984). Tripeleannamine: Enhancement of brain-stimulation reward. *Life Sciences*, 34, 149-153.
- Zarrindast, M. R., & Rezayof, A. (2004). Morphine state-dependent learning: sensitization and interactions with dopamine receptors. *European Journal of Pharmacology*, 497, 197-204.
- Zarrindast, M. R., Fazli-Tabaei, S., Khalilzadeh, A., Farahmansar, M., & Yahyavi, S. H. (2005). Cross state-dependent retrieval between histamine and lithium. *Physiology & Behavior*, 86, 154-163.