

تحلیل فضایی اثرات مخاطرات طبیعی در نواحی روستایی با استفاده از مدل مولفه‌های اصلی وزن جغرافیایی (مطالعه موردی: حوضه الموت قزوین)

حسنعلی فرجی سبکبار^۱- دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

سید علی بدری- دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

رضاعباسی ورکی- دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

الهام عباسی ورکی- دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

تاریخ دریافت: ۱۳۹۲/۷/۲۸ تاریخ تصویب: ۱۳۹۳/۵/۱۹

چکیده

مخاطرات طبیعی در ناحیه کوهستانی الموت بر اساس ماهیت، اثرات و پیامدهای متفاوتی را به وجود آورده است. این تحقیق بر پایه این سئوال پژوهشی شکل گرفته است که مخاطرات طبیعی شایع و تاثیرگذار بر روستائیان حوضه الموت با توجه به پیامدهای اجتماعی، اقتصادی، روانی و محیطی کدام است؟ جامعه آماری تحقیق شامل روستاهای حوضه الموت با حجم نمونه ۶۱۰ نفر از روستائیان (هر روستا حداقل ۱۰ پرسشنامه) می‌باشد. خروجی مدل GWPCA با استفاده از کواریانس داده‌ها در ماتریس هر نقطه روستایی با حداقل ۳۰ نقطه همسایگی، در داده‌های هفت ریسک طبیعی (زلزله/سیل/لغزش/ریزش/بهمن/سرمازدگی/کولاک) حاکمیت و گستردگی هر کدام از مخاطرات را در سطح حوضه نمایش داده است. خروجی مدل در شاخص رعب و وحشت روستائیان از مخاطرات طبیعی حاکمیت و گستردگی ۵۶٪ ریسک سیل را در سطح روستاهای حوضه نشان می‌دهد. در شاخص میزان اختلال در حمل و نقل روستائیان، ریسک لغزش با حاکمیت ۵۷٪ بیشترین اختلال در حمل و نقل را داشته است و در پایان، در شاخص میزان شیوع بیماری در بین روستائیان، ریسک سرمازدگی با حاکمیت ۶۷٪ روستاهای دره‌ای و روستاهای واقع در ارتفاعات جنوب حوضه الموت را تحت تاثیر قرار داده است.

کلیدواژه‌ها: مخاطرات طبیعی، ماتریس وزن جغرافیایی، تحلیل مولفه‌های اصلی وزن جغرافیایی، الموت.

۱. مقدمه

مخاطرات طبیعی^۱ در تمام ادوار حیات بشر وجود داشته اند اما به واسطه رشد تصاعدي جمعیت و تراکم انسان ها در تمام عرصه های زیستی به خصوص نواحی پر خطر، امروزه بشر شاهد بلایای بزرگی چون تسونامی آسیا، گردباد کاترینا و زمین لرزه سیچوان چین با تلفات قابل توجه حتی در کشورهای توسعه یافته می باشد. این مخاطرات در بسیاری موارد تاثیرات محرابی بر جوامع انسانی -اعم از شهری و روستایی- می نهند و پیامدهایشان در ابعاد محیطی، اجتماعی، اقتصادی و روان شناختی برای سالیان متعددی در عرصه سکونتگاههای انسانی محسوس است (پور طاهری و همکاران، ۱۳۹۰، ۳۲).

شواهد موجود نیز حکایت افزایش مدام همه انواع بحران های طبیعی از نظر شدت و فراوانی دارند، به طوریکه از دهه ۱۹۷۰ به بعد تعداد افراد تأثیر پذیرفته و نیز میزان زیان های اقتصادی افزایش بسیاری پیدا کرده است (چاروریات^۲، ۲۰۰۰، ۱۹۰).

مفهوم کلیدی در تحلیل مخاطرات طبیعی بر جوامع انسانی، در آسیب شناسی اقتصاد نهفته است که به طور عمده به تنوع اقتصادی و عملکرد اقتصاد کلان قبل از وقوع بلای طبیعی بستگی دارد. به طور مثال، کارائیب کشور کوچکی است که اقتصاد آسیب پذیر آن عمدتاً به گردشگری و صادرات محصولات کشاورزی و فروش محصولات وابسته است (اندرسون^۳، ۱۹۹۰، ۱۴). ولی با این وجود هنگامی که فعالیت های اصلی اقتصادی به شدت ضربه می خورد، حتی کشورهای بزرگتر نیز تحت تاثیر قرار می گینند. البته نوع ساختار اقتصادی و ارتباط بین بخش های اقتصادی نقش مهمی در میزان تاثیر پذیری از مخاطرات طبیعی بازی می کند. اگر ناحیه جغرافیایی دارای اقتصاد غیر رسمی وسیع باشد به احتمال زیاد صدمات بیشتری از مخاطرات خواهد دید (اندرسون، ۱۹۹۰، ۱۶) زیرا بخش هایی غیر رسمی اقتصادی کمتر تحت پوشش بیمه و نهادهای حمایت گر قرار گرفته اند. اندازه بخش کشاورزی نیز یکی از عوامل مهم تاثیر پذیری از مخاطرات طبیعی است. نواحی جغرافیایی که بیش تر سهم تولید ناخالص آن ها در بخش کشاورزی است به طور عمده از مخاطرات آب و هوایی آسیب پذیر هستند (پیکن و ویکلاس^۴، ۱۹۹۷، ۴۸۳). سرانجام، در کشورهایی که برای تولید برق به نیروی آب وابسته هستند شرایط خشکسالی می تواند شرایط مهم و تاثیرگذاری را در کل اقتصاد با قطع تولید در بخش های مختلف اقتصادی بر جا بگذارد (بنسون و کلای^۵، ۱۹۹۸، ۶).

1 Natural hazards

2 Charveriat


3 Anderson

4 Pichon&Vquillas

5 Benson&Clay

۲. منطقه مورد مطالعه

حوضه آبخیر الموت رود با وسعتی در حدود ۷۲۳/۴ کیلومتر مربع در میان سلسله جبال البرز و شمال شرقی شهرستان قزوین در محدوده جغرافیایی ۱۷° ۳۶' تا ۳۳° ۳۶' عرض شمالی و ۵۰° ۲۲' تا ۵۰° ۳۳' طول شرقی و واقع شده است.



عکس ۱ چشم انداز دره الموت و مخاطرات طبیعی

شرایط اکولوژی (طبیعی-انسانی) حوضه الموت رود از یک طرف بیانگر وجود عوامل و پتانسیل‌های فراوان برای وقوع مخاطرات طبیعی و از طرف دیگر نشان دهنده ضعف و شکنندگی ساختارهای موجود به ویژه در بعد اکولوژی انسانی در هنگام وقوع مخاطرات است. به لحاظ ساختار کالبدی حوضه (تعدد گسل‌های کاری موجود، بستر ضعیف زمین‌ساختی، وجود شکستهای تکتونیکی، کمرنند وسیعی از روراندگی‌های ماسه سنگ‌های رسوبی، سابقه زلزله‌خیزی و شیب و توپوگرافی ناهمگون) و از لحاظ اکولوژی انسانی (قرارگیری ۶۵ روستا در معرض ریسک سیل و زلزله، پراکنش آبادی‌ها، بالا نبودن سطح سواد در مناطق روستایی، ضعف ساختار کالبدی و غیره) دلایل منطقی و مناسبی جهت توجه به مخاطرات طبیعی و شناسایی ریسک‌های شایع به عنوان اولین گام مدیریت مخاطرات می‌باشد.

۳. مواد و روش‌ها

۱. ۳. مدل‌های محلی در برابر مدل‌های جهانی

در روش‌های معمول آماری، روش‌های آماری استنباطی برای تعیین رابطه، اندازه‌گیری اثر، یا تفاوت بین جوامع و گروه‌های آماری استفاده می‌شود، به این صورت که به دنبال تعیین رابطه بین دو متغیر هستیم در نهایت اثبات می‌شود که رابطه وجود دارد یا خیر و یا زمانی که می‌خواهیم اثرگذاری و اثربازی شاخص‌ها را روی هم بسنجیم، اثبات می‌کنیم که آیا یک شاخص بر شاخص دیگر اثردارد. اگر اثر دارد به چه میزان است و زمانی که تفاوت را می‌خواهیم اندازه گیری کنیم میانگین دو جامعه را مقایسه کرده و اثبات می‌کنیم که بین آنها اختلاف معناداری وجود دارد یا خیر. در این روش‌ها فرضیه صفر یا رد می‌شود و یا پذیرفته می‌شود. اما در رابطه علت و معلولی یک معادله ارائه می‌شود که بیانگر میزان و نحوه اثر شاخص‌های مختلف می‌باشد. در اینجا برای کل فضا و جامعه یک مدل یا رابطه ارائه می‌شود. در این صورت فضا ثابت و یکسان در نظر گرفته می‌شود در صورتی که فضا ثابت نیست و دارای تغییرپذیری جغرافیایی است. مدل‌های جاری به عنوان مدل‌های جهانی شناخته می‌شود. با فرض تغییرپذیری فضایی، یک شاخص در تمام فضا به یک گونه ممکن است عمل نکند. برای مثال در مدل‌های علت معلولی ممکن است یک شاخص در یک بخش فضا اثر گذار باشد اما در سایر مناطق اثری نداشته باشد و یا اینکه چنین شاخص و یا معیاری وجود خارجی نداشته باشد در این صورت برای هر واحد فضایی لازم است یک مدل ساخت تا تغییرپذیری‌های جغرافیایی محلی را کشف کرد. در این صورت برای هر واحد فضایی یک مدل ارائه خواهد شد. این مدل‌ها به عنوان مدل‌های محلی شناخته می‌شوند و هر شاخص براساس نمرات واحدهای همسایگی خود اندازه گیری می‌شود.

۲. ماتریس وزن جغرافیایی

کاربرد مدل‌های محلی در توضیح تغییرات داده‌ها مثل میانگین و واریانس در تمام مکان‌ها با ویژگی مشابه است. این رویکرد برای محاسبه تغییرات فضایی به طور گسترده از ایده وزن جغرافیایی استفاده می‌کند (لوید^۱، ۲۰۰۱، ۲۴). عملیات استاندارد محاسبه وزن جغرافیایی، بر مبنای ماتریس فاصله می‌باشد:

$$w_{\mathcal{S}_i} = \begin{bmatrix} w_{i1} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & w_{i2} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & & w_{in} \end{bmatrix}$$

در این ماتریس S_{ti} مقادیر i در مکان S با مختصات X و y است و وزن مربوط به مکان‌های i و n می‌باشد. نکات زیادی در ارتباط با ایده وزن جغرافیایی بر پایه فاصله جغرافیایی وجود دارد گتیس و اولستادیت^۱ (۲۰۰۸) نکاتی را درباره وزن جغرافیایی مطرح ساخته‌اند.

۱. همسایگی فضایی پیوسته است ؟

۲. طول مرز مشترک بر محیط تقسیم می‌شود ؟

۳. فاصله‌ها رتبه بندی می‌شوند ؟

۴. مقادیر برابر و ثابت، وزن جغرافیایی پائینی دارند ؟

۵. D همه‌ی ثقل‌های فاصله‌ای می‌باشد ؟

۶. N نزدیکترین همسایگی‌ها می‌باشد.

مفهوم وزن جغرافیایی از روش‌های آماری متداول توسط فاترینگهام، برندسون و چارلتون^۲ (۲۰۰۲) و لوید (۲۰۰۶) مورد بررسی قرار گرفته است. مقالات کاربردی زیادی در ارتباط با وزن جغرافیایی GWR انتشار یافته است. به نظر ویلر و تیفلس^۳ (۲۰۰۵) محاسبه وزن جغرافیایی نیازمند به محاسبات ترکیبی و چندگانه دارد به همین دلیل GWR کاربردهای متنوع و موضوعی می‌یابد.

۳. تحلیل مولفه‌های اصلی^۴

روش تحلیل مولفه‌های اصلی، یکی از روش‌های آماری چند متغیره است که به طور گستردۀ برای کاهش ابعاد داده‌های چند متغیره استفاده می‌شود (والد و همکاران، ۱۹۸۷). زمانی که با داده‌های چند متغیره سروکارداریم اغلب به دنبال آن هستیم که ابعاد داده‌ها را کم کنیم. روش تجزیه به مولفه‌های اصلی روشنی است که برای این منظور بکار گرفته می‌شود. در این روش p متغیر اولیه توسط تعداد محدودتری q که کوچکتر از تعداد اولیه است جایگزین می‌شود. روش‌های متعددی برای محاسبه مولفه‌های اصلی کلامیک وجود دارد که عمدتاً بر مبنای ماتریس کواریانس و یا همبستگی انجام می‌شود. انتخاب تعداد مولفه‌های اصلی یکی از موضوعات مورد بحث در کاربرد این روش می‌باشد (ژولیف^۵، ۲۰۰۵). از زمان ارائه این مدل تاکنون در حوزه‌ها و رشته‌های مختلف مورد استفاده قرار گرفته است، برای مثال مودر^۶ (۲۰۰۴) از روش PCA برای طبقه‌بندی تصاویر چند طیفی سنجش از راه دور استفاده نموده است. همچنین روش PCA کاربردهای فراوانی برای طبقه‌بندی مناطق جغرافیایی، بر اساس ویژگی‌های افراد واقع در آن

1 Getis&Aldstadt

2 Fotheringham&Brunsdon and Chalton

3 Wheeler &Tiefels

4 Principal components analysis

5 Jolliffe

6 Mather

مکان دارد(توبیاس^۱ و همکاران، ۲۰۰۸). گraham^۲ (۱۹۹۵) از روش PCA در سطح شورای ناحیه‌ای به کشف ساختار جمعیتی و اجتماعی در ایرلند شمالی در سالهای ۱۹۷۱، ۱۹۸۱، ۱۹۹۱ پرداخت(لوید، ۲۰۱۰، ۳۹۲). اسپایمن و تیل^۳ (۲۰۰۸) نیز با روش PCA تحلیل فضای اجتماعی را ارائه نمودند در روش آنها تفاوت‌های ناحیه‌ای بر اساس ویژگی‌های جمعیتی استوار گشته بود. این روش اغلب از تحلیل عاملی و روش‌های ارتباطی برای توصیف تنوع نواحی جمعیتی و اجتماعی بهره می‌برد.

معرفی کامل روش PCA توسط بیلی^۴ و گتل^۵ در سال (۱۹۹۵) و آنوین^۶ (۲۰۰۲) ارائه داده شده است. ایت چیسون (۱۹۸۳) روش PCA را برای ترکیب دادها بکار برد. روش PCA بر اساس ماتریس کواریانس-واریانس و یا ماتریس همبستگی استوار می‌باشد.

میزان هر یک از مولفه‌های اصلی با توجه به تنوع جغرافیایی الگوی مولفه‌ی اصلی را کشف می‌کند. با وجود این در دنیای واقعی تنوع گسترده محلی در روابط بین متغیرها مشاهده می‌شود. لوید (۲۰۱۰) همبستگی بین متغیرهای مورد استفاده در تجزیه و تحلیل تفاوت‌های فضایی را در سراسر ایرلند شمالی نشان می‌دهد. اما بحث اساسی در مدل PCA استفاده از وزن جغرافیایی محلی در همبستگی متغیرها می‌باشد.

۴.۳. مولفه‌های اصلی وزنی جغرافیایی^۷

فاترینگهام و همکاران (۲۰۰۲) ایده تحلیل مولفه‌های اصلی وزن جغرافیایی GWPCA را ارائه داده‌اند. GWPCA در واقع بر مبنای میانگین وزن جغرافیایی و واریانس و کواریانس GW در اطراف میانگین بدست آمده می‌باشد. در نتیجه مجموعه‌ای از واریانس‌ها و کواریانس‌های میانگین‌های GW برای هر یک از مقادیر داده‌های مکانی (n) بدست می‌آید. هنگامی که ماتریس واریانس و کواریانس وزن‌های جغرافیایی بدست آمد محاسبه GWPCA انجام می‌پذیرد(فاترینگهام و همکاران، ۲۰۰۲). میانگین وزن جغرافیایی از رابطه شماره (۱) بدست می‌آید:

(۱)

$$\bar{Y_i} = \frac{\sum_{j=1}^n y_j w_{ij}}{\sum_{j=1}^n w_{ij}}$$

لوید و فاترینگهام پیشنهاد می‌کنند وزن‌های جغرافیایی از طریق روش وزن گاووسی محاسبه شود (فاترینگهام و همکاران، ۲۰۰۲).

1 Tobias

2 Graham

3 Spielman & Till

4 Baily

5 Gatrell

6 Unwin

7 Geographically weighted principal component analysis

(۲)

$$w_{ij} = \exp\left[-.5\left(\frac{d_{ij}}{\tau}\right)^2\right]$$

در رابطه (۲) d_{ij} فاصله مکانی بین دو نقطه i و j می باشد. τ مقادیری است که توسط ضریب کرنل تعیین می شود.

اگر وزن های استاندارد شده جمع شود معادله (۱) به صورت زیر می شود:

(۳)

$$\bar{y}_i = \sum_{j=1}^n y_j w_{ij}$$

در ادامه فاترینگهام و همکاران (۲۰۰۲) وزن استاندارد شده را در قسمت باقیمانده فرض کردند. انحراف معیار وزن جغرافیایی از رابطه (۴) بدست می آید:

(۴)

$$\sqrt{o_i} = \left| \sum_{j=1}^n (y_j - \bar{y}_i)^2 w_{ij} \right|^{\frac{1}{2}}$$

و کواریانس وزن جغرافیایی متغیرهای y_1 و y_2 در مکان i بوسیله رابطه (۵) محاسبه می شود:

(۵)

$$\text{cov}(y_{1i}, y_{2i}) = \sum_{j=1}^n w_{ij} (y_{1j} - \bar{y}_{1i})(y_{2j} - \bar{y}_{2i})$$

ضریب همبستگی وزن جغرافیایی در مکان i بوسیله رابطه (۶) محاسبه می شود:

(۶)

$$r_i = \frac{\text{cov}(y_{1i}, y_{2i})}{\sqrt{\sigma(y_{1i})\sigma(y_{2i})}}$$

در این رابطه واریانس (y_{1i}) و واریانس (y_{2i}) وزن جغرافیایی برای متغیرهای y_1 و y_2 برای موقعیت i می باشد. مؤلفه اصلی از طریق ماتریس همبستگی برای هر مکان استخراج می شود (لوید، ۲۰۱۰، ۳۹۲).

مراحل محاسبه GWPCA

۱-استخراج متغیرهای تحقیق و جمع آوری داده ها

۲-محاسبه ماتریس وزن جغرافیایی

۳-تعیین رابطه خطی بودن داده های محلی

۴-تعیین واحدهای همسایگی با درجات مختلف

۵-محاسبه PCA

۶-اعتبار سنجی با استفاده از اعتبارسنجی متقطع

۷-تعیین شاخصی که بیشترین میزان واریانس را توجیه نماید

۸-نامگذاری شاخص

۹-اتصال اطلاعات به نقشه

۱۰-کارتوگرافی و تحلیل

برای انجام تحقیق از نرم افزارهای ArcGIS برای تولید نقشه های پایه و تولید خروجی استفاده شده است. کلیه مراحل مدل سازی و محاسبه در محیط نرم افزاری متلب ۲۰۱۳ انجام شده است.

تبیین مفهومی شاخص های اثرات مخاطرات طبیعی در نواحی روستایی

مخاطرات طبیعی بر اساس ماهیت و طبیعت، اثرات و پیامدهای متفاوتی در نواحی روستایی به وجود می آورند. مخاطرات طبیعی می تواند بر توزیع درآمد گروه های اجتماعی تاثیر بگذارد. همانطور که گزارش پیشرفت اجتماعی - اقتصادی توسعه قاره آمریکا^۱ (۲۰۰۰) نشان داده، عوامل جغرافیایی می تواند تاثیرات قابل توجهی در میزان ثروت در سطوح محلی، منطقه ای و محلی بگذارد. طول زمان و ابعاد جغرافیایی مخاطرات طبیعی یکی دیگر از عوامل مهم است. مخاطرات در مقیاس کوچک جغرافیایی تاثیرات محدودی را ایجاد می کنند در حالیکه مخاطرات طبیعی در سطح پهناور یک کشور مثل طوفان آب و هوایی تاثیرات گسترده ای را شامل می شود، مخاطرات ناگهانی (مثل طوفان) اثرات طولانی مدت کمتری نسبت به مخاطراتی که به آرامی به وقوع می پیوندد(مثل خشکسالی) دارد. گردابها، سیل و خشکسالی تاثیرات محربتری نسبت به زلزله و آتشسوزی عمده تا تاثیرات جانبی محربتر در بخش کشاورزی، به ویژه در کشورهای با اقتصاد کشاورزی بروز می دهد(اندرسون، ۱۹۹۴، ۱۴).

در نواحی که فعالیت غالب کشاورزی و دامداری باشد و فعالیت ها بر پایه چرای گسترش دام در مراتع استوار باشد، خشکسالی مکرر باعث می شود زمین برای مدت طولانی آبیاری نشود و توانایی زراعت کاهش یابد و به دلیل کمبود علوفه و بیماری ناشی از خشکسالی مرگ و میر دام افزایش می یابد. در این میان خانواده های فقیر بیشتر تحت تاثیر قرار می گیرند، زیرا آن ها استطاعت خرید علوفه یا جابجایی دام ها را در فصل تابستان نخواهند داشت(اسکات و لیشتایلد،^۲ ۱۹۹۴)

از دیدگاه خانواده، مخاطرات طبیعی می تواند یک تهدید چند جانبه برای رفاه خانواده باشد. به طور کلی سه دسته تاثیر بر رفاه فرد یا خانوار وجود دارد: تمامیت فیزیکی (سلامت جانی)، دارایی ها و درآمد خانواده. تاثیرات جانبی مخاطرات زمانی به وقوع می پیوندد که همبستگی خانواده به واسطه فوت سرپرست خانواده از هم گسینته باشد و

1 Inter-American Developments Economic and social
2 Scott &Lichtfield

سیستم‌های عمومی و پشتیبان کننده جامعه در قبال افراد بی سرپرست به شدت ضعیف شده باشد(چاروریات، ۲۰۰۰، ۱۰). مرگ و میر یکی از تاثیرات مستقیم و سریع مخاطرات طبیعی مثل سیل است که ساختمان‌های تخریب شده به همراه جریان آب گل آلود، مردم بلا دیده را با خود می‌برد. بیماری و خشونت می‌تواند همراه مخاطرات طبیعی بروز کند، بروز بیماری و خشونت بسته به کیفیت مدیریت مخاطرات و وضعیت بلای رخ داده متفاوت است. زلزله، طوفان و سیل موجب تخریب توزیع طبیعی آب و آلود ساختن آب مصرفی می‌شود و به تبع آن پس از هر بار وقوع مخاطرات خطر بیماری‌های واگیر دار از طریق آب افزایش می‌باشد(چاروریات، ۲۰۰۰، ۱۱).

۵. شناسایی مخاطرات در نواحی روستایی

شناسایی ریسک در واقع فرایند پیدا کردن، تشخیص دادن و ثبت ریسک است. شناسایی ریسک اولین گام برای طراحی و اجرای برنامه‌های کترل ریسک است (عسکری، ۱۳۸۱، ۶۱). نواحی باید منبع ریسک، نواحی تاثیرگذار، حوادث و علل و پیامدهای بالقوه آنها را شناسایی کند. هدف این مرحله تهیه فهرست جامعی از ریسک‌ها بر اساس پیامدها و حوادثی که ممکن است نظم طبیعی ناحیه را با تاخیر مواجه سازد می‌باشد.

شناسایی ریسک‌ها کار بسیار دقیق و حساسی است و لازم است دقت لازم در شناسایی ریسک صورت گیرد زیرا ریسکی که در این مرحله شناسایی نشده باشد در مراحل بعدی وارد تحلیل نمی‌شود. شناسایی ریسک باید بررسی اثرات جانبی پیامد مورد نظر از جمله اثرات ثانویه و انباشتی را در نظر بگیرد. این مرحله همچنین باید دامنه وسیعی از انواع پیامدها را مورد توجه قرار دهد (عسکری، ۱۳۸۸، ۶۲). شناسایی ریسک باید نهایتاً منجر به تهیه سیستم ثبت ریسک بشود.

فرایند شناسایی ریسک‌های طبیعی شایع در حوضه‌های آنها در دو مرحله صورت گرفته است. محقق در گام اول با استخراج اثرات و پیامدهای ریسک‌های طبیعی بر سکونتگاه‌های روستایی، پرسشنامه چک لیست شناسایی مخاطرات طبیعی در نواحی روستایی را تنظیم نموده است و با انتخاب ۳۰ نفر از کارشناسان محلی (شامل دهداران، شوراهای اسلامی و یا نخبگان محلی) به طور تصادفی (۱۵ نفر از دهستان‌های بala و ۱۵ نفر از دهستان‌های پائین) از روستاهای حوضه‌های آنها را شناسایی نموده است.

تحلیل فضایی مخاطرات طبیعی بر اساس یافته‌های اولیه تحقیق (شامل هفت ریسک طبیعی؛ زلزله، سیل، لغزش، ریزش، بهمن، سرمادگی و کولاک) با روش شاخص‌های ریسک (شامل ۱۱ شاخص شناسایی شده؛ رعب و وحشت روستائیان، یاس و نامیدی از فعالیت‌های کشاورزی، تمایل به مهاجرت، تخریب زیرساخت‌های روستایی،

تخرب مساکن روستایی، اختلال در حمل و نقل، شیوع بیماری، وقفه در فعالیت‌های اقتصادی، فرسایش خاک، تخریب مزارع و مراتع) به لحاظ مفهومی بنیان یافته است.

جدول ۱ طبقه‌بندی تجربه وقوع مخاطرات طبیعی حوضه الموت از دیدگاه کارشناسان (منبع : یافته‌های تحقیق)

تجربه وقوع مخاطرات	نام مخاطرات طبیعی
زياد	زمین لرزه، سیل، لغزش، ریزش، طوفان، سرمازدگی در کشاورزی، کولاک، بهمن، تگرگ، رعد و برق شدید
متوسط	آبرگفتگی، تخریب خاک، خشکسالی، کم آبی، گرد و خاکی، گردبادها، تندباد
کم	جریان‌های گلی، آتش سوزی، موج گرمائی، بادهای شدید گرم، گرمادگی
هرگز	تسونامی، هوازدگی نمکی، بارش‌های اسیدی، بیابان زائی، طوفان‌های ماسه‌ای، فوران آتش‌فشان

پیامدهای ریسک‌های طبیعی رایج در حوضه الموت از دیدگاه روستائیان

یکی از پرسش‌های چک لیست شناسایی ریسک‌های طبیعی در حوضه الموت، شناخت پیامدهای هر کدام از ریسک‌های رایج در سطح روستاهای مورد مطالعه می‌باشد. هدف از این سؤال بومی سازی شاخص‌های سنجش ریسک‌های طبیعی در نواحی روستایی کوهستانی بوده است. جداول (۲) و (۳) و (۴) و (۵) نتایج دیدگاه پاسخ‌گویان از پیامدهای هر یک از مخاطرات طبیعی در سطح حوضه الموت را به نمایش می‌گذارد.

جدول ۲ پیامدهای ریسک‌زدایی در روستاهای حوضه الموت از دیدگاه پاسخ‌گویان منبع : یافته‌های تحقیق

نماینده مخاطرات	اجتماعی	اقتصادی	محیطی	روانی
- ایجاد آشفتگی‌های اجتماعی - از هم گسیختگی همبستگی اجتماعی - فوت سرپرست خانواده - تلفات جانی - مهاجرت روستائیان - شیوع بیماری	- تخریب مسکن - هزینه ایجاد مسکن موقت و دائم - خسارت به شبکه راه‌ها، پل‌ها - احداث درمانگاه‌های اضطراری - تاخیر در تولید - تخریب کارگاه‌های صنعتی - تلفات دامی - هزینه درمان مجروه‌های	- بازیر شدن بافت روستا - تولید نخاله ساختمانی - ضایعات زیست محیطی	- احسان عدم امنیت - بروز نامنی - ایجاد عدم امنیت از سرمایه‌گذاری - ضایعات روانی - ایجاد رعب و وحشت	

جدول ۳ پیامدهای ریسک‌لغزش در روستاهای حوضه الموت از دیدگاه پاسخگویان

پیامدها نام مخاطره	اجتماعی	اقتصادی	محیطی	روانی
۳: چشم	- اختلال در نظم اجتماعی - اختلال در رفت و آمد	- خسارت به محصولات کشاورزی - خسارت به محصولات باقی و درختان - خسارت به مساکن روستایی - تخریب انهر و شبکه‌های آبیاری - تخریب خطوط انتقال نیرو	- تسريع فرسایش خاک - اختلال در چرخه زیست محیطی - تغییرات شرایط فیزیکی حوضه	- ایجاد عدم امنیت از سرمایه‌گذاری در مناطق پرشیب کوهستانی


جدول ۴ پیامدهای ریسک‌سیل در روستاهای حوضه الموت از دیدگاه پاسخگویان

پیامدها نام مخاطره	اجتماعی	اقتصادی	محیطی	روانی
۳: چشم	- تلفات جانی - مهاجرت روستائیان - شیوع بیمارهای خطرناک - اختلال در نظام اجتماعی	- خسارت به مساکن روستایی - از بین رفتن محصولات زراعی و باقی - تخریب آبیاری و بند انجرافی - آسیب دیدگی سریز و بند انجرافی - آسیب دیدگی ایستگاه‌های پمپاژ - تلفات دائمی - تخریب کارگاه‌های صنعت - خسارت به شبکه راه‌ها، پل‌ها - تخریب خطوط انتقال نیرو - هزینه درمان مجرموین	- فرسایش خاک و از بین رفتن کامل اراضی کشاورزی - تخریب منابع گیاهی و جانوری - ایجاد بالاترالهای جدید - تغییرات شرایط فیزیکی حوزه آبی - تغییر در زیستگاه‌های آبی - بازیابی زمین‌ها - اختلال در چرخه زیست محیطی	- ایجاد عدم امنیت از سرمایه‌گذاری در مناطق سیل خیز - زیان‌های درازمدت بهداشتی - ایجاد رعب و وحشت - احساس پاس و نامیدی از فعالیت کشاورزی - تمایل به مهاجرت

جدول ۵ پیامدهای ریسک‌سرمازدگی و کولاک در روستاهای حوضه الموت از دیدگاه پاسخگویان، منبع یافته‌های تحقیق

پیامدها نام مخاطره	اجتماعی	اقتصادی	محیطی	روانی
۳: چشم و کولاک	- تلفات جانی - هزینه درمان مجروحین - اختلال در انجام فعالیت‌های اجتماعی - شیوع بیمارهای خطرناک	- از بین رفتن محصولات کشاورزی - خشک شدن درختان و باغها - وقفه در تولید - کاهش تولید و بیکاری فصلی - آسیب به تاسیسات زیربنایی مثل شبکه آب - تسريع فرسودگی مساکن روستایی - اختلال در حمل و نقل	- تخریب منابع گیاهی و جانوری - آسیب به زندگی گیاهی و جانوری - تشدید پدیده ریزش در کوهستان	- ایجاد عدم امنیت از سرمایه‌گذاری زراعی در مناطق کوهستانی - ایجاد رعب و وحشت - تمایل به مهاجرت به مناطق گرمسیر و دشتی

برای پاسخگویی و رسیدن به نتایج قابل قبول و درک صحیح از تاثیرات و پیامدهای مخاطرات طبیعی شایع در حوضه الموت از شاخص‌ها و متغیرهای بومی شده‌ای از دیدگاه کارشناسان استفاده شده است. به طور کلی مخاطرات طبیعی دارای دو دسته پیامدها محسوس^۱ و پیامد نامحسوس^۲ می‌باشد. که تاثیرات محسوس به دو صورت مستقیم^۳ و غیرمستقیم^۴ طبقه‌بندی می‌شود(افتخاری، ۱۳۸۸، ۱۷۱). شکل شماره (۱) ابعاد و شاخص‌های سنجش میزان تاثیرات مخاطرات طبیعی بر سکونتگاه‌های روستایی را نشان می‌دهد.



شکل شماره ۱ مدل مفهومی سنجش مخاطرات طبیعی در نواحی روستایی و شاخص‌ها-منبع(بافت‌های تحقیق)

آنمان^۵ (۲۰۰۳) به این نکته اشاره کرد که اثرات مخاطرات طبیعی می‌تواند به طور مشهود و غیر مشهود طبقه‌بندی شود. اثرات مشهود، آثاری هستند که به راحتی توسط واحد پولی بتوان اندازه گیری نمود. در حالی که اثرات نامشهود با واحد پولی اندازه گیری نمی‌شوند زیرا این اثرات قابل خرید و فروش در بازار نیستند و واحد ارزش گذاری در بازار ندارد. برای مثال ترس و اضطراب از مخاطرات طبیعی در آینده(الیور،

1 Tangible Losses

2 Intangible Losses

3 Direct

4 Indirect

5 Anaman

(۱۹۸۹) اختلال و ناراحتی در هنگام کار در مزرعه، ترس از مرگ و میر از دیگر آثار غیر مشهود است (سیواکومار^۱، ۲۰۰۵، ۶).

جدول ۶ ابعاد و گویه‌های سنجش پیامدهای مخاطرات طبیعی در محیط روستایی حوضه الموت

بعضی از ابعاد	گویه‌ها
بعضی از ابعاد اقتصادی	۱- میزان رعب و وحشت ساکنین روستا از تکرار پذیری مخاطرات طبیعی ۲- میزان احساس یاس و نامیدی از فعالیت‌های اقتصادی و کشاورزی روستا از مخاطرات طبیعی ۳- میزان تمایل به مهاجرت و تغییر مکان زندگی از تکرار پی در پی مخاطرات طبیعی
بعضی از ابعاد اجتماعی	۱- میزان تخریب زیرساخت‌های روستا از مخاطرات طبیعی ۲- میزان تخریب مسکن/کارگاه‌ها و منازل روستا از مخاطرات طبیعی ۳- میزان کاهش تولید و بروز بیکاری از بروز مخاطرات طبیعی ۴- میزان افزایش نامنی در سرمایه گذاری اقتصادی از بروز مخاطرات طبیعی ۵- میزان اختلال در حمل و نقل و رفت و آمد اهالی روستا از مخاطرات طبیعی
بعضی از ابعاد تکنیکی	۱- میزان بی خانمانی خانوار روستا از بروز مخاطرات طبیعی ۲- میزان اختلال در نظم اجتماعی روستا در هنگام بروز مخاطرات طبیعی ۳- میزان مهاجرت اجباری اهالی روستا از مخاطرات طبیعی ۴- میزان شیوه بیماری‌های خطرناک در روستا در هنگام بروز مخاطرات طبیعی
بعضی از ابعاد امنی	۱- میزان تخریب و فرسایش خاک از هر کدام از مخاطرات طبیعی ۲- میزان تخریب مزارع و باغ‌های روستا از هر کدام از مخاطرات طبیعی ۳- میزان تخریب مراتع روستا از هر کدام از مخاطرات طبیعی

۶. ۳. جامعه آماری و حجم نمونه تحقیق

حوضه الموت رود بنا به ماهیت کوهستانی، موقعیت دره‌ای و دسترسی پائین جاده‌ای، به لحاظ سکونتگاهی یک حوضه روستایی می‌باشد. جامعه آماری شامل ۶۷ سکونتگاه (شهر معلم کلایه و ۶۶ روستای حوضه الموت از دهستان الموت بالا و الموت پائین) می‌باشد. جامعه آماری تحقیق، جهت برآورد معرفت روستائیان نسبت به مخاطرات طبیعی، همگی از گروه سنی ۱۵-۶۴ سال انتخاب شده‌اند که جمعیت گروه مورد مطالعه در دهستان الموت پائین ۲۰۸۰ نفر و در دهستان الموت بالا ۲۵۸۹ نفر در سال ۱۳۹۰ بوده است که با روش نمونه‌گیری کوکران با ضریب اطمینان ۹۵٪ و دقت احتمال ۰.۵ (P,Q=۰.۵) حجم نمونه ۶۱۰ نفر محاسبه گردیده است که محقق جهت تحلیل همسایگی و استفاده از مدل آماری GWPCA، ۶۱ روستای

بالای ۱۰ خانوار دهستان الموت بالا و پائین را به عنوان روستاهای مورد مطالعه انتخاب نمود. بنابراین به غیر از ۶ روستای آلانگان، روچ دره، ورکرود، پونان، بیدلی، میانخانی که زیر ۱۰ خانوار جمعیت داشته‌اند ۶۱ سکونتگاه (شهر معلم کلایه و ۶۰ روستای واقع در حوضه الموت رود) با جمعیتی معادل ۸۳۷۰ نفر (۱۶۷۰ جمعیت شهری، ۶۷۶۳ جمعیت روستایی) کل جامعه آماری تحقیق را شامل شد که محقق جهت دستیابی به نتایج قابل قبول و تحلیل فضایی مخاطرات طبیعی عرصه‌های روستایی، حداقل در هر روستا ۱۰ پرسشنامه سنجدش مخاطرات را به روش تصادفی از روستائیان مورد مطالعه قرار داده است.

جدول ۷ موقعیت روستاهای حوضه الموت رود

موقعیت	نام روستا
جلگه‌ای	سليمان آباد، بیدلی، باغ دشت، شهرک، شریف آباد، مینودشت، بوقان، مدان، هرانک، کافرکشن، سفیددر، خوبان، زوارک، نسا، کلان
کوهستانی	صائین کلایه، ملاکلایه، کندان سر، اندرج، دک، کوچنان، شورستان سفلی، سرخ‌کوله، ترکان، آفتادر، جولادک، فیشان، دینه رود، اووه، نرمیلات، اوانک، حسن آباد، ویکان، خوبکوه، آلانگان، روچ دره، روچ علیا، ورک، گرمارود، ورکرود، اوتر، دهک، شورستان علیا، جیرنده، باغ کلایه، سیلکان، کشک دشت، سراج کلایه، پیچ بن، سرخ کوله، محمودآباد، اتان رود، یارفی، وناش پائین، ایلان، اتان، طاله، وناش بالا، چوثر، کلایه، توان، هنیز، خشکچال، اندرج، مسعود آباد، میانخانی


۴. بحث و نتایج

خروجی مدل GWPCA با استفاده از کواریانس داده‌ها در ماتریس هر نقطه روستایی با ۳۰ نقطه همسایگی، در داده‌های ۷ ریسک طبیعی مربوط به شاخص رعب و وحشت روستائیان، ۴ ریسک طبیعی تاثیرگذار را با خلاصه‌سازی داده‌ها و یافتن ساختار ارتباطی داده‌ها شناسایی و ارائه نموده است. ۴ ریسک طبیعی عبارتند: ریسک سیل، ریسک لغزش، ریسک ریزش، ریسک سرمازدگی.

جدول ۸ مخاطرات طبیعی موثر در رعب و وحشت روستائیان

مخاطرات طبیعی	رتبه تاثیرگذاری	تعداد روستاهای واقع در پهنه پرخطر	درصد حاکمیت روستاهای ریسک در روستاهای کیلومتر مربع	گستردگی جغرافیایی به کیلومتر مربع
ریسک سیل	اول	۳۵ روستا	%۵۶	۳۷۷.۲
ریسک سرمازدگی	دوم	۱۵ روستا	%۲۴	۹۷.۳
ریسک ریزش	سوم	۱۱ روستا	%۱۸	۲۴۵.۲
ریسک لغزش	چهارم	۱ روستا	%۲	.۷

نقشه شماره (۱) حاکمیت و گستردگی ۴ ریسک شناسایی شده را در سطح حوضه الموت رود به نمایش می‌گذارد. ریسک سیل باعث رعب و وحشت در ۵۶٪ روستاهای شمالی حوضه الموت شده است. ریسک سرمایدگی در ۲۴٪ از روستاهای حوضه الموت باعث رعب و وحشت روستائیان گشته است. پراکندگی ریسک ریزش منطبق بر مناطق پرشیب در ارتفاعات و بیشتر در دامنه جنوبی حوضه الموت مشاهده می‌گردد.



نقشه ۱ توزیع فضایی مخاطرات طبیعی در مولفه‌ی اصلی رعب و وحشت روستائیان


توزیع فضایی مخاطرات طبیعی در مولفه‌ی اختلال در حمل و نقل روستائیان

خروچی مدل GWPCA با استفاده از کواریانس داده‌ها در ماتریس هر نقطه روستایی با ۳۰ نقطه همسایگی، در داده‌های ۷ ریسک طبیعی مربوط به شاخص میزان اختلال در حمل و نقل روستائیان،^۳ ریسک طبیعی تاثیرگذار را با خلاصه‌سازی داده‌ها و یافتن ساختار ارتباطی داده‌ها شناسایی و ارائه نموده است. خروچی داده‌ها حاکمیت سه ریسک را در شاخص میزان اختلال در حمل و نقل روستائیان را نشان می‌دهد.

جدول ۹ مخاطرات طبیعی تاثیرگذار در میزان اختلال در حمل و نقل روستائیان

گستردگی جغرافیایی به کیلومتر مربع	درصد حاکمیت ریسک در روستاهای	تعداد روستاهای واقع در پهنه پرخطر	رتبه تاثیرگذاری	مخاطرات طبیعی
۴۲۴.۶	٪۵۷	۳۵ روستا	اول	ریسک لغزش
۲۶۸.۱	٪۳۷	۲۳ روستا	دوم	ریسک ریزش
۶.۲	٪۶	۳ روستا	سوم	ریسک کولاک

نقشه شماره (۲) حاکمیت و گستردگی ۳ ریسک شناسایی شده را در سطح حوضه الموت رود به نمایش می‌گذارد. ریسک لغزش و ریسک ریزش با گستردگی بالا، بیشترین اختلال را در حمل و نقل روستائیان دارد. ریسک لغزش با حاکمیت ۵۷٪ بر اختلال در حمل و نقل بیشترین اختلال در حمل و نقل را دارد. مطابق بر نقشه خروجی، در روستاهای واقع در دامنه‌های شمالی حوضه، ریسک لغزش باعث اختلال را در حمل و نقل گشته است. ریسک ریزش با حاکمیت ۳۷٪ بیشتر روستاهای دامنه‌های جنوبی را تحت تاثیر قرار داده است. تاثیرات ریسک کولاک موضعی و محدود و منطبق بر تواحی مرتفع حوضه می‌باشد.



نقشه ۲ توزیع فضایی مخاطرات طبیعی در مؤلفه اصلی اختلال در حمل و نقل روستائیان


توزیع فضایی مخاطرات طبیعی در مؤلفه شیوع بیماری در بین روستائیان

خروچی مدل GwPCA با استفاده از کواریانس داده‌ها در ماتریس هر نقطه روستایی با ۳۰ نقطه همسایگی، در داده‌های ۷ ریسک طبیعی مربوط به شاخص میزان شیوع بیماری در بین روستائیان، ۲ ریسک طبیعی تاثیرگذار را با خلاصه‌سازی داده‌ها و یافتن ساختار ارتباطی داده‌ها شناسایی و ارائه نموده است. خروچی داده‌ها حاکمیت دو ریسک را در شاخص میزانشیوع بیماری در بین روستائیان را نشان می‌دهد.

جدول ۱۰ مخاطرات طبیعی تاثیرگذار در میزان شیوع بیماری در بین روستائیان

مخاطرات طبیعی	تاثیرگذاری	رتبه	در پهنه پرخطر	تعداد روستاهای واقع	درصد حاکمیت روستاهای	گستردگی جغرافیایی به کیلومتر مربع
ریسک سرمازدگی	اول	۴۱ روستا	٪ ۶۷	۴۵۶,۷		
ریسک کولاک	دوم	۲۰ روستا	٪ ۳۳	۲۶۴		

نقشه شماره (۳) حاکمیت و گستردگی ۲ ریسک شناسایی شده را در سطح حوضه الموت رود به نمایش می‌گذارد. ریسک سرمازدگی و ریسک کولاک در بین هفت ریسک مورد مطالعه تاثیرگذارترین ریسک‌ها در شیوع بیماری می‌باشد. ریسک سرمازدگی با حاکمیت ٪ ۶۷ روستاهای دره‌ای و روستاهای واقع در ارتفاعات جنوب حوضه الموت را تحت تاثیر قرار داده است. ریسک کولاک با حاکمیت ٪ ۳۳ بر روستاهای حوضه الموت بیشتر گستردگی خود را در مناطق شمالی دارد.



نقشه ۳ توزیع فضایی مخاطرات طبیعی در مولفه‌ی شیوع بیماری در بین روستائیان

۵. نتیجه‌گیری

نتایج تحقیق نشان می‌دهد ریسک سیل و سرمازدگی در بین هفت ریسک مورد مطالعه در حوضه الموت بیشترین تاثیر را بر روستائیان ناحیه الموت گذاشته است. ریسک سیل بیشترین رعب و وحشت، تمایل به

مهاجرت، تخریب زیرساخت‌های روستا، فرسایش خاک را از دیدگاه روستائیان داشته است. ریسک سرمازدگی بیشترین یاس و نامیدی روستائیان از فعالیت‌های کشاورزی، وقفه در فعالیت‌های اقتصادی روستائیان، شیوع بیماری در بین روستائیان، تخریب مراع و مزارع را از دیدگاه روستائیان در منطقه مورد مطالعه داشته است. ریسک زلزله بیشترین مهاجرت اجباری روستائیان را سبب گشته و ریسک لغزش بیشترین اختلال در حمل و نقل را به همراه داشته است.

یافته‌های تحلیلی تحقیق(ریسک‌های موثر حوضه الموت بر روستائیان)

شناخت	ریسک سیل	ریسک سرمازدگی	ریسک سیل	ریسک سرمازدگی	درصد حاکمیت روستاهای ریسک در روستاهای	گسترده‌گی جغرافیایی به کیلومتر مربع
رعب و وحشت روستائیان	ریسک سیل				۳۵ روستا	٪۵۶
یاس و نامیدی روستائیان از فعالیت‌های کشاورزی	ریسک سرمازدگی				۳۵ روستا	٪۵۷
تمایل روستائیان به مهاجرت	ریسک سیل				۴۷ روستا	٪۷۷
تخریب زیرساخت‌های روستایی	ریسک سیل				۵۷ روستا	٪۹۳
وقفه در فعالیت‌های اقتصادی روستائیان	ریسک سرمازدگی				۵۱ روستا	٪۸۳
اختلال در حمل و نقل روستائیان	ریسک لغزش				۳۵ روستا	٪۵۷
مهاجرت اجباری روستائیان	ریسک زلزله				۶۱ روستا	٪۱۰۰
شیوع بیماری در بین روستائیان	ریسک سرمازدگی				۴۱ روستا	٪۶۷
فرسایش خاک	ریسک سیل				۶۱ روستا	٪۱۰۰
تخریب مراع و مزارع	ریسک سرمازدگی				۳۴ روستا	٪۵۵

کتابنامه

پورطاهری، مهدی، سجادی، حمدالله و صادقلو، طاهره (۱۳۹۰)، ارزیابی تطبیقی روش‌های رتبه بندی مخاطرات طبیعی در مناطق روستایی (مطالعه موردی، استان زنجان)، پژوهش‌های روستایی، سال دوم، شماره سوم، پائیز ۵۴-۳۱، صص ۱۳۹۰

رکن الدین افتخاری، عبدالرضا، صادقلو، طاهره، احمدآبادی، علی و سجاسی، حمداده (۱۳۸۸)، ارزیابی پنهان بندی روستاهای در معرض خطر سیلاب با استفاده از مدل HAC_GeoRAS در محیط GIS مطالعه موردي: روستاهای حوزه گرگانبرود، مجله توسعه روستایی، دوره اول، شماره ۱، پائیز و زمستان ۱۳۸۸.

عسکری، علی (۱۳۸۸)، راهنمای استاندارد بین المللی ایزو ۳۱۰۰۰ مدیریت ریسک: انتشارات نور علم. تهران.
Askari, A., 2009. International standard guide of Risk Manaagment, ISO 31000, Noor Elm publication, Tehran.

Anderson,M.,1990: Analyzing the Costs and Benefits of Natural Disaster Responses in the Context of Development. Environment Working Paper 29. Washington, DC, United States: World Bank

Benson, C., Clay, E.J., 1998: The Impact of Drought on Sub-Saharan Economies: A Preliminary Examination. World Bank Technical Paper No.401. Washington, United States: World Bank.

Charvériat, Céline, 2000: Natural Disasters in Latin America and the Caribbean:An Overview of Risk. Inter-American Development Bank (BID), New York Avenue, N.W.Washington. Latin American Economic Policies Newsletter.

Eftekhari R A,Sadeghloo T.,Ahmadabadi A.,Sojasi H.,(2010) Zoning of Rural Regions in Flood Hazard with Use of HEC-GeoRAS Model in GIS Sphere (Case study: flooded villages of Gorganrud Basin)

Fotheringham, A. S., Brunsdon, C., & Charlton, M., 2002 :Geographically weighted regression: The analysis of spatially varying relationships. Chichester: John Wiley&Sons.

Getis and J. Aldstadt, 2004. Constructing the spatial weights matrix usinga local statistic. Geographical Analysis, 36:90-104.

Graham, D. T. ,1995. Social and demographic patterns and trends in Northern Ireland: a multivariate approach. Irish Geography, 28, 35–47

Hilson. D., 2002. Extenging the risk process to mamage opportunities. International Journal of Project management, 20, 251-268

Inter-American Development Bank. 2000: Social Protection for Equity and Growth. Washington, DC, United States: Inter-American Development Bank

Jolliffe, I., 2005: Principal Component Analysis. Encyclopedia of Statistics in Behavioral Science, John Wiley & Sons, Ltd


Lloyd, C. D., 2010. Analysing population characteristics using geographically weighted principal components analysis: A case study of Northern Ireland in 2001. Computers, Environment and Urban Systems 34 , 389–399

Lloyd, C. D., 2011: Local models for spatial analysis. Boca Raton: CRC Press

Mather, P. M., 2004: Computer processing of remotely-sensed images: An introduction. Chichester: Wiley.

Oliver J., 1989: A survey of public interpretation and opinions in Queensland on the presenttropical cyclone warning system, Part 1: Case study of tropical cyclone Winifred and Part 2: Case study of tropical cyclone Charlie.In: Disaster Management Studies Centre, Cumberland College of Health Sciences, East Lidcombe, Sydney, New SouthWales

- Pichón, F. and Uquillas, J., 1997. Agricultural Intensification and Poverty Reduction in Latin America's Risk-Prone Areas: Opportunities and Challenges. *Journal of Developing Areas*. 31, 479-514.
- Pourtaheri M. ,SojasiQidari H , Sadeghloo T (2012).Comparative Assessment of Ranking Methods for Natural Disasters in Rural Regions (Case Study: Zanjan Province), *Journal of Rural Research*, 2(3), 31-54
- Scott, C.D., Litchfield, J.A.,1994: Inequality, Mobility and the Determinants of Income among the Rural Poor in Chile, 1968-1986. London, United Kingdom: London School of Economics
- Sivakumar , V.K. , 2005 : Impacts of Natural Disasters in Agriculture,Rangeland and Forestry: an Overview.In: Natural Disasters and Extreme Events in Agriculture, Springer ,1-22.
- Smith Keith , 2001:Environmental hazards, third edition by Rutledge England.
- Spielman, S. E., Thill, J.-C., 2008. Social area analysis, data mining, and GIS. Computers, Environment and Urban Systems, 32, 110–122
- Tobias, M., Bhattacharya, A., White, P., 2008. Cross classification of the New Zealand population by ethnicity and deprivation: Trends from 1996 to 2006. Australian and New Zealand Journal of Public Health, 32, 431–436
- Wheeler, D., Tiefelsdorf, M., 2005. Multicollinearity and correlation among local regression coefficients in geographically weighted regression. *Journal of Geographical Systems*, 7, 161–187.
- Wold, S., K. Esbensen, et al., 1987 . "Principal component analysis." *Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems* 2(1-3): 37-5



پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی