

ارزیابی توانمندی‌ها و کاربری‌های ژئومورفوسایت‌ها (مطالعه موردی: ژئومورفوسایت‌های شهرستان طبس)

محمد سلمانی* - استادیار دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
حسنعلی فرجی سبکبار - دانشیار دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
محمد ناظمی - استادیار گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد طبس
حسن ارجوی - کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی توریسم دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

پذیرش مقاله: ۹۳/۰۳/۳۰ تأیید نهایی: ۹۳/۰۵/۲۵

چکیده

ژئوتوریسم، شاخهٔ جدیدی از گردشگری مسئولانه است که با هدف حفاظت از میراث زمین و همچنین ارتقای سطح زندگی جوامع بومی، حفظ ارزش‌های فرهنگی و توسعهٔ اقتصادی، بر استفاده از جاذبه‌های زمین‌شناسختی و ژئومورفولوژیکی تأکید می‌کند. مجموعهٔ میراث ژئومورفولوژیکی، فرهنگی و گردشگری ژئوتوریسم، در قالب مکان‌هایی نمایان شده است که به عنوان ژئومورفوسایت از آن‌ها یاد می‌شود. شهرستان طبس با وجود فرایندهای مختلف زمین‌شناسی، مجموعهٔ متنوعی از این ژئومورفوسایت‌ها را در خود جای داده است. به‌دلیل قوارگیبری منطقهٔ طبس بین دو ناحیهٔ بزرگ کویری ایران (دشت لوت و کویر مرکزی)، مناطق کویری و بیابانی طبس تقریباً در حاشیهٔ قرار گرفته است و بسیاری از توانمندی‌های آن هنوز به صورت علمی بررسی نشده است. در این پژوهش، بنا بود تا ضمن شناسایی مناطق ژئوتوریستی شهرستان، ژئومورفوسایت‌های منطقهٔ نیز شناسایی شوند؛ براساس مجموعه‌ای از ارزش‌های علمی، حفاظتی و گردشگری ارزیابی شوند و سپس با توجه به کاربری‌های مناسب با گردشگری و توسعهٔ اقتصادی، اولویت‌بندی شوند. پس از جست‌وجوهای گوناگون، درنهایت ۵۰ ژئومورفوسایت برای ارزیابی انتخاب شدند و از بین روش‌های ارزیابی ژئومورفوسایت‌ها، از روش GAM استفاده شد. در ارزیابی کلی ژئومورفوسایت‌های شهرستان، ژئومورفوسایت‌های «رخنمون‌های درنجال»، «سرزمین سیاه» و «مخروط‌افکنه‌های شتری»، به عنوان بهترین ژئومورفوسایت‌ها برای کاربری‌های ژئوتوریستی تعیین شدند و می‌توان آن‌ها را به عنوان یک کالای اقتصادی به گردشگران ارائه کرد. ضمن اینکه حفاظت میراث زمین در طبس به صورت بالفعل صورت نمی‌گیرد و از منظر اقتصادی و اجتماعی، جامعهٔ بومی طبس، سهم بسیار اندکی در گردشگری دارد.

کلیدواژه‌ها: روش ارزیابی GAM، ژئوتوریسم، ژئومورفوسایت، شهرستان طبس، گردشگری پایدار.

مقدمه

از دیدگاه حفاظتی، به ژئوتوریسم به عنوان نوعی از اکوتوریسم توجه می‌شود که بر ژئومورفوسایت‌ها تأکید دارد و از دیدگاه اقتصادی، به میراث زمین به عنوان پایه‌ای برای توسعه گردشگری توجه می‌شود (رینارد، ۲۰۰۸: ۲۲۶). مجموعه میراث ژئومورفولوژیکی، فرهنگی و گردشگری ژئوتوریسم در قالب مکان‌های نمایان شده است که با عنوان ژئومورفوسایت از آن‌ها یاد می‌شود. ژئومورفوسایت‌ها، لندرم‌هایی بودند که در طی زمان، به خاطر آگاهی‌های انسانی، ارزش‌های خاصی یافتند؛ بنابراین، زمینه لازم برای توسعه فعالیت‌های گردشگری و زیرساخت‌های ویژه در یک منطقه را ایجاد کردند و در شناخت تاریخ زمین‌شناسی و تکامل زمین‌شناسی یک منطقه حائز اهمیت بسیارند (فیولت و سورپ، ۲۰۱۱؛ کومانسکو و دیگران، ۲۰۱۱؛ ۱۱۶؛ لوگری و دیگران، ۲۰۱۱؛ ۲۰۱۲؛ پانیزا، ۲۰۱۱) و از نظر ابعاد، به صورت منفرد یا متنوع و بزرگ‌مقیاس یا کوچک‌مقیاس هستند (پریرا و دیگران، ۲۰۰۹؛ ۱۸۱؛ ۲۰۰۷؛ ۱۵۹). تخریب محیط زیست و منابع طبیعی و همچنین افزایش فشار صنعتی و اقتصادی بر زندگی انسان، بر انگیزه بشر برای زندگی در میان طبیعت و عوارض طبیعی تأثیر بسزایی گذاشت و تقاضا را برای گردشگری محیط‌های طبیعی و زمین‌شناختی افزایش داده است. افزایش بازدیدکنندگان از جاذبه‌های ژئوتوریستی، بهنوبه خود، تهدیدهایی را برای ژئومورفوسایت‌هایی که درجه آسیب‌پذیری بالایی دارند، ایجاد کرده است (سای‌لنك و دیگران، ۲۰۱۰؛ ۱). این تهدیدها و درجه آسیب‌پذیری متفاوتی که میراث ژئوتوریسم است، موجب شده است تا مسئله حفاظت از این میراث، به عنوان رویکردی نوین در ارزیابی‌های ژئوتوریستی مطرح شود. هردو مفهوم حفاظت زمین و میراث زمین، در سال‌های اخیر به عنوان چالش‌های جدید در پژوهش‌های ژئودیورسیتی و ژئوتوریسم مطرح شده‌اند (کارکاویل و دیگران، ۲۰۰۹: ۷۵). ارزیابی ژئومورفوسایت‌ها موضوعی است که انگیزه و علاقه جغرافیدانان سراسر دنیا به تلاش برای تمرکز بر توسعه و حفظ روش‌های ارزیابی را- که در گذشته ارائه کردن- نشان می‌دهد (کومانسکو و دیگران، ۲۰۱۱؛ ۱۱۶۴). این روش‌ها در جست‌وجوی شناسایی سایتها و مکان‌های مستعد برای توسعه ژئوتوریسم و برنامه‌ریزی گردشگری و همچنین شناسایی مکان‌هایی است که حفاظت از آن‌ها ضروری است. معیارهایی که برای ارزیابی ژئومورفوسایت‌ها به کار گرفته می‌شوند، در سه بخش ارزش‌های علمی، ارزش‌های حفاظتی و ارزش‌های گردشگری خلاصه می‌شوند. ارزش‌های علمی شامل ارزش‌های دیرینه‌شناسی، کمیابی، آگاهی، آموزشی و... است و ارزش‌های حفاظتی به وضعیت آسیب‌پذیری و مقاومت ژئومورفوسایت‌ها و همچنین تمهدیدهای حفاظت اداری مربوط می‌شود. ارزش‌های گردشگری نیز به ارزش زیبایی، قابلیت دید و امکانات و خدمات گردشگری ارتباط پیدا می‌کنند. این سه ارزش با یکدیگر مرتبط‌اند و تقویت‌کننده یکدیگرند؛ بهنحوی که ارزش علمی، معرف ویژگی و ارزش ذاتی یک ژئومورفوسایت است. ایران از کشورهای مستعد و توانمند در زمینه ژئوتوریسم محسوب می‌شود. در این میان، شهرستان طبس، به عنوان یکی از مستعدترین مناطق زمین‌شناختی و ژئومورفولوژیکی در کشور شناخته می‌شود؛ بنابراین، بررسی آن از منظر ژئوتوریستی، ضرورت دارد. با توجه به گستردگی پژوهش‌های ژئوتوریستی در سطح بین‌المللی، بهویژه در کشورهای اروپایی- که بیشتر در سطح مناطق حفاظت‌شده صورت گرفته است- در این پژوهش بنا بر این گذاشتیم که با شناسایی توانمندی‌های ژئوتوریستی مناطق مستعد و همچنین شناسایی ژئومورفوسایت‌ها و بررسی آن‌ها از نظر گردشگری، گامی در زمینه ژئوتوریسم نوین در کشور با رویکرد حفاظتی و علمی و توسعه اقتصادی برداریم. هدف این پژوهش، ضمن بررسی توانمندی‌ها و ارزش‌های ژئوتوریستی شهرستان طبس، برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری بهینه از سرمایه‌های ژئوتوریستی به منظور شناخت خدمات مورد نیاز گردشگری در کنار این مناطق از جمله توسعه اقتصادی این شهرستان است. با توجه به موارد مذکور، این پژوهش به دنبال شناخت ژئومورفوسایت‌های مستعد برای گردشگری، شناخت وضعیت حفاظتی و ارزش‌های علمی ژئوتوریسم شهرستان طبس و برنامه‌ریزی مطلوب ژئوتوریستی برای کاربری بهینه از ژئومورفوسایت‌هاست.

مبانی نظری

ژئوتوریسم یا ژئومورفوتوریسم، رویکردی است که بر استفاده از اشکال و توانمندی‌های زمین‌شناختی و ژئومورفولوژیکی با محوریت حفاظت از این اشکال و عوارض استفاده پایدار از آن‌ها تأکید دارد (رینارد، ۲۰۰۸: ۲۲۶). همچنین این رویکرد بر حفظ هویت جغرافیایی مکان تأکید می‌کند (رنجر، ۱۳۸۳: ۸۸) و به روابط بین ژئوتوریسم و عناصر، یادمان‌ها، نشانه‌های تاریخی و فرهنگی (پانیزا و پیاستته، ۲۰۰۸؛ دی وائله و ملیس، ۲۰۰۹: ۵۷۸) و تأثیرهای متقابل ژئومورفولوژی و گردشگری اشاره می‌کند (میهای و دیگران، ۱۳۴: ۲۰۰۹) که درنهایت با فعالیتها و بهره‌برداری‌های انسان و تاریخ زندگی انسان مرتبط می‌شود (سرانو و گونزالس تربوا، ۲۰۱۱: ۲۹۶؛ بنابراین، ترکیبی از کالاهای گردشگری، خدمات و زیرساخت‌هایی است که در ناحیه‌ای خاص برای ترویج میراث زمین و عناصر فرهنگی مرتبط با آن تعریف می‌شود (رینارد، ۲۰۰۸: ۲۲۵). از تنوع عوارض و اشکال زمین‌شناختی و ژئومورفولوژیکی با عنوان ژئودیورسیتی یاد می‌شود که عموماً مربوط به عناصر میراث زمین مانند ژئومورفوسایتها و عناصر ژئومورفولوژیکی است (بوروسچی و دیگران، ۲۰۱۱: ۱۳۱) و با بیودیورسیتی ارتباطی مستقیم دارد (فاسولاس و دیگران، ۲۰۰۷). ژئودیورسیتی، به طور کلی سه ارزش اصلی ذاتی، اکولوژیکی و انسان‌شناختی دارد (ماران، ۲۰۱۰: ۵۰-۵۱). حفاظت، یکی از شاخص‌ها و ارزش‌های اساسی در ژئوتوریسم محسوب می‌شود. حفاظت میراث زمین، با شناخت ارزش ذاتی ژئومورفوسایتها در تعامل است (راور و دیگران، ۱۳۳: ۲۰۱۱). به عقیده هوز، هیچ اختلافی بین حفاظت زمین و گردشگری وجود ندارد (هوز، ۲۰۱۱: ۴).

در حوزه ارزیابی ژئوتوریسم و ژئومورفوسایتها، مطالعه‌های متعددی در سطح داخلی و خارج صورت گرفته است. از جمله مهم‌ترین پژوهش‌ها می‌توان به کار پرالونگ (۲۰۰۵) اشاره کرد که به معرفی و ارزیابی ژئومورفوسایتها منطقه چامونیکس مونت‌بلانس سوئیس پرداخته است و با ارائه یک مدل ارزیابی و تعیین معیارهای استاندارد ژئوتوریسم، ژئوتوریسم منطقه را بررسی کرده است. پریرا و دیگران (۲۰۰۷) در مقاله‌ای به ارزیابی قابلیت ژئومورفوسایتها گردشگری در پارک ملی مونتشینو در پرتغال پرداخته‌اند. در مقاله‌ای داشده، ۱۵۴ سایت و دریاچان، از بین آن‌ها ۲۶ ژئومورفوسایت انتخاب شدند و قابل سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری شناخته شدند. پریرا در پایان نتیجه می‌گیرد که باید در ارزیابی ژئومورفوسایتها، ارزش‌های علمی، مکمل و مدیریتی به صورت ترکیبی بررسی شود. فیولت و سورپ (۲۰۱۱) برای پارک ملی پیرنے فرانسه، یک روش ارزیابی در قالب ارزش‌های مدیریتی و گردشگری تعریف کردن و ۳۰ ژئومورفوسایت را از این منظر ارزیابی کردند. درنهایت، نویسنده‌گان پیشنهاد می‌کنند که باید سازمان‌ها و نهادها در حفاظت و معرفی پارک ملی، بیش از گذشته تلاش کنند. همچنین ووجیسیچ و دیگران (۲۰۱۱) روشی برای ارزیابی ژئومورفوسایتها برای کوههای فروسکاگورا در کشور صربستان برای ۱۴ ژئومورفوسایت طراحی کردند. در این کار، آن‌ها ۲۷ معیار را برای ارزیابی انتخاب کردند و به این نتیجه دست یافتند که ژئومورفوسایتها این کوهستان از نظر ارزش علمی و در کل، از نظر ارزش‌های اصلی بسیار ارزشمندند، اما به لحاظ ارزش‌های کارکردی وضعیت خوبی ندارند و باید بیشتر در زمینه این ارزش‌ها و توسعه پایدار فعالیت کرد. در همین سال، فاسولاس و دیگران (۲۰۱۱) مدلی کمی برای ارزیابی ژئومورفوسایتها را پیلوپارک سیلوریتیس یونان براساس شش معیار اصلی تدوین کردند. آن‌ها در نتیجه‌گیری خود، روش کمی ارائه‌شده را شیوه‌ای درجهت ارزیابی مدیریت ژئوتوریسم و حفاظت از آن و ژئوپارک و ابزاری قوی برای ارزیابی پتانسیل‌های ژئوتوریستی از قبیل ارزش‌های علمی، فرهنگی، آموزشی و گردشگری قلمداد می‌کنند. در میان پژوهش‌های داخلی، از نخستین کارها در حوزه ارزیابی ژئومورفوسایتها می‌توان به پژوهش مختاری (۱۳۸۹) در ارزیابی ژئومورفوسایتها حوضه آسیاب خرابه در شمال غرب کشور اشاره کرد. وی با استفاده از معیارهای مهم ژئوتوریسم - که از روش پرالونگ گرفته شده است - ژئومورفوسایتها را بررسی کرده و به این نتیجه دست یافته است که این مکان‌ها قابلیت تبدیل شدن به مکان ژئوتوریستی را دارند؛ بنابراین، ارزش این مکان‌ها از نظر علمی بالاست، اما عواملی همچون

دشواری دسترسی، نوع نگرش مردم به گردشگری، بی‌توجهی به اکوتوریسم، نحوه گذران اوقات فراغت و دوری از مراکز جمعیتی سبب شده است تا سایر ارزش‌های این منطقه پایین باشد. در همین راستا، نویسنده‌گان مختلف به ارائه روش‌های دیگری پرداخته‌اند که محققان مختلف بین‌المللی آن‌ها را ارائه کرده بودند که از جمله آن‌ها می‌توان به پژوهش مقصودی و دیگران (۱۳۹۱) در ارزیابی ژئومورفوسایت‌های پارک ملی کویر و مقیمی و دیگران (۱۳۹۱) در ارزیابی ژئوتوریسم آزادراه قم-کاشان- که در آن برای اولین بار از روش پریرا استفاده شد- اشاره کرد. مجموعه پژوهش‌های فوق بیانگر بررسی و استفاده از شاخص‌های علمی، حافظتی و گردشگری در ارزیابی ژئومورفوسایت‌ها بوده است. درمجموع، پژوهش‌ها به مسئله حفاظت توجه بیشتری داشته‌اند.

روش پژوهش

این پژوهش، کاربردی است و در آن، از روش توصیفی- تحلیلی شاخص‌ها و ارزش‌های روش ارزیابی ژئوتوریسم برای تحلیل اطلاعات استفاده شده است. برای تهیه داده‌ها و اطلاعات، از روش‌های پیمایشی و میدانی و همچنین بررسی منابع کتابخانه‌ای، بر پایه روش ارزیابی ژئوتوریسم GAM استفاده کردیم. تحلیل و ارزیابی نهایی پژوهش را بر پایه شاخص‌ها و ارزش‌های روش ارزیابی GAM- که یکی از روش‌های ارزیابی ژئوتوریسم است- بنا نهادیم. در ابتدای کار، جاذبه‌های ژئوتوریستی شهرستان را بررسی و ۵۰ ژئومورفوسایت را برای ارزیابی انتخاب کردیم. سپس ارزش‌ها و معیارهای مورد بررسی را به روش GAM تعیین کردیم و هریک از ژئومورفوسایت‌ها را از منظر این ارزش‌ها ارزیابی کردیم. درنهایت، با ترکیب ارزش‌ها و معیارها، اولویت‌بندی ژئومورفوسایت‌ها از منظر شاخص‌های علمی، حافظتی و گردشگری صورت گرفت و برنامه‌ریزی و کاربری ژئوتوریستی هریک از ژئومورفوسایت‌ها معین شد. از آنجاکه ژئوتوریسم و ارزش‌های آن، اغلب تخصصی و علمی‌اند، ارزیابی آن از طریق عامه مردم دشوار است. به همین‌دلیل، ارزیابی ارزش‌ها و معیارها، به کمک کارشناسان مربوط به پژوهش (عموماً در حوزه‌های ژئومورفولوژی، زمین‌شناسی و گردشگری) و از طریق مطالعه‌های کتابخانه‌ای، بازدیدهای میدانی و مصاحبه با جامعه بومی صورت گرفت. درواقع، از منظر قلمرو، جامعه آماری، شامل کل ژئومورفوسایت‌های شهرستان طبس است که از میان آن‌ها ۵۰ ژئومورفوسایت به عنوان نمونه انتخاب شدند. از منظر روش ارزیابی نیز جامعه آماری پژوهش میدانی، شامل تمامی افراد و محققان مربوط به گردشگری و ژئومورفولوژی (ژئوتوریسم) است که سابقه پژوهش در حوزه ژئوتوریسم را دارند یا به ژئوتوریسم شهرستان طبس اشراف دارند. همچنین افراد بومی مرتبط با ژئومورفوسایت‌ها اعم از روستاهای مجاور و مسئولان اداره سایت‌ها نیز در پژوهش مشارکت دارند. نمونه آماری نیز با توجه به محدودیت‌های پژوهش، از افرادی با سابقه پژوهش در ژئوتوریسم و همچنین آشنا با ژئوتوریسم شهرستان طبس انتخاب شد. بیشتر ارزش‌ها، از طریق بازدیدهای میدانی و بررسی ژئومورفوسایت‌ها از نزدیک و بررسی کارشناسی، مصاحبه با مردم بومی و راهنمای شهرستان طبس صورت گرفت و بخش کمی از ارزش‌ها نیز از طریق مطالعه‌های کتابخانه‌ای ارزیابی شد. البته برای ارزیابی نهایی ارزش‌ها، مطالعه‌های کتابخانه‌ای و میدانی ترکیب شدند و ارزش نهایی ژئومورفوسایت‌ها از این طریق، تعیین شد.

در چند دهه گذشته، روش‌های مختلفی برای ارزیابی ژئومورفوسایت‌ها ارائه شده است و در همه این روش‌ها، معیارها و ارزش‌های مختلفی برای ارزیابی توانمندی‌های ژئوتوریسم مناطق، تعیین شده است. هر روش، به کمک کارشناسان مختلف ژئوتوریسم و علوم زمین و ارتشیابی شد و پس از طی مراحل مختلف، درنهایت، به عنوان یک روش ارزیابی ارائه شد. با توجه به تنوع طبیعی شهرستان طبس، نیاز به استفاده از روشی بود که مجموعه متعددی از ارزش‌ها را مطالعه کند. از میان روش‌های مختلفی که برای ارزیابی ژئومورفوسایت‌ها به کار رفته است، در این پژوهش از روش جدید

ارزیابی GAM^۱ استفاده شده است. GAM روش ارزیابی فیزیکی ژئومورفوسایت‌های اولیه برای سنجش برنامه‌ریزی و مدیریت پایدار مکان‌های دارای میراث طبیعی و تبدیل آن‌ها به مقاصد گردشگری است. این روش، از دو گروه ارزش‌های اصلی و ارزش‌های مکمل تشکیل شده است. ارزش‌های اصلی شامل ارزش علمی / آموزشی، ارزش زیبایی‌شناختی و ارزش حفاظتی است. ارزش‌های مکمل از دو گروه ارزش‌های کارکرده و گردشگری تشکیل شده‌اند. ارزش گردشگری، سطح فعلی تأسیسات، امکانات و وضعیت کلی گردشگری را نمایش می‌دهد (ووجیسیچ و دیگران، ۲۰۱۱: ۳۶۶). در مجموع، ۱۲ زیرشاخص در ارزش‌های کلی و اصلی و ۱۵ زیرشاخص در بخش ارزش‌های مکمل برحسب اهمیت از صفر تا یک ارزیابی می‌شوند.

جدول ۱. ارزش‌های اصلی و مکمل روش ارزیابی GAM

ارزش‌های اصلی					
ارزش‌های علمی و آموزشی					
۱	۰/۷۵	۰/۵	۰/۲۵	*	شاخص
پدیده نادر	بین‌المللی	ملی	منطقه‌ای	معمولی	کمیاب‌بودن
خیلی بالا	بالا	متوسط	ضعیف	وجود ندارد.	نمایانگری‌بودن
نمونه خوب از فرایندها، اما برای توضیح گردشگران عادی آسان است.	سطح متوسط از فرایندها، اما برای توضیح گردشگران عادی آسان است.	نمونه خوب از فرایندها، اما برای توضیح گردشگران عادی دشوار است.	سطح متوسط از فرایندها، اما برای توضیح گردشگران عادی دشوار است.	وجود ندارد.	سطح تفسیر و آگاهی
- انتشارات بین- المللی	انتشارات ملی	انتشارات منطقه‌ای	انتشارات محلی	وجود ندارد.	میزان شناخت و آگاهی از علوم زمین و خود سایت
ارزش‌های زیبایی و منظره دید					
بیش از ۶ نقطه	بین ۴ تا ۶ نقطه	۲ تا ۳ نقطه	یک نقطه	بدون نقطه دید	تعداد نقاط دید
بزرگ		متوسط		کوچک	سطح ظاهری / مساحت
خیلی بالا	بالا	متوسط	کم	خیلی کم	طبیعت و منظره اطراف
مناسب		متوسط (معمولی)		نامناسب	تناسب محیطی سایت
ارزش‌های حفاظتی					
بدون آسیب	آسیب کم	آسیب متوسط (اشکال اصلی حفظ شدنده)	آسیب بالا (ناشی از فرایندهای طبیعی)	کاملاً آسیب‌دیده (به وسیله فرایندهای انسانی)	وضعیت فعلی
بین‌المللی	ملی	منطقه‌ای	محلي	نیست	سطح حفاظت
نیست	کم (ممکن است از طریق فعالیت‌های انسانی صدمه بییند)	متوسط (ممکن است از طریق فرایندهای طبیعی و انسانی صدمه بییند)	بالا (ممکن است به راحتی صدمه بییند)	برگشت‌ناپذیر (امکان از دست رفتن کل پدیده)	سطح آسیب‌پذیری
بیش از ۵۰ نفر	۵۰-۲۰ نفر	۲۰-۱۰ نفر	۰-۱۰ نفر	صفرا	تعداد مناسب بازدیدکنندگان
ارزش‌های مکمل					
ارزش‌های عملکردی					
خیلی بالا (اتوبوس)	بالا (با ماشین)	متوسط (با استفاده از دوچرخه و دیگر ایزار که با قدرت انسان حرکت می‌کند)	پایین (با پای پیاده و ایزار مخصوص و کارشناسان راهنمای تور)	خارج از دسترس	دسترسی
بیش از ۶ مورد	۶ تا ۴ مورد	۳ تا ۲ مورد	۱ مورد	نیست	ارزش‌های طبیعی مکمل
بیش از ۶ مورد	۶ تا ۴ مورد	۳ تا ۲ مورد	۱ مورد	نیست	ارزش‌های مربوط به تکامل انسان
کمتر از ۵ کیلومتر	بین ۵ تا ۲۵ کیلومتر	بین ۲۵ تا ۵۰ کیلومتر	بین ۵۰ تا ۱۰۰ کیلومتر	بیشتر از ۱۰۰ کیلومتر	نزدیکی به مراکز انتشار
بین‌المللی	ملی	منطقه‌ای	محلي	نیست	نزدیکی به شبکه ارتاطی مهم
خیلی بالا	بالا	متوسط	کم	نیست	ارزش‌های عملکردی دیگر

ادامه جدول ۱. ارزش‌های اصلی و مکمل روش ارزیابی GAM

ارزش‌های گردشگری					
سطح تبلیغات و ترویج	نیست	محلی	منطقه‌ای	ملی	بین‌المللی
بازدیدهای سازمان‌یافته	نیست	کمتر از ۱۲ بار در سال	۱۲ تا ۲۴ بار در سال	۴۸ تا ۲۴ بار در سال	بیشتر از ۴۸ بار در سال
نزدیکی به مرکز بازدیدکنندگان	بیشتر از ۵۰ کیلومتر	۵۰ تا ۲۰ کیلومتر	۱ تا ۵ کیلومتر	کمتر از ۱ کیلومتر	کمتر از ۱ کیلومتر
قالب‌های تفسیری و آگاهی	نیست	کیفیت کم	کیفیت متوسط	کیفیت بالا	کیفیت خیلی بالا
تعداد بازدیدکنندگان	نیست	کم (کمتر از ۵ هزار نفر)	متوسط (۵ تا ۱۰ هزار نفر)	بالا (۱۰ تا ۱۰۰ هزار نفر)	خیلی بالا (بیشتر از ۱۰۰ هزار نفر)
زیرساختمان‌های گردشگری	نیست	کم	متوسط	بالا	خیلی بالا
خدمات راهنمایی تور	نیست	کم	متوسط	بالا	خیلی بالا
سرویس‌های شبانه‌روزی	بیشتر از ۵۰ کیلومتر	۵۰ تا ۲۵ کیلومتر	۵ تا ۱۰ کیلومتر	کمتر از ۵ کیلومتر	کمتر از ۱ کیلومتر
سرویس رستوران	بیشتر از ۲۵ کیلومتر	۲۵ تا ۱۰ کیلومتر	۱ تا ۵ کیلومتر	۱ تا ۵ کیلومتر	کمتر از ۱ کیلومتر

منبع: Vujicic et al; 2011

درنهایت، همه ارزش‌ها محاسبه و با یکدیگر جمع می‌شود و ارزش نهایی به دست می‌آید:


- ارزش نهایی = ارزش‌های اصلی + ارزش‌های مکمل؛

- ارزش‌های اصلی = ارزش علمی + ارزش زیبایی + ارزش حفاظتی؛

- ارزش‌های مکمل = ارزش عملکردی + ارزش گردشگری.

در این پژوهش، شاخص‌های ژئوتوریستی مورد اشاره درباره ژئومورفوسایت‌های شهرستان طبس ارزیابی می‌شود.

شهرستان طبس در شمال شرقی استان خراسان جنوبی قرار دارد. از نظر موقعیت طبیعی، در دامنه غربی ارتفاعات کوه شتری در حاشیه کویر نمک واقع شده است و از شمال به کویر نمک، شهرستان کاشمر و برداشکن از توابع استان خراسان رضوی، از جنوب به کویر لوت و استان کرمان، از شرق و شمال شرق به استان خراسان جنوبی و از غرب به شهرستان‌های بافق و اردکان در استان یزد محدود می‌شود (جوهری، ۱۳۸۸: ۵۰). از شهرستان طبس به عنوان بهشت زمین‌شناسی ایران یاد می‌شود. از مهم‌ترین جاذبه‌های ژئوتوریستی این شهرستان می‌توان به منطقه کال سردر و کال جنی اشاره کرد که مجموعه لندرفم‌هایی رودخانه‌ای و دره‌ای را در خود جای داده است (تقوایی و دیگران، ۱۳۸۸: ۴۸؛ ناظمی و مغزی نجف‌آبادی، ۱۳۸۶-۵۶۰: ۵۶۲). چاله طبس با دربرداشتن دریاچه روح مرغوم و عوارض کویری و نمکی، بخش ویژه‌ای از سرمایه‌های ژئوتوریستی طبس را دربرگرفته است (ساجدی‌فر، ۱۳۸۶: ۱۱۲). پناهگاه حیات وحش نایبندان به عنوان یک منطقه اکولوژیکی، با داشتن عوارض و لندرفم‌های آتش‌نشانی، چشم‌های آب گرم و غارها، از دیگر مناطق ژئوتوریستی مهم شهرستان طبس محسوب می‌شود (کاظم‌پور، ۱۳۹۰: ۱۰). منطقه درنجال نیز یکی از مناطق مهم ژئوتوریستی طبس است که در قسمت شمالی شهر طبس قرار دارد و منطقه‌ای با پدیده‌ها و رخمنهای زمین‌شناسی همانند دایک است. از ویژگی‌های بارز آن، وجود هفت‌هزار متر رسوبات تهشیش‌شده بدون ناپیوستگی است که در منطقه خاورمیانه بی‌نظیر است. وجود کویرها و بیابان‌ها نیز ویژگی بارز شهرستان طبس محسوب می‌شود. تپه‌های ماسه‌ای، برخان‌ها، ریگ‌های بزرگ مثل ریگ شتران و همچنین نیکاه، دق‌ها، عوارض نمکی و... بخشی از جاذبه‌های کویری و بیابانی شهرستان طبس محسوب می‌شود (تریکار، ۱۳۶۹: ۴۱۵؛ پژوهش‌های میدانی، ۱۳۹۱).



نقشهٔ ۱. موقعیت جغرافیایی شهرستان طبس

منبع: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، تهییه: نگارندگان

بحث و یافته‌ها

پس از بررسی توانمندی‌های ژئوتوربیسم شهرستان طبس و معیارهای ارزیابی ژئومورفوسایت‌ها، در این مرحله، ژئومورفوسایت‌های شهرستان پس از انتخاب، از طریق روش GAM ارزیابی شد و ارزش‌های علمی، حفاظتی و گردشگری آن‌ها معین شد. با بررسی‌های میدانی و کتابخانه‌ای و ارزیابی شرایط مختلف ژئوتوربیستی، درنهایت، ۵۰ عارضهٔ زمین‌شناختی و ژئومورفولوژیکی در قالب ژئومورفوسایت، برای ارزیابی انتخاب شدند. در انتخاب این عوارض، به معیارهایی همچون شناخته‌شده‌بودن در سطوح منطقه‌ای و ملی، بکریودن و داشتن جذابیت خاص، کمیاب‌بودن، تنوع ژئومورفولوژیکی، ویژگی‌های کلی منطقه‌ای که عارضه در آن قرار دارد، مسائل فرهنگی و تاریخی و میزان اهمیت آن‌ها از نظر گردشگری توجه شد؛ بنابراین، بدیهی است که تعداد عوارض بیش از ۵۰ مورد است، ولی تعدادی از این عوارض، به دلیل ناشناخته‌بودن، تکراری‌بودن، وجود عارضه مشابه در مکان دیگر و نداشتن تنوع خاص و همچنین در بعضی موارد، نبود اطلاعات کافی و نبود دسترسی به آن عارضه، کنار گذاشته شدند. ضمن اینکه در برابر یک نوع عارضه، چند عارضه مشابه در مناطق دیگر وجود داشتند که در این شرایط، بهترین و گویاترین آن‌ها برای ارزیابی انتخاب شدند. پنجاه ژئومورفوسایت برگزیده شهرستان طبس، در قالب ۲۷ معیار به روش GAM ارزیابی شدند. فهرست ژئومورفوسایت‌ها به همراه نتایج نهایی ارزیابی معیارها برای شهرستان طبس در جداول ۲ و ۳ نمایش داده شده است. در اینجا از حروف انگلیسی برای نمایش میزان ارزش ژئومورفوسایت‌ها استفاده شده است:

$$\text{A} = 1 ; \text{B} = 5/75 ; \text{C} = 5/25 ; \text{D} = 5/100 ; \text{E} = \text{صفر}$$

جدول ۲. ارزیابی ارزش‌های اصلی ژئومورفوسایت‌های شهرستان طبس

ردیف‌گذاری	آبیابی پیوسته	نمایه کنترل	ویژگی فعالی	تئسیس محیطی	زیبایی و منظره			علمی و آموزشی			
					پیوند	پیوند	آبیابی	سطوح تفصیل	پیوند	آبیابی	
A	B	E	A	A	B	A	A	A	B	E	ریگ شتران
A	C	E	A	A	C	A	A	B	C	E	رخمنو های زغال سنگ مزینو
B	E	C	A	C	C	A	A	C	A	E	مخروط‌افکنهای شتری
A	A	D	A	A	C	A	A	B	A	D	سرزینی سیاه
A	B	E	A	A	B	A	A	A	A	B	رخمنو های سنگی درنجال
A	C	E	B	A	A	B	B	C	B	E	دریاچه روح مرغوم
A	A	E	A	A	D	A	A	B	A	D	کوه‌های کهارتانع قديعی کلمرد
A	C	E	A	C	C	A	B	B	A	E	بدلندهای تاقدیس مردون شاه
B	D	E	B	C	B	E	C	C	A	E	واربیزه سنگی زرگ
A	A	D	A	E	C	A	C	D	C	E	دره کانیونی کریت
A	B	E	B	C	C	C	B	C	A	E	نیکاههای جوخواه
C	D	E	E	E	D	E	C	D	B	E	ذخیره‌گاه فسیلی سازندسردر
A	C	E	A	B	D	C	B	B	C	D	چین خودگی‌های نیوژن شتری
A	B	D	A	C	A	E	E	B	C	A	ناودیس مرتفعی علی
B	B	D	A	E	A	E	E	D	C	B	رسوبات تراوتن آب گرم مرتفعی علی
B	C	E	A	E	B	E	E	D	A	A	غار بزرگ فرسایشی سردر
A	A	E	A	C	C	E	B	B	C	B	ناودیس معلق کشته نوح
B	B	D	A	C	B	E	E	D	C	A	تئورهای جن سردر
B	B	D	A	D	A	E	D	B	B	C	آب گرم مرتفعی علی
A	D	E	A	A	C	E	A	D	D	C	ورنی صخراء در شتری
B	B	E	A	C	C	E	E	D	A	B	دودکش‌های جنی کال جنی
A	B	E	A	C	C	C	E	D	C	B	فسایش لایه زنبوری کال جنی
D	D	E	C	C	B	E	C	C	A	D	ذخیره‌گاه فسیلی مگو
A	A	E	A	C	C	E	B	C	C	B	ناودیس کال علی اصغر
B	C	D	A	A	C	E	D	B	C	B	رخمنو رگه فلورین کمر مهدی
B	A	E	A	C	B	E	B	D	C	B	مساء مزینو
B	B	D	B	C	C	E	C	D	D	D	دق ناییندان
A	A	E	A	A	C	A	B	C	A	B	ریگ دارین
A	B	D	A	C	C	C	C	B	A	B	پرتگاه گسل ناییندان
A	C	D	C	E	D	C	E	D	B	D	کراوترهای آتششانی
B	C	D	B	C	A	E	D	B	A	B	آب گرم دیگ رستم
A	B	D	A	C	A	C	A	A	B	C	کوه ناییندان
B	B	D	B	E	A	E	C	D	B	D	آب گرم زردگاه
A	C	E	A	E	C	A	D	C	A	B	پیچان رودهای رودخانه سردر
A	B	E	A	C	D	E	D	C	A	B	اسارت رودخانه کال جنی
75	D	E	A	C	C	A	B	D	A	B	بدلندهای نخلک
A	C	E	A	A	B	C	C	C	B	D	دق خیرآباد
A	B	E	A	C	C	A	B	B	A	A	تپه‌های ماسه‌ای حلوان
A	A	E	A	A	B	E	B	A	A	B	دگر شبیه دارین
A	A	E	A	C	C	E	B	B	D	B	تاقیس خوابیده راهدار
A	A	E	A	C	B	E	C	B	A	B	تاقیس جفری
A	A	E	A	C	B	E	B	B	C	B	تاقیس جبهه‌ای مزینو
A	B	E	A	C	B	E	B	D	C	E	پنجه‌های فرسایشی کلمرد
A	B	E	A	C	C	C	B	C	B	E	اشکال اتو مانند کلمرد
A	C	E	A	A	B	E	C	B	A	C	آبشار تفتون
D	E	C	B	C	B	E	B	E	C	B	تخت دیو پروده
D	C	E	B	D	C	E	C	E	A	B	غار جهنم عشق آباد
A	C	E	A	C	D	E	B	A	B	D	کوچه‌های فرسایشی مزینو
C	D	D	C	D	C	C	D	A	B	E	معدن تراوتن پروده
A	C	E	A	C	D	E	B	A	C	D	افق گونیاتیت سازنده شبیشتو

منبع: یافته‌های پژوهش

جدول ۳. ارزیابی ارزش‌های مکمل ژئومورفوسایت‌های شهرستان طبس

دستوران	رسویس‌ها	خدمات تور	نیزه‌ها	بلندگان	عمکلردی										ج					
					گردشگری	بلندگان	قلب	فسیلی	مکزید	بازدید	سازمانی	تپیقات	عملکردی	شکافات	مکزید	انتشار	ارزش انسانی	ارزش فیض	ارزش پیغم	ارزش
E	E	D	D	C	B	E	C	C	D	C	D	E	D	C						ریگ شتران
E	D	C	C	C	C	D	C	B	C	B	E	D	A							رخمنون‌های زغال سنگ مزینو
C	B	E	E	D	B	C	D	B	D	C	B	E	D	A						مخروطافکنه‌های شتری
E	E	D	D	D	A	E	D	C	D	D	E	E	B	B						سرزمین سیاه
E	E	D	D	D	B	D	E	D	D	D	E	B	A							رخمنون‌های سنگی درنجال
D	C	D	D	D	C	C	D	D	D	D	B	E	C	B						دریاچه روح مرغوم
E	E	D	E	C	A	E	D	E	E	C	D	E	C	A						کوه‌های کمارتفاع قدیمی کلمرد
E	D	D	D	D	B	D	D	D	D	C	C	E	D	A						بدلدهای تاقدیس مردون‌شاه
E	C	D	C	D	C	C	D	D	D	D	B	E	C	C						واربزة سنگی زرگ
E	E	D	D	D	C	C	D	D	D	D	C	D	C	C						دره کانیونی کربت
C	C	D	D	D	C	C	D	D	E	C	B	E	C	A						نیکاهای جوخواه
D	C	D	E	D	D	C	D	D	E	D	B	D	E	C						ذخیره‌گاه فسیلی سازندسردر
E	E	E	E	D	C	B	D	C	D	B	B	D	D	A						چین خودگاهی‌های نتوژن شتری
E	D	E	D	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D						نادویس مرتفعی علی
E	D	E	D	D	C	D	C	D	C	D	C	E	C	D						رسوبات تراوتن آب گرم مرضی علی
E	D	E	D	C	C	D	C	D	C	D	C	E	D	D						غار بزرگ فرسایشی سردر
E	E	E	E	D	B	E	D	E	E	C	D	E	C	A						نادویس معلق کشی نوح
E	D	E	D	D	C	D	C	D	C	D	C	E	D	D						تپوه‌های جن سردر
E	D	D	D	C	C	D	C	B	D	D	C	D	C	D						آب گرم مرتفعی علی
E	D	E	E	D	C	D	D	D	E	C	C	E	E	A						ورنی صحراء در شتری
E	D	E	E	D	D	D	D	D	D	D	C	E	D	C						دودکش‌های جنی کال جنی
E	D	E	E	D	B	D	D	D	D	C	E	D	C	D						فرسایش لایه زنبوری کال جنی
E	D	E	E	D	C	D	D	D	D	C	E	D	D	A						ذخیره‌گاه فسیلی مگو
E	E	D	D	D	B	D	D	D	D	C	E	D	D	A						نادویس کال علی‌اصغر
E	D	C	D	D	C	D	D	D	D	C	D	D	C	D						رخمنون رگه‌فلورین کمر مهدی
E	E	E	D	D	B	E	D	E	D	C	D	E	D	A						مساء مزینتو
E	E	D	E	D	C	E	D	D	E	D	E	E	E	C						دق ناییندان
E	E	D	D	C	B	E	D	C	D	D	D	E	E	C						ریگ دارین
E	E	D	D	C	B	E	D	C	D	D	D	E	E	D						پرتگاه گسل ناییندان
E	E	D	E	D	B	E	D	D	E	D	E	E	C	C						کراپرهای آتششانی
E	E	E	E	D	C	E	D	E	E	E	E	E	C	D						آب گرم دیگ رستم
E	E	D	D	C	C	E	D	C	D	D	E	E	B	B						کوه ناییندان
B	E	D	D	C	C	B	D	C	D	D	B	E	E	A						آب گرم زردگاه
B	E	C	C	D	C	B	D	D	D	D	E	E	B	C						پیچان رودهای رودخانه سردر
C	C	E	D	D	C	C	D	D	D	E	D	B	E	B						اسارت رودخانه کال جنی
E	E	E	E	D	C	C	D	D	D	D	D	E	E	D						بدلدهای نخلک
E	E	D	D	C	D	C	C	D	E	D	B	E	B	B						دق خیرآباد
E	E	C	D	C	B	E	C	C	E	D	D	E	C	C						تپه‌های ماسه‌ای حلوان
E	E	D	E	D	B	E	D	E	E	C	D	E	C	A						دگ شیبی دارین
E	E	E	E	D	A	E	D	C	E	C	D	E	D	A						تاقدیس خوابیده راهدار
E	E	E	E	D	C	E	D	D	E	D	D	E	C	C						تاقدیس جعفری
E	E	E	E	D	A	E	D	D	D	C	E	E	C	A						تاقدیس جعبه‌ای مزینو
E	E	E	E	D	A	E	D	D	E	C	D	E	C	A						پنجره فرسایشی کلمرد
E	E	E	E	D	B	E	D	E	E	C	D	E	C	A						اشکال اتو مانند کلمرد
E	D	E	D	D	B	C	D	B	D	D	B	E	B	D						آشیار تقو
E	E	E	E	D	B	E	D	E	D	D	D	E	B	A						تخت دیوبروده
E	E	E	E	D	B	E	D	D	D	C	D	E	B	A						غار جهنم عشق‌آباد
B	C	E	D	D	C	C	D	D	D	C	B	E	E	A						کوچه‌های فرسایشی مزینو
E	E	E	E	D	B	E	D	D	D	B	D	E	A	A						معدن تراوتن پروده
B	C	E	D	D	C	C	D	D	D	C	B	E	E	A						افق گویناییت سازند شیشو

منبع: نگارندگان

پس از ارزیابی، ارزش نهایی ارزش‌های اصلی و مکمل و همچنین ارزش نهایی هر ژئومورفوسایت تعیین شد که نتایج نهایی آن در جدول ۴ نشان داده شده است:

جدول ۴. ارزش نهایی ژئومورفوسایت‌های شهرستان طبس

ردیه	ژئومورفوسایت	ارزش مکمل اصلی	ارزش نهایی	ردیه	ژئومورفوسایت	ارزش مکمل اصلی	ارزش نهایی	ردیه	ژئومورفوسایت	ارزش مکمل اصلی	ارزش نهایی
۱	رخمنون‌های کوههای درنجال	۱۰/۲۵	۱۰/۲۵	۲۴	رخمنون کمر مهدی	۴/۲۵	۱۴/۵	۲۴	چین خودگی‌های شتری	۶/۷۵	۴/۲۵
۲	سرزمین سیاه	۹/۵	۹/۵	۲۴	پرتگاه گسل نایندان	۴/۵	۱۴	۲۸	برآمدگاه راهدار	۶/۷۵	۷/۷۵
۲	مخروط‌افکنهای شتری	۸	۸	۲۸	تاقدیس خوابیده راهدار	۶	۱۴	۳۰	ناآدیس معلق کشتی نوح	۷	۳/۵
۲	رخمنون‌های زغال سنگ مزینو	۹	۹	۳۰	ناآدیس معلق کشتی نوح	۴/۵	۱۳/۷۵	۳۰	اشکال اتومانند کلمرد	۵/۵	۱۳/۷۵
۵	ربیگ شتران	۸	۸	۳۰	آب گرم زردگاه	۴/۲۵	۱۳/۲۵	۳۰	پنجره فرسایشی مزینو	۵	۳/۷۵
۶	دریاچه روح مرغوم	۸	۸	۳۰	ذخیره‌گاه فسیلی مگو	۴/۵	۱۲/۷۵	۳۳	تاقدیس جعفری	۶/۷۵	۴/۲۵
۷	کوههای قدیمی کلمرد	۹	۹	۳۳	مساء مزینو	۸/۲۵	۱۲/۷۵	۳۳	تاقدیس لانه زبوروی کال جنی	۶/۲۵	۵/۲۵
۸	بدنهای مردون شاه	۸	۸	۳۶	رسبابات تراوerten	۸/۲۵	۱۲/۷۵	۳۶	غار بزرگ فرسایشی سردر	۴/۵	۴/۲۵
۸	نبکاهای جوخواه	۷	۷	۳۶	تتوههای جن سردر	۳/۷۵	۱۲/۲۵	۳۶	فرسایش لانه زبوروی کال جنی	۵/۷۵	۳/۷۵
۱۰	کوه نایندان	۱۰	۱۰	۳۶	ورنی صحراء در شتری	۷/۲۵	۱۱/۴۵	۳۶	ناآدیس مرتضی علی	۴/۵	۵/۲۵
۱۲	ربیگ دارین	۸/۵	۸/۵	۴۰	بدنهای نخلک	۷/۲۵	۱۲/۲۵	۴۰	آب گرم مرتضی علی	۴/۵	۴/۲۵
۱۲	دگرشیبی دارین	۸/۵	۸/۵	۴۰	ناآدیس کال زرد	۶/۵	۱۱/۷۵	۴۰	ناآدیس کال زرد	۵/۷۵	۴/۲۵
۱۳	دق خیرآباد	۷/۲۵	۷/۲۵	۴۳	معدان تراوerten پرووده	۶/۵	۱۱/۷۵	۴۳	غار جهنم عشق‌آباد	۵/۷۵	۳/۷۵
۱۳	آبشار تفتو	۶/۵	۶/۵	۴۴	کوچه‌های فرسایشی کلمرد	۶	۱۱/۵	۴۴	ذخیره‌گاه فسیلی سردر	۵/۷۵	۵/۲۵
۱۶	پیچان رودهای سردر	۶/۵	۶/۵	۴۵	دوکش‌های کال جنی	۷	۱۱/۵	۴۵	واریزه سنگی زرگ	۶/۲۵	۳/۷۵
۱۷	آب گرم مرتضی علی	۶/۵	۶/۵	۴۶	تخت دیو پرووده	۷	۱۱/۵	۴۶	دره کانیونی کریت	۶/۷۵	۴/۷۵
۱۷	ناآدیس جعبه‌ای مزینو	۷/۲۵	۷/۲۵	۴۷	دق نایندان	۷	۱۱/۲۵	۴۷	تاقدیس جعبه‌ای مزینو	۴/۷۵	۳/۷۵
۲۲	اسارت رودخانه کال جنی	۶	۶	۴۸	ذخیره‌گاه فسیلی سردر	۷/۲۵	۱۱/۲۵	۴۸	کراترهای آتشفسانی	۴/۲۵	۴/۲۵
۲۴	آب گرم دیگ رستم	۶/۷۵	۶/۷۵	۵۰	زمین‌شناسان به عنوان دیگر ژئومورفوسایت‌های برتر برگزیده شدند. ژئومورفوسایت‌های دریاچه روح مرغوم، کوههای کم ارتفاع	۴/۲۵	۱۱	۵۰	منبع: نگارندگان	۲/۲۵	۲/۲۵

براساس نتایج، رخمنون‌های سنگی درنجال، سرزمین سیاه و ربیگ شتران از بیشترین ارزش برخوردارند که ارزش علمی رخمنون‌های درنجال به دیرینه‌شناسی و شناخته‌شده‌بودن در سطح ملی برمی‌گردد. در مقابل، سرزمین سیاه، هم تنوع زیاد و هم اختلاف زیاد چشم‌انداز دارد و در سطح ملی هم شناخته شده است. همین شرایط را ربیگ شتران نیز دارد. البته در بخش ارزش علمی، مسئله حفاظت و نقاط دید مدنظر قرار گرفته است که ربیگ شتران و سرزمین سیاه از این نظر شرایط ایده‌آل‌تری دارند. در بخش ارزش‌های مکمل، عوارض مختلفی شرایط مساعد داشتند. دریاچه روح مرغوم، ذخیره‌گاه فسیلی مگو، واریزه سنگی زرگ، آب گرم مرتضی علی، آب گرم زردگاه، ناآدیس کال زرد و افق گونیاتیت شیشتو از نمونه‌های این ژئومورفوسایت‌ها بودند. در ارزیابی کلی، درنهایت، رخمنون‌های سنگی درنجال - که در بین زمین‌شناسان به دهانه کلوت نیز معروف است - به عنوان بهترین ژئومورفوسایت شهرستان طبس انتخاب شد و بعد از آن، سرزمین سیاه در منطقه نایندان، مخروط‌افکنهای شتری در رشته‌کوه شتری و رخمنون‌های زغال سنگ در منطقه مزینو به عنوان دیگر ژئومورفوسایت‌های برتر برگزیده شدند. ژئومورفوسایت‌های دریاچه روح مرغوم، کوههای کم ارتفاع

قدیمی کلمرد و ریگ شتران را نیز می‌توان به عنوان ژئومورفوسایت‌های برتر معرفی کرد. بیشتر این عوارض، هم ارزش علمی و هم مقیاس بزرگی دارند و به همین سبب برای فعالیت‌های گردشگری مناسب‌اند. در تحلیل کلی می‌توان گفت بیشتر ارزش ژئومورفوسایت‌ها به دلیل شرایط مطلوب علمی است و در بخش ارزش‌های مکمل، شرایط بعضًا مطلوب نبود. پس از ارزیابی کلی ژئومورفوسایت‌های شهرستان، ضرورت داشت تا یک ارزیابی کلی، با ترکیب همه معیارها و به تفکیک ارزش‌های علمی، حفاظتی و گردشگری صورت گیرد تا ارزش‌های هر ژئومورفوسایت با شیوه‌های مختلف سنجیده شود و عیار ژئوتوریستی آن‌ها آشکارتر شود. به همین دلیل، معیارهای مناسب با ارزش‌های علمی و حفاظتی و گردشگری در روش‌های مختلف جمع‌آوری شد. ارزش‌های علمی شامل جغرافیای دیرینه، نمایانگری‌بودن، کمیاب‌بودن، سطح تفسیر و آگاهی، میزان شناخت و ادراک علمی، قالب‌های تفسیری، تنوع ژئومورفولوژیکی و جذابیت آموزشی‌اند. ارزش‌های حفاظتی، عموماً معیارهای حساسیت و شکنندگی، وضعیت حفاظت، محافظت اداری، شدت استفاده، درجه مقاومت، تغییرهای قابل قبول، یکپارچگی و دست‌نخوردگی، درجه حفاظت، طبیعی‌بودن و ارتباط با مسائل انسانی و ارزش‌های گردشگری شامل کیفیت چشم‌انداز، ارتباط با مسائل فرهنگی، نقاط دید، اختلاف چشم‌انداز، تباین رنگ، طبیعت و منظرة اطراف، مساحت سایت، زیرساخت‌های گردشگری، سرویس‌های شبانه‌روزی، وضعیت تبلیغات، دسترسی، وضعیت دید، نزدیکی به راه‌های ارتباطی، راهنمایان تور، ارزش‌های اکولوژیکی و... را شامل می‌شوند. نتایج نهایی ارزیابی‌ها در جدول ۵ مشاهده می‌شود.

جدول ۵. ارزش نهایی شاخص‌های علمی، حفاظتی و گردشگری ژئومورفوسایت‌های شهرستان طبس

ردیه	ژئومورفوسایت	ارزش علمی			ارزش حفاظتی			ارزش گردشگری			ردیه
		ارزش	ردیه	ارزش	ردیه	ارزش	ردیه	ارزش	ردیه	ارزش	
۱	رخمنون‌های سنگی درنجال	۴/۵	۱	درة کانیونی کریت	۳/۲۵	۱	دریچه روح مرغم	۹/۲۵	۱	دریچه روح مرغم	۹/۲۵
۲	سرزمین سیاه	۴	۲	دگرشیسی دارین	۳	۲	رخمنون‌های زغال سنگ مزینو	۹	۲	رخمنون‌های زغال سنگ مزینو	۹
۳	دگرشیسی دارین	۳/۷۵	۲	کوه‌های کم ارتفاع کلمرد	۳	۲	مخروط‌افکنه شتری	۸/۲۵	۳	مخروط‌افکنه شتری	۸/۲۵
۳	کوه‌های کم ارتفاع کلمرد	۳/۷۵	۲	تاقدیس خوابیده راهدار	۳	۲	نیکاهای جوخواه	۷/۷۵	۳	نیکاهای جوخواه	۷/۷۵
۵	بدلندهای تاقدیس مردون‌شاه	۳/۵	۲	تاقدیس جعفری	۳	۲	ریگ شتران	۷/۵	۵	ریگ شتران	۷/۵
۵	ریگ شتران	۳/۵	۲	تاقدیس جعبه‌ای مزینو	۳	۲	دق خیرآباد	۷/۵	۵	دق خیرآباد	۷/۵
۵	پرتگاه گسل ناییندان	۳/۵	۲	کوه ناییندان	۳	۲	رخمنون‌های سنگی درنجال	۷/۲۵	۵	رخمنون‌های سنگی درنجال	۷/۲۵
۵	تپه‌های ماسه‌ای حلوان	۳/۵	۲	ریگ دارین	۳	۲	بدلندهای تاقدیس مردون‌شاه	۷	۵	بدلندهای تاقدیس مردون‌شاه	۷
۹	آب گرم دیگ رستم	۳/۲۵	۲	پرتگاه گسل ناییندان	۳	۲	سرزمین سیاه	۷	۹	سرزمین سیاه	۷
۹	تاقدیس جعبه‌ای مزینو	۳/۲۵	۲	ناویس کال زرد	۳	۲	واریزه سنگی زرگ	۶/۷۵	۹	واریزه سنگی زرگ	۶/۷۵
۹	آیشار تقو	۳/۲۵	۲	ناویس مرتفعی علی	۳	۲	پیچان رودهای سردر	۶/۷۵	۹	پیچان رودهای سردر	۶/۷۵
۱۲	ناویس مرتفعی علی	۳	۲	ناویس معلق کشتی نوح	۳	۲	آب گرم تفتو	۶/۵	۱۲	آب گرم تفتو	۶/۵
۱۲	رخمنون فلورین کمر مهدی	۳	۲	سرزمین سیاه	۳	۲	کوههای کم ارتفاع کلمرد	۶/۵	۱۲	کوههای کم ارتفاع کلمرد	۶/۵
۱۲	ناویس معلق کشتی نوح	۳	۱۴	رسوبات تراویرت مرتفعی علی	۲/۷۵	۱۲	تپه‌های ماسه‌ای حلوان	۶/۵	۱۲	تپه‌های ماسه‌ای حلوان	۶/۵
۱۲	تاقدیس خوابیده راهدار	۳	۱۴	تتورهای جن سردر	۲/۷۵	۱۲	افق گونیاتیت سازند شیشه‌تو	۶/۵	۱۲	افق گونیاتیت سازند شیشه‌تو	۶/۵
۱۲	مخروط‌افکنه شتری	۳	۱۴	آب گرم مرتفعی علی	۲/۷۵	۱۲	ریگ دارین	۶/۵	۱۲	ریگ دارین	۶/۵
۱۲	اسارت رودخانه کال جنی	۳	۱۴	فرسایش لانه‌زنیبوری کال جنی	۲/۷۵	۱۷	آب گرم مرتفعی علی	۶/۲۵	۱۲	آب گرم مرتفعی علی	۶/۲۵
۱۲	ریگ دارین	۳	۱۴	مساء مزینو	۲/۷۵	۱۷	ناویس کال زرد	۶/۲۵	۱۲	ناویس کال زرد	۶/۲۵
۱۹	غار بزرگ فرسایشی سردر	۲/۷۵	۱۴	ریگ شتران	۲/۷۵	۱۷	آب گرم زردگاه	۶/۲۵	۱۹	آب گرم زردگاه	۶/۲۵
۱۹	واریزه سنگی زرگ	۲/۷۵	۱۴	کراترهای آتش‌شنانی	۲/۷۵	۲۰	دره کانیونی کریت	۶	۱۹	دره کانیونی کریت	۶
۱۹	آب گرم مرتفعی علی	۲/۷۵	۱۴	اسارت رودخانه کال جنی	۲/۷۵	۲۰	چین خودگی نشون شتری	۶	۱۹	چین خودگی نشون شتری	۶
۱۹	کوه ناییندان	۲/۷۵	۱۴	تپه‌های ماسه‌ای حلوان	۲/۷۵	۲۰	ذخیره‌گاه فسیلی مگو	۶	۱۹	ذخیره‌گاه فسیلی مگو	۶
۱۹	پیچان رودهای سردر	۲/۷۵	۱۴	پنجره فرسایشی مزینو	۲/۷۵	۲۳	ورنی صحراء در شتری	۵/۷۵	۱۹	ورنی صحراء در شتری	۵/۷۵
۱۹	نیکاهای جوخواه	۲/۷۵	۱۴	اشکال اتومانند کلمرد	۲/۷۵	۲۴	ناویس مرتفعی علی	۵/۵	۱۹	ناویس مرتفعی علی	۵/۵
۱۹	تاقدیس جعفری	۲/۷۵	۱۴	رخمنون‌های سنگی درنجال	۲/۷۵	۲۴	رخمنون‌های سنگی درنجال	۵/۵	۱۹	رخمنون‌های سنگی درنجال	۵/۵

ادامه جدول ۵. ارزش نهایی شاخص‌های علمی، حفاظتی و گردشگری ژئومورفوسایت‌های شهرستان طبس

رتبه	ژئومورفوسایت	ارزش علمی	ارزش حفاظتی						ارزش گردشگری	ارزش
			ارزش	رتبه	ارزش	رتبه	ارزش	رتبه		
۱۹	غار جهنم عشق آباد	۱۴	۲/۷۵	مخروطافکته شتری	۲۴	۲/۷۵	آب گرم دیگ رستم	۵/۵	آب گرم دیگ رستم	۵/۵
۱۹	کوچه‌های فرسایشی کلمرد	۲۷	۲/۷۵	آیشار نقو	۲۴	۲/۵	دگرگشی دارین	۵/۵	دگرگشی دارین	۵/۵
۱۹	معدن تراورتن پروده	۲۷	۲/۷۵	رخمنون‌های زغال سنگ مزینو	۲۸	۲/۵	کوه ناییندان	۵/۲۵	کوه ناییندان	۵/۲۵
۲۹	دریاچه روح مرغوم	۲۷	۲/۵	دق خیرآباد	۲۸	۲/۵	اسارت رودخانه کال جنی	۵/۲۵	اسارت رودخانه کال جنی	۵/۲۵
۲۹	توره‌های جن سردر	۲۷	۲/۵	نیکاهای جوخاه	۲۸	۲/۵	اشکال اتومانند کلمرد	۵/۲۵	اشکال اتومانند کلمرد	۵/۲۵
۲۹	اشکال اتومانند کلمرد	۲۷	۲/۵	پیچان رودهای سردر	۳۱	۲/۵	معدن تراورتن پروده	۵	معدن تراورتن پروده	۵
۲۹	بدلندهای نخلک	۲۷	۲/۵	افق گونیاتیت سازند شیشتو	۳۱	۲/۵	تخت دیو پروده	۵	تخت دیو پروده	۵
۲۹	افق گونیاتیت سردر	۲۷	۲/۵	آب گرم زردگاه	۳۱	۲/۵	پنجره فرسایشی مزینو	۵	پنجره فرسایشی مزینو	۵
۲۹	ناودیس کال علی‌اصغر	۲۷	۲/۵	دق ناییندان	۳۱	۲/۵	تاقدیس جبهه‌ای مزینو	۵	تاقدیس جبهه‌ای مزینو	۵
۲۹	چین خودگی نتوزن شتری	۲۷	۲/۵	رخمنون فلورین کمر مهدی	۳۱	۲/۵	بدلندهای نخلک	۵	بدلندهای نخلک	۵
۲۹	رخمنون زغال سنگ مزینو	۲۷	۲/۵	بدلندهای تاقدیس مردون شاه	۳۱	۲/۵	مساء مزینو	۵	مساء مزینو	۵
۳۷	رسوبات تراورتن مرتضی علی	۲۷	۲/۲۵	دودکش‌های جنی کال جنی	۳۷	۲/۵	ذخیره‌گاه فسیلی سردر	۴/۷۵	ذخیره‌گاه فسیلی سردر	۴/۷۵
۳۷	دودکش‌های جنی کال جنی	۲۷	۲/۲۵	چین خودگی‌های نتوزن شتری	۳۷	۲/۵	رسوبات تراورتن آب گرم مرتضی علی	۴/۷۵	رسوبات تراورتن آب گرم مرتضی علی	۴/۷۵
۳۷	فرسایش لانه‌زنبوری	۳۹	۲/۲۵	دریاچه روح مرغوم	۳۷	۲/۲۵	فرسایش لانه‌زنبوری کال جنی	۴/۷۵	فرسایش لانه‌زنبوری کال جنی	۴/۷۵
۳۷	ذخیره‌گاه فسیلی مگو	۳۹	۲/۲۵	غار بزرگ فرسایشی سردر	۳۷	۲/۲۵	تاقدیس خوابیده راهدار	۴/۷۵	تاقدیس خوابیده راهدار	۴/۷۵
۳۷	مساء مزینو	۳۹	۲/۲۵	ورنی صحراء در شتری	۳۷	۲/۲۵	کوچه‌های فرسایشی کلمرد	۴/۷۵	کوچه‌های فرسایشی کلمرد	۴/۷۵
۳۷	دق خیرآباد	۳۹	۲/۲۵	آب گرم دیگ رستم	۴۲	۲/۲۵	ناودیس معلق کشتی نوح	۴/۵	ناودیس معلق کشتی نوح	۴/۵
۳۷	پنجره فرسایشی مزینو	۴۳	۲/۲۵	بدلندهای نخلک	۴۲	۲	توره‌های جن سردر	۴/۵	توره‌های جن سردر	۴/۵
۴۴	دره کانیونی کریت	۴۳	۲	واریزه سنگی زرگ	۴۴	۲	غار بزرگ فرسایشی سردر	۴/۲۵	غار بزرگ فرسایشی سردر	۴/۲۵
۴۴	تخت دیو پروده	۴۵	۲	تخت دیو پروده	۴۴	۱/۵	پرتگاه گسل ناییندان	۴/۲۵	پرتگاه گسل ناییندان	۴/۲۵
۴۶	کراترهای آتششناشی	۴۵	۱/۷۵	غار جهنم عشق آباد	۴۴	۱/۵	تاقدیس جعفری	۴/۲۵	تاقدیس جعفری	۴/۲۵
۴۷	آب گرم زردگاه	۴۵	۱/۷۵	کوچه‌های فرسایشی کلمرد	۴۷	۱/۵	غار جهنم عشق آباد	۴	غار جهنم عشق آباد	۴
۴۸	ورنی صحراء در شتری	۴۵	۱/۵	معدن تراورتن پروده	۴۷	۱/۵	دودکش جنی کال جنی	۴	دودکش جنی کال جنی	۴
۴۹	دق ناییندان	۴۹	۱/۲۵	ذخیره‌گاه فسیلی مگو	۴۹	۱	دق ناییندان	۳/۲۵	دق ناییندان	۳/۲۵
۴۹	ذخیره‌گاه فسیلی سردر	۵۰	۱/۲۵	ذخیره‌گاه فسیلی سردر	۵۰	۰/۷۵	کراترهای آتششناشی	۱/۷۵	کراترهای آتششناشی	۱/۷۵

منبع: نگارندگان

همان‌طورکه در نتایج ملاحظه می‌کنید، در بخش ارزش‌های علمی، ژئومورفوسایت رخمنون‌های درنجال یا همان دهانه کلوت بیشترین ارزش را به خود اختصاص داد که از دلایل آن می‌توان به مواردی چون دیرینه‌شناسی، کمیاب‌بودن در سطح منطقه خاورمیانه، مشخص‌بودن فرایندها، انتشار عکس‌ها و تصاویر در سطوح بین‌المللی، وجود مقاالت‌های متعدد درمورد این عارضه و تنوع عناصر ژئومورفولوژیکی اشاره کرد. سرزمین‌سیاه که منطقه‌ای با روانه‌های بازالتی است، به‌دلیل عواملی چون کمیاب‌بودن در منطقه، شهرت در سطوح منطقه‌ای و ملی، قابل توصیف‌بودن برای گردشگران غیر علمی، داشتن بافت و الگوی مناسب و نمایاندن یک فرایند زمین‌شناختی، به عنوان دومین ژئومورفوسایتی که ارزش علمی بالایی داشت، انتخاب شد. در بخش ارزش‌های حفاظتی، دره کانیونی کریت به‌دلیل مقاومت بالا و همچنین ژئومورفوسایت‌های منطقه حفاظت‌شده ناییندان، بیشترین ارزش‌های حفاظتی را به خود اختصاص دادند. در بخش ارزش‌های گردشگری انتخاب رخمنون‌های زغال سنگ مزینو و دریاچه روح مرغوم به عنوان بهترین ژئومورفوسایت‌ها به‌لحاظ ارزش گردشگری انتخاب شدند. در ارزش‌های گردشگری، مسئله دید، دسترسی، راههای ارتباطی، میزان تبلیغات، زیست‌ساختهای و همچنین پشتونهای فرهنگی و اکولوژیکی حائز اهمیت است. نکته شایان ذکر در این مورد، شرایط متفاوت ژئومورفوسایت‌ها در بخش ارزش‌های حفاظتی است؛ در حالی که بیشتر ژئومورفوسایت‌ها در بخش ارزش‌های علمی و گردشگری شرایط مشابهی داشتند، در بخش حفاظتی شرایط متفاوتی را تجربه می‌کردند. اغلب ژئومورفوسایت‌هایی که ارزش علمی و گردشگری

مناسبی نداشتند، شرایط حفاظتی مناسبتری داشتند، اما در حالت و بررسی کلی، ارزش‌های گردشگری اغلب ژئومورفوسایت‌ها چندان مطلوب نبود.

نتیجه‌گیری

نتایج کلی ارزیابی‌ها بیانگر نبود استانداردهای حفاظتی برای ژئومورفوسایت‌ها بود. شرایط حفاظتی ژئوتوریسم به دو صورت حفاظت اداری و حفاظت از نظر میزان مقاومت و آسیب‌پذیری مطرح بود. بیشتر ژئومورفوسایت‌های شهرستان طبس، در شرایط فعلی، آسیب چندانی نمیدهد بودن، ولی این سالم‌بودن به‌سبب حفاظت بالا نیست؛ بلکه به این دلیل است که اساساً بسیاری از این ژئومورفوسایت‌ها شناخته‌شده نیستند و مورد توجه گردشگران واقع نمی‌شوند. حتی مؤسسه‌های گردشگری، علاقه‌ای به فعالیت در این سایتها ندارند. درمورد آثار تاریخی هم باید به این نکته اشاره کرد که با وجود داشتن تاریخ غنی و آثار تاریخی و فرهنگی، این آثار کمتر با مسائل زمین‌شناسی و ژئومورفوسایت‌ها در ارتباط‌اند. وضعیت ارزش‌های گردشگری نیز در شهرستان طبس درمجموع چندان مساعد نیست. ارزش‌های گردشگری شامل ارزش‌های درونی یک ژئومورفوسایت و خدمات گردشگری اطراف آن است. از نگاه ارزش‌های اولیه، ژئومورفوسایت‌ها از وضعیت نسبتاً مساعدی برخوردارند، ولی در بخش ارزش‌های ثانویه، شهرستان طبس با یک بحران، دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ به‌طوری‌که خدمات گردشگری برای بعضی از ژئومورفوسایت‌ها اساساً وجود ندارد.

پس از مطالعه‌ها و نتیجه‌گیری کلی، بررسی و مقایسه روش و نتایج این پژوهش با سایر مطالعه‌های انجامشده در این حوزه، نمایانگر رویکرد اصلی پژوهشی در حوزه ارزیابی ژئوتوریسم در شهرستان طبس صورت نگرفته است، این بررسی درمورد مطالعه‌های مشابه خارجی - که روش‌های ارزیابی ژئوتوریسم را ارائه کرده‌اند - و پژوهش‌های داخلی - که از این روش‌ها برای ارزیابی مناطق ژئوتوریستی استفاده کرده‌اند - صورت گرفته است. مطالعه‌های خارجی عموماً بر طراحی روش ارزیابی متتمرکز شده و پژوهش‌های داخلی نیز از این روش‌ها استفاده کرده‌اند. معیارها و ارزش‌های مورد استفاده برای ارزیابی ژئوتوریسم در همه پژوهش‌های داخلی و خارجی مشابه است و بر ارزش‌های علمی، حفاظتی و گردشگری متتمرکز شده و در پژوهش حاضر نیز بر همین بنیان استوار است، اما برخلاف سایر پژوهش‌های داخلی که عموم روش‌های مورد استفاده در آن‌ها، بیشترین تأکید را بر ارزش‌های علمی یا حفاظتی یا گردشگری داشت، در این پژوهش از روش جدید GAM استفاده شده است که صرف نظر از توجه به ارزش‌های علمی و حفاظتی، ارزش‌های گردشگری و خدمات و زیرساخت‌های گردشگری را بیش از سایر روش‌ها مد نظر دارد و دیدی اقتصادی و بازاریابی نیز به ژئوتوریسم دارد. نتایج ارزیابی ژئوتوریسم در پژوهش حاضر، در حالت کلی با سایر مطالعه‌ها مطابقت دارد؛ به‌طوری‌که ژئوتوریسم منطقه مورد مطالعه، اغلب از منظر ارزش علمی در سطح مطلوب بوده است، اما از منظر خدمات گردشگری و زیرساختی با مشکل‌های زیادی روبروست و در خطر تخریب نیز قرار دارد، اما تفاوت نتایج پژوهش حاضر، در بخش ارزش‌های حفاظتی است؛ چراکه از منظر حفاظتی، ارزش‌های ژئومورفوسایت‌ها نسبتاً مساعد است، اما این مسئله نه به‌دلیل حفاظت اداری و علمی، بلکه به‌دلیل ناآشنای مردم و گردشگران با بسیاری از سرمایه‌های ژئوتوریسم شهرستان است؛ بنابراین، نارسایی شدیدی نیز در بخش عامه‌پسند گردشگری در شهرستان طبس وجود دارد؛ چراکه یکی از اهداف ژئوتوریسم، مردمی‌کردن علوم زمین است. نکته شایان ذکر دیگر در مقایسه نتایج این پژوهش با سایر پژوهش‌ها، جامع‌نگری این پژوهش و توجه یکسان به ارزش‌های ژئوتوریسم است. در بیشتر مطالعه‌های داخلی و خارجی، عموماً توجه به یک جنبه از ژئوتوریسم (علمی یا حفاظتی) بیش از سایر شاخص‌هاست، اما در پژوهش حاضر، به ارزش‌های علمی، حفاظتی و گردشگری یه یک اندازه توجه شده است و ضمن تأکید بر حفاظت و توسعه ارزش‌های علمی، بر اهمیت اقتصادی ژئوتوریسم تأکید می‌شود. به‌همین‌منظور، ارزیابی‌ها به‌صورت جداگانه در سه بخش ارزش‌های علمی، حفاظتی و گردشگری صورت گرفته است و متفاوت با سایر پژوهش‌های داخلی است. در تحلیل نتایج نیز برخلاف سایر مطالعه‌ها - که

پیشنهاد و راهکار ژئوتوریسم به صورت کلی بیان شده است- در این پژوهش، برنامه‌ریزی ژئوتوریستی برای ژئوتوریسم منطقه در نظر گرفته شده و درواقع، پس از اولویت‌بندی ژئومورفوسایت‌ها، برای هر ژئومورفوسایت با توجه به وضعیت فعلی آن، برنامه‌ریزی و کاربری ژئوتوریستی به صورت جداگانه در نظر گرفته شده و برنامه‌ریزی‌ها برای تمامی ژئومورفوسایت‌ها با توجه به وضعیت فعلی آن صورت گرفته است. با توجه به موارد گفته شده، باید برنامه‌ریزی‌هایی صحیح و اصولی درجهت بهره‌برداری از سرمایه‌های هریک از ژئومورفوسایت‌ها صورت گیرد. ضرورت دارد برنامه‌ریزی‌ها برای استفاده از مکان‌های پهینه در ژئوتوریسم انجام پذیرد، اما در برنامه‌ریزی ژئوتوریستی، تنها نباید بر ژئومورفوسایت‌های مستعد و مطلوب تأکید کرد؛ بلکه برنامه‌ریزی برای هر ژئومورفوسایت، باید براساس وضعیت کنونی صورت گیرد تا زمینه تقویت و ارتقای هریک از ژئومورفوسایت‌ها فراهم شود. با توجه به موارد گفته شده می‌توان گفت که برای رخمنون‌های سنگی درنجال، سرزمین سیاه، پرتگاه گسل ناییندان، کوه‌های کمارتفاع قدیمی کلمرد، دگرشیبی دارین و تپه‌های ماسه‌ای حلوان باید برنامه‌هایی درجهت بازاریابی و اقتصادی طراحی کرد؛ چراکه می‌توان آن‌ها را در قالب کالاهای گردشگری به گردشگران ارائه کرد. در این میان اما ناویدیس کال زرد، ریگ شتران، آب گرم مرتضی علی، تنورهای جن سردر، پیچان رودهای رودخانه سردر، آبشار تفت و مخروط‌افکنهای شتری که برای گردشگری نسبتاً مطلوب‌اند، در قالب برنامه‌ریزی گردشگری قرار می‌گیرند و می‌توان از آن‌ها برای توسعه گردشگری استفاده کرد، اما باید به مسئله حفاظت و تمهیدهای حفاظتی آن‌ها قبل از ورود گردشگران توجه خاص داشت. درنهایت، برای سایر ژئومورفوسایت‌ها باید برنامه‌ای درجهت ارتقای شاخص‌های گردشگری و حفاظتی تدوین کرد؛ چراکه باید تمهیدهایی در زمینه حفاظت از ژئومورفوسایت‌ها و همچنین تقویت زیرساخت‌های گردشگری و ارزش‌های آن صورت گیرد و سپس گردشگران به سوی ژئومورفوسایت‌ها هدایت شوند.

منابع

۱. تریکار، ڇان، ۱۳۶۹، *اشکال ناهمواری در نواحی خشک؛ ترجمه صدیقی و محسن پورکرمانی، چاپ اول، نشر معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی، تهران.*
۲. تقوایی، مسعود، احسانی، غلامحسین و اعظم صفرآبادی، ۱۳۸۸، *نقش و جایگاه برنامه‌ریزی چندبعدی در توسعه توریسم و اکوتوریسم، مجله جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، سال بیستم، شماره پیاپی ۳۵، شماره ۳، صص ۴۵-۶۲*.
۳. رنجبر، محسن، ۱۳۸۸، *قابلیت‌های ژئوتوریستی تنگ زینگان صالح‌آباد شهرستان مریوان، فصلنامه چشم انداز جغرافیایی، سال چهارم، شماره ۹، صص ۸۱-۱۰۰*.
۴. ساجدی‌فر، آیلار، ۱۳۸۶، *ژئوتوریسم بیابان‌های ایران، وزارت صنایع و معدن، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، پایگاه ملی داده علوم زمین (www.ngdir.com)*.
۵. کاظم پور، محسن، ۱۳۹۰، *پناهگاهی برای زرده یوز، روزنامه جام جم، سه شنبه ۱۷ خرداد ۹۰، شماره ۱۰، ص ۱۰*.
۶. مختاری، داوود، ۱۳۸۹، *ارزیابی توانمندی‌های اکوتوریستی مکان ژئومورفیکی حوضه آبریز آسیاب خرابه در شمال غرب ایران به روش پرالونگ (Pralong)؛ مجله جغرافیا و توسعه، سال هشتم، شماره ۱۸، صص ۲۷-۵۲*.
۷. مقصودی، مهران، علیزاده، محمد، رحیمی هرآبادی، سعید و مجتبی هدایی آرانی، ۱۳۹۱، *ارزیابی قابلیت ژئومورفوسایت‌های گردشگری در پارک ملی کویر با استفاده از روش Pereira؛ مجله مطالعات گردشگری، سال هفتم، شماره ۱۹، صص ۴۹-۶۸*.
۸. مقیمی، ابرهیم، رحیمی هرآبادی، سعید، هدایی آرانی، مجتبی، علیزاده، محمد و حسن ارجوی، ۱۳۹۱، *ژئومورفوتوریسم و قابلیت‌سنجدی ژئومورفوسایت‌های جاده‌ای با بهره‌گیری از روش پری‌پرا، مطالعه موردی: آزادراه قم- کاشان، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی تهران، سال دوازدهم، شماره ۲۷، صص ۱۶۳-۱۸۴*.
۹. ناظمی، محمد و شهلا مغزی نجف‌آبادی، ۱۳۸۶، *بررسی‌های نوزمین ساختی در مسیر کال جنی- شمال طبس، مجموعه مقالات سومین همایش منطقه‌ای معدن و علوم وابسته، صص ۵۶-۵۹*.

10. Bruschi, V. M., Cendrero, A. and Cuesta Albertos, J. A., 2011, **A Statistical Approach To The Validation And Optimization Of Geoheritage Assessment Procedures**, geoheritage, Vol. 3, No. 3, PP. 131-149.
11. Carcavilla, L., Duran Juan, J., Garcia-Cortes, A. and Lopez-Martinez, J., 2009, **Geological Heritage and Geoconservation in Spain: Past, Present and Future**, Geoheritage, Vol. 1, No. 2-4, PP. 75° 91.
12. Comanescu, L., Nedelea, A. and Dobre, R., 2011, **Evaluation of geomorphosites in Vistea Valley (Fagaras Mountains-Carpathians, Romania)**, International Journal of the Physical Sciences, Vol. 6, No. 5, PP. 1161 -1168.
13. De Waele, J. and Melis, M. T., 2009, **Geomorphology and Geomorphological Heritage of the Ifrane–Azrou Region (Middle Atlas, Morocco)**, Environ Geol, Vol. 58, No. 3, PP. 587° 599.
14. Fassoulas, C., Mouriki, D., Dimitriou-Nikolakis, P. and Iliopoulos, G., 2011, **Quantitative Assessment of Geotopes as an Effective Tool for Geoheritage Management**, geoheritage, Vol. 4, No. 3, PP. 177-193.
15. Fassoulas, C., Paragamian, K. and Iliopoulos, G., 2007, **Identification and Assessment of Cretan Geotopes**, bulletin of geological society of Greece, international congress Athens.
16. Feuillet, T. and Sourp, E., 2011, **Geomorphological Heritage of the Pyrenees National Park (France): Assessment, Clustering, and Promotion of Geomorphosites**, Geoheritage, Vol. 3, No. 3, PP. 151° 162.
17. Hose, T. A., 2011, **3G's fo Mo ootossss m**, geoheritage, Vol. 4, No. 1-2, PP. 7-24.
18. Johari, M., 2009, **Scientific Travel In Iran, Tabas**, seintific information, Vol. 23, No. 7, PP. 50-52. (*In Persian*)
19. Kazempour, M., 2011, **Shelter For Zardeh Yooz**, Jame Jam, 6 July 2011, No. 10, P. 10. (*In Persian*)
20. Lugeri, F. R., Amadio, V., Bagnaia, R., Cardillo, A. and Lugeri, N., 2011, **Landscapes and Wine Production Areas: A Geomorphological Heritage**, Geoheritage, Vol. 3, No. 3, PP. 221° 232.
21. Maghsoudi, M., Alizadeh, M., Rahimi Herabadi, S. and Hodaei Arani, M., 2012, **Capability Assessment Of Tourism Geomorphosites In Kavir National Park By Using Pereira Method**, tourism researches, Vol. 7, No. 19, PP. 49-68. (*In Persian*)
22. Maran, A., 2010, **Valuing The Geological Heritage Of Serbia**, Bulletin of the Natural History Museum, Vol. 3, No. 2, PP. 47-66.
23. Mihai, B., Reynard, E., Werren, G., Ionut, S., Ionut, S. and Zenaida, C., 2009, **Impacts of Tourism on Geomorphological Processes in the Bucegi Mountains in Romania**, Geographica Helvetica, Vol. 64, No. 3, PP. 134-147.
24. Moghimi, E., Rahimi Herabadi, S., Hodaei Arani, M., Alizadeh, M. and Oroji, H., 2012, **Geomorphotourism and Assessment of Road Geomorphosites by Using Preira Method, Case Study: Ghom-kashan Freeway**, applied researches of geographic sciences, Vol. 12, No. 27, PP. 163-184. (*In Persian*)
25. Mokhtari, D., 2010, **Assessment of Ecotourism Capabilities for geomorphic Zone Asiaab Kharabeh Basin in Northwest Iran by Pralong Method**, geography and development, Vol. 8, No. 18, PP. 27-52. (*In Persian*)
26. Nazemi, M. and Maghzi Najafabadi, S., 2007, **Neo-Tectonic Surveys in Kal Jeni Road, North Of Tabas County**, regional seminar of mine and associated sciences, PP. 56-59. (*In Persian*)
27. Panizza, M. and Piacente, S., 2008, **Geomorphosites and Geotourism**, Rev.Academica, Vol. 2, No. 1, PP. 5-9.
28. Panizza, M., 2011, **Geomorphosites: Concepts, Methods and Examples Of Geomorphological Survey**, Chinese Science Bulletin, Vol. 46, No. 1. PP. 4-5.
29. Pereira, P., Pereira, D. and Caetano, A., 2007, **Geomorphosite assessment in Montesinho Natural Park (Portugal)**, Geographica Helvetica, Vol. 62, PP. 159-168.

30. Pralong, J., 2005, **A Method for Assessing Tourist Potential and Use of Geomorphological Sites**, Géomorphologie: relief, processus, environnement, No 3, PP. 189-196.
31. Ranjbar, M., 2009, **Geotourism Capabilities of Zinagan Salehabad Strait in Marivan County**, geographical perspective, Vol. 4, No. 9, PP. 81-100. (*In Persian*)
32. Reynard, E., 2008, **Scientific Research and Tourist Promotion of Geomorphological Heritage**, Geogr. Fis. Dinam. Quat, Vol. 31, No. 2, PP. 225-230.
33. Reynard, E., Regolini-bissig, G., kozlik, L. and Benedetti, S., 2009, **Assessment and Promotion of Cultural Geomorphosites in the Trient Valley (Switzerland)**, Mem.descr. Carta Geol, Vol. 2, No. 2, PP. 181-189.
34. Rovere, A., Vacchi, M., Parravicini, V., Bianchi, C. N., Zouros, N. and Firpo, M., 2011, **Bringing Geoheritage Underwater: Definitions, Methods, and Application in two Mediterranean Marine Areas**, Environ Earth Sci, Vol. 64, No. 1, PP. 133° 142.
35. Sai-leung, N. G., Jiangfeng, L. I., Shiming, F. and Young, C. Y., 2010, **Geodiversity and Geoconservation in Hong Kong**, Asian Geographer, Vol. 27, No. 1-2, PP. 1-11.
36. Sajedifar, A., 2007, **Geotourism of Iran Deserts; Industries and Mines Ministry, Mine Explores and Geology Organization**, Rtrieved from: National Site of Earth Data (www.ngdir.com).
37. Serrano, E. and Gonzalez Trueba, J. J., 2011, **Environmental Education and Landscape Leisure Geotourism Map and Geomorphosites in the Picos de Europa National Park**, geojournal of tourism and geosites, Vol. 8, No. 2, PP. 295-308.
38. Taqvaei, M., Ehsani, Q. and Safarabadi, A., 2009, **Role and Importance of Multi-Dimensions Planning in Tourism and Ecotourism Development**, geography and environmental planning, Vol. 20, No. 35, PP. 45-62. (*In Persian*)
39. Trikar, J., 1990, **Forms of Heights in Arid Zones**, Translated by Seddiqi & Pourkermani, M., First edition, Astan Qods Razavi, Tehran.
40. Vujicic, D. M., Djordjije, A., Vasiljevic, D. A., Markovic, B. S., Hose, A. T., Lukic, T., Hadzic, O. and Janievic, S., 2011, **Preliminary Geosites Assessment Model (GAM) and its Application on Fruska Gora Mountain, Potential Geotourism Detinariion of Serbia**, Acta geographica Slovenica, Vol. 51, No. 2, PP. 361° 37.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی