

Comparing the Mental Health of Parents of Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder and with Normal Children

Farideh Farokhzadi¹, M.A; Mohamad Reza Mohamadi², Ph.D; Ahmad Alipour³, Ph.D
Mohamad Ebrahim Maddahi, Ph.D⁴, Maryam Salmanian⁵, M.A

Received: 18. 12. 14 Revised: 3.3.15 Accepted: 1.6. 15

Abstract

Objective: In this study mental health of parents of children with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) has been compared with mental health of parents of healthy children.**Method:** The present study is descriptive (Casual – Comparative). By in access sampling, 400 parents of children with ADHD (200 cases in children, 6-18) and 400 parents of normal children (200 healthy children 18-6 years) were selected. SADS and K-SADS were used for collecting data. SPSS advanced, inferential two-variable tests chi and independent-t test were used for data analysis.**Results:** analysis show that parents of children with ADHD suffer from disorders such as anxiety disorder 15.6%, obsessive exercise disorder 5.1%, obsessive thought disorder 4.6%, antisocial personality disorder / 5%, Simple phobia disorder / 5%, Social phobia disorder / 3%, Schizophrenic disorder / 3%, panic attacks / 3% 1 and physical building disorder / 5% more than parents of normal children. Thus, there was significant difference between these disorders in parents of children with ADHD and parents of normal children.**Discussion:** High prevalence of disorders in parents of children with ADHD show that parents of children with ADHD have fewer mental health in compare with parents of normal children.

Keywords: Attention Deficit Hyperactivity Disorder, mental Health, Parents

1. Corresponding author: PhD Candidate for General Psychology in Golestan Azad University (Email:Farokhzadi.f@gmail.com)
2. Professor in Tehran University
3. Professor in Payame Nour University
4. Associate Professor in Shahed University
5. PhD Candidate for Medical Sciences in Tehran university

مقایسه سلامت روانی والدین کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیشفعالی با والدین کودکان سالم

فریده فرخزادی^۱, دکتر محمد رضا محمدی^۲,
دکتر احمد علیپور^۳, دکتر محمد ابراهیم مداعی^۴,
مریم سلمانیان^۵

تاریخ دریافت: ۹۴/۹/۲۷ تجدیدنظر: ۹۳/۱۲/۱۲ پذیرش نهایی: ۱۱/۳/۹۴

چکیده

هدف: در این پژوهش، سلامت روانی والدین کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیشفعالی با سلامت روانی والدین کودکان سالم مقایسه شده است. **روش:** تحقیق حاضر از نوع توصیفی و پسرویدادی (علی-مقایسه‌ای) است که با بهره‌گیری از روش نمونه‌گیری دردسترس، ۴۰۰ نفر از والدین کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/بیشفعالی (۲۰۰ نفر کودک دارای اختلال ۶-۱۸ سال) و ۴۰۰ نفر از والدین کودکان سالم (۲۰۰ نفر کودک سالم ۶-۱۸ سال) انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه اختلال‌های عاطفی و اسکیزوفرنیا (کودکان و بزرگسال) استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از نرمافزار پیشرفته SPSS و آزمون‌های استنباطی مجذور خی دومتیری و t مستقل استفاده گردید. **یافته‌ها:** در تجزیه و تحلیل بدست آمده، فراوانی اختلال اضطراب فراگیر ۱۵.۶٪، اختلال اعمال وسوسی ۵.۱٪، اختلال افکار و سوسایی ۴.۶٪، اختلال شخصیت ضداجتماعی ۵٪، اختلال فوبی ساده ۵٪، اختلال فوبی اجتماعی ۳٪، اختلال اسکیزوفرنی فرم ۳٪، حملات پانیک ۳٪ و اختلال جسمی‌سازی ۵٪ در والدین کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/بیشفعالی نسبت به والدین کودکان عادی بیشتر می‌باشد. همچنین شواهد موجود نشان می‌دهد، از آنجا که در اختلالات اضطراب فراگیر و فوبی ساده برابر با $p < .05$ و همچنین حاصله نیز در اختلالات فوق از t جدول (۱/۹۶) بزرگ‌تر می‌باشد، لذا می‌توان چنین قضاویت کرد که تفاوت معناداری بین اختلال‌های فوق در والدین کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/بیشفعالی و والدین کودکان عادی وجود دارد. **نتیجه‌گیری:** شیوع بالای اختلالات در والدین کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیشفعالی نشان می‌دهد که والدین کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/بیشفعالی دارای سلامت روانی کمتری نسبت به والدین کودکان سالم می‌باشند.

کلید واژه: اختلال نارسایی توجه/بیشفعالی، سلامت روانی، والدین

۱. نویسنده مسئول: دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی

۲. استاد دانشگاه تهران

۳. استاد روانشناسی، دانشگاه پیام نور

۴. دانشیار دانشگاه شاهد

۵. دانشجوی دکتری پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران

مقدمه

حداقل ۶ نشانه می‌باشد. بسته به نشانه‌های موجود، افراد مبتلا به این اختلال به سه زیرگروه متفاوت تقسیم می‌شوند: نوع نارسایی توجه، نوع بیش‌فعال/تکانشگری و نوع ترکیبی (بخشایش و میرحسینی، ۱۳۹۳). در تحقیقات، علت آسیب‌شناختی اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی را حضور اختلال در مناطق جلویی مغز معرفی می‌کنند (سورف، ۲۰۱۰). عوامل ایجاد‌کننده اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی دقیقاً معلوم نیست، ولی عواملی که مطرح شده‌اند عبارتند از: ۱- عوامل ژنتیک ۲- عوامل مربوط به رشد ۳- آسیب مغزی ۴- عوامل عصبی- شیمیایی ۵- عوامل عصبی- فیزیولوژیک ۶- عوامل روانی- اجتماعی (کاپلان، سادوک، ۲۰۰۷). فرناندز و همکاران (۲۰۰۸) تجزیه و تحلیل پیچیده‌ای از فعالیت خودکار مغز را در اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی انجام دادند. نتایج کاهش فعالیت در لوب قدامی و تأخیر رشد در تکامل کورتکس لب پیشانی مغز را نشان داد.

narssayi در بازداری رفتاری و اختلال در کارکردهای اجرایی مشکل اساسی کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی محسوب می‌شود، این کودکان از مهارت کافی و لازم برای نظارت بر رفتار خود برخوردار نیستند و نمی‌توانند رفتار خود را برای زمانی طولانی تنظیم کنند (کردستانی، ۱۳۹۳).

علاوه بر این، حضور کودک مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی در خانواده درخواست‌های مضاعفی را بر والدین و بالاخص مادران این کودکان تحمل می‌کند و باعث افزایش فشار روانی و انواع مشکلات روانشناختی از قبیل افسردگی و خلق منفی در این والدین می‌شود. کودک دارای اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی هویتی منفرد و جداگانه ندارد و کل خانواده را در معرض خطر افزایش عواقب منفی، همچون مشکلات سلامت جسمانی و روانی و تجارب منفی قرار می‌دهد. از دیگر مشکلات رفتاری همچون پرخاشگری، نافرمانی و قانون‌شکنی نیز به عنوان یکی از جدی‌ترین مشکلات این کودکان، تأثیرات منفی بسیاری بر سیستم خانواده و

اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی به عنوان یک مسئله برای روان‌پزشکان، روانشناسان، والدین و معلمان مطرح می‌باشد. زیرا ویژگی رفتاری کودکان مبتلا از قبیل ناتوانی در مهار رفتار حرکتی، نارسایی توجه، ناتوانی یادگیری، پرخاشگری، مشکلات تحصیلی، برانگیختگی و بی‌قراری حرکتی، معضل اساسی برای والدین، همسالان و متولیان آموزشگاهی به شمار می‌آید و به فرآیند تحول استعدادهای ذهنی و مهارت‌های اجتماعی- عاطفی خود کودک نیز آسیب جدی وارد می‌کند. فراوانی مشکلات مختلف تحصیلی، شغلی و غیره در بزرگسالان این کودکان به طور معناداری از جمعیت عادی بیشتر است (جنتیان، نوری، شفتی، مولوی و سماواتیان، ۱۳۸۷). آمار گوناگونی در زمینه نرخ شیوع این اختلال وجود دارد. نرخ شیوع این اختلال برای بزرگسالان ۲/۵ درصد و کودکان رقم ۵ درصد گزارش شده است، با این وجود، با احتیاط می‌توان گفت که ۳/۷ درصد از کودکان سنین مدرسه را مبتلایان به این اختلال تشکیل می‌دهند. بطورکلی احتمالاً در هر کلاس عادی یک یا دو کودک دارای اختلال نارسایی توجه وجود دارد (راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی، ویراست پنجم^۱).

نشانه‌های اصلی اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی بر اساس راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی ویراست پنجم، وجود پنج نشانه مرتبط با تکانشگری، نارسایی توجه یا بیش‌فعالی باید قبل از سن ۱۲ سالگی شروع شود و حداقل در دو موقعیت متفاوت مانند کودکستان، مدرسه، خانه و یا هنگام ارزیابی و معاینه روان‌شناختی دیده شود. در راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی ویراست پنجم ۱۸ نشانه ارایه شده و الزام شده است که حداقل شش نشانه در نارسایی توجه یا بیش‌فعالی/تکانشی باید مشاهده شود تا بتوان این اختلال را در افراد تشخیص داد. به عبارت دیگر، حداقل نشانه‌ها برای تشخیص اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی در بزرگسالان ۵ نشانه و برای کودکان،

می تواند سلامت روانی والدین را تحت تأثیر قرار دهد (میعی کرمانی، ۱۳۸۳).

یافته ها از این نظر حمایت می کند که برای ارزیابی کامل باید تمام نشانه ها، تاریخچه پزشکی خانواده و فرد، عملکرد کودک در خانه و مدرسه و ارتباط وی با همسالان بطور دقیق بررسی شود (جانستون و جی مش، ۱۳۸۵). بررسی های ژنتیک خانواده، یکی از روش های پژوهشی روان پزشکی از دیدگاه سبب شناسی اختلال می باشد (بیدرمن، فارون، کیناک، بنجامین و کرینچر، ۱۹۹۲). در مورد موضوع فراوانی اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی و سابقه والدین کودکان مبتلا به این اختلال نشان داده شده است که عوامل وراثتی می تواند در سبب شناسی این اختلال دخالت داشته باشد (صدری کرمانی، شیرازی و لوحه سرا، ۱۳۸۵). مطالعات بیدرمن و همکاران (۲۰۰۹)، نشان داد که گوناگونی ژنتیکی با تغییرات مغزی ارتباط دارد و ژن انتقال دهنده دوپامین، ژن R10R بر روی اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی اثر دارند و کاهش فعالیت در ژن R10R در سمت راست افراد دارای اختلال نارسایی مغز در سمت راست افراد دارای اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی وجود دارد. بیدرمن و همکاران (۲۰۰۹)، پژوهشی در مورد تأثیر ژن داوطلب شده چند ریختی بر روی اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی انجام دادند. تجزیه و تحلیل نشان می دهد که با ۲۵ سال بررسی طولی، ۷۶٪ از موارد با تکرار ژن داوطلب شده چند ریختی ۴۷ در مقایسه با ۶۷٪ موارد بدون تکرار ژن داوطلب شده چند ریختی ۴۷، ظهور اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی بیشتر تر تخمین زده می شود. یافته ها نشان می دهد که ژن داوطلب شده چند ریختی ۴۷ با ظهور موارد اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی و رابطه دارد. اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی و اختلال های اضطرابی انتقال ژنی مستقل در خانواده دارند (بیدرمن، فارون، کیناک، اشتینجارد و تسوانگ، ۱۹۹۱، بیدرمن و همکاران، ۱۹۹۲). وجود اختلال های روان پزشکی گوناگون در خانواده های مبتلایان به

سلامتی والدین شان بر جای می گذارد (کردستانی، ۱۳۹۳). از طرفی خانواده و فضای حاکم بر آن نقش مؤثر و تعیین کننده ای در رشد روانی، شکل گیری شخصیت و سلامت روانی اعضای خانواده به ویژه کودکان دارد (جانستون و جی مش، ۱۳۸۵). تاکنون تعاریف متعددی از «سلامت روان» ارائه شده است که همگی بر اهمیت تمامیت و یکپارچگی شخصیت تأکید ورزیده اند. گلدوستاین^۲، (به نقل از سارا فینو، ۱۳۸۷) سلامت روانی را تعادل بین اعضا و محیط در رسیدن به خودشکوفایی می داند. در سال های اخیر انجمان کانادایی بهداشت روانی، «سلامت روان» را در سه بخش تعریف کرده است:

الف - بازخوردهای مربوط به خود ب - بازخوردهای مربوط به دیگران ج - توانایی اخذ تصمیم های شخصی. بنابراین امروزه چالش اصلی روانشناسان چگونگی استفاده از این اطلاعات برای حصول سلامت و ارتقای آن است (زنگنه، ۱۳۸۱). در بحث سلامت روان، رابطه مادر و کودک از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا این ارتباط چنان نزدیک و درهم تنیده می شود که هرگونه تغییر در یکی، بر دیگری نیز اثر می گذارد و این تعامل ادامه خواهد یافت. اختلال های روان شناختی مادر بر رابطه او با فرزندش تأثیر می گذارد و تغییر رفتار کودک، مادر را متأثر می نماید (صالحی، سalarی فر و هادیان، ۱۳۸۳). در بررسی مقایسه سلامت روانی مادران و کودکان دچار اختلال روان پزشکی با کودکان سالم نشان داده شده است که مادران کودکان مبتلا به اختلال روان پزشکی از افسردگی و اضطراب بیشتر و کارکرد اجتماعی و سلامت روان پایین تر برخوردارند (صالحی، سalarی فر و هادیان، ۱۳۸۳). در تمامی فرهنگ ها و جوامع، خانواده، کانون شکل گیری هویت رفتار است که روابط افراد و اعضای خود را به طور متقابل متأثر می سازد. از سویی اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی با علایم محدودیت میدان توجه و بیش فعالی از شایع ترین اختلال های روان پزشکی دوران کودکی است که

بود. از طرفی در تخمین مقایسهٔ تنش والدگری مادران مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی با مادران کودکان بهنجار نشان داده شده است که تنش والدگری (قلمر و والد) و مؤلفه‌های آن در مادران کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی در مقایسه با مادران کودکان بهنجار تفاوت معنادار وجود دارد. همچنین بین تنش والدگری (قلمر و کودک) در مادران کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی بیش‌فعالی و مادران کودکان بهنجار تفاوت معناداری دیده می‌شود. نتایج این پژوهش نشان داد که مادران کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی در مقایسه با مادران کودکان بهنجار دارای تنش والدگری بیش‌تری هستند (یونسی، سلطانی‌فر و تیموری، ۱۳۸۸). دافی^۳ و همکاران (۲۰۰۱) بر روی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی که والدین آنها دچار اختلال افسردگی دوقطبی بودند، کار کردند. نتایج تحقیقات آنها نشان داد که رابطهٔ معناداری بین خودگزارشی^۴ والدین از افسردگی خود و نارسایی توجه کودکشان وجود دارد، اما بین نمره‌های بدست آمده از گزارشات والدین و اندازه‌های قابل مشاهده از نارسایی توجه، رابطه‌ای بدست نیامد. خوشابی، فروزان، مرادی و محمدخانی (۱۳۸۵) بر روی عوامل خطرساز در اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی تحقیقی انجام دادند. آنها به این نتیجه رسیدند که عوامل خطرساز شامل، جنس پسر، خویشاوندی والدین، تاریخچه اختلال بیش‌فعالی / نارسایی توجه در والدین یا سایر بستگان، تاریخچه اختلالات روانی در والدین یا رتبه اول یا دوم بودن، از عوامل خطرساز این اختلال هستند. درنتیجه، اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی با عوامل خطرساز خانوادگی فراوانی همراه است. پس ضروری است که در برنامه‌ریزی‌های خرد و کلان بهداشت روانی کشور، کودکان مبتلا به اختلالات نارسایی توجه/بیش‌فعالی و خانواده‌های آنان به عنوان یک سیستم درگیر مشکل در نظر گرفته شوند. در سال‌های اخیر، در شناخت ماهیت این اختلال پیشرفت‌های چشم‌گیری حاصل

اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی نیز می‌تواند بیانگر ارثی بودن اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی باشد. بر پایهٔ فراوانی این اختلال در خانواده می‌توان زیر گروههایی از اختلال‌های اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی را در خانواده پیش‌بینی کرد (بیدرمن و همکاران، ۱۹۹۲). بررسی سبب‌شناسی و وراثتی آن ممکن است بیانگر همبودی آن با سایر اختلال‌های روان‌پزشکی باشد (اسمالی و همکاران، ۲۰۰۰، به نقل از جانستون و جی مش، ۱۳۸۵). از طرفی در بررسی اختلال‌های روان‌پزشکی در خانواده کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی شیوع بالای اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی در خانواده مبتلایان نشان‌دهندهٔ تأثیر عامل ژنتیک قوی اختلال می‌باشد. بیش‌تر بررسی‌های کنترل شده خانوادگی، خطر نسبی بالاتر اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی را در خویشاوندان درجهٔ یک و دوی مبتلایان به این اختلال گزارش کرده‌اند (بیدرمن، فارون، کنیاک، لی، تسوانگ، ۱۹۹۰، سادوک، سادوک، ۲۰۰۰، فارون، بیدرمن، ۱۹۹۴، اسکاچار، واج‌ماس، ۱۹۹۰). در پژوهش‌ها نشان داده شده است که اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی یک اختلال خانوادگی همراه و مرتبط با افزایش احتمال دیگر اختلالات روانی خانوادگی دیگر است و در خویشاوندان افراد دارای اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی، اختلالات افسردگی و نافرمانی مقابله‌ای بیش‌تر بود (بیدرمن و همکاران، ۱۹۸۶).

غنى‌زاده، محمدی و معینی (۲۰۰۸) بر روی همپوشی اختلالات روانی و اختلالات روانی مربوط به والدین در نمونه‌ای از کودکان ایرانی دارای اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی کار کردند. نتایج تحقیق نشان داد که کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی، حداقل دارای یک اختلال روانی همراه دیگر هستند. عموماً احتمال نافرمانی مقابله‌ای در پسرها و اختلال اضطراب در دخترها وجود دارد و معمول‌ترین اختلال روانی در والدین اختلالات خلقی

مقایسه‌ای) است که دارای دو گروه و یک متغیر است. جامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونه‌گیری بر اساس ماهیت و هدف اصلی پژوهش مبنی بر مقایسه سلامت روانی والدین کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/بیشفعالی و والدین کودکان سالم می‌باشد. جامعه آماری، والدین کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/بیشفعالی و والدین کودکان سالم است.

نمونه آماری و روش نمونه گیری:

در این پژوهش، جامعه، والدین کودکان ۶-۱۸ سال شهر تهران بوده است که شرکت‌کننده‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند، بدین صورت که ۴۰۰ نفر از والدین کودکان ۶-۱۸ سال دچار اختلال نارسایی توجه/بیشفعالی و ۴۰۰ نفر از والدین کودکان سالم از میان مراجعه‌کنندگان به بیمارستان روزبه، کلینیک تخصصی روانپزشکی کودکان محمدی و مدارس منطقه ۳ و ۵ آموزش و پرورش شهر تهران در پژوهش مشارکت کردند. کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/بیشفعالی بر پایه نظریه روانپزشک و ملاک‌های تشخیصی راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی، ویراست پنجم و پرسشنامه اختلال‌های عاطفی و اسکیزوفرنیا (کودکان) بالینی و پرسشنامه اختلال‌های عاطفی و اسکیزوفرنیا (بزرگسال) استفاده گردید.

ابزار پژوهش

برای گردآوری داده‌های پژوهش، پرسشنامه‌های زیر به کار برده شد:

پرسشنامه اختلال‌های عاطفی و اسکیزوفرنیا (بزرگسال): یک مصاحبه تشخیصی نیمه‌ساختاریافته با پایایی بالاست که وجود اختلال را در طول زندگی و حمله کنونی ارزیابی می‌کند. این پرسشنامه برای افراد ۱۸ سال به بالا به کار می‌رود و طیف گسترده‌ای از اختلال‌های روانپزشکی و سلامت روانی را بر پایه معیارهای راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی،

شده است. مطالعات مولکولی و رفتاری نشان می‌دهد که ژن‌ها در این اختلال نقش دارند (فاراون و همکاران، ۱۹۹۱، کونتسی، اسیتونسون، ۲۰۰۰، سانوهارا و همکاران، ۲۰۰۰، به نقل از جانستون و جی مش، ۱۳۸۵) درمورد نقایص مربوط به شناخت این اختلال نظریه‌های متعددی ارائه شده است (هرچند پیشرفت‌هایی در فهم ماهیت شناختی و زیستی این اختلال انجام شده، اما نظریه و پژوهش نظامدار و قاطعی درمورد جنبه‌های اجتماعی و بین‌فردي آن ارائه نشده است). اگرچه خانواده‌های کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/بیشفعالی، بیش از یک ربع قرن مورد مطالعه قرار گرفته‌اند (باتل و لیسی، ۱۹۷۲، کمپل، ۱۹۷۳، به نقل از جانستون و جی مش، ۱۳۸۵). اما اخیراً توجه به این موضوع کاهش یافته است و بسیاری از سؤال‌های مربوط به خانواده‌های کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/بیشفعالی بی‌پاسخ مانده است. همچنان در سطح توصیفی، میزان مشکلاتی که این خانواده‌ها در حیطه‌های روابط خانوادگی و ناسازگاری والدین تجربه می‌کنند، نامشخص است. عدم همسانی در نتایج پژوهش‌ها بیانگر این است که عوامل متعددی درمورد رابطه بین اختلال نارسایی توجه/بیشفعالی و تعامل‌های والد-کودک مؤثر است و تبیین ویژگی‌های کودکان و خانواده‌ها که تحت تأثیر عوامل مختلفی است، به صورت یک چالش باقی مانده است، (جانستون و جی مش، ۱۳۸۵).

با توجه به اینکه در زمینه میزان شیوع اختلال اختلال نارسایی توجه/بیشفعالی و اختلالات همراه با آن در خانواده‌های ایرانی بررسی اندکی انجام شده است. لذا در پژوهش حاضر به بررسی فراوانی نسبی این اختلال، همبودی آن با سایر اختلال‌ها در والدین کودکان اختلال نارسایی توجه/بیشفعالی و مقایسه آن با والدین کودکان سالم می‌پردازیم.

روش

تحقيق حاضر از نوع توصیفی و پس‌رویدادی (علی-

پرسشنامه نیمه‌ساختار یافته اختلال‌های عاطفی و اسکیزوفرنیا (کودکان و والدین) با والدین و کودک مصاحبه شد و یادآوری گردید که اطلاعات محرمانه می‌باشد.

یافته‌ها

۱- اختلالات روان‌شناختی در بزرگسالان در این قسمت، اطلاعات و شاخص‌های آماری شامل میانگین، انحراف معیار، فراوانی و درصد افراد نمونه آماری استخراج شده مربوط به پرسشنامه اختلال‌های عاطفی و اسکیزوفرنیای والدین افراد نمونه آماری است که اختلالات روان‌شناختی در بزرگسالان مانند مشکلات روان‌بزشکی، دوره‌های افسردگی اساسی و خفیف، دوره‌های سندروم مانی و هیپومنی، سوء مصرف مواد یا وابستگی، دوره‌های پسیکوز، اختلال پانیک، اختلال اضطراب فرگیر، اختلال وسوس، اختلال فوبی، شخصیت ضداجتماعی، اختلال جسمی‌سازی، رفتار خودکشی، اختلال استرس پس از رویداد آسیب‌زا، اختلالات تجزیه‌ای، صرع، زوال عقل، کم‌توانی ذهنی و اختلالات روانی دیگر را می‌سنجد که در جدول زیر ارائه می‌شود.

براساس دستورالعمل مربوط به طبقه‌بندی افراد در دو گروه سالم و افراد دارای اختلال، فراوانی، درصد افراد نمونه آماری، میانگین و انحراف معیار استخراج به ترتیب در جدول زیر گزارش می‌گردد.

جدول ۱- شاخص‌های آماری اختلال‌های عاطفی و اسکیزوفرنیای والدین کودکان عادی و کودکان بیش‌فعال

اختلال	کودکان عادی											
	کودکان بیش‌فعال						کودکان عادی					
	کودکان بیش‌فعال	کودکان عادی										
افسردگی اساسی	۴.۳۳	۹.۶۶	۴.۸۳	۱۰.۰۴	۱۵.۳	۶۱	۸۴.۷	۳۳۸	۱۷.۱	۶۷.۵	۸۲.۹	۲۲۷
افسردگی اساسی تک دوره	۶.۱۶	۱۷.۳۹	۱۲.۰۵	۳۲.۲۲	۱۶.۰	۶۴	۸۴.۰	۳۲۵	۱۷.۲	۶۸	۸۲.۸	۲۲۷
افسردگی اساسی راجعه	۲.۶۸	۵.۹۱	۲.۲۹	۶.۷۸	۱۲.۵	۵۰	۸۷.۵	۳۴۹	۱۷.۲	۶۸	۸۲.۸	۲۲۷
افسردگی خوبی	۳.۸۴	۸.۴۷	۴.۳۴	۸.۹۳	۱۵.۰۵	۶۰	۸۴.۹۵	۳۳۹	۱۸.۷	۷۴	۸۱.۳	۳۲۱
افسردگی خفیف	۲.۰۳	۵.۲۲	۲.۴۹	۶.۲۱	۷.۰۵	۲۸	۹۲.۹۵	۳۷۱	۹.۱۵	۳۶	۹۰.۸۵	۳۵۹
هایپومنیک	۰.۰۸	۱.۵۵	۰.۳۵	۲.۶۱	۰.۳	۱	۹۹.۷	۳۹۸	۱.۴	۵.۵	۹۸.۶	۳۸۹
مانیک	۰.۰۸	۱.۵۵	۰.۳۵	۲.۶۰	۰.۳	۱	۹۹.۷	۳۹۸	۱.۴	۵.۵	۹۸.۶	۳۸۹

ویراست پنجم ارزیابی می‌کند. این آزمون ویژگی بالا و حساسیت پایینی دارد (اسمالی و همکاران، ۲۰۰۰، به نقل از حبرانی، علاقه‌بندی و محمدی، ۱۳۸۲).

پرسشنامه اختلال‌های عاطفی و اسکیزوفرنیا (کودکان): این پرسشنامه یک مصاحبه تشخیصی نیمه‌ساختاری‌یافته است که وجود اختلال را در طول زندگی و حمله کنونی ارزیابی می‌کند و برای افراد ۱۸-۶ سال به کار می‌رود و بر پایه راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی ویراست پنجم، اختلال‌ها را می‌سنجد و توسط متخصص بالینی احرا می‌شود. طیف اختلال‌هایی که توسط آزمون سنجیده می‌شود شامل، اختلال خلقی، پسیکوز، اختلال اضطرابی، اختلال خوردن، اختلال‌های دفعی، اختلال‌های رفتاری، ایدایی، تیک، سوء مصرف مواد و اختلال استرس پس از رویداد آسیب‌زا می‌باشد. این تست ویژگی بالا ولی احتمالاً حساسیت پایینی دارد. (آمبریوزینی^۵ ۲۰۰۰ به نقل از محمدی، علیپور، فرخزادی و رستمی، ۲۰۱۲).

روش

پس از تهیه پرسشنامه‌ها و تأیید روایی و اعتبار آنها با مراجعه به بیمارستان روزبه، کلینیک تخصصی یکی از مولفان و مدارس منطقه ۳ و ۵ شهر تهران، بعد از تشخیص اختلال نارسایی توجه /بیش‌فعالی در کودک توسط فوق‌تخصص روان‌بزشکی کودک و نوجوان طبق ضوابط تشخیصی راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی، ویراست پنجم، جهت پر کردن

بیش‌فعال

فریده فرhzادی و همکاران: مقایسه سلامت روانی والدین کودکان مبتلا به...

۰.۰۸	۱.۹۵	۰.۳۶	۲.۷۴	.۳	۱	۹۹.۷	۳۹۸	۱.۰	۴	۹۹.۰	۳۹۱	اختلال دو قطبی مانیک
۰.۰۸	۱.۰۵	۰.۳۵	۲۶۰	.۳	۱	۹۹.۷	۳۹۸	۱.۳	۵	۹۸.۷	۳۹۰	اختلال دو قطبی افسرده
۰.۰۸	۱.۰۵	۰.۶۰	۶.۲۰	.۳	۱	۹۹.۷	۳۹۸	۱.۳	۵	۹۸.۷	۳۹۰	اختلال دو قطبی نوع ۱-دوره مانیک منفرد
۲.۱۱	۰.۳۲	۲.۱۳	۰.۳۵	.۳	۱	۹۹.۷	۳۹۸	.۵	۲	۹۹.۵	۳۹۳	اختلال دو قطبی نوع ۱-دوره مانیک جدید
۲.۱۱	۰.۳۲	۲.۱۳	۰.۳۵	.۳	۱	۹۹.۷	۳۹۸	.۵	۲	۹۹.۵	۳۹۳	اختلال دو قطبی نوع ۱-دوره افسرده جدید
۰.۰۹	۰.۹۶	۰.۰۳	۰.۳۲			۱۰۰.	۳۹۹			۱۰۰.	۳۹۵	اختلال دو قطبی نوع ۲
۱.۰۵	۰.۵۱	۱.۰۲	۰.۲۲	۰.۳	۱	۹۹.۷	۳۹۸	۰.۶۵	۲.۵	۹۹.۳۵	۳۹۲	اختلال افسرده‌گی اساسی
۰.۱۶	۱.۸۲	۰.۳۸	۲۶۱	.۵	۲	۹۹.۵	۳۹۷	۱.۰	۴	۹۹.۰	۳۹۱	اختلال دو قطبی نوع ۲ با نمای سایکوتیک
۳.۹۲	۸.۸۰	۴.۵۰	۹.۴۱	۲.۵	۱۰	۹۷.۵	۳۸۹	۴.۱	۱۶	۹۵.۹	۳۷۹	اختلال دو قطبی نوع ۱ با نمای سایکوتیک
۰.۰۷	۰.۵۷	۰.۰۴	۰.۳۲			۱۰۰.	۳۹۹			۱۰۰.	۳۹۵	اختلال اسکیزو افکتیو
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰			۱۰۰.	۳۹۹			۱۰۰.	۳۹۵	اسکیزووفرینی(نوع ۱)
۰.۰۸	۰.۷۷	۰.۰۵	۰.۴۲			۱۰۰.	۳۹۹			۱۰۰.	۳۹۵	اختلال هذیانی
۰.۱۴	۱.۱۹	۰.۰۷	۰.۵۷	.۵	۲	۹۹.۵	۳۹۷	.۵	۲	۹۹.۵	۳۹۳	اختلال سایکوتیک
۰.۰۶	۰.۴۱	۰.۰۴	۰.۳۲	.۳	۱	۹۹.۷	۳۹۸			۱۰۰.	۳۹۵	اسکیزووفرنی فرم
۰.۴۹	۳.۵۰	۰.۵۱	۳.۲۰	۲.۰	۸	۹۸.۰	۳۹۱	۲.۵	۱۰	۹۷.۵	۳۸۵	اختلال سایکوتیک کوتاه‌مدت
۰.۴۴	۳.۱۲	۰.۵۰	۳.۰۷	۲.۰	۸	۹۸.۰	۳۹۱	۲.۵	۱۰	۹۷.۵	۳۸۵	حملات پانیک
۰.۱۵	۱.۰۹	۰.۱۹	۲.۲۵	۱.۸	۷	۹۸.۲	۳۹۲	.۵	۲	۹۹.۵	۳۹۳	حملات پانیک با گذر هراسی
۹.۴۲	۱۰.۵۰	۲.۸۹	۹.۶۸	۲۱.۸	۸۷	۷۸.۲	۳۱۲	۸.۲	۳۲	۹۱.۸	۳۵۸	اختلال اضطراب فراگیر
۰.۷۹	۲.۱۴	۰.۵۴	۱.۸۳	۴.۶	۱۸	۹۵.۴	۳۷۷					اختلال افکار وسوسی
۰.۵۳	۱.۴۷	۰.۵۸	۲.۹۷	۵.۱	۲۰	۹۴.۹	۳۷۵					اختلال اعمال وسوسی
۰.۰۳	۰.۳۳	۰.۰۴	۰.۲۶			۱۰۰.	۳۹۵					گذر هراسی
۰.۱۰	۱.۵۱	۰.۱۵	۱.۰۰	.۳	۱	۹۹.۷	۳۹۴					فوبي اجتماعي
۰.۴۲	۱.۸۴	۰.۱۹	۱.۰۳	.۵	۲	۹۹.۵	۳۹۳					فوبي ساده
۰.۱۳	۰.۹۳	۰.۰۸	۰.۵۷	.۳	۱	۹۹.۷	۳۹۴					حملات پانیک بدون گذر هراسی
۰.۱۱	۱.۳۶	۰.۱۶	۲.۴۵	.۵	۲	۹۹.۵	۳۹۳					شخصیت ضداجتماعی
۰.۰۹	۰.۹۰	۰.۲۴	۱.۴۷	.۵	۲	۹۹.۵	۳۹۳					جسمی سازی
۰.۰۲	۰.۲۰	۰.۰۳	۰.۲۵	۱.۵	۶					۹۸.۵	۳۸۹	خودکشی
۰.۴۵	۲.۷۲	۰.۹۰	۴.۳۱	.۵	۲	۹۹.۵	۳۹۳					اختلال استرس پس از رویداد آسیبزا
۰.۰۰	۰.۰۵	۰.۰۳	۰.۲۶	۰.۳۳	۱.۳۳	۱۰۰.	۳۹۵			۱۰۰.	۳۹۵	اختلال تجزیه‌ای
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰			۱۰۰.	۳۹۵					مسخ شخصیت
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰							۱۰۰.	۳۹۵	صرع
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰			۱۰۰.	۳۹۵					زوال عقل
۰.۰۳	۰.۵۰	۰.۰۰	۰.۰۰			۱۰۰.	۳۹۵					کم توانی ذهنی

این جدول نشان می‌دهد که از بین اختلالات موجود، میانگین افسرده‌گی اساسی و همچنین افسرده‌گی اساسی تک دوره در بین والدین کودکان عادی افراد نمونه آماری بیشتر و بالاتر از سایر اختلال‌هاست. همچنین اختلال اضطراب فراگیر، در بین والدین کودکان بیش فعال بیشتر و بالاتر از سایر اختلال‌هاست.

نتایج جدول ۱ نشان می‌دهد، از بین اختلالات موجود، تعداد و درصد افرادی که به افسرده‌گی اساسی و همچنین افسرده‌گی اساسی تک دوره مبتلا می‌باشند، در بین والدین کودکان عادی، افراد نمونه آماری بیشتر و بالاتر از سایر اختلال‌هاست. همچنین تعداد اختلال اضطراب فراگیر، اختلال اعمال وسوسی، اختلال شخصیت ضداجتماعی، اختلال فوبی ساده، اختلال فوبی اجتماعی، اختلال اسکیزووفرنی فرم، اختلال اگروفوبیا، اختلال پانیک، اختلال جسمی-سازی، اختلال خودکشی، اختلال استرس پس از رویداد و اختلال تجزیه‌ای در بین والدین کودکان بیش فعال بیش تر و بالاتر از سایر اختلال‌هاست.

بخش استنباطی:

جدول ۲- نتیجه حاصل از اجرای آزمون t مستقل در پرسشنامه اختلال‌های عاطفی و اسکیزوفرنیای والدین برای اختلالات خلقي

بیشترین مقدار	تفاوت میانگین‌ها		سطح معناداری	درجه آزادی	نسبت	sig	F	اختلال
	کمترین	p						
	مقدار							
۱.۸۷	-۰.۶۷	.۳۵۱	۷۹۲	.۹۳۳	.۰۶۹	۳.۳۱۳		افسرگی اساسی جدید
۱.۸۷	-۱.۰۸	.۵۹۷	۷۹۲	.۵۲۹	.۳۸۳	.۷۶۲		افسرگی اساسی قدیم
۹.۴۹	۲.۲۹	.۰۰۱	۷۹۲	۳.۲۰۹	.۰۰۰	۳۷.۴۸۴		افسرگی اساسی تک دوره
۹.۴۹	۲.۲۹	.۰۰۱	۷۹۲	۳.۲۰۹	.۰۰۰	۳۷.۴۸۴		افسرگی اساسی راجعه
۱.۴۹	-۰.۲۸	.۱۷۷	۷۹۲	۱.۳۵۱	.۰۰۴	۸.۳۴۸		افسرده خوبی جدید
۱.۵۱	-۰.۲۷	.۱۷۰	۷۹۲	۱.۳۷۳	.۰۰۳	۸.۷۸۵		افسرگی خفیف قدیم
۱.۹۱	-۱.۱۶	.۶۳۴	۷۹۲	.۴۷۶	.۴۶۰	.۵۴۷		افسرگی خفیف جدید
۰.۵۸	-۰.۰۲	.۰۶۹	۷۹۲	۱.۸۱۹	.۰۰۰	۱۲.۸۵۶		هابیومانیک قدیم
۰.۵۸	-۰.۰۲	.۰۶۹	۷۹۲	۱.۸۱۹	.۰۰۰	۱۲.۸۵۶		هابیومانیک جدید
۰.۵۷	-۰.۰۳	.۰۷۴	۷۹۲	۱.۷۹۱	.۰۰۰	۱۲.۴۳۴		مانیک جدید
۰.۵۷	-۰.۰۳	.۰۷۴	۷۹۲	۱.۷۹۱	.۰۰۰	۱۲.۴۳۴		مانیک قدیم
۰.۵۷	-۰.۰۳	.۰۷۴	۷۹۲	۱.۷۹۱	.۰۰۰	۱۲.۴۳۴		اختلال دو قطبی مانیک
۰.۶۰	-۰.۰۳	.۰۷۹	۷۹۲	۱.۷۶۰	.۰۰۱	۱۱.۹۸۵		اختلال دو قطبی افسرده
۰.۵۷	-۰.۰۳	.۰۷۴	۷۹۲	۱.۷۹۱	.۰۰۰	۱۲.۴۳۴		اختلال دو قطبی نوع ۱-دوره مانیک مفرد
۱.۱۵	-۰.۱۱	.۱۰۳	۷۹۲	۱.۶۳۲	.۰۰۱	۱۰.۲۱۸		اختلال دو قطبی نوع ۱-دوره مانیک جدید
۰.۰۶	-۰.۰۳	.۵۶۳	۷۹۲	.۵۷۸	.۲۴۲	۱.۳۷۳		اختلال دو قطبی نوع ۱-دوره افسرگی جدید
۰.۰۶	-۰.۰۳	.۵۶۳	۷۹۲	.۵۷۸	.۲۴۲	۱.۳۷۳	۲	اختلال دو قطبی نوع ۲

چنین قضاوت کرد که تفاوت معنی‌داری بین اختلال‌های فوق الذکر در والدین کودکان بیش‌فعال بیشتر و بالاتر از این اختلالات در والدین کودکان عادی مشاهده می‌شود، ولی این تفاوت در سایر اختلالات معنادار نیست.

اطلاعات جدول ۲ نشان می‌دهد، از آنجا که p (سطح معنی‌داری در دو دامنه) مربوط اختلال‌های افسرگی اساسی تک دوره، افسرگی اساسی راجعه، آلفای 0.05 کوچکتر هستند و به عبارت دیگر p برابر با ($p < 0.05$) و همچنین t حاصله نیز در اختلالات فوق از t جدول (۱/۹۶) بزرگتر می‌باشند، لذا می‌توان

جدول ۳- نتیجه حاصل از اجرای آزمون t مستقل در پرسشنامه اختلال‌های عاطفی و اسکیزوفرنیای والدین برای اختلالات سایکوتیک

کمترین مقدار	تفاوت میانگین‌ها		سطح معناداری	درجه آزادی	نسبت	sig	F	اختلال
	کمترین	p						
	بیشترین مقدار							
.۰۵	-۰.۱۵	.۲۸۳	۷۹۲	-۱.۰۷۵	.۰۳	۴.۵۶۹		اختلال افسرگی اساسی با نمای سایکوتیک جدید
.۰۰۵	-۰.۱۵	.۲۸۳	۷۹۲	-۱.۰۷۵	.۰۳۳	۴.۵۶۹		اختلال افسرگی اساسی با نمای سایکوتیک قدیم
.۰۰۲	.۰۰۰	.۰۹۹	۷۹۲	۱.۶۵۲	.۰۰۱	۱۱.۰۷۲		اختلال دو قطبی نوع ۲ با نمای سایکوتیک
.۰۵۳	-۰.۱۰	.۱۷۵	۷۹۲	۱.۳۵۷	.۰۰۹	۶.۹۳۶		اختلال دو قطبی نوع ۱ با نمای سایکوتیک

اطلاعات جدول ۳ نشان می‌دهد، از آنجا که p (سطح معنی‌داری در دو دامنه) مربوط اختلال‌های فوق از آلفای 0.05 بزرگتر هستند و به عبارت دیگر p ($p < 0.05$) و همچنین t حاصله نیز در اختلالات فوق

عادی مشاهده نمی‌شود و این تفاوت در اختلالات معنادار نیست.
جدول ۴-نتیجه حاصل از اجرای آزمون t مستقل در پرسشنامه اختلال‌های عاطفی و اسکیزوفرنیای والدین برای اختلالات اضطرابی

اختلال	F	sig	t	نسبت	درجه آزادی	سطح معناداری	P	کمترین مقدار	بیشترین مقدار	تفاوت میانگین‌ها
حملات پانیک	.۰۲۵	.۸۷۳	.۰۹۵	.۷۹۲	.۷۹۲	.۹۲۴	.۰۴۶	-.۰۴۴	.۰۴۹	
حملات پانیک با گذر هراسی	.۲۴۹	.۶۱۸	.۲۶۲	.۷۹۲	.۷۹۲	.۷۹۳	-.۰۳۷	.۰۴۹		
اختلال اضطراب فراگیر جدید	.۲۲۳۵۲	-.۳۰۳۷	.۷۸۷	.۰۰۲	.۱۴۹۸	-.۳۲۲			
اختلال اضطراب فراگیر قدیم	.۱۰۷۰۸۲	-.۵۰۶۶	.۷۸۷	.۰۰۰	.۵۵۰	-.۲۴۳			
اختلال افکار وسوسی	.۱۱۸۳۵	...۰۱	-۱.۷۷۱	.۷۹۲	.۰۷۷	.۰۵۳	-.۰۰۳			
اختلال اعمال وسوسی	.۰۵۹۷	.۴۴۰	.۲۷۶	.۷۹۲	.۷۸۲	.۷۸۲	-.۰۳۷	.۰۲۸		
گذر هراسی	.۰۹۰	.۳۴۱	.۴۸۸	.۷۹۲	.۶۲۶	.۰۰۳	-.۰۰۵			
فوبي اجتماعي	.۱۱۴۶	.۲۸۵	.۵۶۶	.۷۹۲	.۰۵۷۲	.۰۱۳	-.۰۲۳			
فوبي ساده	.۱۱۲۲۲	...۰۱	-۲.۱۰۹	.۷۹۲	.۰۳۵	.۰۴۳	-.۰۰۲			
حملات پانیک بدون گذر هراسی	.۴۰۰۸۸	.۰۴۴	-.۹۸۹	.۷۹۲	.۲۲۳	.۰۱۶	-.۰۰۵			

چنین قضاوت کرد که تفاوت معنی‌داری بین اختلال‌های فوق الذکر در والدین کودکان بیش فعال بیشتر و بالاتر از این اختلالات در والدین کودکان عادی مشاهده می‌شود، ولی این تفاوت در سایر اختلالات معنادار نیست.

اطلاعات جدول ۴ نشان می‌دهد، از آنجا که p (سطح معنی‌داری در دو دامنه) مربوط اختلال‌های اضطراب فراگیر(جدید و قدیم) و فوبی ساده، از آلفای ۰/۰۵ کوچکتر هستند و به عبارت دیگر، p برابر با (p<0/05) و همچنین t حاصله نیز در اختلالات فوق از t جدول (1/۹۶) بزرگتر می‌باشدند، لذا می‌توان

جدول ۵-نتیجه حاصل از اجرای آزمون t مستقل در پرسشنامه اختلال‌های عاطفی و اسکیزوفرنیای والدین برای سایر اختلالات

اختلال	F	sig	t	نسبت	درجه آزادی	سطح معناداری	P	کمترین مقدار	بیشترین مقدار	تفاوت میانگین‌ها
شخصیت صداجماعی	.۴۵۱	.۵۰۲	.۳۳۲	.۷۹۲	.۷۴۰	.۰۲۳	-.۰۳۲			
جسمی‌سازی	.۱۲۵۶۷	.۰۰۰	۱.۷۶۳	.۷۹۲	.۰۷۸	.۰۰۰۲	-.۰۳۲			
خودکشی	.۱۷۰۳	.۱۹۲	.۶۵۲	.۷۹۲	.۰۱۵	.۰۰۰۲	-.۰۰۴			
اختلال استرس پس از رویداد آسیب‌زا	.۱۱۴۲۶	...۰۱	۱.۷۰۸	.۷۹۲	.۰۸۸	.۰۰۰۷	-.۰۰۴			
اختلال استرس پس از رویداد آسیب‌زا	.۱۱۱۰۷	...۰۱	۱.۶۸۳	.۷۹۲	.۰۹۳	.۰۰۰۷	-.۰۹۱			
اختلال استرس پس از رویداد آسیب‌زا	.۱۶۶۵۸	...۰۰۰	۲.۰۳۹	.۷۹۲	.۰۴۲	.۰۰۰۲	.۰۹۳			
سرگردانی تجزیه	.۴۰۰۶۱	.۰۴۴	۱.۰۰۵	.۷۹۲	.۳۱۵	.۰۰۰	.۰۰۱			
یاد زدودگی تجزیه‌ای	.۱۴۷۸۷	...۰۰۰	۱.۹۰۸	.۷۹۲	.۰۵۷	.۰۰۰	.۰۱۳			
کم توانی ذهنی	.۳۹۸۰	.۰۴۶	-.۹۹۵	.۷۹۲	.۲۲۰	.۰۰۰۷	-.۰۰۲			

بالا می‌توان قضاوت نمود که والدین کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی در مقایسه با والدین کودکان بدون اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی، سلامت روانی کمتری دارند
بحث و نتیجه گیری

هدف این تحقیق، مقایسه سلامت روانی والدین کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی و والدین کودکان سالم است. نتایج در پژوهش حاضر نشان داد که والدین کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی از سلامت روان کمتر برخوردارند.

اطلاعات جدول ۵ نشان می‌دهد، از آنجا که p (سطح معنی‌داری در دو دامنه) مربوط به اختلال پس از رویداد آسیب‌زا، از آلفای ۰/۰۵ کوچکتر هستند و به عبارت دیگر p برابر با (p<0/05) و همچنین t حاصله نیز در اختلالات فوق از t جدول (1/۹۶) بزرگتر می‌باشدند، لذا می‌توان چنین قضاوت کرد که تفاوت معنی‌داری بین اختلال‌های فوق الذکر در والدین کودکان بیش فعال بیشتر و بالاتر از این اختلالات در والدین کودکان عادی مشاهده می‌شود، ولی این تفاوت در سایر اختلالات معنادار نیست. بنابر شواهد

دارای کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه و بیشفعالی کار کردند و به این نتیجه رسیدند که مادران کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه و بیشفعالی نسبت به مادران کودکان عادی فاقد چنین اختلال، افسردگی و اضطراب بیشتری را متحمل می‌شوند که در پژوهش حاضر نیز اختلال اضطراب فرآگیر در والدین کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه بیشفعالی بیشتر می‌باشد و با نتایج این پژوهش هم‌سویی دارد. صالحی، سالاری‌فر و هادیان (۱۳۸۳) در بررسی مقایسه سلامت روانی مادران و کودکان در چار اختلال روان‌پزشکی با کودکان سالم به این نتیجه دست یافتند که مادران کودکان مبتلا به اختلال روان‌پزشکی از افسردگی و اضطراب بیشتر و کارکرد اجتماعی و سلامت روان پایین‌تر برخوردارند که در پژوهش حاضر نیز اختلال اضطراب فرآگیر در والدین کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه بیشفعالی بیشتر می‌باشد و با نتایج این پژوهش هم‌سویی دارد.

محمدی، علیپور، فرخزادی و رستمی (۲۰۱۲) پژوهشی در مورد مقایسه سابقه اختلال نارسایی توجه/بیشفعالی و سوءصرف مواد در والدین کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیشفعالی با والدین کودکان سالم انجام دادند. شیوع بالای اختلالات و سابقه اختلال نارسایی توجه/بیشفعالی در خانواده مبتلایان نشانگر احتمال به ارت رسیدن این اختلال می‌باشد و از طرفی نشان می‌دهد که والدین کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/بیشفعالی دارای سوءصرف مواد بیشتر و سابقه اختلال نارسایی توجه/بیشفعالی می‌باشند. در این پژوهش هم نشان داده شد که والدین کودکان اختلال نارسایی توجه/بیشفعالی از سلامت روان کمتر برخوردارند. محمدرضا، محمدی و معینی (۲۰۰۸) تحت عنوان «همپوشی اختلالات روانی مربوط به والدین در نمونه‌ای از کودکان ایرانی دارای اختلال نارسایی توجه/بیشفعالی» انجام دادند. در این

بیشتر بررسی‌های کنترل شده خانوادگی، خطر نسبی بالاتر اختلال نارسایی توجه بیش را در خویشاوندان درجه یک و دو مبتلایان به این اختلال گزارش کرده‌اند (بیدرمن، فارون کیناک، نی، تسوانگ، ۱۹۹۰، سادوک، سادوک، ۲۰۰۰، فارون، بیدرمن ۱۹۹۴، اسکاچار، واچماس، ۱۹۹۰). در بررسی‌های مختلف (بیدرمن و همکاران، ۱۹۹۲، دالکون و همکاران، ۱۹۹۷) خطر بیماری‌زایی برای اختلال نارسایی توجه ۲۵٪/در مقایسه با خطر نزدیک به ۵٪ در خویشاوندان گروه گواه اختلال روان‌پزشکی برآورده شده است (جانستون و جی مش، ۱۳۸۵). والس و همکاران (۲۰۰۱) به این نتیجه رسیدند که شایع‌ترین اختلالات روان‌پزشکی در فرزندان بیماران دوقطبی شامل اختلال افسردگی، نارسایی توجه/بیشفعالی و اختلال دوقطبی بود. در پژوهش حاضر نیز والدین کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/بیشفعالی از سلامت روان کمتر برخوردارند و با نتایج این پژوهش هم‌سویی دارد. از طرفی بیدرمن و همکاران (۱۹۸۶) پژوهشی تحت عنوان «مطالعه خانواده‌های بیماران دارای اختلال نارسایی توجه و گروه کنترل» انجام دادند. در بررسی خانوادگی اختلال نارسایی توجه، اطلاعاتی از خانواده‌های درجه اول از ۲۲ کودک دارای اختلال نارسایی توجه و ۲۰ کودک عادی جمع‌آوری شد. احتمال شیوع برای اختلال نارسایی توجه در گروه اول ۳۱/۵٪ بود که این میزان به طور قابل توجهی ۵/۷ درصد بیشتر از گروه عادی بود. در خانواده‌های گروه دارای اختلال نارسایی توجه، احتمال وجود اختلالات افسردگی و اختلال نافرمانی مقابله‌ای بیشتر بود. این یافته‌ها اشاره می‌کند که اختلال نارسایی توجه یک اختلال خانوادگی همراه و مرتبط با افزایش احتمال دیگر اختلالات روانی خانوادگی دیگر است. در پژوهش حاضر نیز نشان داده شد که والدین کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/بیشفعالی از سلامت روان کمتر برخوردارند. کولاکووسکی^۶، لیوسکا^۷ و ولانسی^۸ (۱۹۹۸) روی رابطه افسردگی و اضطراب در مادران

کودک) در مادران کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیشفعالی و مادران کودکان بهنجار تفاوت معناداری دیده می‌شود ($P<0.000$). نتیجهٔ پژوهش مذکور این بود که مادران کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیشفعالی در مقایسه با مادران کودکان بهنجار دارای تنفس والدگری بیشتری هستند که در پژوهش حاضر نیز اختلال اضطراب فرآگیر در والدین می‌باشد و با نتایج این تحقیق منطبق است. حبرانی، محمدی و علاقبند راد (۱۳۸۲) پژوهشی در مورد اختلال‌های روان‌پزشکی در خانواده کودکان مبتلا به نارسایی توجه/بیشفعالی انجام دادند. شایع‌ترین اختلال‌های روان‌پزشکی در بستگان کودکان مورد بررسی به ترتیب، اختلال‌های افسردگی $51/7\%$ ، اختلال نارسایی توجه/بیشفعالی $48/3\%$ ، اختلال‌های اضطرابی $41/7\%$ و اختلال‌های وسوسی اجباری 25% بود. نتیجهٔ این بررسی، شایع بالای اختلال نارسایی توجه/بیشفعالی، اختلال‌های خلقی و اضطرابی در خانواده بیماران مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیشفعالی می‌باشد که می‌تواند نشانگر یک زمینهٔ زنیکی مشترک بین این اختلال‌ها و زیرگروه‌هایی از اختلال نارسایی توجه/بیشفعالی باشد که از نظر عوامل خطر، سبب‌شناسی و پاسخ درمانی متفاوت هستند. در این تحقیق نیز درصد اختلال‌های اضطرابی و وسوسی در والدین کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/بیشفعالی بطور معنادار بیش‌تر می‌باشد و با بیش‌تر پژوهش‌ها همسویی دارد.

همان طور که نتایج پژوهش حاضر روشن نمود، درصد فراوانی اختلال اضطراب فرآگیر، اختلال افکار وسوسی، فوبی ساده، فوبی اجتماعی، حملات پانیک بدون گذر هراسی، اختلال جسمی‌سازی، اختلال استرس پس از رویداد آسیب‌زا، سرگردانی تجزیه‌ای، یاد‌زدودگی، خودکشی و کم‌توانی ذهنی در بین والدین کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/بیشفعالی، بیش‌تر از والدین کودکان عادی می‌باشد و

تحقیق، سن میانگین برای کودکان $8/7$ سال، برای مادران $40/1$ و پدران $34/6$ بود. فقط $7/6$ درصد از پسران و $21/7$ درصد از دختران اختلال نارسایی توجه/بیشفعالی را بدون اختلالات روانی دیگر داشتند. معمول‌ترین و بیش‌ترین نوع اختلال همراه اختلال رفتاری مخرب، اختلال اضطرابی بود. شایع اختلال نارسایی توجه/بیشفعالی در طول زندگی برای والدین به ترتیب $45/8\%$ و $47/7\%$ بود. مقدار اختلال افسردگی شدید در مادران و پدران به ترتیب $48/1\%$ و 43% بود. نتیجهٔ اینکه در نمونه‌های کلینیکی روان‌پزشکی، کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/بیشفعالی حداقل دارای یک اختلال روانی همراه هستند. معمولاً اختلال نافرمانی مقابله‌ای در پسرها و اختلال اضطراب در دخترها وجود دارد. معمول‌ترین اختلال روانی در والدین، اختلال خلقی بود. در پژوهش حاضر نیز اختلال اضطراب فرآگیر و فوبی ساده در والدین کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیشفعالی بیش‌تر از والدین کودکان سالم و اختلال‌های نافرمانی مقابله‌ای و سلوک در کودکان بیش‌فعال بیش‌تر از کودکان عادی می‌باشد. یوسفی، سلطانی و تیموری (۱۳۸۸)، پژوهشی تحت عنوان «مقایسه تنفس والدگری مادران کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیشفعالی با مادران کودکان بهنجار» انجام دادند. این پژوهش به منظور بررسی سطح تنفس والدگری در مادران کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیشفعالی و مقایسه آن با مادران کودکان بهنجار انجام شده بود. نتایج این پژوهش نشان داد که بین تنفس والدگری (قلمرو والد) و مؤلفه‌های آن در مادران کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیشفعالی و مادران کودکان بهنجار تفاوت معناداری وجود دارد ($P<0.000$) و نیز بین تنفس والدگری (قلمرو کودک) و مؤلفه‌های آن در مادران کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیشفعالی و مادران کودکان بهنجار تفاوت معناداری وجود دارد ($P<0.000$) و همچنین بین تنفس والدگری (قلمرو

باتوجه به ناهماهنگی برخی از یافته‌های بررسی حاضر با یافته‌های پژوهش‌های پیشین به نظر می‌رسد که پژوهشی با حجم نمونه بیشتر در مناطق مختلف و فرهنگ‌های مختلف، افزایش اعتبار یافته‌ها را در پی خواهد داشت و نیاز به بررسی بیشتر در زمینه سبب شناسی، سیر و پیش‌آگهی اختلال دارد.

تشکر و سپاسگزاری

بدین‌وسیله از همکاری آموزش و پژوهش کل استان تهران، آموزش و پژوهش منطقه ۵ و ۳، مدیران و کارکنان محترم مدارس (شهدا) چشم، هدایت، فیاض بخش)، مسئولین و کارکنان محترم بیمارستان روزبه و کلینیک تخصصی روان‌پژوهی کودکان و به ویژه ریاست محترم آن آقای دکتر محمدی و همچنین همه کودکان تحت آزمون و خانواده‌های محترم آنها به جهت همکاری صمیمانه برای انجام این پژوهش تشکر و قدردانی می‌شود.

یادداشت‌ها

1) Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Fifth Edition. (DSM5)

- 2) Goldstein
- 3) Daffy
- 4) Self - report
- 5) Ambrosini
- 6) Kolakowski
- 7) Liwska,
- 8) Wolanczy

منابع

- بخشایش و میرحسینی، (۱۳۹۳). اثربخشی بازی درمانی بر کاهش علائم اختلال بیش‌فعالی/نارسایی توجه. *مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام*، دوره بیست دوم، شماره ششم.
- جاستون، ش و جی‌مش، آ. (۱۳۸۵). خانواده‌های کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی (قسمت اول). *ترجمه فرشاد قدیری، محمود نجفی، نشریه تعلیم و تربیت استثنایی*، شماره ۵۴-۵۵، ص ۱۶-۳.
- جاستون، ش و جی‌مش، آ. (۱۳۸۵). خانواده‌های کودکان دارای اختلال نارسایی توجه - بیش‌فعالی (قسمت دوم). *ترجمه فرشاد قدیری، محمود نجفی، نشریه تعلیم و تربیت استثنایی*، شماره ۵۹، ص ۷-۱۸.
- جنتیان، س، نوری، آ، شفتی، ع، مولوی، ح و سماواتیان، ح. (۱۳۸۷). اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی - رفتاری بر شدت علایم اختلال بیش‌فعالی/نارسایی توجه در دانش‌آموزان پسر ۹ تا ۱۱ ساله مبتلا به اختلال نارسایی توجه بیش. *تحقیقات علوم رفتاری*، دوره ۲، شماره ۲.
- حبرانی، پ، علاقه‌بند راد، ج و محمدی، م. (۱۳۸۲). اختلال‌های روان‌پژوهی در خانواده کودکان مبتلا به نارسایی توجه بیش‌فعالی. *مجله اندیشه و رفتار، سال نهم*، شماره ۱.

تفاوت معناداری از نظر اختلالات اضطراب فراگیر، فوبی ساده و استرس پس از رویداد آسیب‌زا، بین والدین کودکان اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی با والدین کودکان عادی وجود دارد و این اختلالات در والدین کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی نسبت به والدین کودکان عادی بیشتر می‌باشد. بنابراین، سلامت روانی در والدین کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی کمتر از والدین کودکان عادی می‌باشد. بیشتر نتایج حاصله مربوط به این پژوهش با نتایج محققان و پژوهشگران پیشین همسوی دارد. چند اختلال که در والدین عادی بیشتر بوده است، ممکن است مربوط به نحوه نمونه‌گیری و نحوه پاسخ دادن والدین و عدم ابراز واقعیت‌ها باشد.

با توجه به شیوع بالای اختلال‌های روان‌پژوهی در خانواده کودکان مبتلا و هم در خود کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی می‌توان وجود یک زمینه ژنتیکی مشترک بین این اختلال‌ها را یادآور شد. در این پژوهش نیز همانند بسیاری از پژوهش‌های دیگر، محدودیت‌های در انجام پژوهش و تعمیم نتایج بدست آمده وجود داشت که به برخی از آنها اشاره می‌شود:

- ۱- یافته‌های پژوهش حاضر از طریق پرسش-نامه‌های خودگزارش‌دهی دانش‌آموزان و والدین در زمینه سلامت روان بدست آمده است که باید در تعمیم نتایج احتیاط لازم را لحاظ نمود.
- ۲- شرکت‌کنندگان در تحقیق حاضر حاضر، والدین دانش‌آموزان بدون اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی پسر منطقه ۳ و دانش‌آموزان دختر منطقه ۵ تهران بودند، لذا نتایج قابل تعمیم به همه دانش‌آموزان کشور نیست.
- ۳- عدم همکاری والدین
- ۴- محدودیت مهم این تحقیق، عدم نمونه گیری تصادفی است.

- between ADD and anxiety disorders, *American Journal of Psychiatry*, 48, 633-642.
- Biederman,J. Brown,A, B. Valera,E,M. Doyle. A, E. Bush, G. Spencer,T. Monuteaux,M,C. Mick, E. Whitfield- Gabrieli,S. Makris,N. La Violette. P, S. Oscar- Berman,M. Faraone,S,V.& Seidman. L, J. (2009). Effect of dopamine transporter gene (SLC6A3) variation on dorsal anterior cingulated function in attention-deficit/hyperactivity disorder. *AMJMed Gent B Neuropsychiatr Gent*, 153B(2), 75-365.
- Biederman,J.,Faraone,S.V.,Keenak,K.,Benjamin,J., & Krfcsher, B. (1992). Further evidence for family- genetic risk factor of ADIID, *Archive of General Psychiatry*, 49, 728-738.
- Biederman,J.,Faraone,S.V.,Keenak,K.,Knee,D.,& Tsuang, M. (1990) Family-genetic and psychosocial risk factors in DSM-III-ADD, *Journal of American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*,29,526-533.
- Duffy, A.Grof,P.Kutcher,S.Robertson,C.& Martin, A.(2001).Measures of attention and hyper activity symptoms in high-risk sample of children of bipolar parents.*Journal affective disorders*.159-165.
- Dulcan,M.,Dunne,J.,Ayres,W.,Benson,S.,Bemet,W.,Bukstein,O.,Kinlon,J.,Leonard,H.,&Licamele, W.(1997). Practice parameters for assessment and treatment of children and adolescents and adults with ADHD, *Journal of American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 36, (10 supplement) 85S-121S.
- Faraone S.V., & Biderman J. (1994). Genetics of ADHD, *Journal of Child & Adolescent Psychiatry*, 3, 285-301.
- Fernández,A.Ríos-Lago,M. Abasólo,D. Hornero,R. Álvarez-Linera,J. Paul,N. Maestú,F.& Ortiz.T. (2008). The correlation between white-matter microstructure and the Complexity analysis
- Ghanizadeh, A, Mohammadi, M & Moini, R. (2008). comorbidity of psychiatric disorders and parental psychiatric disorders in a sample of Iranian with ADHD, *J Atten Disord*, 12(2), 55-149
- Kolakowski,A.Liwska,M.&Wolanczy,T.(1998) State and trait anxiety and depression in mothers of children with ADHD *Europen psychiatry*. Volum15, pp.312s-312s(1).
- Mohammadi, M. Farokhzadi, F.Alipoor, A & Rostami,R.(2012). Substance Abuse Disorders in the Parents of ADHD Children, and Parents of Normal Children, *Acta Medica Iranica*; 50 (5): 319-327.
- of spontaneous brain activity in attention-deficit/hyperactivity disorder: diagnostic implications. *Biol Psychiatry*, 65(7), 7-571.
- Sadock,B.J. & Sadock,V.A.(2000). *Comprehensive textbook of psychiatry*, Philadelphia: Williams & Wilkins. (p.2679 -2693).
- خوشابی. ک. ، فروزان. آ. س ، مرادی. ش ، محمدخانی. پ. (۱۳۸۵). بررسی عوامل خطرساز در اختلال بیشفعالی/انراسی
- توجه در کودکان، ششمین همایش سالیانه انجمن علمی زنگنه.ع(۱۳۸۱). بررسی عوامل مرتبط با بهداشت روانی معلمین و دبیرستانهای خوف در شهر کرمان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه باهنر کرمان.
- سارافیو، ا. (۱۳۸۷). روانشناسی سلامت، ترجمه الهه میرزابی و همکاران، انتشارات رشد.
- صالحی، م. سالاری، فر، م و هادیان، م. (۱۳۸۳). مقایسه سلامت روانی مادران کودکان دچار اختلال روانپزشکی با گروه گواه. *مجله اندیشه و رفتار*، سال دهم، شماره ۱ و ۲.
- صدری کرمانی، ک.شیرازی ، آ و لوحه‌سر، ش. (۱۳۸۵). فراوانی اختلال بیشفعالی با نارسانی توجه در سابقه والدین کودکان مبتلا به این اختلال، *مجله اندیشه و رفتار*، سال دوازدهم، شماره ۱، ص ۵۸-۵۵.
- کاپلان و سادوک. (۲۰۰۷). خلاصه روانپزشکی (علوم رفتاری/ روانپزشکی بالینی)، ترجمه دکتر فرزین رضایی، ویراست دهم. کردستانی، د. (۱۳۹۱). تأثیر آموزش رفتاری والدین بر سلامت عمومی مادران کودکان با اختلال نارسانی توجه/بیشفعالی و کاهش مشکلات برون ریزانه این کودکان. *مجله علوم رفتاری*، دوره ۸، شماره ۳.
- میعی کرمانی، ص. (۱۳۸۳). مقایسه سلامت روانی والدین کودکان دبستانی مبتلا به اختلال بیشفعالی / نارسانی توجه با والدین کودکان عادی شهرستان فارسان با ملاحظه وضعیت اجتماعی- اقتصادی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
- یوسفی، ش، سلطانی، فر، ع و تیموری، س. (۱۳۸۸). مقایسه تنش والدگری مادران کودکان مبتلا به اختلال بیشفعالی و نقش توجه با مادران کودکان بهنجران. *مجله اصول بهداشت روانی*، شماره ۱۱، ص ۱۱۵-۱۲۲.
- Ambriosini,J.(2000).Historical development and pre-sent status of the schedule for affective disorders&schizophrenia for school age children (K-SADS), *Journal of American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*,39 ,526-534
- American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 5th ed Washington DC:USA; 2012-2013.
- BIEDERMAN J, MUNIR K, KNEE D et coll. A family study of patients with attention deficit disorder and normal controls. *Psychiatry Res* 1986, 20 : 263-274
- Biederman J, Petty CR, Ten Haagen KS, Small J, Doyle AE,& Spencer T, V.(2009). Effect of candidate gene polymorphisms on the course of attention deficit... *Psychiatry Res*. Dec 30;170(2-3):199-203.
- Biederman, J, Faraone, S.V., Keenak, K., Steinjard, R., & Tsuang, M. (1991). Famillial association

- Schachar R , & Wachsmuth , R. (1990). Hyperactivity and parental psychopathology. *Journal Child Psychol Psychiatry*. 31:381-392.
- Smalley, S.L., McGough, J.J., Del'Homme, M., NewDelman, J., Gordon, E., Kim, T., Liu, A., & McCracken, J.T. (2000). Familial clustering of symptoms and disruptive behavior in multiplex families with ADHD. *Journal of American Academy of child & adolescent psychiatry*, 39, 1135 -1185.
- Soreff , s. (2010). Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder. *Medicine specialties psychiatry child*.
- Wals M. Hillegers, MH. Reichart, CG. Ormel ,J. Nolen.WA.&Verhulst ,FC.(2001)..Prevalence of psychopathology in children of abipolar parent. *J AM Acad child Adolesc Psychiatry*:1020-1094.

