

علوم زیستی ورزشی _ زمستان ۱۳۹۴
دوره ۷، شماره ۴، ص : ۶۳۵ - ۶۴۷
تاریخ دریافت : ۱۲ / ۱۵ / ۹۲
تاریخ پذیرش : ۰۹ / ۲۰ / ۹۳

تأثیر مصرف حاد کافئین بر کراتین کیناز و لاكتات دهیدروژناز پلاسمای پس از یک جلسه فعالیت مقاومتی در مردان ورزشکار

عباس فروغی پردنگانی^۱ - محسن ابراهیمی^{*} - روح الله حق شناس^۲

۱. کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران. ۲. استادیار گروه فیزیولوژی ورزش دانشگاه سمنان، سمنان، ایران. ۳. استادیار گروه فیزیولوژی ورزش دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

براساس برخی شواهد مصرف کافئین قبل از فعالیت ورزشی بر آسیب عضلانی بدن اثر می‌گذارد. هدف پژوهش حاضر بررسی مصرف ۶ میلی‌گرم بر کیلوگرم کافئین متعاقب یک جلسه فعالیت ورزشی مقاومتی بر کراتین کیناز (CK) و لاكتات دهیدروژناز (LDH) در مردان فعل بود. ۲۰ دانشجوی پسر رشته تربیت بدنی (سن ۲۱/۲۲±۱/۲۵ سال، قد ۱۷۵/۱۳±۶/۸۸ سانتی‌متر، وزن ۶۹/۲۲±۷/۱۰ کیلوگرم و شاخص توده بدن ۲۲/۲۱±۲/۱۱ کیلوگرم بر متر مکعب، بهصورت تصادفی در دو گروه دارونما ($n=10$) و کافئین ($n=10$) تقسیم شدند و یک ساعت پیش از فعالیت مقاومتی بهصورت دوسوکور کافئین یا دارونما دریافت کردند. فعالیت مقاومتی شامل یک مرحله تمرین دایره‌ای در ۵ ایستگاه و هر ایستگاه شامل ۳ نوبت بود که هر نوبت با ۷۵ درصد یک تکرار بیشینه در ۸ تا ۱۰ تکرار انجام گرفت. نمونه‌های خونی قبیل از مصرف کافئین یا دارونما، بالاصله پس از تمرین، ۲۴ و ۴۸ ساعت بعد از تمرین جمع‌آوری شد. نتایج نشان داد تمرین مقاومتی موجب افزایش معنادار سطح آزمی CK ($P=0/013$) و LDH ($P=0/001$) شد. اما این تغییرات بین دو گروه تفاوت معناداری نداشت ($P\geq0/05$). بهنظر می‌رسد مصرف ۶ میلی‌گرم بر کیلوگرم کافئین قبل از فعالیت مقاومتی نمی‌تواند موجب کاهش شاخص‌های آسیب عضلانی در خون شود.

واژه‌های کلیدی

آسیب عضلانی، کافئین، کراتین کیناز، لاكتات دهیدروژناز، فعالیت مقاومتی.

مقدمه

هنگام فعالیت بدنی شدید، مصرف اکسیژن می‌تواند به بیش از ۲۰ برابر زمان استراحت افزایش یابد. در این زمان مصرف اکسیژن در تارهای عضلانی فعال ممکن است به ۲۰۰ برابر برسد و تولید رادیکال‌های آزاد را افزایش دهد (۱۷). این پدیده با اندازه‌گیری آنزیمهای آسیب عضلانی هم نامیده می‌شوند، اندازه‌گیری می‌شود. از جمله این شاخص‌ها می‌توان کراتین کیناز (CK) و لاکتات دهیدروژنаз (LDH) را نام برد. چندین نظریه برای توجیه سازوکارهای بروز آسیب عضلانی پیشنهاد شده که شامل نظریه‌های اسید لاتکتیک، اسپاسم عضلانی، تخریب بافت همبند، التهاب، نشت آنزیمهای درون‌عضلانی و نظریه تخریب عضلانی است (۱۶). با توجه به اینکه گونه‌های آزاد اکسیژن^۱ (ROS) در پاسخ به ورزش تولید شده و به آسیب اکسایشی و آسیب عضلات اسکلتی منجر می‌شود، امکان دارد مکمل‌های آنتی‌اکسیدانی با تقویت دفاع آنتی‌اکسیدانی بدن از فشار اکسایشی حاصل از ورزش، التهاب و آسیب عضلانی جلوگیری کنند (۳۲). از این‌رو محققان علوم ورزشی همواره در بی راهکارهایی هستند تا بهمنظور بهبود عملکرد، از تغییرات نامطلوب افزایش شاخص‌های آسیب عضلانی جلوگیری کنند یا دست کم آن را به پایین‌ترین حد ممکن برسانند. یکی از شیوه‌های مقابله با تأثیرات نامطلوب خستگی و فشارهای ناشی از فعالیت‌های بهنسیبت شدید استفاده از مکمل‌های خوراکی است (۳). از طرفی براساس نتایج برخی پژوهش‌ها، مداخلات تغذیه‌ای و استفاده از مکمل‌های آنتی‌اکسیدانی می‌تواند یکی از راه‌های مناسب برای محافظت در برابر آسیب عضلانی ناشی از فعالیت‌های ورزشی باشد (۲۸).

کافئین (۱،۳،۷-تری متیل گرانتین^۲) ماده‌ای است که به‌طور طبیعی در برخی مواد غذایی مانند قهوه، چای، کاکائو، شکلات و نوشابه‌های کولاکار وجود دارد (۱۴). کافئین در ورزشکاران رقابتی و تفریحی، یک کمک ارگوژنیک شناخته شده است (۳۱). کافئین بر بافت‌های مختلف مانند سیستم عصبی، متابولیکی، هورمونی، عضلانی، قلبی-عروقی، ریوی و عملکرد کلیه طی استراحت و فعالیت تأثیر می‌گذارد (۱۹، ۲۴). دوازگایام^۳ و همکاران (۱۹۹۶) کافئین را به لحاظ دارا بودن خواص آنتی‌اکسیدانی و فراوانی در نسوج بدن هم‌تراز با گلوتاتیون پراکسیداز معرفی کرده‌اند (۱۲). براساس یافته‌های این محققان در غلظت‌های میلی‌مولار، کافئین بازدارنده مؤثری در مقابل رادیکال‌های هیدروکسیل، پراکسیل

-
1. Reactive Oxygen Species
 2. 1,3,7-Trimethyl xanthine
 3. Davasagayam

و سوپراکسید است. باسینی کامرون^۱ و همکاران (۲۰۰۷)، طی مطالعه‌ای تأثیر مصرف کافئین بر آسیب عضلانی ورزشکاران متعاقب فعالیت ورزشی شدید را بررسی کردند. آنها گزارش کردند که مصرف کافئین موجب کاهش درد در ساق و عضلات پا در طول ورزش فوتbal شدید می‌شود (۵).

موتل^۲ و همکاران (۲۰۰۳)، پیشنهاد کردند احتمالاً اثر نیروافرایی کافئین علت اصلی کاهش درد در طول ورزش است (۲۶). همچنین مارکو و همکاران (۲۰۰۹)، در پژوهشی با عنوان «تأثیر مصرف کافئین بر آسیب عضلانی بازیکنان»، عدم تأثیر کافئین بر افزایش شاخص‌های آسیب عضلانی را مشاهده کردند (۲۲). از طرفی پترسون و همکاران (۲۰۰۷)، افزایش معنadar شاخص‌های آسیب عضلانی را متعاقب مصرف کافئین و فعالیت ورزشی شدید مشاهده کردند (۲۹). نظر به اینکه کافئین اهمیت زیادی در رژیم غذایی روزانه افراد دارد و کمیته بین‌المللی المپیک نیز مصرف متعارف کافئین را بلامانع دانسته است و با توجه به اینکه پژوهش‌های بسیار کمی در زمینه تأثیر کافئین بر آسیب عضلانی انجام گرفته و نتایج این پژوهش‌ها بسیار متناقض است، پرسش‌های زیادی در زمینه تأثیر کافئین بر آسیب عضلانی مطرح می‌شود که لزوم بررسی‌های بیشتر را آشکار می‌کند. از جمله این پرسش‌ها این است که آیا مصرف کافئین در ورزشکارانی که فعالیت مقاومتی انجام می‌دهند، از آن‌ها در مقابل آسیب عضلانی محافظت می‌کند یا اینکه بر عکس به صورت یک ماده اکسیداتیو عمل می‌کند؟ با توجه به موارد بالا محقق احتمال می‌دهد ارتباطی بین مصرف کافئین و آسیب عضلانی و گونه‌های رادیکال آزاد^۳ (ROS) وجود داشته باشد. احتمالاً بررسی تغییرات این متغیرها در حین ورزش تأثیر کافئین بر آسیب عضلانی و ROS را روشن‌تر خواهد کرد. بنابراین پژوهش حاضر در پی بررسی چگونگی تأثیر کافئین متعاقب یک جلسه فعالیت مقاومتی با وزنه بر برخی شاخص‌های آسیب عضلانی در مردان جوان ورزشکار است. بر این اساس هدف از این پژوهش بررسی اثر مصرف ۶ میلی‌گرم بر کیلوگرم کافئین و اجرای یک جلسه فعالیت مقاومتی با وزنه آزاد بر کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز (شاخص‌های آسیب عضلانی) در مردان جوان ورزشکار بود.

-
1. Bassini-Cameron
 2. Motl
 3. Reactive Oxygen Species

روش پژوهش

آزمودنی‌ها: این پژوهش از نوع نیمه‌تجربی است. جامعه آماری این پژوهش را ۱۲۰ نفر از دانشجویان پسر رشته تربیت بدنی ۱۹ تا ۲۴ ساله، با حداقل شش ماه ورزش مداوم و دست کم ۳ جلسه فعالیت ورزشی در هفته تشکیل دادند. از میان این افراد ۲۰ دانشجوی تربیت بدنی بهصورت نمونه‌گیری در دسترس و داوطلبانه در پژوهش حاضر شرکت کردند. پیش از آزمون، آزمودنی‌ها پرسشنامه سلامتی و فرم رضایت‌نامه شرکت در پژوهش را تکمیل کردند. همچنین براساس نیاز طرح و با استفاده از پرسشنامه مصرف کافئین، آزمودنی‌های با مصرف بیشتر از ۳۰۰ میلی‌گرم کافئین در شبانه‌روز حذف شدند. آزمودنی‌ها براساس دستورالعمل کتبی از هر گونه فعالیت شدید و مصرف فراوردهای غذیه‌ای مکمل و مواد غذایی دارای خواص آنتی‌اکسیدانی ۷۲ ساعت و مواد مصرفی حاوی کافئین ۴۸ ساعت قبل از برگزاری آزمون اصلی منع شدند.

اندازه‌گیری اولیه: یک هفته پیش از آزمون، آزمودنی‌ها تحت سنجش متغیرهای آنتروپومتریکی قرار گرفتند و داده‌های مربوط به قد، وزن، درصد چربی و شاخص توده بدنی اندازه‌گیری شد. بالاصله پس از اندازه‌گیری اولیه، بهمنظور آشنازی آزمودنی‌ها با حرکات و دستگاه‌های مورد استفاده، تمامی آزمودنی‌ها به سالن آمادگی جسمانی و بدنسازی فراخوانده شدند تا هم با شیوه مناسب جایه‌جا کردن وزنه‌ها و تکنیک صحیح نفس‌گیری آشنا شوند و هم یک تکرار بیشینه^۱ (IRM) آنها در حرکات مورد نظر محاسبه شود، برای تعیین IRM از فرمول برزیسکی^۲ استفاده شد (۸).

پروتکل ورزشی: پروتکل تمرین مقاومتی بهصورت دایره‌ای و شامل پنج ایستگاه بود، که بهترتیب عبارت است از اسکات، پرس سینه، پرس پا، جلو بازو و سرشانه با هالت. هر حرکت شامل سه نوبت و هر نوبت شامل ۸ تا ۱۰ تکرار بود. بین هر نوبت ۹۰ ثانیه و بین هر مرحله ۵ دقیقه استراحت گنجانده شد، شدت فعالیت برابر ۷۵ درصد IRM بود، این حرکات پس از ۱۵ دقیقه گرم کردن انجام گرفت (۴، ۲۵).

نحوه تهیه مصرف مکمل: مکمل کافئین با نام تجاری SIGMA-ALORICH از داخل کشور تهیه شد. ۶۰ دقیقه پیش از فعالیت (بهمنظور به حداقل رسیدن غلظت کافئین در خون)، مقدار ۶ میلی‌گرم بر کیلوگرم و همین مقدار دارونما (نشاسته) بههمراه ۲۰۰ میلی لیتر آب به روش دوسوکور به آزمودنی‌ها داده شد.

1. One-repetition maximum

2. Brzycki

نمونه‌گیری خون و ارزیابی بیوشیمیایی: اولین نمونه خون در ساعات اولیه صبح آزمون در حالت ناشتا (۱۲ ساعت ناشتایی) پیش از مصرف مکمل از محل ورید پیش آرنجی بازوی راست هر گروه اخذ شد و بهدلیل آن نمونه خون دوم بلافضله بعد از فعالیت مقاومتی و بار دیگر نمونه‌های خون سوم و چهارم در فاصله زمانی ۲۴ و ۴۸ ساعت پس از اجرای پروتکل ورزشی از همه آزمودنی‌ها جمع‌آوری شد. سطوح CK پلاسمما با استفاده از کیت‌های شرکت پارس آزمون (تهران، ایران) با حساسیت یک واحد و سطوح LDH هم با استفاده از کیت‌های شرکت پارس آزمون و با حساسیت پنج واحد با دستگاه اتو آنالایزر مدل هیتاچی (مدل ۹۰۲، ژاپن) تعیین شد.

روش تجزیه و تحلیل آماری: برای تجزیه و تحلیل داده‌ها ابتدا از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای تعیین نرمال بودن داده‌ها استفاده شد. سپس برای تفسیر شاخص‌ها در پاسخ به مکمل و ورزش در دو گروه از آزمون t مستقل و برای مقایسه تغییرات درون‌گروهی داده‌ها از تحلیل واریانس مکرر (یکطرفه) و تعقیبی بنفرونی در سطح معناداری 0.05 استفاده شد. از نرم‌افزار spss.20 برای تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها استفاده شد.

یافته‌های پژوهش

جدول ۱ آمار توصیفی ویژگی‌های فردی شامل سن، وزن، قد و BMI آزمودنی‌ها در دو گروه کافئین و دارونما را نشان می‌دهد.

در بررسی اطلاعات متغیرهای پژوهش، آمار توصیفی و نتایج تحلیل واریانس یکطرفه به تفکیک در دو گروه مکمل و دارونما در چهار مرحله آزمون در جدول ۲ نشان داده شده است.

جدول ۱. آمار توصیفی مربوط به ویژگی‌های فردی آزمودنی‌ها در دو گروه

	سن (سال)	وزن (کیلوگرم)	قد (سانتی‌متر)	BMI (کیلوگرم بر مترمربع)
گروه کافئین	۲۰/۸۲±۱/۲۶	۶۶/۵۲±۷/۴۴	۱۷۴/۱۱±۸/۲۰	۲۱/۷۶±۲/۱۳
گروه دارونما	۲۱/۶۴±۱/۱۵	۷۷/۵۶±۵/۹۴	۱۷۷/۵۶±۵/۰۰	۲۲/۸۶±۲/۲۸

جدول ۲. داده‌های گروه کافئین و دارونما

		P***	بین گروهی	M±SD	دارونما	M±SD	کافئین	آزمون
CK	*گروه کافئین	۰/۰۳۳	۰/۹۹۶	۱۵۵/۷۸±۴۶/۵۱	۱۳۵/۳۳±۶۲/۴۴	۱۹۵/۸۹±۶۲/۲۵	۱۹۵/۶۷±۱۳۱/۹۸	پیش از مصرف مکمل بلافضله بعد از تمرین
	*گروه دارونما	۰/۰۱۳	۰/۲۰۳	۳۳۰/۳۳±۱۳۷/۴۷	۲۵۳/۰۰±۱۰۷/۴۹	۲۴۱/۰۰±۸۵/۲۷	۱۹۵/۶۷±۷۵/۸۸	۲۴ ساعت بعد از تمرین
	زمان	۰/۲۸۴	۰/۲۵۵	۲۰۰/۴۴±۲۰/۸۲	۲۲۲/۳۳±۵۱/۶۰	۲۱۹/۳۳±۲۷/۳۴	۲۴۲/۶۷±۴۸/۹۵	پیش از مصرف مکمل بلافضله بعد از تمرین
	گروه دارونما	۰/۰۰۱	۰/۹۲۶	۱۹۱/۳۳±۲۱/۶۶	۱۹۳/۰۰±۴۸/۵۴	۱۹۸/۳۳±۲۲/۶۴	۲۰۳/۷۸±۳۵/۱۹	۲۴ ساعت بعد از تمرین
LDH	زمان	۰/۴۵۴	۰/۷۰۲	۱۹۸/۳۳±۲۲/۶۴	۲۰۳/۷۸±۳۵/۱۹	۱۹۵/۶۷±۷۵/۸۸	۱۹۵/۶۷±۶۲/۴۴	۴۸ ساعت بعد از تمرین
	گروه دارونما	۰/۰۰۱	۰/۹۲۶	۱۹۱/۳۳±۲۱/۶۶	۱۹۳/۰۰±۴۸/۵۴	۲۱۹/۳۳±۲۷/۳۴	۲۴۲/۶۷±۴۸/۹۵	۲۴ ساعت بعد از تمرین
	زمان	۰/۲۸۴	۰/۲۵۵	۲۰۰/۴۴±۲۰/۸۲	۲۲۲/۳۳±۵۱/۶۰	۲۰۰/۴۴±۲۰/۸۲	۲۰۰/۴۴±۲۰/۸۲	پیش از مصرف مکمل بلافضله بعد از تمرین
	گروه دارونما	۰/۰۰۱	۰/۹۲۶	۱۹۱/۳۳±۲۱/۶۶	۱۹۳/۰۰±۴۸/۵۴	۱۹۸/۳۳±۲۲/۶۴	۱۹۵/۶۷±۷۵/۸۸	۴۸ ساعت بعد از تمرین

* معناداری در سطح ($p \leq 0.05$)

** مقدار P بیانگر آزمون تی مستقل بین گروه کافئین و دارونما

*** Sig بیانگر آزمون تحلیل واریانس یکطرفه و تعقیبی بنفرونی در گروههای مکمل و دارونما

نتایج نشان داد مقدار CK در گروه کافئین پس از تمرین مقاومتی بهطور معناداری افزایش یافت

($P=0.033$). همچنین مقدار CK در گروه دارونما پس از تمرین مقاومتی بهطور معناداری افزایش پیدا

کرد ($P=0.013$), اما تفاوت بین گروه کافئین و دارونما در کاهش CK معنادار نبود ($P=0.284$).

به عبارت دیگر مصرف ۶ میلی گرم بر کیلوگرم کافئین در کاهش CK متعاقب یک مرحله تمرین مقاومتی با ۱RM ۷۵ درصد تأثیر نداشته است (نمودار ۱).


نتایج نشان داد مقدار LDH در گروه کافئین پس از تمرین مقاومتی بهطور معناداری افزایش یافت

($P=0.021$). همچنین مقدار LDH در گروه دارونما پس از تمرین مقاومتی بهطور معناداری افزایش پیدا


کرد ($P=0.011$), اما تفاوت بین دو گروه کافئین و دارونما در افزایش LDH معنادار نبود ($P=0.454$).

به عبارت دیگر مصرف ۶ میلی گرم بر کیلوگرم کافئین در کاهش LDH متعاقب یک مرحله فعالیت

مقاومتی با ۱RM ۷۵ درصد تأثیر نداشته است (نمودار ۲).



نمودار ۱. تغییرات مقادیر CK در مراحل مختلف اندازه‌گیری



نمودار ۲. تغییرات مقادیر LDH در مراحل مختلف اندازه‌گیری

بحث

با توجه به نتایج بهنظر می‌رسد مصرف ۶ میلی‌گرم بر کیلوگرم کافئین نمی‌تواند تأثیری بر افزایش آنزیم‌های CK و LDH داشته باشد. آتشک و بتوراک^۱ (۲۰۱۲) بیان کردند که تمرين مقاومتی به عنوان

1. Atashak & Batorak

فشار مکانیکی می‌تواند موجب افزایش تغییرات بیوشیمیابی در بدن شود (۳۰). نتایج این پژوهش ضمن تأیید این مطلب حاکی از افزایش مقادیر CK گروه تجربی به مقدار ۴۸ درصد و افزایش LDH گروه تجربی به مقدار ۱۰ درصد بود. همچنین افزایش CK و LDH گروه دارونما به مقدار ۴۰ و ۱۰ درصد بود. در برخی مطالعات پیشین از افزایش آنزیمهای CK و LDH به عنوان شاخصی برای ارزیابی آسیب‌های سلول‌های عضلانی پس از فعالیت ورزشی استفاده می‌شود (۲). از سوی دیگر، مطالعات نشان داده‌اند تمرین‌های شدید و طولانی مدت بدون توجه به زمان بازیافت مناسب، موجب صدمه دیدن تارهای عضلانی در طول انقباضات، تجزیه درونی عضلات اسکلتی و بافت‌های همبند می‌شوند و با یک پاسخ التهابی، نفوذ ماکروفازها، آنزیمهای سیتوزومی و سیتوپلاسمی تارهای عضلانی، آزاد شدن آنزیمهای CK و LDH همراه می‌شود و به دنبال آنها علائم درد، محدودیت حرکتی و تغییرات بیوشیمیابی و اسپاسم تارهای عضلانی پدید می‌آید (۶، ۱۸). در عین حال افزایش CK و LDH به ویژه در مراحل تمرین و بازیافت، منعکس‌کننده تراوش پروتئین‌ها و احتمالاً سایر مواد از طریق غشای عضله است. ضمن اینکه عواملی مانند سن، جنس، آمادگی بدنی، فصل سال و نیز تمرین با افزایش نوسانات این آنزیمهای در ارتباط است (۳۳، ۹، ۱۳، ۷).

همسو با نتایج پژوهش حاضر، مک براید^۱ و همکاران (۲۰۰۰) نشان دادند یک جلسه فعالیت مقاومتی شدید موجب افزایش شاخص‌های آسیب عضلانی در مردان تمرین کرده می‌شود (۲۵). در مطالعه‌ای آوری^۲ و همکاران (۲۰۰۳) به بررسی پروتکلی با سه جلسه فعالیت مقاومتی در سه روز مجزا پرداختند و بیان کردند که فعالیت مقاومتی موجب افزایش شاخص‌های آسیب عضلانی می‌شود (۴). در مطالعه‌ای دیگر گوزل^۳ و همکاران (۲۰۰۷) به بررسی تأثیر دو پروتکل متفاوت فعالیت مقاومتی بر شاخص‌های آسیب عضلانی مردان کم تحرک سالم پرداختند. این محققان دریافتند که فعالیت ورزشی با شدت باشد بالا موجب افزایش بیشتر شاخص پراکسیداسیون لیپیدی به نسبت فعالیت ورزشی باشد پایین می‌شود (۱۵). همچنین لیو^۴ و همکاران (۲۰۰۵)، نوین^۵ همکاران (۲۰۰۷)، دمینیک^۶ و همکاران (۲۰۱۱) در تأیید این مسئله بیان کردند که فعالیت مقاومتی موجب ایجاد آسیب عضلانی

1. McBride

2. Avery

3. Guzel

4. Liu

5. Nevin

6. Deminice

می‌شود (۲۷، ۲۰، ۱۱، ۱۰). با این حال، این نتایج در تضاد با یافته‌های مطالعه مک آنالتی^۱ و همکاران (۲۰۰۵) بود که گزارش دادند یک جلسه فعالیت مقاومتی تأثیر معناداری بر شاخص‌های آسیب عضلانی در مردان ورزشکار ندارد (۲۳). شاید یکی از دلایل تناقض یافته‌های آنها با مطالعه حاضر، شدت کمتر فعالیت ورزشی در مطالعه آنها (۴۰-۶۰ درصد IRM) در مقایسه با مطالعه حاضر (۷۵ درصد IRM) باشد.

به‌نظر می‌رسد از جمله سازوکارها و نظریه‌های عمل احتمالی که از طریق آن ورزش‌های مقاومتی می‌تواند موجب تولید آسیب عضلانی شود، تغوری «آسیب تزریق مجدد - ایسکمی^۲» است (۱) که بیانگر آن است که انقباض‌های عضلانی شدید ممکن است موجب کاهش موقت جریان خون و در دسترس بودن اکسیژن و در نتیجه ایسکمی شود. پس از انقباض‌های (مرحله انبساط عضلانی) تزریق مجدد خون موجب عرضه فراوان اکسیژن و در نتیجه تولید رادیکال‌های آزاد اکسیژن می‌شود. استرس و فشارهای مکانیکی^۳ فرضیه و سازوکار بعدی توجیه کننده افزایش آسیب عضلانی متعاقب فعالیت‌های مقاومتی می‌تواند باشد (۱). بر این اساس، ورزش‌های مقاومتی به‌ویژه انقباض‌های برون‌گرا موجب آسیب بافت عضلانی و متعاقب آن شروع فرایندهای التهابی و سرانجام تولید رادیکال‌های آزاد اکسیژن و پراکسیداسیون لیپیدی می‌شود.

اما در زمینه اثر کافئین بر آسیب عضلانی، نتایج این پژوهش نشان داد که تغییرات سطوح کراتین کیناز و لاكتات دهیدروژناز به عنوان شاخص پلاسمایی آسیب عضلانی تحت تأثیر مصرف کافئین قرار نگرفت (نمودارهای ۱ و ۲) که این نتایج همسو با نتایج مارکو^۴ و همکاران (۲۰۰۹) و مهدوی^۵ و همکاران (۲۰۱۲) است.

مارکو و همکاران تأثیر مصرف ۵/۵ میلی‌گرم بر کیلوگرم کافئین بر شاخص‌های آسیب عضلانی پس از دوازده مرحله آزمون دوی سرعت ۲۰ متر را بررسی کردند. نتایج این پژوهش هیچ اثری از خواص پراکسیدانی - آنتی‌اکسیدانی کافئین بعد از آزمون آشکار نساخت (۲۲). همچنین مهدوی و همکاران در تحقیقی اثر مصرف ۵ میلی‌گرم بر کیلوگرم کافئین را متعاقب آزمون وینگت بر شاخص‌های فشار اکسایشی و آسیب عضلانی بررسی کردند. آنها در وهله اول افزایش معناداری از این شاخص‌ها متعاقب تست وینگت مشاهده نکردند. همچنین تفاوت معناداری بین دو گروه کافئین و دارونما مشاهده نکردند (۲۱).

1. McAnulty

2. Ischemia-reperfusion injury

3. Mechanical stress

4. Marco

5. Mahdavi

از طرفی برخی پژوهش‌ها نشان دادند که مصرف کافئین از بروز آسیب عضلانی جلوگیری می‌کند یا خود می‌تواند موجب بروز آسیب عضلانی شود. برای مثال باسینی کامرون^۱ و همکاران (۲۰۰۷)، طی مطالعه‌ای تأثیر مصرف کافئین بر آسیب عضلانی ورزشکاران متعاقب فعالیت ورزشی شدید را بررسی کردند. آنها گزارش کردند که مصرف کافئین موجب کاهش درد در ساق و عضلات پا در طول ورزش شدید می‌شود (۵). موتل^۲ و همکاران (۲۰۰۳) بیان کردند احتمالاً اثر نیروافزاگی کافئین علت اصلی کاهش درد در طول ورزش است (۲۶). از طرفی پترسون و همکاران (۲۰۰۷)، افزایش معنادار شاخص‌های آسیب عضلانی را متعاقب مصرف کافئین و فعالیت شدید ورزشی را مشاهده کردند (۲۹). این تنافق‌ها ممکن است ناشی از عوامل اثرگذار و مداخله‌گر مانند سن، جنس، تفاوت‌های فردی، آمادگی بدنی، نوع فعالیت بدنی و نحوه مکمل‌دهی باشد. همچنین شدت و مدت فعالیت بدنی هم ممکن است از دلایل اصلی وجود تنافق بین پژوهش‌های مختلف باشد.

نتیجه‌گیری

با توجه به افزایش معنادار غلظت CK و LDH که یکی از نشانگرهای اصلی آسیب عضلانی است، نتیجه گرفته می‌شود حتی یک جلسه فعالیت مقاومتی می‌تواند موجب آسیب عضلانی شود. همچنین مکمل‌سازی کافئین نمی‌تواند روند آسیب سلولی را مهار کند و از آسیب سلولی ناشی از تولید رادیکال‌های آزاد متعاقب یک جلسه فعالیت مقاومتی جلوگیری بعمل آورد.

تشکر و قدردانی

از دانشجویان عزیزی که با صبر و حوصله در این تحقیق شرکت کردند تشکر و قدردانی می‌شود.

منابع و مأخذ

- آتشک، سیروان؛ شرفی، حسین؛ آذری‌جانی، محمدعلی؛ گلی، محمدممین؛ بتوراک، کاوه؛ کریمی، وریا. (۱۳۹۱). "تأثیر مکمل اسید چرب امگا-۳ بر پراکسیداسیون لیپیدی و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام پلاسمما متعاقب یک جلسه فعالیت مقاومتی در مردان ورزشکار جوان". *مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان*. دوره هفدهم، ص ۵۱-۵۹.

1. Bassini-Cameron
2. Motl

۲. شیخ الاسلامی وطنی، داریوش؛ مرادی، آرزو. (۱۳۹۱). "پاسخ هورمونی، شاخص‌های آسیب عضلانی و غلظت اسیدهای آمینه پلاسمای دنبال فعالیت مقاومتی حاد همراه با مصرف مکمل BCAA". *علوم زیستی ورزش*. ش ۱۵، ص ۶۲-۴۵.
۳. کاشف، مجید؛ بنیان، عباس؛ راد، مرتضی. (۱۳۹۱). "تأثیر مصرف مکمل کراتین و مخلوط کراتین-کربوهیدرات بر توان بی‌هوایی و شاخص‌های آسیب سلولی (CK ، LDH) در پسران ورزشکار ۱۸-۱۵ ساله". *علوم زیستی ورزشی*. ش ۱۳، ص ۱۵۲-۱۲۵.
4. Avery NG, Kaiser JL, Sharman MJ, Scheett TP, Barnes DM, Gomez AL, et al. (2003). Effects of vitamin E supplementation on recovery from repeated bouts of resistance exercise. *Journal of Strength and Conditioning Research*; 17(4): 801-809.
 5. Bassini-Cameron A, Sweet E, Bottino A, Bittar C, Veiga C, Cameron LC. (2007). Effect of caffeine supplementation on haematological and biochemical variables in elite soccer players under physical stress conditions. *Br. J. Sports Med*; 41: 523-530.
 6. Belviranli M, and Gokbel H. (2006). Acute Exercise Induced Oxidative Stress and Antioxidant Changes. *European Journal of General Medicine*; 3: 126-131.
 7. Bloomer RJ, Flavo MJ, Schilling BK, and Smith, WA. (2007). Prior Exercise and Antioxidant Supplementation: Effect on Oxidative Stress and Muscle Injury. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*; 4: 9-15.
 8. Brzycki MA. (1995). Practical approach to strength training. 2th Edition. Indianapolis. Master Press; p: 62-65.
 9. Cooper CE, Vollaard NBJ, Choueiri T, Wilson MT. (2002). Exercise, Free Radicals and Oxidative Stress. *Biochemical Society Transactions*; 30: 280-285.
 10. Deminice R, Sicchieri T, Mialich MS, Milani F, Ovidio PP, Jordão AA (2011). Oxidative stress biomarker responses to an acute session of hypertrophy-resistance traditional interval training and circuit training. *J Strength Cond Res*; 25(3): 798-804.
 11. Deminice R, Sicchieri T, Payão PO, Jordão AA (2010). Blood and salivary oxidative stress biomarkers following an acute session of resistance exercise in humans. *International Journal of Sports Medicin*; 31(9): 599-603.
 12. Devasagayam TPA, Kamat JP, Mohan H, Kesavan PC. (1996). Caffeine as an antioxidant: inhibition of lipid peroxidation induced by reactive oxygen species. *BBA Biomembranes*; 1282(1): 63-70.
 13. Evans WJ. (2000). Vitamin E, Vitamin C and Exercise. *American Journal of Clinical Nutrition*; 72: 647-652.
 14. Greer, B.K. (2006). Dissertation: The effects of Branched-chain amino acid supplementation on indirect indicators of muscle damage and performance. ProQuest Information and Learning Company.
 15. Güzel NV, Hazar S, Erbas D. (2007). Effects of different resistance exercise protocols on nitric oxide, lipid peroxidation and creatine kinase activity in sedentary males. *J Sport Sci Med*; 6: 417- 422.

16. Howatson G, van someren K. (2008). The prevention and treatment of exercise-induced muscle damage. *Sports medicine*; 38(6): 483-503.
17. jakson MJ. (1999). Free radical in skin and muscle: damaging agent or signals for adaptation? *Proc nutr soc*; 58: 673-676.
18. Krstrup P, Hellsten Y, Bangsbo J. (2004). Intense interval training enhances human skeletal muscle oxygen uptake in the initial phase of dynamic exercise high but not at low intensities. *J Physiol*; 559(1): 335-345.
19. Lenn JON, Uhl T, Mattacola C, Boissonneault G, Yates J, Ibrahim W. (2002). The effects of fish oil and isoflavones on delayed onset muscle soreness. *Med Sci Sports Exercise*; 34: 1605-1613.
20. Liu JF, Chang WY, Chan KH, Tsai WY, Lin CL, Hsu MC. (2005). Blood lipid peroxides and muscle damage increased following intensive resistance training of female weightlifters. *Ann N Y Acad Sci*; 1042: 255-261.
21. Mahdavi R, Daneghian S, Homayouni A, Jafari A. (2012). Effects of Caffeine Supplementation on Oxidative Stress, Exercise-Induced Muscle Damage and Leukocytosis. *Age (year)*; 24: 2-65.
22. Marco M, Anselmo CB, Marcio CX, Jarbas RS, José FFV. (2009). Caffeine Supplementation and muscle damage in soccer players. *Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences*; v45, n. 2, abr.
23. Mcanulty S, Mcanulty L, Nieman D, Morrow J, Utter A, Dumke C. (2005). Effect of resistance exercise and carbohydrate ingestion on oxidative stress Res; 39: 1219–1224.
24. McArdle WD, Katch FI, Katch VL. (2005). sport & exercise nutrition. Baltimore (MD): Lippincott Williams & Wilkins; (Series Editor).
25. McBride JM, Kraemer WJ, McBride TT, Sebastianelli W. (1998). Effect of resistance exercise on free radical production. *Med Sci Sports Exer*; 30: 67–72.
26. Motl RW, O'connor PJ, Dishman RK. (2003). Effect of caffeine on perceptions of leg muscle pain during moderate intensity cycling exercise. *J Pain*; 4: 316-321.
27. Nevin AG, Hazar S, Erbas D. (2007). Effect of different resistance exercise protocols on nitric oxide, lipid peroxidation and creatine kinase activity in sedentary males. *Journal of sport science andmedicine*; 6(41): 417-422.
28. Nieman DC, Henson DA, McAnulty L. (2002). Influence of vitamin C supplementation on oxidative and immune changes after an ultamarathon. *J Appl Phyiol*; 92: 1970-1977.
29. Pettersson J, et al. (2007). Muscular exercise can cause highlypathological liver function tests in healthy men. *Br J Clin Pharmacol*; 65(2): 253-259.
30. Atashak S, Baturak K. (2012). The Effect of BCAA supplementation on serum C – Reactive protein and Creatine Kinase after acute resistance exercise in soccer players. *Annals of Biological Research*; 3(3): 1569-1576.
31. Tokmakidis SP, Kokkinidis EA, Smilios I. (2003). The effects of ibuprofen on delayed muscle soreness and muscular performance after eccentric exercise. *J Strength Cond. Res*; 17: 53-59.
32. Vassilakopoulos T, Karatza MH, Katsaounou P, Kollintza A, Zakynthinos S, Roussos C.

-
-
- (2003). Antioxidants attenuate the plasma cytokine response to exercise in humans. *J Appl Physiol*; 94: 1025-1032.
33. Williams MH. (2004). Dietary Supplements and Sports Performance: Introduction and Vitamins. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*; 1(2): 1-6.

