

تأثیر موسیقی درمانی بر کاهش عود افسردگی و استرس معتادین به مواد مخدر

یدالله خرم آبادی^۱، طاهره اسدی فرهادی^۲

تاریخ دریافت: ۱۳۹۵/۰۶/۰۸ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۲/۱۱/۰۸

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر برسی تأثیر موسیقی درمانی بر کاهش عود افسردگی و استرس معتادین به مواد مخدر در شهر همدان بود. **روش:** در این طرح شبه‌آزمایشی تعداد ۶۰ نفر از معتادین به مواد مخدر مراجعه کننده به مرکز ترک اعتیاد بهزیستی همدان به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی تعداد ۳۰ نفر به گروه گواه و ۳۰ نفر به گروه آزمایش تخصیص یافتند. گروه آزمایش به مدت ۸ ماه بطور سه روز در هفته به مدت ۵ ساعت در معرض موسیقی قرار گرفتند. هر دو گروه با مقیاس اضطراب، افسردگی، استرس و آزمایش متادون پیش و پس از موسیقی درمانی مورد ارزیابی قرار گرفتند.

یافته‌ها: داده‌ها نشان داد موسیقی درمانی موجب کاهش میزان افسردگی و استرس می‌شود. **نتیجه‌گیری:** با توجه به یافته‌ها می‌توان گفت موسیقی درمانی روش مفیدی در کاهش عود افسردگی و استرس معتادین به مواد مخدر می‌باشد. بنابراین به عنوان یکی از شیوه‌های کارآمد درمان پیامدهای اعتیاد می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

کلید واژه‌ها: موسیقی درمانی، اعتیاد، افسردگی، استرس

۱. استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، همدان، ایران

۲. نویسنده مسئول: مدرس مدعو گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، همدان، ایران، پست الکترونیک:

fat_asadi37@yahoo.com

مقدمه

امروزه اعتیاد یک بیماری زیست‌شناختی، روان‌شناختی و اجتماعی است، عوامل متعددی در سوءصرف و اعتیاد به مواد مخدر مؤثر هستند که در تعامل با یکدیگر منجر به شروع مصرف و سپس اعتیاد می‌شوند. واژه اعتیاد و معتاد تا حدودی با وابستگی ارتباط دارند. اختلال سوءصرف مواد مجموعه علائم شناختی، رفتاری و روان‌شناختی است که الگویی از تکرار و بروز عوارض تحمل، ترک و اعمال اجباری را به همراه دارد (انجمان روانپژوهشی آمریکا، ۲۰۰۰؛ به نقل از نریمانی و رجبی، ۱۳۹۲). در زمینه اعتیاد بیشترین توجه به فعالیت نظام فعال‌ساز رفتاری معطوف است (آزاد فلاخ، ۱۳۷۹). منظور از اعتیاد وابستگی جسمانی و روانی به انواع مواد مخدر، محرك و توهمنداست که در صورت کنار گذاشتن علائم ترک و سندروم محرومیت از مواد در افراد ظاهر می‌گردد (مهریار، ۲۰۰۸). از اثرات جانبی مواد مخدر می‌توان به مشکلات رفتاری، بی‌قراری، کم‌حوالگی، افکار پارانوئیا، افسردگی و افزایش پرخاشگری، تغییر رفتار اجتماعی و اندیشه‌ای اجتماعی افراد مصرف کننده اشاره کرد (گورمان^۱ و همکاران، ۲۰۰۴؛ به نقل از نجاتی، شیری، و نوری، ۱۳۹۱).

عادت‌های سوءصرف مواد به متغیرهای روان‌شناختی از جمله ویژگی‌های شخصیتی و سطح هوشی فرد نیز بستگی دارد (هیروی، میلسون^۲، ۲۰۰۳). مواد در افراد معتاد می‌تواند از طریق رفع حالت‌های آزاردهنده و یا ناخوشایندی نظری درد، اضطراب یا افسردگی، رفتارهای پیش‌آیند خود را تقویت کند. داده‌ها حاکی است که بیماران مبتلا به اختلالات افسردگی یا اضطرابی در کوشش برای ترک سیگار کمتر از مردم عادی موفق هستند. علائم افسردگی در افراد مبتلا به سوءصرف مواد یا وابستگی به مواد شایع است. حدود یک سوم تا نیمی از کسانی که سوءصرف مواد شب‌افیونی دارند یا به آن وابستگی دارند و حدود چهل درصد کسانی که سوءصرف یا وابستگی الکل دارند، زمانی در طول عمر خود واجد ملاک‌های تشخیصی اختلال افسردگی اساسی بوده‌اند (جیمز‌سادوک^۳ به نقل از رضاعی، ۱۳۸۷). مهم‌ترین منابع افسردگی روانی عبارتند از عوامل جمعیت‌شناختی،

۱۵۲

152

۱۳۹۵
سال دهم، شماره ۵۸، تابستان
Vol. 10, No. 38, Summer 2016

1. Gorman
2. Heravi & Milani
3. Sadock, & Benjamin

عوامل محیطی و عوامل اجتماعی-روانی (کیم و نرمت^۱، ۲۰۱۲). بالتلر^۲ و همکاران (۱۹۸۷) در یافتند، بیمارانی که بر طبق ملاک‌های DSM-III-R اضطراب داشتند از نظر اجتماعی مضطرب، مایوس و افسرده بودند و اعتماد به نفس نداشتند (به نقل از کاویانی، ۱۳۸۰). اضطراب زمینه‌ساز اختلالات متعددی نظیر ترس، وسواس، خودکشی، سوءصرف مواد، اختلالات شخصیتی و انواع انحرافات است (اشپلبرگر^۳، ۱۹۸۳، و شین و کیم^۴، ۲۰۱۲). اگر اضطراب شدید باشد و یا زیاد به طول بینجامد زیان‌آور بوده و همچنین نقش مهمی در شروع بیماری‌های روان‌تنی نظیر فشار خون، و همچنین اختلالات روانی نظیر افسردگی، اضطراب ایفا می‌کند (کامپو، گیل^۵، ۲۰۰۵). رایج‌ترین مسایل روانی و عاطفی در افراد معتاد افسردگی، اضطراب واسترس است که اغلب بر کنش‌های عاطفی و شناختی آن‌ها اثر می‌گذارد. این سه سازه را بر اساس میزان کنترل فرد بر پیرامونش تعریف می‌کنند از نظر آن‌ها فرد زمانی دچار استرس می‌شود که نتواند با یک موقعیت کنار آید، این احساس ناتوانی و ادامه‌ی تهدید، فرد را به سوی درماندگی و افسردگی سوق می‌دهد؛ فرد احساس می‌کند که کنترلی بر محیط پیرامون خود ندارد و در معرض تهدید قرار گرفته است.

۱۵۳
۱۵۳

افسردگی و اضطراب به عنوان دو نشانه^۶ در بیماران اختلال وابستگی به مواد از شیوه بالایی برخوردار است (عرب، ۱۳۸۱). موسیقی همیشه در زندگی بشر ایجاد کننده آرامش، نشاط، سرزندگی، حزن، همدردی و شیدایی است (اشمیت پترز^۷، ۱۹۹۲). موسیقی درمانی به طور مؤثر می‌تواند بیماری‌های ناشی از استرس و احساسات را در انسان‌ها درمان نماید. در تحقیقی که بر روی افرادی با بیماری روحی شدید انجام گرفت؛ مشخص شد که موسیقی موجب افزایش کیفیت زندگی این افراد می‌شود، مثلاً نوشتن قطعه‌هایی موسیقی در معتادین موجب ابراز وجود این افراد می‌شود که تأثیر مشتبی بر آنان دارد. نتایج معالجات نشان داده که بیماران در هنگام اندیشیدن در مورد خود و تمدد اعصاب بهبودی چشمگیری می‌یابند. ممکن است، موسیقی به عنوان یک معالجه کننده استرس، تجربیات

اضطراب را کاهش دهد (هیروی، و میلانی، ۲۰۰۸). اسوانسدویتر و اسنیدال^۱ (۲۰۰۶) نشان دادند که موسیقی درمانی روشی مطمئن و مؤثر در درمان بی قراری و اضطراب بیماران به شمار می رود. موسیقی می تواند به عنوان عامل شتاب دهنده مهمی در کمک به بیماران برای کسب مجدد کار کردهای شناختی و فیزیکی نقش ایفا نماید (به نقل از مپار و گل شکوه، ۱۳۸۷). در تحقیق هیروی و میلسون (۲۰۰۳)، نتایج حاکی از تأثیر موسیقی درمانی برای جلوگیری از علائم استرس و بزهکاری داشت. موسیقی درمانی روشی مؤثر برای معالجه علائم و بیماری‌ها است. از آنجا که ناراحتی‌های عصبی و روانی در روزهای پیش از ترک بسیار زیادند. به ویژه افرادی که قبل از ترک کرده و ناراحتی‌های آن را تجربه کرده‌اند، فکر ترک مجدد سبب افزایش میزان اضطراب در آنان می‌گردد؛ فکر اینکه مبادا به علت این ناراحتی‌ها مجبور شوند برنامه درمانی خود را نیمه کاره رها کنند؛ بیش از پیش باعث نامیدی و احساس ناتوانی در آن‌ها می‌شود. بنابراین ضرورت دارد به منظور از بین بردن این ترس‌ها، افکار بی اساس و اختلالات روانی نظری (افسردگی واسترس) در معتادین یک برنامه درمانی ترتیب داده شود تا این نیاز عاطفی و احساسی در آنان مرتفع گردد با توجه به اینکه موسیقی تغییرات بیشتری در حالات جسمی، عاطفی، اجتماعی و روانی افراد معتاد ایجاد می‌کند می‌تواند موجب تقویت مهارت‌های شناختی، توجه و حافظه گردد و این نیاز را در درمان افرادی که به مواد مخدر وابسته هستند، برآورده سازد و همزمان نیاز افراد را به مصرف داروهایی که در ترک مؤثر هستند، کمتر نماید. لذا می‌توان این روش را در استراتژی درمان نسبت به سایر روش‌های ترک اعتماد به عنوان یکی از شیوه‌های کارآمد به کار گرفت. در این تحقیق سعی شده که به این سؤال اساسی پاسخ داده شود که موسیقی درمانی چه اثری بر کاهش عود افسردگی و استرس معتادین به مواد ایجاد می‌کند؟

روش

جامعه، نمونه و روش نمونه‌گیری

پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع پژوهش‌های کاربردی و از لحاظ روش گرداوری داده‌ها شبیه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری تحقیق معتقدین به مواد مخدر بودند که جهت ترک به مراکز ترک اعتیاد بهزیستی همدان از تاریخ ۹۰/۲/۱ تا ۹۰/۹/۳۰ مراجعه کردند. برای نمونه‌گیری از افرادی که دارای شرایط ورود بودند ثبت نام به عمل آمد و از بین آن‌ها تعداد ۶۰ نفر به تصادف انتخاب شدند و به تصادف به دو گروه تقسیم شدند و به تصادف یک گروه به عنوان آزمایش و دیگری به عنوان گروه گواه در نظر گرفته شد. گروه آزمایش به مدت ۸ ماه بطور سه روز در هفته به مدت ۵ ساعت موسیقی درمانی دریافت نمود.

ابزار

۱. آزمایش میزان مصرف متادون: با این آزمایش میزان مورفین در خون افراد قبل و بعد از انجام آزمایش مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش میزان مصرف متادون، آزمایشی است که با استفاده از آزمایش خون میزان خاصی از مورفین در خون افراد قبل و بعد از انجام آزمایش در هر دو گروه گواه و آزمایش مورد بررسی قرار گرفته است.

۲. پرسشنامه اضطراب، افسردگی و استرس (DASS-21): پرسشنامه‌ای خود گزارشی برای ارزیابی حالات عاطفی منفی در افسردگی، اضطراب و استرس است. هریک از خرده مقیاس‌ها (افسردگی، اضطراب، استرس) شامل ۷ سؤال است که نمره نهایی هر کدام از طریق مجموعه نمرات سؤال‌های مربوط به آن به دست می‌آید. هر سؤال از صفر تا ۴ نمره گذاری می‌شود. سؤالات ۵۳، ۵۲، ۲۱، ۱۷، ۱۶، ۱۳، ۱۰، ۵، ۱۸، ۱۴، ۱۲، ۱۱، ۸، ۶، ۱ استرس را مورد سنجش قرار می‌دهند. آنتونی^۱ و همکاران (۲۰۰۲) پرسشنامه را مورد بررسی قرار دادند و نتایج همبستگی بین خرده‌مقیاس‌ها نشان داد همبستگی افسردگی و استرس ۰/۴۸، اضطراب و استرس ۰/۵۳، و اضطراب و افسردگی ۰/۲۸ می‌باشد. روایی و اعتبار این آزمون در ایران

توسط سامانی و جوکار (۲۰۰۷) مورد بررسی قرار گرفته است که اعتبار بازآزمایی را برای مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس به ترتیب برابر $0/76$ ، $0/77$ و $0/78$ گزارش نمودند. همچنین آلفای کرونباخ را برای مقیاس افسردگی، اضطراب، و استرس به ترتیب برابر $0/81$ ، $0/74$ و $0/78$ گزارش نمودند.

روند اجرا

ابتدا از افراد دارای شرایط ورود به پژوهش که به مرکز ترک اعتیاد بهزیستی شهر همدان مراجعه کرده بودند 60 نفر به تصادف انتخاب و سپس به صورت تصادفی به دو گروه 30 نفری تقسیم و به تصادف در یک گروه مداخله اجرا شد. پس از انتخاب شرکت کنندگان، جهت ملاحظات اخلاقی به آن‌ها اطمینان داده شد که نتایج پژوهش به صورت کلی منتشر خواهد شد و اطلاعات آنان محترمانه باقی خواهد ماند. با استفاده از انجام آزمایش‌های خون میزان متادون در خون افراد معتاد قبل و بعد از انجام آزمایش مورد بررسی قرار گرفت. برای گروه آزمایش درمان با موسیقی به مدت 8 ماه، به میزان سه روز در هفته به مدت 5 ساعت اجرا شد. گروه گواه هیچ درمانی دریافت نکردند.

جلسات درمانی بالحظ کردن موارد زیر انجام شد. 1 - ابتدا قبل از برگزاری جلسه، آرام سازی^۱ (آرمیدگی) توسط روانشناس انجام می‌شد. اجرای موسیقی توسط مجری موسیقی در مکانی آرام و کم نور برای تحریک نقاط عصبی و ماهیچه‌ای در خصوص آمادگی روحی و جسمی فرد صورت می‌گرفت؛ 2 - مدت 10 دقیقه بعد از اجرای آرمیدگی شعری مطابق با موضوع جلسه به همراه موسیقی و نتی مرتبط، نواخته و خوانده می‌شد که عمولاً 15 دقیقه طول می‌کشید؛ 3 - درین اجرا، یادداشت‌هایی از مشاهدات حاصل از عکس‌العمل‌های مراجع توسط روانشناس ثبت می‌شد؛ 4 - بعد از اتمام جلسه و مصاحبتی اطمینان بخش از افراد خواسته می‌شد، احساساتی را که در جلسه و حین برگزاری موسیقی تجربه کرده‌اند را بروی کاغذ بیاورند که هدف از این کار کمک به بهبودی سریع‌تر در خصوص اختلالات روانی و وضعیت عمومی افراد بود.

۱۵۶

156

سال دهم، شماره ۳۸، تابستان ۱۳۹۵
Vol. 10, No. 38, Summer 2016

یافته‌ها

آماره‌های توصیفی متغیرهای مورد مطالعه به تفکیک گروه و نوع آزمون در جدول ۱ ارائه شده است.

جدول ۱: آماره‌های توصیفی متغیرهای مورد مطالعه به تفکیک گروه و نوع آزمون

متغیرها	گروه‌ها	نوع آزمون	تعداد	میانگین	انحراف استاندارد
آزمایش	آزمایش	پیش آزمون	۳۰	۶۱/۶۰	۱۸/۱۰
		پس آزمون	۳۰	۶۰/۹۰	۱۸/۲۰
اعتیاد	گواه	پیش آزمون	۳۰	۵۶/۵۰	۲۱/۵۰
		پس آزمون	۳۰	۴۴/۷۰	۱۸/۰۵
آزمایش	آزمایش	پیش آزمون	۳۰	۳۱/۵۰	۲/۵۱
		پس آزمون	۳۰	۳۱/۵۰	۲/۴۵
افسردگی	گواه	پیش آزمون	۳۰	۳۲/۱۰	۲/۸۹
		پس آزمون	۳۰	۲۹/۵۰	۲/۶۱
آزمایش	آزمایش	پیش آزمون	۳۰	۳۲/۸۰	۲/۳۱
		پس آزمون	۳۰	۳۲/۹۰	۱/۸۸
استرس	گواه	پیش آزمون	۳۰	۳۳/۱۰	۲/۷۹
		پس آزمون	۳۰	۳۰/۴۰	۲/۴۳

۱۵۷
۱۵۷

برای بررسی تأثیر مداخله درمانی از تحلیل کواریانس چندمتغیری می‌بایستی استفاده شود. با توجه به اینکه اجرای تحلیل کواریانس نیازمند مفروضه‌هایی است، ابتدا شرط همگنی واریانس‌ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون لون در جدول زیر ارائه شده است.

جدول ۲: نتایج آزمون لون برای بردسی برابری واریانس‌ها

متغیرها	آماره F	درجه آزادی	معناداری
اعتیاد	۰/۳۸	۵۸	۰/۵۴
افسردگی	۰/۰۹	۵۸	۰/۷۵
استرس	۱/۱۳	۵۸	۰/۲۹

همانگونه که در جدول ۲ مشاهده می‌شود در تمام متغیرها شرط برابری واریانس‌ها برقرار است. لذا تحلیل کواریانس چندمتغیری انجام شد و نتایج آن حکایت از معناداری و مؤثر

بودن مداخله داشت ($F=9/970$, $P<0/001$, $F=9/970$, $P<0/001$, $F=9/970$, $P<0/001$).^۱

برای بررسی الگوهای تفاوت از تحلیل کواریانس تک متغیری به شرح زیر استفاده شد.

جدول ۳: نتایج تحلیل کواریانس تک متغیری برای بررسی الگوهای تفاوت

متغیرها	میانگین مجدورات	آماره F	معناداری
اعتیاد	۳۹۴۴/۷۰	۱۱/۹۶۰	۰/۰۰۱
افسردگی	۶۴/۰۶	۹/۹۶۰	۰/۰۰۳
استرس	۹۳/۷۵	۱۹/۸۵۰	۰/۰۰۵

همانگونه که در جدول فوق مشاهده می‌شود در تمام متغیرها موسیقی درمانی مؤثر بوده است. به بیان دیگر با توجه به آماره‌های توصیفی می‌توان گفت: موسیقی درمانی باعث کاهش افسردگی، و استرس و میزان مواد در خون معتادان شده است.

بحث و نتیجه‌گیری

مطالعه حاضر با هدف تعیین اثربخشی موسیقی درمانی بر کاهش عود افسردگی و استرس در افراد معتاد به مواد مخدر انجام شد. برای درمان کاهش عود افسردگی واسترس معتادین از تکنیک درمان با موسیقی استفاده شد؛ شنیدن موسیقی بر روی اعصاب درونی انسان تأثیر می‌گذارد و باعث ترشح هورمون‌های گوناگون بدن می‌گردد و بدن را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به عنوان مثال میزان ترشح آندوروفین را افزایش می‌دهد و این آندوروفین می‌تواند از شدت درد کاسته و به انسان نششگی طبیعی بخشد (کمپل دان، ۱۳۸۰). به طور کلی نتایج پژوهش نشان می‌دهد، بین موسیقی درمانی می‌تواند باعث کاهش عود معتادین به مواد مخدر شود. نتایج پژوهش حاضر با نتایج عبدالله‌نژاد (۱۳۸۸) در مورد کاهش عود مصرف مواد مخدر در معتادین همسو است. عبدالله‌نژاد حتی در مطالعه خود بیان می‌کند بین نوع ماده مصرفی معتادان و نوع موسیقی که گوش می‌دهند، ارتباط معناداری وجود دارد؛ موسیقی درمانی نه تنها به عنوان یک ابزار توانبخشی می‌تواند، نقش به سزایی در درمان معتادان ایفا کند؛ بلکه به واسطه پویایی، خلاقیت بی‌انتها، نشاط‌آور و غیر تهدیدآمیز بودن مورد استقبال سوء مصرف کنندگان نیز قرار می‌گیرد. نتایج پژوهش

حاضر با نتایج یکر، و لیبی^۱ (۲۰۰۷) همسو است. هندرمانی یکی از شیوه‌های قدیمی و رایج است و با توجه به کامل نبودن اثربخشی درمان دارویی و توجه روز افزون به روش‌های غیرداروئی، هندرمانی به ویژه موسیقی درمانی به عنوان یکی از شیوه‌های رایج درمان مورد توجه قرار گرفته است (جیوتون وسان^۲ (۲۰۰۹)؛ ویکیم^۳ (۲۰۱۰)؛ مک فاری^۴ (۲۰۱۱)؛ استینزیک^۵ (۲۰۱۱)). همچنین نتایج تحقیق نشان داد که موسیقی درمانی افسردگی افراد معتاد را کاهش داد. این یافته با یافته‌های استریتر^۶ (۲۰۱۲)؛ لینگ لی^۷ (۲۰۱۱) هماهنگ است. در تحقیق اخیر نشان داده شد موسیقی درمانی به عنوان درمانی مکمل به افراد مبتلا کمک می‌کند تا وضعیت عمومی خود را در رابطه با عملکرد ذهنی و اجتماعی بهبود بخشدند. لیسیک^۸ (۲۰۰۸) در پژوهش دیگری نشان داد که موسیقی باعث افزایش عواطف مثبت می‌شود. دیلارد (۲۰۰۶) نشان داد که موسیقی به عنوان عامل شتاب‌دهنده مهمی در کمک به بیماران برای کسب مجدد کارکردهای شناختی و فیزیکی نقش ایفا می‌نماید و بهبود تحقیقات کمی در مورد موسیقی روانی توسط چندین محقق تشخیص داده شده است. گیلبو^۹ (۲۰۰۷)، سیلورمن^{۱۰} (۲۰۱۱) اثر درمانی موسیقی را مورد تأیید قرار داده‌اند. همچنین نتایج نشان داد موسیقی درمانی اضطراب و استرس در افراد معتاد را کاهش می‌دهد. البته در تبیین این موضوع باید بیان نمود، موسیقی در کاهش اضطراب بیمارانی که دارای مشکلات جسمی هستند، همچون بیماری‌های قلبی تأثیر دارد. موسیقی می‌تواند فشار روانی را کاهش دهد با شنیدن موسیقی آرام، انسان احساس آرامش نموده و در این حالت فعالیت‌های دستگاه عصبی بهتر و منظم تر انجام می‌شود (جیلسون، ۱۹۷۷). در پژوهش دیگری که توسط شین، وکیم (۲۰۱۱) بر روی ۲۳۲ زن باردار انجام گرفت تأثیر موسیقی درمانی بر اضطراب و استرس در زنان باردار نشان داده شد. در پژوهش دیگری تحقیق در بیماران قلبی انجام گرفت و نشان داد، موسیقی می‌تواند موجب کاهش استرس،

1. Baker & Libby
2. Guetin & Soun
3. Wakim
4. Mcffrey
5. Stanczyk
6. Streeter
7. Ling Lai
8. Lesiuk
9. Gilboa
- 10.Silverman

تعداد ضربان قلب، تعداد تنفس، کیفیت زندگی و رفاه روانی شود. از پژوهش‌هایی که به اثرات مثبت موسیقی درمانی اشاره می‌نماید و آن را تایید نموده می‌توان به پژوهش‌های استریتر^۱ (۲۰۱۲)، بیکر^۲ (۲۰۰۷)، کمپو^۳ (۲۰۰۵)، کوپیر و فوستر^۴ (۲۰۰۸)، بنسیمون^۵ (۲۰۰۸)، گیلبو^۶ (۲۰۰۷)، دیلیرد^۷ (۲۰۰۶) اشاره نمود. نتیجه پژوهش حاضر همخوان با پژوهش‌های فوق می‌باشد. تحقیقات موسیقی درمانی بر اهمیت گوش دادن به موسیقی دلخواه برای تمدد اعصاب تاکید نموده‌اند؛ فراتحلیل در این زمینه نشان داد انتخاب موسیقی دلخواه موجب کاهش استرس می‌شود و زمانی که موسیقی موجب انگیخته شدن حالت مطلوب می‌گردد، عملکرد افراد بهتر می‌شود (لیسیک، ۲۰۰۸). ترکیب موسیقی به عنوان یک روش درمانی که تلفیقی از نوع درمان دارویی و موسیقی است از اثرات مثبت این روش درمانی می‌باشد. پیشنهاد می‌شود که علاوه بر موسیقی درمانی، روش‌های درمانی دیگری نیز توامان با این روش درمانی به طور مجزا در مردان و زنان صورت گیرد تا این روش‌ها جایگزین مواد دارویی گردد.

منابع

۱۶۰

160

سال دهم، شماره ۳۸، تابستان ۱۳۹۵
Vol. 10, No. 38, Summer 2016

- آزاد فلاخ، پرویز (۱۳۷۹). بنیادهای زیستی-روانی زمینه ساز اعتیاد. *مجله روانشناسی*، ۱۵(۶)، ۲۴۶-۲۳۴.
- اشمیت پترز، زاکلین (۱۳۹۱). مقدمه‌ای بر موسیقی درمانی. *ترجمه علی زاده محمدی*، و فرزانه پولادی، انتشارات شاهنگ، تهران.
- садوک، بنجامین؛ سادوک الکوت، ویرجینا (۲۰۰۲). خلاصه روانپژوهشی. *ترجمه دکتر فرزین رضاعی*، (۱۳۸۷). انتشارات ارجمند.
- جوهری فرد، رضا؛ گودرزی، محمدعلی؛ و ضمیری، امین (۱۳۸۸). تأثیر درمان شناختی-رفتاری گروهی بر اضطراب و نگرش ناکارآمد بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر. *مجله یافته‌های نو در روانشناسی*، ۲(۶)، ۹۴-۸۱.
- زارع، مریم؛ افخم ابراهیمی، عزیزه؛ و بیرشک، بهروز (۱۳۸۸). بررسی اثر موسیقی درمانی بر کاهش بی‌قراری در مبتلایان به آزلایم ساکن در خانه‌های سالمندان شهرستان شهریار. *تازه‌های علوم شناختی*، ۱۱(۲)، ۶۲-۵۵.

1. Streeter
2. Campo
3. Cooper & Foster

4. Bensimon
5. Dillard

کاویانی، حسین؛ جواهری، فروزان؛ و بحیرابی، هادی (۱۳۸۴). اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی (MBCT) در کاهش افکار خودآیند منفی، نگرش ناکارآمد، افسردگی و اضطراب. *تازه‌های علوم‌شناسنگی*، ۱۷(۱)، ۵۹-۴۹.

عرب، مصطفی (۱۳۸۱). تاثیر گروه درمانی شناختی-مذهبی در کاهش افسردگی، اضطراب و میزان عود-معتادین خود معرف. *همایش سراسری اعتیاد چالش‌ها و درمان‌ها*، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، ۹۲-۹۱.

کمپل دان (۱۳۸۰). اعجاز موسیقی. ترجمه بهزاد منیژه، نشر محمد، تهران.

ماپار، مریم؛ گل شکوه، فرزانه (۱۳۸۷). تأثیر موسیقی درمانی بر علائم مثبت بیماران اسکیزوفرنی مرکز شفا دزفول. *یافته‌های نو در روانشناسی*، ۲(۷)، ۲۲-۷.

نریمانی، محمد؛ رجبی، سوران (۱۳۹۱). تأثیر بیوفیدبک EEG بر کاهش افسردگی، اضطراب، استرس و عقاید و سوسه انگیز افراد با اختلال سوءصرف مواد. *اعتیاد پژوهی*، ۲۱(۶)، ۱۸-۷.

نجاتی، وحید؛ شیری، اسماعیل؛ و نوری، ژاله (۱۳۹۱). مقایسه توانایی بازشناسی حالات هیجانی و ذهن خوانی در افراد مصرف کننده مواد افیونی و همتایان سالم. *اعتیاد پژوهی*، ۲۱(۶)، ۳۰-۱۹.

Baker, F.A., Libby, M.; Gleadhill Genevieve, A. (2007). Music therapy and emotional: Exposing substance abuse clients to the experiences of non-drug-induced emotions. *The Arts in Psychotherapy*, 34, 321-330.

Bensimon, M.; Amir, D., Acmt, D.A.; Wolf, Y. (2008). Drumming through trauma: Music therapy with post-traumatic soldiers, *the arts in psychotherapy*, 35, 34-48.

Campo, J.L., Gil, M.G., & Davila, S.G. (2005). Effects of specific noise and music stimuli on stress and fear levels of laying hens of several breeds. *Applied Animal Behavior Science*, 91(1-2), 75-84.

Cooper, L.; Foster, I. (2008). The use of music to aid patients' relaxation in a radiotherapy waiting room. *Radiography*, 14, 184-188.

Dillard, L.M. (2006). Musical countertransference experiences of music therapists: A phenomenological study. *The Arts in psychotherapy*, 33, 208-17.

Gilboa. A. (2007). Testing the MAP: A graphic method for describing and analyzing music therapy sessions, *the arts in psychotherapy*, 34, 309- 20.

Guetin, S.; Soun, B.; Voiriot, G.; Picot, M.C.; Herisson, C. (2009). The effect of music therapy on mood and anxiety-depression: An observational study in institutionalized patients with traumatic brain injury. *Annals of Physical Rehabilitation Medicine*, 52, 30-40.

Heravi, M.; Milani, M. (2003). *Investigating the effect of relaxation therapy on level of exam anxiety in nursing student*, Shahed University of Medical Science., Retrieved from: www.irandoc.org.

Jellison, J.A. (1997). The effect of music on autonomic stress responses and verbal report. In: C.K. Madsen, R.A. Greer, and C.H. Madsen Edit. *Research in the classroom: Teachers College Press*, P. 206-19.

Kim, Y.; NRMT, M.B. (2012). Music therapists' job satisfaction, collective self-esteem, and burnout, *The Arts in Psychotherapy*, 39, 66-71.

- Lesiuk, T. (2008). The effect of preferred music listening on stress levels of air traffic controllers, *The Arts in Psychotherapy*, 35, 1-10.
- Ling Lai, H. (2011). Preliminary study of the effects of an educational workshop on therapeutic music and aesthetic experience with music in first-line nurses. *Nurse Education Today*, 31(8), 63-9.
- Mc Caffrey, T.; Edwards, J.; Fannon, D. (2011). Is there a role music therapy in the recovery approach in mental health? *The Arts Psychotherapy*, 38, 185-189.
- Shin, H.S.; Kim, J.H. (2011). Music Therapy on Anxiety, Stress and Maternal-fetal Attachment in Pregnant Women during Trans vaginal Ultrasound, *Asian Nursing Research*, 5(1), 19-27.
- Silverman, M.J. (2011). Effects of music therapy on psychiatric patients' proactive coping skills: two pilot studies, *The Arts in Psychotherapy*, 38, 125-129.
- Spielberger, C.D. (1983). *Manual for the state Trait Anxiety Inventory*, Consulting Psychologists Press, Inc.
- Streeter, E.; Davies, M.E.P.; Reiss, J.; Hunt, A. (2012). Computer aided music therapy evaluation: testing the Music Therapy Logbook prototype 1 system, *The Arts Psychotherapy*, 39, 1-10.
- Stanczyk, M.M. (2011). Music therapy in supportive cancer care, *Reports of practical oncology and radiotherapy*, 16, 170-172.
- Wakim, J.H.; Smith, S.; Guinn, G. (2010). The Efficacy of Music Therapy. *Journal of Perianesthesia nursing*, 25(4), 226-32, DOI: 10.1016/j.jopan.2010.05.009.

۱۶۲
162

۱۳۹۵، شماره ۳۸، تابستان
Vol. 10, No. 38, Summer 2016

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی