

تأثیر تحریک فراجمجمه‌ای مغز با استفاده از جریان مستقیم الکتریکی (TDCS) بر حافظه کاری و شدت نشانه‌های افسردگی

* محمد اورکی^۱ سپیده شاهمرادی^۲

۱. دانشیار روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور، ایران

۲. کارشناس ارشد روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور، ایران

(تاریخ وصول: ۹۷/۰۵/۲۷ – تاریخ پذیرش: ۹۷/۱۱/۱۵)

The Effectiveness of Transcranial Direct Current Stimulation (TDCS) on the Working Memory and Severity of Depression Symptoms

1.*Mohammad Oraki, 2. Sepideh Shahmoradi

1. Associate Professor of Psychology, Payame Noor University, Iran

2. MA of Psychology, Payame Noor University, Iran

(Received: Aug . 26, 2018 - Accepted: Jan. 25, 2018)

Abstract

چکیده

Introduction: The purpose of this study was to investigate the effect of brain stimulation on the skull using direct tDCS electric current on working memory and severity of depression symptoms. **Method:** The present study is a semi-experimental, pretest-post test with control group. In this study, Tdcs brain electrical stimulation therapy was performed on the experimental group and compared to the control group that did not receive any treatment. Each experimental group consisted of 16 experimental groups and 16 control group who were matched according to age, sex, and education and were randomly assigned to the groups. Brain electrical stimulation was performed for 10 sessions and each session was performed for 20 minutes in the experimental group and repeated repeatedly after 4 weeks. At the end of the post-test, both groups were tested and tested. **Findings:** Analysis of data obtained by using covariance analysis showed that there is a significant difference between two groups in working memory and depression ($P < 0.01$). **Conclusion:** According to the results, it seems that brain stimulation It can improve working memory and severity of depression symptoms. It can be used as an effective treatment.

Keywords: Direct Brain Electrical Stimulation (TDCS), Working Memory, Depression

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر تحریک فراجمجمه‌ای مغز با استفاده از جریان مستقیم الکتریکی (tDCS) بر حافظه کاری و شدت نشانه‌های افسردگی بود. روش: پژوهش حاضر در قالب یک طرح نیمه‌آزمایشی پیش آزمون پس آزمون با گروه گواه اجرا شدن‌نموده پژوهش شامل ۳۲ نفر از افرادی که به یکی از کلینیک‌های شهر تهران برای درمان افسردگی مراجعه کرده و با تشخیص افسردگی داوطلب شرکت در این پژوهش بودند. می‌شد. از بین افراد انتخاب شده ۱۶ نفر در گروه آزمایشی و ۱۶ نفر در گروه گواه جایی شده سپس هر دو گروه براساس سن، جنس و تحصیلات همتاسازی شدند. دو نوع مختلف تحریک آندی و شم (ساختنگ) با شدت جریان ۲ میلی‌آمپر و به مدت ۲۰ دقیقه، طی جلسه ارائه شد. شرکت‌کنندگان قبل و بعد از تحریک با پرسشنامه افسردگی بک و آزمون کامپیوتری تعیین فراخنای حافظه کاری (n-back) مورد تست شدند. قرار گرفته‌ها: تحلیل داده‌های بدست آمده با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد که بین دو گروه در حافظه کاری و افسردگی تفاوت معنی‌داری وجود دارد ($P < 0.01$)

نتیجه گیری: به نظر می‌رسد روش تحریک فراجمجمه‌ای مغز با استفاده از جریان مستقیم الکتریکی می‌تواند سبب بهبود حافظه کاری و شدت علائم افسردگی شود. باید می‌توان ادعا کرد که این مداخله بعنوان یک مداخله مکمل در کنار سایر درمان‌های روان‌شناسی و دارویی می‌تواند مورد توجه متخصصین قرار گیرد.

واژگان کلیدی: افسردگی، تحریک فراجمجمه‌ای مغز با استفاده از جریان مستقیم الکتریکی (TDCS)، حافظه کاری

Email: orakisalamat@gmail.com

* نویسنده مسئول: محمد اورکی

مقدمه

ذهنی معیوب باعث می‌شود افراد افسرده رویدادها و واقعی زندگی را به درستی ارزیابی ننمایند (مصفاوی و همکاران، ۲۰۱۷).

در این میان، بدون درمان مناسب آن، علایم و نشانه‌ها می‌توانند تا روزها، ماه‌ها و حتی سال‌ها تداوم یابند، ولی به کارگیری یک شیوه درمانی مناسب و موثر می‌تواند به اکثر بیمارانی که دچار افسردگی هستند، یاری رساند (هوپنر، ۴۰۰۹). حافظه کاری^۵ در واقع، عنصر مرکزی آگاهی است و رابطه نزدیکی با هوشیاری سیال دارد (نیلسون و همکاران^۶، ۲۰۱۷). و نوعی از حافظه است که اطلاعات را به صورت موقت ذخیره می‌کند و هدایت فرایندهای متعددی همچون فهم، زبان و یادگیری را بر عهده دارد. بر اساس مدل کلاسیک بادلی و هیچ^۷، حافظه کاری از دو حافظه کوتاه مدت (کلامی و تصویری) تشکیل شده است (فیلهو و همکاران^۸، ۲۰۱۷). ملبی لروگ و هولمه^۹ (۲۰۱۳) معتقدند که حافظه کاری به نظامی اشاره دارد که هم درگیر پردازش شناختی و هم درگیر ذخیره موقت اطلاعاتی است که درگیر در جریان طیف وسیعی از تکالیف شناختی پردازش هستند. تکالیف شناختی با هر درجه از پیچیدگی که باشد شامل چند مرحله از پردازش است و حافظه کاری این امکان را فراهم می‌آورد که

افسردگی^۱ یکی از مهمترین اختلالات روانشناسی و عصب‌شناختی است که احتمال آن در یک دوره زندگی حدود ۱۷ درصد است و تقریباً ۱۰ درصد مردم جهان نیازمند مراقبت‌های جدی در زمینه افسردگی هستند (مصفاوی و همکاران، ۲۰۱۷). افسردگی در حال حاضر جدی‌ترین بیماری قرن تلقی شده و به گزارش دانشگاه هاروارد تا سال ۲۰۲۰ در رتبه اول یا دوم بیماری‌های شایع قرار می‌گیرد (سپیر و همکاران^۲، ۲۰۰۰). سازمان بهداشت جهانی، افسردگی را در ردیف چهارم فهرست حادترین مشکلات بهداشت عمومی در سراسر جهان قرار داده است. میزان شیوع افسردگی در کودکان ۰/۴ تا ۲/۵ درصد و در نوجوانان ۴ تا ۸ درصد برآورد شده است و میزان شیوع آن در طی عمر برای نوجوانان سنین ۱۵ تا ۱۸ سال ۱۴ درصد تخمین زده شده است. افسردگی در بین همه بیماری‌های جسمی و روانی در بین زنان ۴۵-۱۵ سال نیز شایع‌ترین بیماری شناخته شده است (هادلی و همکاران^۳، ۲۰۱۱). افراد افسرده به دلیل پردازش ناقص اطلاعات تمایل دارند که جنبه‌های منفی رویدادهای زندگی را مورد توجه قرار دهند و آنها را به عنوان رویدادهای عام و فراگیر فهم کنند. در حقیقت، پردازش ناقص اطلاعات یکی از ویژگی‌های افسردگی شدید است. ساختارهای

3. Hoppner

5. Working Memory

6. Nilsson

7. Baddeley & Hitch

8. Filho

9. Melby ° Lervag & Hulme

1. Depression

2. Speer

2. Hadley

و مفرون به صرفه جهت بهبود فعالیتهای شناختی و کاهش اختلالات روانی از جمله افسرگی افزایش چشمگیری یافته است. روش مذکور، روشی است که باعث بهبود فرایند یادگیری و تصمیم‌گیری می‌شود و همنچنین به تقویت حافظه کاری و خلاقیت‌های زبانشناختی منجر می‌گردد (ربیع پور و همکاران، ۲۰۱۸).

تحریک الکتریکی مستقیم مغزی روشی غیر تهاجمی است که طی آن جریان مستقیم ضعیفی (۱تا۴ میلی آمپر) بر پوست سر وارد می‌شود و با استفاده از آن تغییرات بلندمدت در قطبیت قشر مغز در پی دپولاریزاسیون و هیپرپلاریزاسیون نورون‌ها و تأثیر بر گیرنده‌های عصبی، ایجاد می‌شود. به عبارت دیگر، در این نوع تحریک الکتریکی نقاطی از سر با استفاده از جریان‌های ضعیف الکتریکی مورد هدف قرار می‌گیرند. تحریک الکتریکی مستقیم مغز تحریک‌پذیری نورون را در منطقه تعیین شده مغزی تغییر می‌دهد، سطح فعالیت شبکه نورونی را تنظیم کرده و فعالیت‌های نقطه‌های نورون‌های مغزی تحریک شده را تغییر می‌دهد. محققان بر این باورند که تحریک یاد شده برای بهبود اندام‌ها و کاهش بسیاری از اختلالات و آسیب‌های روانی مشمر ثمر است. (طلوعی، ۱۳۹۵). بوگیو و همکاران معتقدند که یکی از مهم‌ترین خصوصیات تحریک الکتریکی مستقیم مغز، توانایی آن برای ایجاد تغییرات قشری، حتی بعد از پایان تحریک است. آنها بیان کرده‌اند که بعد از ۵ جلسه تحریک الکتریکی مستقیم مغز یک میلی آمپر آندی ۲۰

آخرین شکل انجام تکلیف در حافظه ذخیره و همواره در دسترس قرار گیرد. در واقع، حافظه کاری در فرایند ذخیره‌سازی غیرفعالانه اطلاعات نقش داشته و دارای توانایی شناختی برای دستکاری اطلاعات ذخیره شده است (زمانی و بوستان، ۱۳۹۶).

در این میان، دو الگوی شناختی متمایز وابسته به افسرگی شناخته شده‌اند؛ اول آن که افراد افسرده مشکلات گسترشده‌ای را در حیطه‌های تمرکز و حافظه گزارش می‌کنند، دوم این که با وجود این مشکلات، آنها تمرکز خود را بر افکار منفی مربوط به خود حفظ می‌نمایند. نارسایی‌های شناختی در افراد افسرده از نظر ماهیت و شدت متفاوت است تنوع نارسایی‌های شناختی در افراد افسرده را می‌توان ناشی از نارسایی در اختصاص منابع پردازش اطلاعات از جمله بدکارکردی حافظه کاری در آن‌ها دانست (زائل، ۲۰۱۱). از طرفی، صدمه و آسیب به حافظه کاری به عنوان ویژگی اصلی تعدادی از اختلالات روانی و نورولوژیکی مانند هانتینگتون، پارکینسون، آلزایمر، افسرگی و اسکیزوفرنی^۱ شناخته شده است. صدمات مذکور، به سختی قابل درمان بوده و رویکردهای سنتی مانند دارودرمانی و توانبخشی شناختی پیشرفتهای محدودی در این زمینه داشته‌اند (ارکان و یار یاری، ۱۳۹۳).

امروزه تمایل به کاربرد تحریک الکتریکی مستقیم مغز به عنوان یک روش مدرن و پیشرفته، بی‌خطر

1 . zaehle

2 . huntington,Parkinson,alzheimer,depression, schizophrenia

تحریک الکتریکی مستقیم مغز سبب بهبود کاری پیشرونده، پسروند، کنترل ذهنی، حافظه منطقی، بازنگری و یادگیری تداعی‌ها می‌شود. همچنین، سبب کاهش زمان واکنش ساده و انتخابی می‌شود. ارکان و یار یاری (۱۳۹۳)، نیز ضمن بررسی تاثیر تحریک فراجمجمه‌ای مغز با استفاده از جریان مستقیم الکتریکی (tDCS) بر روی حافظه کاری در ناحیه قشر پیش‌پیشانی خلفی جانبی نشان دادند که تحریک آندی سبب کاهش زمان واکنش و افزایش پاسخ‌های صحیح شده و به نظر می‌رسد موجب بهبود حافظه کاری می‌شود. با وجود پژوهش‌های مرور شده‌ای که نشان دهنده تاثیر تحریک الکتریکی مستقیم بر حافظه کاری بودند برخی یافته‌های نیز البته بر روی جمعیت بزرگسال حاکی از تاثیر کمتر این روش در تقویت حافظه کاری آنها بود (نیلسون و همکاران، ۲۰۱۷). برخی یافته‌ها نیز موید تاثیر روش تحریک الکتریکی مستقیم بر نشانه‌های افسردگی است. از جمله این مطالعه‌ها می‌توان به پژوهش اولیویرا و همکاران^۲ (۲۰۱۳)، که با الکترود آند و کاتد انجام شده است، اشاره کرد. آنها در بررسی خود نشان دادند که این نوع تحریک منجر به افزایش تعداد پاسخ‌های درست گروه تحریک آندی است که نشان از تاثیر معنادار بر حافظه کاری کند افراد افسرده دارد. در مطالعه‌ای دیگر هادلی و همکاران (۲۰۱۱)، نشان دادند که با استفاده از تحریک الکتریکی مستقیم نیمکره چپ مغز، نشانه‌های

دقیقه‌ای، این تحریک اثرات سودمندی در بهبودی اختلالات روانپریشی خواهد داشت. در مطالعات اخیر برخی مطالعه‌ها به بررسی تاثیر تحریک الکتریکی مستقیم مغز بر بهبود و کیفیت حافظه کاری و علائم افسردگی پرداخته‌اند. یکی از این پژوهش‌ها مطالعه فیلهو و همکاران (۲۰۱۷) در خصوص تاثیر تحریک الکتریکی مستقیم مغز بر حافظه کاری افراد دچار سکته مغزی بود. نتیجه این پژوهش نشان داد که حافظه کاری دیداری، گفتاری و شنیداری آزمودنی‌ها بعد از تحریک مستقیم مغزی بهبود یافت.

در پژوهش دیگری باربی و همکاران^۱ (۲۰۱۳) نقش قشر پشتی جانبی پیش‌پیشانی (DLPFC) را در حافظه کاری بررسی نموده‌اند. براساس یافته‌های این پژوهشگران، قشر پشتی جانبی پیش‌پیشانی (DLPFC) چپ برای دستکاری دانش فضایی و کلامی و قشر پشتی جانبی پیش‌پیشانی (DLPFC) راست برای استدلال فضایی و کلامی ضروری است که آن را هماهنگ با مدل دامنه عمومی حافظه کاری می‌دانند، که فرض می‌کند قشر پشتی جانبی پیش‌پیشانی (DLPFC) مکانیسم‌های محاسباتی خاصی برای نظارت و دستکاری بازنمایی‌های شناختی دارد؛ بنابراین تکنیک‌هایی که مستقیماً فعالیت کرتکس پیش‌پیشانی خلفی جانبی را مورد بررسی و تنظیم قرار می‌دهند می‌توانند، قابلیت خوبی برای بهبود حافظه کاری داشته باشند. نتایج تحقیق زمانی و همکاران (۱۳۹۶)، حاکی از آن بود که

روانی - حرکتی، احساس گناه و ... برشدت آن می‌افزاید و به این ترتیب درمان دشوارتر شده و احتمال پیدایش مشکلات عمیق‌تری وجود دارد از سوی دیگر گرچه افسردگی اختلالی است که در حال حاضر با روش‌های متعددی از جمله دارو، روان‌درمانی و شوک‌درمانی مورد مداوا قرار می‌گیرد. با این وجود برخی بررسی‌ها نشان داده‌اند که نیمی از مبتلایان به افسردگی نشانه‌هایشان پس از دریافت درمان‌های یاد شده پایدار باقی می‌ماند، بنابراین در شرایطی که دارو و مراقبت‌های پزشکی موفق نیستند تحریک الکتریکی مستقیم مغز یکی از مداخله‌های مکملی خواهد بود که شاید بتواند بخشی از مشکلات مبتلا به این اختلال را حل نماید (صادقی و همکاران، ۲۰۱۳). با این حال پژوهش‌های اندکی درخصوص اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم مغز بر اختلال افسردگی و حافظه‌کاری انجام گرفته است. لذا، تحقیق حاضر درصد بررسی این موضوع است که آیا تحریک الکتریکی مغز با جریان مستقیم بر بهبود حافظه کاری و کاهش علایم افسردگی می‌نجامد یا خیر؟

روش

این پژوهش، یک مطالعه نیمه‌آزمایشی همراه با گمارش تصادفی آزمودنی‌ها، در گروه‌های آزمایش و کنترل، به همراه پیش‌آزمون، پس‌آزمون است.

افسردگی مخصوصاً تمایل به خودکشی^۱ در طول هفته تا ۶۷ درصد کاهش می‌یابد. همچنین نتایج بررسی آرول آناندام و لو^۲ (۲۰۰۹)، بیانگر این نکته بود که نشانه‌های افسردگی کاهش چشمگیری به دنبال تحریک الکتریکی قشر فوقانی نیمکره چپ داشته است. کالو و همکاران^۳ (۲۰۱۲)، نیز نشان دادند که تحریک الکتریکی مستقیم مغزی فعال نسبت به تحریک مستقیم مغزی غیرفعال اثر بیشتری بر کاهش افسردگی داشته است. مصافی و همکاران (۲۰۱۷)، در پژوهشی نشان دادند که تفاوت معناداری بین تحریک الکتریکی مستقیم مغز در بین دو گروه کنترل و آزمایش از میزان افسردگی وجود دارد. همچنین تفاوت معناداری بین تحریک مستقیم مغز و گروه‌های کنترل بر حسب باورها و تفکرات مستقل وجود داشته است. براساس نتایج پژوهش به نظر می‌رسد که تحریک مستقیم مغز در کاهش شدت افسردگی موثر بود. و در نهایت ریگوناتی^۴ و همکاران (۲۰۰۸)، در پژوهشی تأثیرات تحریک الکتریکی مستقیم مغز و داروی فلوکستین بر افسردگی را مورد مقایسه قرار داده‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که تحریک الکتریکی مستقیم مغز و فلوکستین هر دو تأثیر مشابهی دارند.

باتوجه به اینکه عدم درمان نشانه‌های مربوط به اختلال افسردگی مانند مشکل حافظه، کندی

-
1. Suicide
 2. Arul Anandam & Loo
 3. Kalu
 4. Rigonatti

افسردگی بک دوباره اجرا شد تا نتایج مداخله ثبت گردد. ۴ هفته پس از مداخله تحریک فراجمجمه‌ای مغز با استفاده از جریان مستقیم الکتریکی، برای درمان مجدد و ارزیابی دوام و پایداری اثرات درمانی در طول زمان، مقیاس افسردگی بک و آزمون ان بک دوباره اجراشد. از آزمون آماری تحلیل کوواریانس در نرم افزار SPSS-20 استفاده شد.

ابزار

پرسشنامه افسردگی بک : برای اندازه‌گیری افسردگی از پرسشنامه افسردگی بک استفاده شده است. سیاهه افسردگی بک (ویرایش دوم) این پرسشنامه ۲۱ ماده‌ای به اندازه‌گیری نشانه‌های افسردگی که فرد طی دو هفته گذشته تجربه کرده است اشاره دارد و براساس یک درجه بندی ۴ نمره‌ای به شیوه لیکرت نمره گذاری می‌شود. نمره کل این مقیاس از ۰ تا ۶۳ می‌تواند تغییر کند و نمرات بالاتر نشان‌دهنده سطوح شدیدتر افسردگی هستند.

بک، استیر و گاربین^۱ همسانی درونی مقیاس را بر حسب ضریب آلفا کرونباخ از ۰/۹۲ تا ۰/۹۶ و ضریب اعتبار بازآزمایی را از ۰/۴۸ تا ۰/۸۶ گزارش کرده‌اند. ضریب همبستگی مقیاس افسردگی بک با مقیاس درجه‌بندی روانپژوهی همیلتون^۲ برای افسردگی ۰/۷۳ با مقیاس خودسنجی افسردگی زونگ ۰/۷۶ و با مقیاس

جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه زنان و مردان مبتلا به افسردگی ۲۰ تا ۳۵ سال مراجعه کننده به یک کیلینیک روانپژوهی در شهر تهران بود. از بین این افراد ۳۲ نفر از مراجعینی که داوطلب شرکت در آزمایش بودند انتخاب شدند. میانگین سنی ۲۸/۴ و انحراف استاندارد ۳/۵۶ برای گروه آزمایش و میانگین سنی ۲۸/۲ و انحراف استاندارد ۳/۰۷۷ برای گروه کنترل بود. این افراد پس از انجام مصاحبه بالینی توسط روانشناس بر پایه معیارهای راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (DSM5) مبتلا به اختلال افسردگی تشخیص داده شده و در آزمون افسردگی بک نمره بالاتر از ۲۰ را کسب نمودند. معیارهای ورود افراد به نمونه شامل نداشتن بیماری‌های روان‌پریشی و اختلال دوقطبی، عدم مصرف دارو و قرار داشتن سن فرد در محدوده ۲۰ تا ۳۵ سال بود. جهت رعایت اصول اخلاقی در پژوهش حاضر، افراد گروه کنترل وارد لیست انتظار شدند تا در صورت اثربخشی آزمایش، آنها نیز همانند گروه آزمایش مورد مداخله قرار گیرند همچنین رضایت‌نامه برای شرکت در آزمایش از تمامی افراد اخذ شد. همچنین به افراد دو گروه این اطمینان داده شد که نتایج فقط در اختیار محقق خواهد بود و صرفاً جهت تحلیل و استفاده در این پژوهش مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. قبل از شروع آزمایش نیز، به آزمودنی‌ها گفته شد که در هر مرحله از تحقیق در صورت عدم تمایل به همکاری می‌توانند از فرآیند پژوهش کناره‌گیری نمایند. در پایان درمان، پرسشنامه

1 . Beck, steiner,garbin
2 . hamilton

آزمون ان بک برای ارزیابی حافظه فعال مورد استفاده قرار می‌گیرد. این آزمون یکی از پر کاربردترین ابزارهای غیر وابسته به فرهنگ است. در این آزمون تعدادی محرك بینایی به صورت سریال برروی صفحه نمایشگر ظاهر می‌شوند و فرد باید در دو شرایط با بار متفاوت حافظه کاری پاسخ دهد، در شرایط با بار کم فرد باید در صورت تشابه هر محرك با محرك قبل کلید هدف را فشار دهد. در شرایط با بار زیاد فرد باید هر محرك را با دو محرك قبل مقایسه نموده و در صورت تشابه کلید مربوطه را فشار دهد. خروجی این آزمون تعداد پاسخ‌های صحیح و غلط ارائه شده است. طراحی این تکلیف به گونه‌ای است که در تمام مراحل، افراد مجبور هستند به همه محرك‌ها پاسخ دهنند. بنابراین، این تکلیف نیازمند یک کنترل مداوم و به روز کردن اطلاعات در حافظه کاری است. در این آزمون از یک مجموعه صدتاًی از تصاویر خطی استفاده شده است. این آزمون از اعتبار قوی برخوردار است و در حال حاضر در مطالعات بالینی و تجربی مورد استفاده گسترده قرار می‌گیرد و اعتبار آن با چندین آزمون دیگر که حافظه کاری را می‌سنجند، نشان داده شده است.

روش تحریک فراجمجمه‌ای مغز با استفاده از جریان مستقیم الکتریکی (tDCS): دستگاه مورد استفاده در این تحقیق دستگاه ActiveDose ساخت شرکت ActivaTek آمریکا است. منبع جریان این دستگاه یک باتری ۹ ولت آلکالین

افسردگی پرسشنامه چندوجهی شخصیتی مینه سوتا^۱ ۰/۷۴ به دست آمده است. (Bek^۲ و همکاران، ۱۹۸۸) دابسون^۳ و محمدخانی در بررسی ویژگی‌های روانسنجی این پرسشنامه ضریب کل اعتبار این پرسشنامه را برابر ۰/۹۱ محسوبه کردند. ضریب روایی همگرا با پرسشنامه نشانگان مختصر برابر ۰/۸۷، ضریب همبستگی هر آیتم با کل پرسشنامه ۰/۶۸ و ضریب از آزمایی آن برابر ۰/۹۴ به دست آمد (Dabsan و محمدخانی ۲۰۰۷).

آزمون ان بک (n-back): یک تکلیف سنجش عملکرد شناختی مرتبط با کنش‌های اجرایی است که عموماً در مطالعات تصویربرداری عصبی برای برانگیختن کارکرد مغز آزمودنی‌ها به کار می‌رود. این تکلیف برای نخستین بار در سال ۱۹۵۸ توسط کرچنر^۳ معرفی شد. روند کلی تکلیف بدین قرار است که دنباله‌ای از محرك‌ها (عموماً دیداری) به صورت گام به گام، به آزمودنی ارائه می‌شود و آزمودنی باید بررسی کند که آیا محرك ارائه شده فعلی، با محرك n گام قبل از آن همخوانی دارد یا خیر. انجام این آزمایش با مقداری مختلف n صورت می‌گیرد و با افزایش میزان n بر دشواری تکلیف افزوده می‌شود. بدین ترتیب، در تکلیف یک 1-back، آخرین محرك ارائه شده با محرك قبلی مقایسه می‌شود و در تکلیف 3-back، محرك ارائه شده با ۳ محرك قبل مقایسه خواهد شد.

1. Beck

2. Dobson

3. kirchner

شدت جریانی به میزان ۲ میلی آمپر با الکترودهای به اندازه 8×5 سانتیمتر مربع که درون اسفنج آگشته به کلریدسدیم ۹ درصد قرار داشت تا ضمن افزایش رسانایی جریان الکتریکی از افزایش حرارت پیشگیری شود، به مدت ۲۰ دقیقه دریافت می‌کردند. شایان ذکر است که جریان الکتریکی با شدت دو میلی آمپر بر سلامتی شرکت کنندگان اثر سوء ندارد. دستگاه از لحاظ شدت جریان و اندازه الکترودها و مدت زمان تحریک قابل کنترل است. کلیه آزمودنی‌ها در جلسه اول، آخر پس از اتمام درمان توسط پرسشنامه افسردگی بک و آزمون ان بک مورد ارزیابی قرار گرفتند.

در این آزمایش دو نوع جریان داریم ۱- tDCS واقعی با جریانی که الکترود آند آن در کرتکس خلفی جانبی پیش پیشانی DLPC چپ معادل نقطه F3 در سیستم 10×20 EEG و الکترود کاتد بر بالای قشر حدقه‌ای در طرف مقابل است.

۲- TDCS شمیا ساختگی به عنوان گروه کنترل، به این صورت که مکان الکترودها همانند الکترودهای تحریک آندی است، با این تفاوت که برای احساس خارش اولیه، جریان فقط در ۲۰ ثانیه اول وارد و سپس در طول آزمایش قطع شد. آزمودنی‌ها با کمترین ارتباط با آزمونگر، دو نوع مختلف از تحریک TDCS تحریک (آندی، شم) را طی سه جلسه روی قشر پیش پیشانی خلفی جانبی با شدت ۲ میلی آمپر و به مدت ۱۵ دقیقه دریافت می‌کنند (تیو و همکاران، ۲۰۱۱).

است. وزن آن $0/19$ کیلوگرم، حداکثر شدت جریان ۲ میلی آمپر DC است که از طریق اتصال الکترودهایی با قطبیت متفاوت (آندوکاتد) که روی سر نصب می‌شوند، جریان ثابت الکتریکی را از روی جمجمه به مغز منتقل می‌کند. الکترودها می‌توانند کربنی و رسانا باشند. روش تحریک فرآجیمجهای مغز با استفاده از جریان مستقیم الکتریکی (tDCS) روشی غیرتهراجمی است که جریان خفیف الکتریکی (حداکثر ۱۰ میلی آمپر) را به صورت مستقیم وارد مغز می‌کند قطب آند در این روش منجر به افزایش تحریک‌پذیری قشری و قطب کاتد منجر به کاهش تحریک‌پذیری قشری می‌گردد. این پژوهش با توجه به پروتکلهای جدید صورت گرفت که شدت جریان را ۲ میلی آمپر و زمان ارائه جریان در هر جلسه را ۲۰ دقیقه پیشنهاد می‌کنند در این پژوهش ابتدا ۱۰ جلسه درمان به مدت ۱۰ روز صورت گرفت و بعد به فاصله ۴ هفتة، مجددا ۱۰ جلسه درمانی طبق نظر روانپژوهشک به دلیل تمدید تاثیر درمان به صورت مکرر اجرا گردید.

روش اجرا

روش انجام آن بدین صورت بود که در شروع جلسه آزمودنی روی صندلی راحتی می‌نشست و تحریک مستقیم الکتریکی آنودال در ناحیه «پشتی جانبی قشر پیش پیشانی نیمکره چپ» و بازداری کاتودال ناحیه «پشتی جانبی قشر پیش پیشانی نیمکره چپ» را انجام می‌داد. آزمودنی‌ها

ارزیابی قرار گرفته است. یافته‌های توصیفی گروه‌های آزمایشی گواه در مرحله پیش آزمون، پس آزمون در رابطه با افسردگی و حافظه کاری در جدول شماره ۱ ارائه شده است.

یافته‌ها

در پژوهش حاضر، اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمون آماری تحلیل کواریانس مورد

جدول ۱. آماره‌های توصیفی افسردگی و حافظه کاری گروه‌های آزمایشی و گواه در پیش آزمون، پس آزمون

گروه گواه		گروه آزمایش		شاخص آماری	متغیر
پس آزمون	پیش آزمون	پس آزمون	پیش آزمون		
۲۶/۸۰	۲۶/۴۲	۱۰/۵۵	۲۵/۰۲	میانگین	افسردگی
۱۰/۶۰	۱۰/۲۲	۵/۷۵	۹/۶۵		
۴۷/۰۲	۴۶/۷۲	۶۱/۰۷	۴۳/۵۰	میانگین	حافظه
۷/۹۸	۸/۵۴	۸/۰۵	۷/۲۷		

وابسته (پس آزمون‌ها در سطح بررسی همگنی شبیب رگرسیون در دو گروه معنی‌دار نیست. ($p > 0.05$). سپس آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانس انجام شد که نتایج آن در جدول شماره ۲ گزارش شده است.

یکی از پیش فرض‌های تحلیل کواریانس قبل از آزمون تحلیل کواریانس برای بررسی مفروضه همگنی شبیب رگرسیون پیش آزمون و پس آزمون است. نتایج تحلیل همگنی شبیب رگرسیون نشان داد که تعامل متغیرهای همراه (پیش آزمون‌ها) و

جدول ۲. نتایج آزمون لوین برای بررسی مفروضه همگنی واریانس‌ها

Sig.	df2	df1	F	مرحله	متغیر
۰/۸۵	۹	۱	۰/۰۳۳	پس آزمون	حافظه کاری
۰/۰۴۳	۶	۱	۰/۰۴۳	پس آزمون	افسردگی

جدول ۳ نتایج تحلیل کواریانس برای بررسی تفاوت گروه آزمایش گواه در پس آزمون با گواه و پیش آزمون گزارش شده است.

با توجه به جدول شماره ۲، نتایج نشان داد متغیر حافظه کاری ($f=0.033$) و متغیر افسردگی ($f=0.043$) معنی‌دار نشده است. بنابراین پیش فرض‌های تحلیل کو واریانس برقرار است. در

جدول ۳. نتایج تحلیل کواریانس یک طرفه در حافظه کاری و مقیاس افسردگی بک تفاوت گروه آزمایش

Eta	P	F	MS خطای آزمایش	MS خطای	Ss آزمایش	Ss خطای	متغیر
۰/۷۶	۰/۰۰۱	۴۷/۸۳	۱۶/۲۴	۷۷۷/۱۵	۲۳۴/۶۹	۷۷۷/۱۵	حافظه کاری
۰/۴۳۴	۰/۰۰۱	۴۴/۹۷۹	۵۶/۶۶۳	۵۴۸/۶۵۶	۱۴۷۳/۲۲	۲۵۴۸/۶۵۶	افسردگی بک

الکتریکی مغز در درمان افسردگی، مشابه اثرات فلوکستین^۲ است. همچنین نتایج پژوهش نیستج^۳ (۲۰۰۹) و همکاران نشان داد تحریک آندال چپ به تجربه هیجانات مثبت در افراد مبتلا به افسردگی منجر می‌شود. پژوهش هادلی و همکاران (۲۰۱۱) نیز با نتایج پژوهش حاضر هسو است. نتایج این پژوهشگران نیز نشان داد که با استفاده از تحریک الکتریکی مستقیم نیمکره مغز، نشانه‌های افسردگی مخصوصاً تمایل به خودکشی کاهش چشمگیری داشته است. مصافی و همکاران نیز (۲۰۱۷) تحریک مستقیم مغز را در کاهش شدت افسردگی موثر دانسته‌اند. افزون بر آن نتایج پژوهش اولیویرا^۴ و همکاران (۲۰۱۳)، کالو^۵ و همکاران (۲۰۱۲)، آرول و آناندام و لو^۶ (۲۰۰۹)، باگیو^۷ و همکاران (۲۰۰۷) نتایج پژوهش حاضر را مورد تایید قرار داده است. همچنین، در تحقیقات اولیویرا و همکاران (۲۰۱۳) و یاریاری (۱۳۹۳) نشان داده شده است که تعداد پاسخ‌های درست گروه تحریک آندی تاثیر معناداری بر حافظه کاری افراد افسرده دارد، که در این راستا، نتایج پژوهش حاضر نیز مبنی بر تاثیر معنادار تحریک الکتریکی مستقیم مغز بر بهبود حافظه کاری همسو و منطبق با یافته‌های تحقیقات مذکور است.

-
- 2. Fluoxetine
 - 3. Nitsche
 - 4. oliveira
 - 5. kalev
 - 6. orwell, onandam
 - 7. Baguio

با توجه به جدول شماره ۳، متغیر حافظه کاری ($F=47.83$, $p=0.001$) و متغیر افسردگی ($F=44.97$, $p=0.001$) معنی دار هستند. بنابراین می‌توان گفت بین نمرات گروه آزمایش و کنترل در پس‌آزمون با توجه به تعديل اثر پیش‌آزمون تفاوت وجود دارد که بیشترین ضریب تاثیر مربوط به حافظه کاری (0.76) بوده است. به عبارتی می‌توان گفت که تحریک مغز از روی جمجمه با استفاده از جریان مستقیم الکتریکی (tDCS) به نظر می‌رسد که بیشتر بر حافظه کاری افراد افسرده اثر گذاشته است تا شدت نشانگان افسردگی.

بحث و نتیجه‌گیری

این پژوهش با هدف اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم مغز بر بهبود حافظه کاری و شدت نشانه‌های اختلال افسردگی افراد مبتلا به افسردگی انجام گرفته است. نتایج تحلیل کواریانس پس از تعديل میانگین و کنترل مداخله‌گرها حاکی از بهبود معنادار در نمرات حافظه کاری و کاهش معناداری در نمرات افسردگی گروه آزمایش نسبت به گروه گواه است. با توجه به نتایج مرحله پس‌آزمون به نظر می‌رسد که روش تحریک الکتریکی مستقیم مغز می‌تواند بر بهبود حافظه کاری و کاهش شدت علایم اختلال افسردگی و در افراد مبتلا به اختلال افسردگی موثر باشد.

نتایج حاصل از این پژوهش با پژوهش ریگوناتی^۱ و همکاران (۲۰۰۸) مطابقت دارد، نتایج پژوهش این پژوهشگران حاکی از آن بود که اثرات تحریک

-
- 1 . Rigonatti

در مطالعه فرگنی^۴ و همکاران (۲۰۰۵) و نیز اوهن^۵ و همکاران (۲۰۰۷) زمان واکنش تغییری نداشت که می‌تواند ناشی از تکلیف سخت تر ۳ بک و شدت جریان ضعیفتر یک میلی آمپر باشد، طوری که تحریک قشری لازم برای پاسخگویی سریع‌تر به تکلیف سخت‌تر را فراهم نکرده است. یک فرض این است که افزایش دوپامین در ناحیه پیش‌پیشانی سبب بهبود حافظه کاری شده باشد (باجیو^۶ و همکاران، ۲۰۰۵). فرض دیگر افزایش تحریک-پذیری کرتکسی در ناحیه پیش‌پیشانی چپ توسط دیلاریزه کردن نورونی است که می‌تواند موجب تغییر در استراحت نورونی شود. بنابراین تحریک الکتریکی مغز‌آندی موجب آثار بهبود تحریکی می‌شود که شاید سطوح گلوتامات، آمینواسید مرتبط با حافظه و یادگیری محرك^۷ پاسخ را افزایش دهد.

به هر حال، روش تحریک مغزی در کنار سایر روش‌های درمانی مانند دارو درمانی و درمان شناختی رفتاری یک روش غیر تهاجمی و بدون عارضه و سریع الاثر بوده و می‌تواند واجد اثرات مثبتی برای مبتلایان به اختلالات خلقی، بویژه مبتلایان به افسردگی در زمینه مشکلات شناختی از جمله توجه، تمرکز و حافظه باشد.

در این آزمایش تحریک الکتریکی بصورت مکرر در دو دوره اجرا گردید که منجر به بهبود پایدارتری در علایم اختلال افسردگی و حافظه کاری منجر می‌شود. آزمودنی‌ها از جلسات سوم درمان، بهبود قابل ملاحظه‌ای در وضعیت خلقی،

در مورد تاثیر تحریک الکتریکی مستقیم مغز بر حافظه کاری، نتایج بروونی^۸ و همکاران (۲۰۱۱)، افزایش عملکرد شناختی، مانند حافظه کاری را نشان داده است. فیلهو و همکاران (۲۰۱۷)، نیز همسو با نتایج تحقیق حاضر به این نتایج دست یافته‌اند که بعد از تحریک مستقیم مغز، حافظه کاری دیداری، گفتاری و شنیداری افراد بهبود چشمگیری داشته است. نتایج تحقیق زمانی و دوستان (۱۳۹۶) نیز خاطرنشان می‌کند که تحریک الکتریکی مستقیم مغز، سبب بهبود حافظه کاری پیش رو نده، پس رو نده، کنترل ذهنی، حافظه منطقی، بازنگری و یادگیری تداعی‌ها می‌شود. همان‌گونه که قبلاً اشاره شد در این پژوهش، میزان تغییرات نمره حافظه کاری که با تکلیف کامپیوترا ای ان بک سنجیده شد، و در حالت تحریک آندی در گروه آزمایش و کنترل با هم مقایسه شدند. نتایج حاصل از آنالیز نشان داده که حالت تحریک آندی معنادار است. بدین معنی که ۲۰ دقیقه تحریک آندی کرتکس پیش‌پیشانی خلفی جانی چپ با شدت ۲ میلی آمپر، حافظه کاری افراد را به شکل معناداری افزایش داد. این یافته با نتایج پژوهش مالکوینی^۹ و همکاران (۲۰۱۱) همسو است؛ اگرچه از تکلیف ۲ بک و ۱ میلی آمپر استفاده شده بود. همچنین با تکلیف ۳ بک و ۱ میلی آمپر در یافته‌های مارشال^{۱۰} و همکاران (۲۰۰۵) نیز هم راستا است.

4. Fregny
5. Ohn
6. Baguio

1. Brunoni
2. Malkovini
3. Marshal

الکتریکی مستقیم مغز روشنی سودمند و موثر در درمان اختلالات افسردگی و شناختی، و درمانی امیدوار کننده به دلیل سهولت در استفاده و دسترسی آسان و ارزان بودن و نداشتن عوارض جانبی مشخص است. با توجه به نتایج این پژوهش و سایر پژوهش‌ها پیشنهاد می‌شود به عنوان یک روش مداخله‌ای کمکی برای کاهش افسردگی و تقویت حافظه کاری در کنار سایر درمان‌های روانشناسی و دارویی مرسوم به کارگرفته شود. مهم‌ترین محدودیت این پژوهش، نمونه‌گیری داوطلبانه و همچنین حجم نمونه پایین و نداشتن دوره پیگیری برای بررسی میزان پایداری مداخله بوده است.

تشکر و قدردانی: در پایان لازم است مراتب سپاس‌گزاری خود را از کلیه افرادی که ما را در تمامی مراحل پژوهش حاضر همراهی کردند بویژه شرکت کنندگان مبتلا به افسردگی ابراز نماییم.

فصلنامه عصب روانشناسی، سال سوم،
شماره سوم (پیاپی ۱۰)، ۵۱-۶۲

طلویعی، س. (۱۳۹۵). بررسی اثر تحریک مغزی با جریان مستقیم یک طرفه همزمان بر دو ناحیه قشر حرکتی اولیه و قشر پری فرونتال خلفی [°] کناری بر روی عملکرد اندام فوقانی بیماران مبتلا به سکته مغزی تحت حاد، پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیوتراپی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

خواب، تمرکز و حافظه و قدرت تصمیم‌گیری را گزارش کردند که با پیشرفت درمان، بطور قابل ملاحظه‌ای بهبود می‌یافتد. در تبیین این مسئله می‌توان به پراکنده بودن اثرات تحریک اشاره کرد که در تحریک ناحیه پیشانی تجویز شده است و می‌تواند اثرات بالینی گسترده‌تری را ایجاد کند، و همچنین سریع‌الاثر بودن روش تحریک الکتریکی مغز نسبت به دارو درمانی را نشان می‌دهد. در طی دوره درمان، هیچ‌گونه عارضه‌ای به جز خارش مختصر در ناحیه الکترود گزارش نشد.

در نهایت می‌توان اذغان کرد تحریک الکتریکی مستقیم مغز ابزاری است که توانمندی مغز را در پردازش اطلاعات ورودی افزایش می‌دهد. این ویژگی اثربخشی سایر درمان‌ها را تقویت می‌کند اما فرد را از آنها بی‌نیاز نمی‌کند. برای مثال، هر چند تحریک الکتریکی مغز، قدرت یادگیری را در کودکان مبتلا به اختلال یادگیری افزایش می‌دهد، ولی آنها را از کار درمانی بی‌نیاز نمی‌کند. تحریک

منابع

- ارکان، ا. و یار یاری، ف. (۱۳۹۳). تحریک مغز از روی جمجمه با استفاده از جریان مستقیم الکتریکی (TDCS) بر حافظه کاری در افراد سالم، فصلنامه روانشناسی، دوره ۲، شماره ۲، ۱۷-۱۰.
- زمانی، گ. و دوستان، م. (۱۳۹۶). تأثیر تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ای مغز بر حافظه کاری و زمان واکنش دختران ورزشکار،

- Arul-Anandam., A. P., Loo. C. (2009). Transcranial direct current stimulation: a new tool for the treatment of depression? *J Affective Disord*, 117(3),137-145.
- Barbey, A.K., Koenigs, M., & Grafman, J. (2013). Dorsolateral prefrontal contributions to human working Memory. *Cortex*, 9, 195-220.
- Beck AT, Steer RA, Garbin MG. (1988). Psychometric properties of the Beck Depression Inventory: Tewnty-five years later. *Clin psychol rev*, (8): 77-100.
- Boggio PS, Bermpohl F, Vergara AO, Muniz AL, Nahas FH, Leme PB, (2011). Go-no-go task performance improvement after anodal transcranial DC stimulation of the left dorsolateral prefrontal cortex in major depression. *J Affective Disord*, 101(1): 91-8.
- Brunoni A, Ferrucci R, Bortolomasi M, Vergari M, Tadini L, Boggio P. (2011). Transcranial direct current stimulation (TDCS) in unipolar vs. bipolar depressive disorder. *Progress in Neuro-Psychopharmacol Biolo Psychiatr*, 65(1):63-.101.
- Dobson KS, Mohammadkhani P. (2007).Psychometric characteristics of Beck Depression Inventory-II in patients with major depressive disorder. *J Rehabil*, 29, 80-86. [Persian].
- Filho, E. M. D. S., Albuquerque. J. A. D., Mescouto, K. A., Freitas, R.
- P. D. A. (2017). Effect of transcranial direct current stimulation on the working memory of post-stroke people an integrative review. *Manual Therapy, Posturology & rehabilitation journal*. 15, 496-502.
- Fregni F, Boggio PS, Nitsche MA, Marcolin MA, Rigonatti SP, Pascual-Leone A. (2005). Treatment of major depression with transcranial direct current stimulation. *Bipolar Disorde*, 2(1): 4-106.
- Hadley D, Anderson BS, Borckardt JJ, Arana A, Li X, Nahas Z. (2011). Safety, tolerability, and effectiveness of high doses of adjunctive daily left prefrontal repetitive transcranial magnetic stimulation for treatment-resistant depression in a clinical setting. *J ECT*. 28(1): 18-25.
- Hoppner, J., Schulz, M., Irmisch, G., Mau, R., Schläfke, D., & Richter, J. (٢٠٠٩). Antidepressant efficacy of two different rTMS procedures. High frequency over left versus low frequency over right prefrontal cortex compared with sham stimulation. *Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci*, 253,103° 9.
- Kalu, U. G., Sexton, C. E., Loo, C. K., Ebmeier. K. P. (2012). Transcranial direct current dtimulation in the treatment of major depression: a meta-analysis. *Psychological Medicine*, 42, 1791-1800.
- Masafi, S., Maddahi, M. E., Mujembari, K. A., Badiee Aval,

- S. (2017). The Effectiveness of Transcranial direct current stimulation (TDCS) on reducing depression severity and automatic thoughts in depressed women. International Journal of Research Health Sciences, 6(20), 37-4.
- Melby-Lervåg M1, Hulme Is working memory training effective? A .(۲۱۱۳) A meta-analytic review Developmental psychology Feb;49(2):270-91. doi: 10.1037/a0028228. Epub
- Nilsson, J., Lebedev, A. V., Rydstrem, A., Loeden, M. (2017). Direct-current stimulation does little to improve the outcome of working memory training in older adults. Psychological Science, 1-14.
- Nitsche MA, BoggioPS,Fregni F, Pascual-Leone A. (2009).Treatment of depression with transcranial direct current stimulation (TDCS), A review Exper Neurol, 19(1):9-14.
- Ohn, SH., Park, C., Yoo, W., Ko, M., Choi, K.P., & Kim, G. (2008). Time-dependent effect of transcranial direct current stimulation on the enhancement of working memory, Neuroreport, 19, 43° 47.
- Oliveira, J. F., Tamires, A., Zan, A. T., Valiengo, L., Lotufo, P., Bense, I. M., Fregni, F. & Brunoni, A. R. (2013). Acute working memory improvement after TDCS in antidepressant free patient with major depressive disorder. Neuroscience Letters, 537, 60-64.
- Rabipour, S., Wu, A. D., Davidson, P. S. R., Iacoboni, M. (2018). Expectation may influence the effects of transcranial direct current stimulation. Journal of Health, 69, 134-149.
- Rigonatti SP, Boggio PS, Myczkowski ML, Otta E, Fiquer JT, Ribeiro RB (2008). Transcranial direct stimulation and fluoxetine for the treatment of depression. Eur Psychiatr, 23(1): .6-74
- Sadeghi, K., Khazaie. H. (2013). The comparison of efficacy pharmacotherapy and group cognitive therapy in dimensions oft temperament and character of patients with major depression disorder. Journal of Kermanshah University of Medical Sciences (J Kermanshah Univ Med Sci) 17(4): 230-236.
- Speer, A. M. , Kimbrell, T. A. , Wassermann, E. M. , J, D. R. , Willis, M. W. , Herscovitch, P. , & Post, R. M. (2000). Opposite effects of high and low frequency rTMS on regional brain activity in depressed patients. Biol. Psychiatry, 48, 1133 - 1141.
- Zaehle, T., Sandmann, P., & Thorne, J. D. (2011). Investigating the role of current strength in TDCS modulation of working memory performance in healthy controls. Frontiers in Psychiatry, 2, 1-6.