

همبستگی فراوانی گرد و غبار با تعداد دانش آموزان بیمار مقطع ابتدایی با استفاده از ضرایب آماری. مورد مطالعه: دبستانهای ناحیه ۴ شهر اهواز

جبرائیل قربانیان^{۱*}، عادل سعیداوی^۲

۱. گروه جغرافیا، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

۲. دانش آموخته کارشناسی ارشد اقلیم شناسی واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۸/۰۹/۰۸

تاریخ دریافت: ۱۳۹۹/۰۱/۰۳

چکیده:

ریز گردها عامل خطرناکی برای حیات گیاهان، حیوانات و انسان محسوب می‌شوند. این پدیده، در ایران زندگی ساکنان غرب کشور، از جمله استان خوزستان را تحت تأثیر خود قرار داده و به محیط زیست، سلامتی و اقتصاد مردم در این مناطق، خسارت‌های فراوانی وارد ساخته است. اثرات این پدیده بر روی سلامتی مردم و به خصوص کودکان و دانش آموزان استان خوزستان و شهر اهواز، بیش از سایر حوزه‌ها و بخش‌ها، قابل تأمل و بررسی است. منطقه مورد مطالعه (اهواز) در جنوب غرب ایران واقع شده است. مختصات این محدوده، بین ۳۱-۲۵ درجه تا ۴۸-۳۰ دقیقه عرض شمالی و بین ۶۵-۵۰ درجه طول شرقی می‌باشد. هدف از این تحقیق، تحلیل فراوانی روزهای وقوع ریزگردها و همبستگی آنها با بیماری‌های دانش آموزان مقطع ابتدایی ناحیه ۴ شهرستان اهواز می‌باشد. داده‌های ریزگردها، از اداره کل هواشناسی استان خوزستان اخذ و آمار دانش آموزان مبتلا به عوارض و بیماریهای ناشی از گرد و غبار از طریق توزیع پرسشنامه و تکمیل آن توسط اولیای دبستانهای منتخب، گردآوری گردید. داده‌ها از پرسشنامه‌ها استخراج و در محیط اکسل وارد شد. بین متغیرهای فراوانی گرد و غبار با تعداد دانش آموزان بیمار، از همبستگی اسپیرمن و پیرسن استفاده گردید و از نرم‌افزارهای، اس پی اس نیز برای پردازش و محاسبات و تحلیل روند داده‌ها، رسم نمودار و تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد. نتایج نشان داد فراوانی روزهای گرد و غبار بر افزایش مبتلایان به عوارض ناشی از گرد و غبار موثراند و این فراوانی با ضرایب ۰/۶۵۰ پیرسون و ۰/۷۲۱ اسپیرمن، همبستگی مثبت و معنی داری با افزایش دانش آموزان بیمار در سال ۹۴-۹۵ داشته است.

کلید واژه: ضریب همبستگی، گرد و غبار، دانش آموزان، اهواز

مقدمه

ریز گردهای ناشی از طوفان‌های گردوغبار، عامل خطرناکی برای حیات گیاهان، حیوانات و انسان محسوب می‌شود.. ریز گردها تأثیرات مخربی بر روی انسان‌ها داشته و بیماری‌های تنفسی و ریوی را بر انسان‌ها تحمیل می‌نمایند. غلظت بالای ذرات در طوفان‌های گردوغبار، باعث بیماری‌هایی نظیر سینوزیت، برونشیت، آسم و آرژی و صدمه به عملکرد دفاعی بدن و در نهایت منجر به افزایش عفونت‌های بیمارستانی می‌گردد و هزینه‌های جامعه را در حوزه‌های بهداشت و سلامت، اقتصاد، محیط زیست و امور اجتماعی بالا می‌برد.

پدیده ریزگردها در ایران زندگی ساکنان غرب کشور از جمله استان خوزستان را تحت تأثیر خود قرار داده و به محیط زیست، سلامتی و اقتصاد مردم در این مناطق، خسارات‌های فراوانی وارد ساخته است. اثرات این پدیده بر روی سلامتی مردم و به خصوص کودکان و دانش آموزان استان خوزستان و شهر اهواز، بیش از سایر حوزه‌ها و بخش‌ها، قابل تأمل و بررسی است. لذا در این تحقیق سعی بر آن است بیماری‌های ناشی از ریز گردها و اثرات منفی آن بر سلامتی مردم با تأکید بر سلامتی دانش آموزان مقطع ابتدایی ناحیه ۴ شهرستان اهواز مورد بررسی قرار گیرد. (*Swet, et al, 2016:177*) معتقدند که انتشار گرد و غبار بادی و فرسایش خاک، به خواص خاک سطحی از منطقه منشاء بستگی دارد. (*Gabet, 2014:182*) طی یک بررسی نشان داد، حرارت خاک، خود عامل جدا نمودن ذرات فرسایش پذیری خاک و انتشار ریزگرد ها است. همچنین (*Aarons, et al, 2016:160*) در دهه های اخیر، تشدید نرخ کشاورزی و دام، استفاده ترکیبی از زمین، تغییرات آب و هوای شمال آمریکا را، دلیل بر تولید گرد و غبار می دانند. (*Griffin, 2007:459*) در مطالعه‌ی که در جزایر کارائیب بر روی شیوع آسم، هم زمان با افزایش طوفان‌های گردوغباری انجام داد، نتیجه گرفت که در طی یک دوره زمانی، بیماری آسم به میزان ۱۷٪ افزایش یافته است. (*Hyun, 2011: 92*) در کشور جمهوری کره، مطالعه‌ای در مورد اثرات گردوغبار آسیایی بر روی سلول‌های پوست، انجام داد و نتیجه گرفت این ریزگرد ها با صدمه زدن به سلول‌های پوست، باعث تغییر در ژن‌های این سلول‌ها می‌گردد.

(رجی و همکاران، ۱۳۹۴، ۱۱) در ارزیابی ذرات گرد و غبار شهرهای غرب ایران، نشان دادند که میزان کانیهای کوارتز و کلسیت، نسبت به کانیهای دیگر، بیشتر است. (*Ghorbanian, et al, 2014, 300*) در بررسی عناصر سنگین ریزگردهای شهر اهواز دریافتند که بیشترین میزان فلزات سنگین، سرب و نیکل (دو برابر استاندارد) و کادمیوم و کبالت و مس و کرندوم، بالاتر از حد استاندارد می باشد. با توجه به گزارش سازمان بهداشت جهانی (WHO)، سالیانه بیش از سه میلیون نفر به علت عوارض ناشی از ریز گردها با مرگ زودرس، جان خود را از دست می‌دهند (Ludovic, et al, 2015, 24). (بشیری و سوری، ۱۳۹۶، ۶۷) در بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی ذرات معلق بزرگتر از ۱۰ میکرومتر در استان کردستان، با پرتو اشعه ایکس نشان دادند که در این ذرات، کانی‌های کوارتز و کلسیت دارای حضور چشم گیری هستند (*Zarasvandi, etal, 2011, 138*) در

^۱. World Health organization


بررسی ترکیب کانی شناختی ذرات تشکیل دهنده گرد و غبار استان خوزستان، دریافتند که عمده‌ترین کانی‌های موجود در این ریزگردها، کربنات، سیلیکات، رس‌ها و ژیپس‌ها هستند.

(قربانی و همکاران، ۱۳۹۳، ۹۱) در بررسی بافت ریزگرد اهواز به روش پرتو اشعه ایکس و رابطه تشدید این طوفان‌ها با تخریب تالاب هورالعظیم، دریافتند که بیشترین پراش، مربوط به دو گروه کلسیت و کوارتز بوده و پیک ذرات قطر ۳۰ میکرون دارد. (Alharban, et al., 2007, 459) در تحقیقی دیگر که توسط (Griffin, 2007, 459) در کویت صورت گرفته نشان می‌دهد که تنفس غلظت بالای کلسیت (کربنات کلسیم) موجود در ذرات گرد و غبار، منجر به عطسه و سرفه می‌گردد. (نجفی و همکاران، ۱۳۹۲، ۱۷) معتقدند ریزگردها این توانایی را دارند که آرژی‌های محتوى ۱۰۷ نوع از باکتری‌ها و ۱۰۶ نوع از قارچ‌ها را با خود حمل نمایند. نتایج تحقیق (قادری و همکاران، ۱۳۹۴، ۲۶۳) بر روی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان‌ها در شهر اهواز نشان می‌دهد که مراجعات در اثر بیماری‌های تنفسی و قلبی دارای حساسیت بالایی نسبت به ریزگردها بوده اند که این حساسیت روند افزایش داشته است. (حاج علیلو و وثوق، ۱۳۸۸) به نقل از (دریواسی و دیگران، ۱۳۹۴، ۳۳) و (قربانی، ۱۳۸۷) در بررسی عوارض عناصر سنگین ریزگردها نشان دادند عنصر کادمیوم می‌تواند عالیمی چون تهوع، مشکلات تنفسی، کم خونی و بی‌هوشی، ناراحتی‌های کلیوی، ناراحتی‌های قلبی و تشنج را به همراه داشته باشد. عنصر نیکل نیز موجب ناراحتی‌های حاد تنفسی، سوزش‌های شدید در ناحیه نای، همچنین انواع سرطان‌های حلق، بینی و ریه می‌شود.

هدف از این تحقیق، تحلیل پارامتر تعداد روزهای وقوع ریزگردها و همبستگی آنها با بیماری‌های دانش آموزان مقطع ابتدایی ناحیه ۴ شهرستان اهواز می‌باشد. فرضیه‌های تحقیق عبارتند از افزایش وقوع روزهای گرد و غبار طی سال ۹۴-۹۵، همبستگی مثبت با افزایش تعداد دانش آموزان بیمار دبستان‌های مقطع ابتدایی ناحیه ۴ اهواز داشته است. همچنین عوارض و بیماری‌های غالب مشاهده شده ناشی از ریزگردها در سال ۹۵-۹۴ در میان دانش آموزان دبستان‌های مقطع ابتدایی ناحیه ۴ اهواز بیشتر از نوع تنفسی بوده است. با توجه به اینکه طی دهه گذشته مناطق غرب و جنوب غربی کشور به خصوص استان خوزستان، با معضلی به نام طوفان‌های گرد و غبار مواجه بوده‌اند و پیامدها ناشی از این پدیده بر کیفیت هوای محیط و بهداشت و سلامت مردم (بهخصوص گروه‌های سنی حساس کودکان و بزرگسالان) آثار منفی بر جای گذاشته است، لذا انجام این تحقیق در خصوص حوزه سلامتی مردم و به ویژه بیماری‌های ناشی از پدیده ریزگردها در دانش آموزان مدارس شهر اهواز، می‌تواند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد.

مواد و روش

منطقه مورد مطالعه (اهواز) در جنوب غرب ایران و در یک بستر جلگه‌ای و مرکز استان خوزستان واقع شده است. مختصات این محدوده، بین ۳۱-۲۵ درجه تا ۳۱-۲۵ دقیقه عرض شمالی و بین ۴۸-۳۰ و ۵۰-۴۸ درجه طول شرقی می‌باشد شکل (۱) موقعیت منطقه مورد مطالعه را نشان می‌دهد.



شکل(۱) موقعیت منطقه مورد مطالعه

تحقیق حاضر در اسفند ماه سال ۹۵ در شهر اهواز انجام شده است و مراحل تحقیق به شرح زیر می باشد:

۱. اخذ داده های تعداد روز های وقوع طوفان های گردوبغار مربوط به سال ۹۴-۹۵ از اداره کل هواشناسی خوزستان
۲. اخذ آمار مربوط به دانش آموزانی که دچار بیماری شده اند از اداره کل آمورش پرورش ناحیه ۴ اهواز
۳. با استفاده از روش های آماری و ضریب همبستگی اسپیرمن و پیرسن، ارتباط بین فراوانی روزهای وقوع ریزگردها با نوع بیماری ها و تعداد نفرات دانش آموز بیمار، بررسی شد.
۴. برای پردازش و محاسبات و تحلیل روند داده ها، رسم نمودار و تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای ، اس پی اس و اکسل استفاده گردید.

بحث و نتایج

تحلیل وضعیت گردو غبار

در این تحقیق، ابتدا فراوانی روزهای گردو غبار سال ۹۴-۹۵ بر اساس اطلاعات آماری ایستگاه سینوپتیک هواشناسی اهواز، جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفت. ایستگاه سینوپتیک اهواز با موقعیت عرض جغرافیایی ۳۱

درجه و ۲۰ دقیقه و طول ۴۸ درجه و ۳۳ دقیقه واقع گردیده و طی این سال، ۶۹ روز گرد و غبار در این شهر، ثبت و گزارش شده است جدول (۱).

جدول ۱- تعداد روزهای گردوغبار و دوره بلند مدت ایستگاه سینوپتیک اهواز (اداره هواشناسی خوزستان)

سالانه بلند مدت	اسفند	بهمن	دی	آذر	آبان	مهر	ماه
۸۲/۴	۶/۷	۴/۶	۲/۱	۲	۳	۵	بلند مدت
	۷	۳	۰	۱	۰	۶	۹۴-۹۵ سال
۹۴-۹۵ سالانه	شهریور	مرداد	تیر	خرداد	اردیبهشت	فروردین	ماه
۶۹	۸۲/۴	۶/۷	۹/۲	۱۱/۳	۱۰/۸	۷/۹	بلند مدت
	۵	۹	۱۲	۱۳	۸	۵	۹۴-۹۵ سال

با توجه به جدول (۱) در سال ۹۴-۹۵ پدیده گردو غبار طی ماه خرداد با ۱۳ روز، بیشترین وقوع و در دی ماه (بدون رخداد) کمترین مقدار را دارا بوده است. همچنین وقوع این پدیده طی ماههای اسفند (۷ روز) خرداد (۱۳ روز) مهر (۶ روز) بیشتر از دوره بلند مدت بوده است. در مجموع سال ۹۴-۹۵ با داشتن ۶۹ روز گردو غبار نسبت به دوره بلند مدت (۸۲ روز) یک سال، کم گرد و غبار محسوب می‌گردد.


بررسی تعداد محصلین دبستان‌های مطالعاتی

در این تحقیق، اثرات گردوغبار در دبستان‌های مقطع ابتدایی ناحیه ۴ آموزش و پرورش شهر اهواز بر روی ۱۷ دبستان منتخب مورد بررسی قرار گرفته است. اسامی این دبستان‌ها و تعداد محصلین به شرح جدول (۲) می‌باشد.

جدول ۲- تعداد محصلین دبستان‌های مقطع ابتدایی ناحیه ۴ شهر اهواز (نگارنده‌گان)

نام دبستان	معرفت	علوی	بهار علم	شهداي عين ۲	قدس ۱	عصمت
تعداد دانش اموزان	۷۴۵	۱۱۶	۱۰۴	۳۲۸	۳۴۶	۵۵۷
نام دبستان	بهبهانی	حضرت محمد ص	شریعتی	نور اسلام	نجات اللهی	علامه امینی
تعداد دانش اموزان	۴۷۶	۳۸۶	۴۰۷	۴۶۷	۴۹۳	۳۵۲
نام دبستان	فارابی	معراج	میثم	مدرس ۱	نمونه فردا	----
تعداد دانش اموزان	۲۶۷	۲۷۸	۱۳۸	۵۴۱	۹۹	----
میانگین دانش آموزان دبستان‌های ناحیه ۴:						۳۵۸/۸

با توجه به جدول (۲) ميانگين تعداد دانش آموزان بر اساس ۱۷ دبستان منتخب معادل ۳۵۹ نفر بوده است. همچنين دبستان‌های معرفت، عصمت و مدرس به ترتیب با ۷۴۵ و ۵۵۷ و ۵۴۱ نفر، بيشترین دانش آموز و دبستان‌های نمونه فردا، بهار علم و علوی نيز به ترتیب با ۹۹ و ۱۰۴ و ۱۱۶ نفر كمترین دانش آموز را در ميان دبستان‌های مطالعاتي اين ناحيه دارا بوده‌اند. شکل (۲)



شکل ۲- نمودار تعداد محصلین دبستان‌های ناحیه ۴ شهر اهواز سال ۹۴-۹۵(نگارندگان)

آمار دانش آموزان مبتلا به بيماري‌های ناشی از گردوغبار:


پس از بررسی آمار تعداد محصلین دبستان‌های ناحیه ۴، بررسی تعداد دانش آموزان غایب، بالأخص دانش آموزان بيمار، در اثر ريز گردها از اهميت ويزهای در اين تحقیق برخوردار است. لذا جهت حصول به آمار مربوطه با حضور در دبستان‌های مربوطه و توزيع پرسشنامه‌ها، فرایند تهیه آمار دانش آموزان مبتلا به عوارض گردوغبار در ۱۷ دبستان منتخب اين ناحيه انجام گردیده است. بيشترین عوارض و بيماري‌های مشاهده شده، عوارض و حساسیت‌های تنفسی (نظیر سرفه، آبریزش بینی، خارش گلو، خارش چشم) بوده است.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی

جدول ۳- تعداد دانش آموزان دبستان های ناحیه ۴ مبتلا به بیماری های ناشی از گردوغبار سال ۹۴-۹۵ (نگارندگان)

نام دبستان	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند	فروردین	اردیبهشت	میانگین بیماران
معرفت	۶۴۶	۰	۱۷	۰	۶۷	۷۵	۱۴	۵۶	۳۶/۶
علوی	۱۴	۰	۳	۰	۹	۱۵	۳	۸	۱۳
بهار علم	۱۰	۰	۳	۰	۱۰	۹	۲	۷	۵/۱
شهدای عین ۲	۳۷	۰	۸	۰	۳۲	۳۲	۵	۲۳	۱۷/۹
قدس ۱	۲۸	۰	۴	۰	۳۰	۲۸	۵	۱۲	۱۳/۴
عصمت	۶	۰	۳	۰	۱۵	۱۳	۰	۸	۵/۶
بهبهانی	۱۴	۰	۳	۰	۱۷	۱۲	۰	۱۰	۷/۰
حضرت محمد	۳۲	۰	۷	۰	۴۳	۴۰	۸	۱۹	۱۸/۶
شریعتی	۲۶	۰	۷	۰	۲۶	۱۹	۵	۱۳	۱۲/۰
نور اسلام	۱۳	۰	۴	۰	۱۹	۱۳	۱	۱۰	۷/۵
نجات الهی	۱۳	۰	۷	۰	۱۹	۱۶	۲	۹	۸/۳
علامه امینی	۱۲	۰	۵	۰	۱۶	۱۶	۲	۶	۷/۱
فارابی	۱۴	۰	۴	۰	۱۷	۱۴	۵	۷	۷/۶
معراج	۲۱	۰	۷	۰	۲۹	۲۰	۵	۹	۱۱/۴
میشم	۱۱	۰	۳	۰	۱۵	۱۰	۲	۷	۶/۰
مدرس ۱	۱۱	۰	۴	۰	۱۹	۱۴	۲	۹	۷/۴
نمونه فردا	۱۷	۰	۵	۰	۱۵	۱۷	۴	۹	۸/۴
میانگین ناحیه ۴	۲۰/۲	۰	۵/۵	۰	۲۳/۴	۲۱/۷	۳/۸	۱۳/۱	۱۱/۴


میانگین بیماران ناشی از گردو غبار در دستانهای ناحیه ۴ اهواز سال ۹۴-۹۵



شکل ۳- نمودار دانش آموزان دبستانهای ناحیه ۴ مبتلا به بیماری در اثر گردو غبار سال ۹۴-۹۵(نگارندگان)


با توجه به جدول (۳) طی سال ۹۴-۹۵ آمار دانش آموزان (بیمار) در دبستانهای معرفت (۳۶/۶ نفر)، حضرت محمد (۹۱۸/۶ نفر)، شهدای عین دو (۱۷/۹ نفر)، بالاتر از آمار دبستانهای دیگر ناحیه ۴ بوده است. در اشکال (۴ تا ۹) نمودار تعداد دانش آموزان مبتلا به بیماری‌های ناشی از گردو غبار در ماههای مهر، آذر، بهمن، اسفند، فروردین و اردیبهشت آورده شده است.

دانش آموزان مبتلا به بیماری (ناشی از گردو خاک) ناحیه ۴ اهواز مهر ۹۴




شکل ۴- نمودار تعداد دانش آموزان مبتلا به بیماری در اثر گردو غبار دبستانهای ناحیه ۴ مهر ۹۴ (نگارندگان)

دانش آموزان مبتلا به بیماری (ناشی از گردو خاک) ناحیه ۴ اهواز آذر ۹۴




شکل ۵- نمودار تعداد دانش آموزان مبتلا به بیماری در اثر گردو غبار دبستانهای ناحیه ۴ آذر ۹۴ (نگارندگان)

دانش آموزان مبتلا به بیماری (ناشی از گرد و خاک) ناحیه ۴ اهواز بهمن ۹۴




شکل ۶-نمودار تعداد دانش آموزان مبتلا به بیماری در اثر گرد و خاک در استان های ناحیه ۴ بهمن ۹۴ (نگارندگان)

دانش آموزان مبتلا به بیماری (ناشی از گرد و خاک) ناحیه ۴ اهواز اسفند ۹۴




شکل ۷-نمودار تعداد دانش آموزان مبتلا به بیماری در اثر گرد و خاک در استان های ناحیه ۴ اسفند ۹۴ (نگارندگان)

دانش آموزان مبتلا به بیماری (ناشی از گرد و خاک) ناحیه ۴ اهواز فروردین ۹۴



شکل ۸-نمودار تعداد دانش آموزان مبتلا به بیماری در اثر گرد و خاک در استان های ناحیه ۴ فروردین ۹۵ (نگارندگان)

دانش آموزان مبتلا به بیماری (ناشی از گرد و خاک) ناحیه ۴ اهواز اردیبهشت ۹۴



شکل ۹-نمودار تعداد دانش آموزان مبتلا به بیماری در اثر گرد و غبار دبستان های ناحیه ۴ اردیبهشت ۹۵ (نگارندگان)

نوع بیماری دانش آموزان:

جدول (۴) بیماری های ناشی از ریز گردهای بهمن ۹۵ را در دبستان های مقطع ابتدایی ناحیه ۴ اهواز نشان می دهد.

جدول ۴- نوع بیماری دانش آموزان دبستان های ناحیه ۴ در ارتباط با ریز گردها در سال تحصیلی ۹۴-۹۵ (نگارندگان)

نام دبستان	میانگین ماهانه بیماران	بیماری ها و عوارض تنفسی	بیماری های گوارشی	قلیلی
معرفت	۳۶/۶	۳۳	۳	۰/۶
علوی	۱۳	۱۲/۵	۰/۵	۰
بهار علم	۵/۱	۵/۱	۰	۰
شهدای عین ۲	۱۷/۹	۱۶/۸	۰/۹	۰/۲
قدس ۱	۱۳/۴	۱۲/۸	۰/۶	۰
عصمت	۵/۶	۵/۵	۰/۱	۰
بهبهانی	۷	۶/۸	۰/۲	۰
حضرت محمد	۱۸/۶	۱۷/۶	۰/۸	۰/۲
شریعتی	۱۲	۱۱	۰/۸	۰/۲
نور اسلام	۷/۵	۷/۴	۰/۱	۰
نجات الهی	۸/۳	۷/۸	۰/۵	۰
علامه امینی	۷/۱	۷	۰/۱	۰
فارابی	۷/۶	۷/۴	۰/۱	۰/۱
معراج	۱۱/۴	۱۱	۰/۳	۰/۱
میثم	۶	۵/۸	۰/۲	۰
۱ مدرس	۷/۴	۷/۳	۰/۱	۰
نمونه فردا	۸/۴	۸/۲	۰/۲	۰
میانگین ناحیه ۴	۱۱/۳	۱۰/۸	۰/۵	۰/۱
درصد		۹۴/۸	۴/۴	۰/۸

با توجه به جدول ۴ از سال تحصیلی (۹۵-۹۶) ۹۴/۸ درصد دانش آموزان بیمار دبستان‌های مقطع ابتدایی ناحیه ۴ علائم و عوارض بیماری‌های تنفسی را دارا بوده‌اند در حالی که ۴/۴ درصد دانش آموزان بیمار علائم گوارشی و کمتر از ۱ درصد بیماری‌های قلبی را از خود بروز داده‌اند.

بررسی همبستگی تعداد دانش آموزان مبتلا به بیماری با فراوانی روزهای گردوغبار

۱-دبستان معرفت

جدول ۵- نتایج همبستگی، دانش آموزان بیمار دبستان معرفت با تعداد روزهای گردوغبار شهر اهواز ۹۵ (نگارندگان)

ماه	تعداد دانش آموز (بیمار)	تعداد روزهای غبار
مهر	۶۴	۶
آبان	۰	۰
آذر	۱۷	۱
دی	۰	۰
بهمن	۶۷	۳
اسفند	۷۵	۷
فروردین	۱۴	۵
اردیبهشت	۵۶	۸
ضریب همبستگی پیرسون		*۰/۷۶۷
ضریب همبستگی اسپیرمن		*۰/۷۱۱

با توجه به نتایج بدست آمده از ضرایب همبستگی پیرسون و اسپیرمن در جدول (۵) همبستگی مشت و معنی‌داری بین تعداد دانش آموزان بیمار دبستان معرفت با پارامتر تعداد روزهای گردوغبار وجود دارد. (اگرچه ضریب پیرسون به میزان *۰/۷۶۷ همبستگی بالاتری را نسبت به ضریب اسپیرمن *۰/۷۱۱ نشان می‌دهد.)

۲-دبستان علوی

جدول ۶- نتایج همبستگی، دانش آموزان بیمار دبستان علوی با تعداد روزهای گردوغبار شهر اهواز ۹۵ (نگارندگان)

ماه	تعداد دانش آموز (بیمار)	تعداد روزهای گردوغبار
مهر	۱۴	۶
آبان	۰	۰
آذر	۳	۱
دی	۰	۰
بهمن	۹	۳
اسفند	۱۵	۷
فروردین	۳	۵
اردیبهشت	۸	۸
ضریب همبستگی پیرسون		*۰/۷۷۷
ضریب همبستگی اسپیرمن		*۰/۷۸۸

با توجه به نتایج بدست آمده از ضرایب همبستگی پیرسون و اسپیرمن در جدول (۶) همبستگی مثبت و معنی داری بین تعداد دانش آموزان بیمار دبستان علوی با پارامتر تعداد روزهای گردوغبار وجود دارد. (اگرچه ضریب اسپیرمن به میزان *۰/۷۸۸ همبستگی بالاتری را نسبت به ضریب پیرسون *۰/۷۷۷ نشان می دهد).

۳-دبستان بهار علم
جدول ۷- همبستگی، تعداد دانش آموزان بیمار دبستان بهار علم با تعداد روزهای گردوغبار شهر اهواز ۹۵ (نگارندگان)

ماه	تعداد دانش آموز (بیمار)	تعداد روزهای گردوغبار
مهر	۱۰	۶
آبان	۰	۰
آذر	۳	۱
دی	۰	۰
بهمن	۱۰	۳
اسفند	۹	۷
فروردین	۲	۵
اردیبهشت	۷	۸
ضریب همبستگی پیرسون		*۰/۷۰۰
ضریب همبستگی اسپیرمن		*۰/۶۴۲

با توجه به نتایج بدست آمده از ضرایب همبستگی پیرسون و اسپیرمن در جدول (۷) همبستگی مثبت و معنی داری بین تعداد دانش آموزان بیمار دبستان بهار علم با پارامتر تعداد روزهای گردوغبار وجود دارد. (اگرچه ضریب پیرسون به میزان $0/700^*$ همبستگی بالاتری را نسبت به ضریب اسپیرمن $0/642^*$ نشان می دهد).

۴-دبستان شهدای عین دو

جدول ۸- همبستگی، دانش آموزان بیمار دبستان شهدای عین دو با تعداد روزهای گردوغبار اهواز ۹۵- (نگارندگان)

ماه	تعداد دانش آموز (بیمار)	تعداد روزهای گردوغبار
مهر	۳۷	۶
آبان	۰	۰
آذر	۸	۱
دی	۰	۰
بهمن	۳۲	۳
اسفند	۳۸	۷
فروردین	۵	۵
اردیبهشت	۲۳	۸
ضریب همبستگی پیرسون		$0/0719^*$
ضریب همبستگی اسپیرمن		$0/0759^*$

با توجه به نتایج جدول (۸) همبستگی مثبت و معنی داری بین تعداد دانش آموزان بیمار دبستان شهدای عین دو، با پارامتر تعداد روزهای گردوغبار وجود دارد. (ضریب اسپیرمن به میزان $0/0759^*$ همبستگی بالاتری را نسبت به ضریب پیرسون $0/0719^*$ نشان می دهد).

۵-دبستان قدس ۱

جدول ۹- همبستگی، تعداد دانش آموزان بیمار دبستان قدس با تعداد روزهای گردوغبار شهر اهواز ۹۵ (نگارندگان)

ماه	تعداد دانش آموز (بیمار)	تعداد روزهای گردوغبار
مهر	۲۸	۶
آبان	۰	۰
آذر	۴	۱
دی	۰	۰
بهمن	۳۰	۳
اسفند	۲۸	۷
فروردین	۵	۵
اردیبهشت	۱۲	۸
ضریب همبستگی پیرسون		۰/۶۰۱
ضریب همبستگی اسپیرمن		۰/۶۷۹

با توجه به نتایج جدول (۹) همبستگی مثبت و معنی‌داری بین تعداد دانش آموزان بیمار دبستان قدس با پارامتر تعداد روزهای گردوغبار وجود دارد. (ضریب اسپیرمن به میزان ۰/۶۷۹ همبستگی بالاتری را نسبت به ضریب پیرسون ۰/۶۰۱ نشان می‌دهد).

۶-دبستان عصمت

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی

جدول ۱۰- همبستگی، دانش آموزان بیمار دبستان عصمت با تعداد روزهای گردوغبار شهر اهواز (نگارندگان)

ماه	تعداد دانش آموز (بیمار)	تعداد روزهای گردوغبار
مهر	۶	۶
آبان	۰	۰
آذر	۳	۱
دی	۰	۰
بهمن	۱۵	۳
اسفند	۱۳	۷
فروردین	۰	۵
اردیبهشت	۸	۸
ضریب همبستگی پیرسون		۰/۵۲۶
ضریب همبستگی اسپیرمن		۰/۶۱۴

با توجه به نتایج جدول (۱۰) همبستگی مثبت و معنی‌داری بین تعداد دانش آموزان بیمار دبستان عصمت با پارامتر تعداد روزهای گردوغبار وجود دارد. (ضریب اسپیرمن به میزان ۰/۶۱۴ همبستگی بالاتری را نسبت به ضریب پیرسون ۰/۵۲۶ نشان می‌دهد).

۷-دبستان بهبهانی

جدول ۱۱- همبستگی، تعداد دانش آموزان بیمار دبستان بهبهانی با تعداد روزهای گردوغبار شهر اهواز ۹۵ (نگارندگان)

ماه	تعداد دانش آموز (بیمار)	تعداد روزهای گردوغبار
مهر	۱۴	۶
آبان	۰	۰
آذر	۳	۱
دی	۰	۰
بهمن	۱۷	۳
اسفند	۱۲	۷
فروردین	۰	۵
اردیبهشت	۱۰	۸
ضریب همبستگی پیرسون		۰/۵۸۵
ضریب همبستگی اسپیرمن		۰/۵۴

با توجه به نتایج جدول(۱۱) همبستگی مثبت و معنی داری بین تابع تعداد دانش آموزان بیمار دبستان بهبهانی با پارامتر تعداد روزهای گردوغبار وجود دارد. (ضریب پیرسون به میزان ۰/۵۸۵ همبستگی بالاتری را نسبت به ضریب اسپیرمن ۰/۵۴ نشان می دهد).

۸-دبستان حضرت محمد

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی

جدول ۱۲- همبستگی، دانش آموزان بیمار دبستان حضرت محمد(ص) با روزهای گردوغبار شهر اهواز ۹۵ ، نگارندگان

ماه	تعداد دانش آموز (بیمار)	تعداد روزهای گردوغبار
مهر	۳۲	۶
آبان	۰	۰
آذر	۷	۱
دی	۰	۰
بهمن	۴۳	۳
اسفند	۴۰	۷
فوریه	۸	۵
اردیبهشت	۱۹	۸
ضریب همبستگی پیرسون		۰/۶۱۲
ضریب همبستگی اسپیرمن		۰/۶۸۷

با توجه به نتایج جدول (۱۲) همبستگی مثبت و معنی‌داری میان تعداد دانش آموزان بیمار دبستان حضرت محمد با پارامتر تعداد روزهای گردوغبار وجود دارد. (ضریب اسپیرمن به میزان ۰/۶۸۷، همبستگی بالاتری را نسبت به ضریب پیرسون ۰/۶۱۲ نشان می‌دهد)

۹-دبستان شریعتی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

پرتال جامع علوم انسانی

جدول ۱۳- همبستگی، دانش آموزان بیمار دبستان شریعتی با تعداد روزهای گردوغبار شهر اهواز ۹۵ (نگارندگان)

ماه	تعداد دانش آموز (بیمار)	تعداد روزهای گردوغبار
مهر	۲۶	۶
آبان	۰	۰
آذر	۷	۱
دی	۰	۰
بهمن	۲۶	۳
اسفند	۱۹	۷
فروردین	۵	۵
اردیبهشت	۱۳	۸
ضریب همبستگی پیرسون		۰/۵۹۶
ضریب همبستگی اسپیرمن		۰/۶۴۲

با توجه به نتایج جدول (۱۳) همبستگی ثبت و معنی‌داری بین تعداد دانش آموزان بیمار دبستان شریعتی با پارامتر تعداد روزهای گردوغبار وجود دارد. (ضریب اسپیرمن به میزان $0/642$ همبستگی بالاتری را نسبت به ضریب پیرسون $0/596$ نشان می‌دهد)

۱۰-دبستان نور اسلام

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی

جدول ۱۴- همبستگی، دانش آموزان بیمار دبستان نور اسلام با تعداد روزهای گردوغبار شهر اهواز ۹۵ (نگارندگان)

ماه	تعداد دانش آموز (بیمار)	تعداد روزهای گردوغبار
مهر	۱۳	۶
آبان	۰	۰
آذر	۴	۱
دی	۰	۰
بهمن	۱۹	۳
اسفند	۱۳	۷
فروردین	۱	۵
اردیبهشت	۱۰	۸
ضریب همبستگی پیرسون		۰/۵۵۶
ضریب همبستگی اسپیرمن		۰/۶۳

با توجه به نتایج جدول (۱۴) همبستگی مثبت و معنی‌داری بین تعداد دانش آموزان بیمار دبستان نور اسلام با پارامتر تعداد روزهای گردوغبار وجود دارد. (ضریب اسپیرمن به میزان ۰/۶۳ همبستگی بالاتری را نسبت به ضریب پیرسون ۰/۵۵۶ نشان می‌دهد)

۱۱- دبستان نجات الهی

جدول ۱۵- همبستگی، دانش آموزان بیمار دبستان نجات الهی با تعداد روزهای گردوغبار شهر اهواز ۹۵ (نگارندگان)

ماه	تعداد دانش آموز (بیمار)	تعداد روزهای گردوغبار
مهر	۱۳	۶
آبان	۰	۶
آذر	۷	۱
دی	۰	۰
بهمن	۱۹	۳
اسفند	۱۶	۷
فروردین	۲	۵
اردیبهشت	۹	۸
ضریب همبستگی پیرسون		۰/۵۴۰
ضریب همبستگی اسپیرمن		۰/۶۳۹

با توجه به نتایج جدول (۱۵) همبستگی مثبت و معنی داری بین تعداد دانش آموزان بیمار دبستان نجات الهی با پارامتر تعداد روزهای گردوغبار وجود دارد. (ضریب اسپیرمن به میزان ۰/۶۳۹ همبستگی بالاتری را نسبت به ضریب پیرسون ۰/۵۴۰ نشان می دهد).

۱۲-دبستان علامه امینی

جدول ۱۶- همبستگی، دانش آموزان بیمار دبستان علامه امینی با تعداد روزهای گردوغبار شهر اهواز ۹۵ (نگارندگان)

ماه	تعداد دانش آموز (بیمار)	تعداد روزهای گردوغبار
مهر	۱۲	۶
آبان	۰	۰
آذر	۵	۱
دی	۰	۰
بهمن	۱۶	۳
اسفند	۱۶	۷
فروردین	۲	۵
اردیبهشت	۶	۸
ضریب همبستگی پیرسون		۰/۵۴۲
ضریب همبستگی اسپیرمن		۰/۶۷۹


با توجه به نتایج جدول (۱۶) همبستگی مثبت و معنی داری بین تعداد دانش آموزان بیمار دبستان علامه امینی با پارامتر تعداد روزهای گردوغبار وجود دارد (ضریب اسپیرمن به میزان ۰/۶۷۹ همبستگی بالاتری را نسبت به ضریب پیرسون ۰/۵۴۲ نشان می دهد)

۱۳-دبستان فارابی

جدول ۱۷- همبستگی، تعداد دانش آموزان بیمار دبستان فارابی با تعداد روزهای گردوغبار شهر اهواز ۹۵ (نگارندگان)

ماه	تعداد دانش آموز (بیمار)	تعداد روزهای گردوغبار
مهر	۱۴	۶
آبان	۰	۰
آذر	۴	۱
دی	۰	۰
بهمن	۱۷	۳
اسفند	۱۴	۷
فروردین	۵	۵
اردیبهشت	۷	۸
ضریب همبستگی پیرسون		۰/۶۰۴
ضریب همبستگی اسپیرمن		۰/۶۷۹

با توجه به نتایج جدول (۱۷) همبستگی مثبت و معنی‌داری بین تعداد دانش آموزان بیمار دبستان فارابی با پارامتر تعداد روزهای گردوغبار وجود دارد. (ضریب اسپیرمن به میزان ۰/۶۷۹ همبستگی بالاتری را نسبت به ضریب پیرسون ۰/۶۰۴ نشان می‌دهد).

۱۴-دبستان معراج


جدول ۱۸- همبستگی، تعداد دانش آموزان بیمار دبستان مراجع با تعداد روزهای گردوغبار شهر اهواز ۹۵ (نگارندگان)

ماه	تعداد دانش آموز (بیمار)	تعداد روزهای گردوغبار
مهر	۲۱	۶
آبان	۰	۰
آذر	۷	۱
دی	۰	۰
بهمن	۲۹	۳
اسفند	۲۰	۷
فروردین	۵	۵
اردیبهشت	۹	۸
ضریب همبستگی پیرسون		۰/۴۸۳
ضریب همبستگی اسپرمن		۰/۶۱۴

با توجه به نتایج جدول (۱۸) همبستگی مثبت و معنی داری بین تعداد دانش آموزان بیمار دبستان مراجع با پارامتر تعداد روزهای گردوغبار وجود دارد. (ضریب اسپرمن به میزان ۰/۶۱۴ همبستگی بالاتری را نسبت به ضریب پیرسون ۰/۴۸۳ نشان می دهد)

۱۵- دبستان میشم

جدول ۱۹- همبستگی، تعداد دانش آموزان بیمار دبستان میشم با تعداد روزهای گردوغبار شهر اهواز ۹۵ (نگارندگان)

ماه	تعداد دانش آموز (بیمار)	تعداد روزهای گردوغبار
مهر	۱۱	۶
آبان	۰	۰
آذر	۳	۱
دی	۰	۰
بهمن	۱۵	۳
اسفند	۱۰	۷
فروردین	۲	۵
اردیبهشت	۷	۸
ضریب همبستگی پیرسون		۰/۵۵۸
ضریب همبستگی اسپرمن		۰/۶۱۴

با توجه به نتایج جدول (۱۹) همبستگی مثبت و معنی‌داری بین تابع تعداد دانش آموزان بیمار دبستان میثم با پارامتر تعداد روزهای گردوغبار وجود دارد. (ضریب اسپیرمن به میزان ۰/۶۱۴ همبستگی بالاتری را نسبت به ضریب پیرسون ۰/۵۵۸ نشان می‌دهد)

۱۶-دبستان مدرس ۱

جدول ۲۰- همبستگی، تعداد دانش آموزان بیمار دبستان مدرس با تعداد روزهای گردوغبار شهر اهواز ۹۵ (نگارندگان)

ماه	تعداد دانش آموز (بیمار)	تعداد روزهای گردوغبار
مهر	۱۱	۶
آبان	۰	۰
آذر	۴	۱
دی	۰	۰
بهمن	۱۹	۳
اسفند	۱۴	۷
فروردین	۲	۵
اردیبهشت	۹	۸
ضریب همبستگی پیرسون		۰/۵۴۷
ضریب همبستگی اسپیرمن		۰/۶۳۹

با توجه به نتایج بدست آمده از ضرایب همبستگی پیرسون و اسپیرمن در جدول (۲۰) همبستگی مثبت و معنی‌داری بین تعداد دانش آموزان بیمار دبستان مدرس با پارامتر تعداد روزهای گردوغبار وجود دارد. (ضریب اسپیرمن به میزان ۰/۶۳۹ همبستگی بالاتری را نسبت به ضریب پیرسون ۰/۵۴۷ نشان می‌دهد).

۱۷-دبستان نمونه فردا

جدول ۲۱- همبستگی، دانش آموزان بيمار دبستان نمونه فردا با تعداد روزهای گردوغبار شهر اهواز ۹۵ (نگارندگان)

ماه	تعداد دانش آموز (بيمار)	تعداد روزهای گردوغبار
مهر	۱۷	۶
آبان	۰	۰
آذر	۵	۱
دي	۰	۰
بهمن	۱۵	۳
اسفند	۱۷	۷
فروردين	۴	۵
اردیبهشت	۹	۸
ضریب همبستگی پیرسون		۰/۶۹۳
ضریب همبستگی اسپیرمن		۰/۷۵۲*

با توجه به نتایج جدول (۲۱) همبستگی مثبت و معنی داری بین تعداد دانش آموزان بيمار دبستان نمونه فردا با پارامتر تعداد روزهای گردوغبار وجود دارد. (ضریب اسپیرمن به میزان $^{*}0/752$ همبستگی بالاتری را نسبت به ضریب پیرسون $0/693$ نشان می دهد).

۱۸- دبستان های ناحیه ۴

جدول ۲۲- همبستگی، دانش آموزان بيمار دبستان های ناحیه ۴ با تعداد روزهای گردوغبار شهر اهواز ۹۵ (نگارندگان)

ماه	تعداد دانش آموز (بيمار)	تعداد روزهای گردوغبار
مهر	۲۰/۲	۶
آبان	۰	۰
آذر	۵/۵	۱
دي	۰	۰
بهمن	۲۳/۴	۳
اسفند	۲۱/۷	۷
فروردين	۳/۸	۵
اردیبهشت	۱۳/۱	۸
ضریب همبستگی پیرسون		۰/۶۵۰
ضریب همبستگی اسپیرمن		۰/۷۲۱*

با توجه به نتایج جدول (۲۲) همبستگی مثبت و معنی‌داری بین تعداد دانش آموزان بیمار دبستان‌های ناحیه ۴ با پارامتر تعداد روزهای گردوغبار وجود دارد. (ضریب اسپیرمن به میزان $^{*}0.721$ همبستگی بالاتری را نسبت به ضریب پیرسون 0.650 نشان می‌دهد).

بررسی همبستگی (ضرایب پیرسون و اسپیرمن) تعداد دانش آموزان بیمار با تعداد روزهای گردوغبار در سال تحصیلی ۹۴-۹۵ در جدول (۲۳) آورده شده است.

جدول ۲۳- همبستگی تعداد دانش آموزان بیمار دبستان‌های مقطع ابتدایی ناحیه ۴ با روزهای گردوغبار ۹۵ (نگارندگان)

نام دبستان	ضریب همبستگی پیرسون	ضریب همبستگی اسپیرمن
معرفت	۰/۷۷۷*	۰/۷۱۱*
علوی	۰/۷۷۷*	۰/۷۸۸*
بهار علم	۰/۷۰۰	۰/۶۴۲
شهدای عین دو	۰/۷۱۹*	۰/۷۵۹*
قدس ۱	۰/۶۰۱	۰/۶۷۹
عصمت	۰/۵۲۶	۰/۶۱۴
بهبهانی	۰/۵۸۵	۰/۵۴۰
حضرت محمد	۰/۶۱۲	۰/۶۸۷
شریعتی	۰/۵۹۶	۰/۶۴۲
نور اسلام	۰/۵۵۶	۰/۶۳۰
نجات الہی	۰/۵۴۰	۰/۶۳۹
علامہ امینی	۰/۵۴۲	۰/۶۷۹
فارابی	۰/۶۰۴	۰/۶۷۹
معراج	۰/۴۸۳	۰/۶۱۴
میثم	۰/۵۵۸	۰/۶۱۴
مدرس ۱	۰/۵۴۷	۰/۶۳۹
نمونه فردا	۰/۶۹۳	۰/۷۵۲*
میانگین ناحیه ۴	۰/۶۵۰	۰/۷۲۱*

با توجه به نتایج جدول (۲۳) ضرایب همبستگی پیرسون و اسپیرمن، بیانگر این موضوع هست که افزایش تعداد روزهای گردوغبار با مبتلایان به عوارض و بیماری‌های ناشی از گردوغبار رابطه مستقیم دارد. بنابراین پارامتر تعداد روزهای گردوغبار برافزايش مبتلایان به عوارض ناشی از گردوغبار تأثیرگذار بوده‌اند.

نتیجه‌گیری

با اینکه سال ۹۴-۹۵ شهر اهواز، با داشتن ۶۹ روز گردو غبار نسبت به دوره بلند مدت (۸۲ روز)، یک سال، کم گرد و غبار محسوب می‌گردد ولی بیشترین بیماری‌های مشاهده شده ناشی از گردوغبار در دانش آموزان ناحیه ۴ اهواز، عوارض و حساسیت‌های تنفسی (نظیر سرفه، آبریزش بینی، خارش گلو، خارش چشم) بوده است (۹۴/۸ درصد)، ۴/۴ درصد بیماری‌های گوارشی و کمتر از ۱ درصد، علائم و بیماری‌های قلبی بوده اند. نتایج بررسی نشان داد که بین تعداد دانش آموزان بیمار دبستان‌های ناحیه مورد مطالعه، با پارامتر تعداد روزهای گردوغبار، یک همبستگی مثبت و معنی‌داری وجود دارد. (ضریب اسپیرمن به میزان ^{*}۰/۷۲۱ و ضریب پیرسون ۰/۶۵۰ را نشان می‌دهد) این ضرایب آماری، بیانگر این موضوع هست که افزایش تعداد روزهای گردوغبار با مبتلایان به بیماری‌های تنفسی و قلبی و گوارشی، رابطه مستقیم داشته است. تشابه نتایج این بررسی با پژوهش‌های (قادری و همکاران ۱۳۹۴) حاکی از افزایش این نوع بیماری هاست. همچنین تشابه این تحقیق با سایر بررسی‌های مشابه (رجبی و دیگران، ۱۳۹۴، بشیری و سوری، ۱۳۹۶، زراسوندی و همکاران، ۲۰۱۱، قربانیان و همکاران، ۱۳۹۳) در غلظت بالای کانی کلسیت ریزگردهای اهواز و اظهار نظر مشابه (حاج علیلو و وثوق، ۱۳۸۸) که عناصر سنگین ریزگردها، نظیر کبات، کروم، نیکل، کادمیوم، آرسنیک، منگنز و جیوه، را که باعث اختلال در سیستم بدن و دستگاه تنفسی می‌دانند با درصد بالای بیماران تنفسی این تحقیق طبق جدول (۴) مطابقت دارد. نتایج این مطالعه با پژوهش‌های انجام یافته (Griffin, 2007, 459) و (Alharban, et al, 2010, 169) نیز، در رابطه با عوارض تنفس کلسیت موجود در ذرات گردوغبار، حاکی از این است که بین دو متغیر ذرات کلسیت ریزگرد ها با بیماری‌های گوارشی و قلبی و تنفسی دانش آموزان رابطه معنی‌داری وجود دارد. نتایج بررسی (نجفی و همکاران، ۱۳۹۲) که معتقد‌نشد، ریز گردهای رسی و سیلتی در طول مسیر حرکت خود، مقادیر زیادی از باکتری‌ها و قارچ‌ها و سایر آلاینده‌های آلی و معدنی را جذب و به نقاط دور دست منتقل می‌نمایند، با نتایج این تحقیق در افزایش بیماری‌های تنفسی مشابهت دارد.

امید است برنامه ریزان محیطی، با استفاده از راهکار‌های مناسب (کاشت پوشش گیاهی سازگار با آب و هوا، روش نقش بند، ریگ پاشی، تامین آب تالاب‌ها و) در منشاء حرکت ریزگرد ها، جلوی بخشی از این طوفان‌ها که حاوی میکروارگانیسم‌ها و عناصر سنگین مضر هستند را بگیرند که این امر مهم با تفاهم بین‌المللی و منطقه‌ای به نتیجه خواهد رسید.

تقدیر و تشکر

از کلیه مسئولین محترم مدیریت آموزش و پژوهش ناحیه ۴ شهر اهواز به خصوص آموزش مقطع ابتدایی و مدیران ۱۷ مدرسه ابتدایی این ناحیه، که به ما در ارائه آمار و اطلاعات و تدوین پرسشنامه و تکمیل آن از طریق دانش آموزان، یاری رساندند قدردانی می شود.

منابع

- ۱-اداره کل هواشناسی استان خوزستان (۱۳۹۶) داده های آب و هوا، سال های ۹۵-۶۵.
- ۲- اداره کل محیط زیست استان خوزستان (۱۳۹۶) داده های ریزگرد ها، سال های ۹۵-۶۵.
- ۳- بشیری، ر.، سوری، ب (۱۳۹۶) بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیابی ذرات معلق بزرگتر از ۱۰ میکرومتر در استان کردستان و غرب ایران. *فصلنامه زمین شناسی ایران*، ۴۱، (۳): ۷۹-۶۷.
- ۴- حاج علیلو، ب.، وثوق، ب (۱۳۸۸) زمین شناسی پزشکی. چاپ اول. انتشارات دانشگاه پیام نور. ۲۵۵ صفحه.
- ۵- دریوواسی، س.، صائب ک.، ملاشاهی، م (۱۳۹۴) بررسی تاثیر میزان فاصله از منبع آلودگی بر غلظت فلزات سنگین در خاک اطراف کارخانه سیمان شهرستان نکا. *مجله علوم و تکنولوژی محیط زیست*، ۱۷، (۴): ۴۴-۳۳.
- ۶- رجبی، م.، سوری، ب (۱۳۹۴) ارزیابی مقادیر فلزات سنگین در ذرات گرد و غبار. *فصلنامه علمی پژوهشی انجمن علمی بهداشت محیط ایران*، ۸، (۱): ۱۱-۲۲.
- ۷- قادری، ف.، پورفلاح، س (۱۳۹۴) تأثیر گرد و غبار هوای شهر اهواز بر افزایش مرگ و میر شهر، اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار، اهواز، ۱۴-۱۲ اسفند. ۲۶۳-۲۶۸.
- ۸- قربانیان، ج.، کردوانی، پ. (۱۳۹۳) آنالیز بافت ریزگرد های شهر اهواز به روش پرتو ایکس و رابطه تشدید این طوفانها با تخریب تالاب هور العظیم. *فصلنامه علمی پژوهشی اکویولوژی تالاب*، ۶، (۲۰): ۹۹-۹۱.
- ۹- قربانی، ز. (۱۳۸۷) بهداشت حرفه ای، نوشته شده در سایت گوگل، *Savehoh. Blogfa.com*، سه شنبه دهم دی ماه ساعت ۱۱:۷.
- ۱۰- نجفی، م. خوش اخلاق، ف. زمان زاده، م. شیرازی، م.ح. صمدی، م. (۱۳۹۲) بررسی ترکیبات گرد و غبار در غرب و جنوب غرب ایران. *فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی*، ۲، (۶): ۱۷-۳۶.

11- Aarons, S.M., Aciego, S.M., Gabrielli, P., Delmonte, B., Bouman, C. (2016) Ice core record of dust sources in the western United States over the last 300 years. Journal of Chemical Geology, 442:160-173.

- 12- Al-Hurban, A.E., Al-ostad, A.N. (2010) *Textural characteristics of dust fall out and potential effect on public health in Kuwait city and suburbs*, *Journal of Environmental geology*, 60: 169-181.
- 13- Gabet, E.J. (2014) *Fire increases dust production from chaparral soils*, *Journal of Geomorphology*, 217: 182-192.
- 14-Ghorbanian, G., Kardavani, P., Sarvati, MR., Jedari Eyvazi, J. (2014) *measuring the concentrations of heavy metals in dust in ahvaz*, *Journal of Biodiversity and Environmental Sciences (JBES)*, 5: 300-305.
- 15- Griffin, D.W. (2007) *Atmospheric Movement of Microorganisms in Clouds of Desert Dust and Implications for Human Health*, *Journal of Clinical Microbiology*, 20 (3): 459-577.
- 16- Hyun, C., Dong, W.S., Wonnyon, K., Seong, J.D., Soo, H.L., Minsoo, N. (2011) *Asian dust storm particles induce a broad toxicological transcriptional program in human epidermal keratinocytes*, *Toxicology Letters*, 200(1-2): 92-99.
- 17- Ludovic, F.H., Holger, P., Dimitri, N.M. (2015) *Regional climate impact of aerosols emitted by transportation modes and potential effects of policies on demand emissions*, 41 : 24-30.
- 18- Swet, N., Katra, I. (2016) *Reduction in soil aggregation in response to dust emission processes*, *Journal of Geomorphology*, 268:177-183.
- 19- Zarasvandi, A., Carranza, E.J.M., Moore, F., Rastmanesh, F. (2011) *Spatio-temporal occurrences and mineralogical-geochemical characteristics of airborne dusts in Khuzestan Province (southwestern Iran)*, *Journal of Geochemical Exploration*, 111: 138-151.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی