



Tabriz Islamic Art University
1999



Technical Note

The field monitoring of influential biodeteriogenic Agent the historic rock surfaces in Persepolis-UNESCO World Heritage Site



Mohammad Sohrabi¹, Mahsa Esmaillou^{2*}, Hamid Fadaei³, Mohammad Hassan Talebian⁴,
Nasrin Noohi³

¹Assistant Professor in Iranian Research Organization for Science and Technology, & The Museum of
Iranian Lichens, Tehran, IRAN

²PhD student in Microbiology, Iranian Research Organization for Science and Technology, Tehran, IRAN

³Assistant Professor in Research Center for Conservation of Cultural Relics, Research Center of Iranian
Cultural Heritage and Tourism Organization, Tehran, IRAN

⁴Architectural Conservation, Associate Professor in Department of Fine Arts, University of Tehran, IRAN,

Received: 21/02/2020

Accepted: 09/06/2020

Abstract

Cultural heritage has always been the focus of many civilizations and therefore, it needs to be preserved for future generations. From prehistoric times, when grandeur and beauty were the aims of architecture, stone was the most widely used durable material. Biodeterioration of the stone monuments, one of the most important causes for the loss of the cultural heritage, is defined as any undesirable change in the properties of a material caused by the action of biological agents such as fungi, bacteria, cyanobacteria, lichens and plants, as well as animals such as insects. The world heritage of Persepolis, for example, has been unprotected from biodeterioration for the centuries, and has unfortunately not been addressed during this time. The purpose of this study is to provide a new perspective on the study of the destructive biological factors affecting this historic site to provide a framework for future studies and serious consideration of the biological debate in conservation and restoration issues. Therefore, the presence of various factors possibly derived from the action of animals, vascular plants, mosses, fungi, lichens, green microalgae, and photosynthetic and non-photosynthetic bacteria were investigated. Based on objective observations, the presence of biodegradation factors affecting floors and the all sides of walls of various buildings in Persepolis was qualitatively investigated. Based on the results, the studied areas were classified into four classes with very high, high, medium and low risk. In addition to the initial estimate of biodiversity, the factors affecting the biodegradation of Persepolis were presented for the first time and the critical points for the presence of destructive factors were determined. Lichens exist throughout Persepolis and have proved useful in archaeological studies, since their growth can be chronologically employed to measure the age of rocks and indeed ancient monuments, their radial growth increasing logarithmically over time based on the assumed specific rate. In this study, the presence of lichens has been investigated from the perspective of biodeterioration, their presence at the microscopic scale can intensify the weathering and biodeterioration of the rock. Such action is not visible to the naked eye but leaves irreparable damage to the stone surface. It was estimated that this complex process at Persepolis is the result of more than 15 different Vascular plant species and

* Corresponding author: sohrabi@irost.org

5 Non-vascular plant (mosses), 16 or 17 different species of birds, 3 to 5 species of snails and 2 to 4 species of reptiles and insects. It was shown that the establishment of a biomonitoring laboratory at Persepolis is the important task of studying the action of microorganisms since it is estimated that more than 20 strains of non-photosynthetic bacteria, more than 10 taxa of cyanobacteria, about 15 plants and mosses, more than 130 lichen species and 20 species of non-lichen fungi are involved in the biodegradation of Persepolis. The results are the estimative and provide the basis for more detailed studies to monitor the factors involved in biodegradation, which is one of the necessities of this World Heritage Site.

Keywords: XRD, Persepolis, Biodeterioration, Conservation and Restoration, World Cultural Heritage, Critical points, Biodiversity.





مقاله پژوهشی



پایش میدانی عوامل مؤثر در فرسودگی زیستی بر سطوح تاریخی سنگ‌های میراث جهانی تخت جمشید

محمد سهرابی^{*}، مهسا اسماعیل‌لو^۱، حمید فدایی^۲، محمدحسن طالبیان^۳، نسرین نوحی^۳

۱. گلستان‌شناس، استادیار گروه زیست‌فناوری صنعتی و محیط‌زیست، پژوهشکده زیست‌فناوری و موزه گلستان‌گاه‌های ایران سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران
۲. دانشجوی دکتری میکروبیولوژی، گروه زیست‌فناوری صنعتی و محیط‌زیست، پژوهشکده زیست‌فناوری، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران
۳. استادیار پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی - فرهنگی، پژوهشگاه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، تهران، ایران
۴. دانشیار پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۰/۰۳/۱۳۹۹

تاریخ دریافت: ۱۴۰۲/۱۲/۱۳۹۸

چکیده

میراث فرهنگی، به عنوان ارزشمندترین یادگار گذشتگان، هویت فرهنگی و تمدنی آن‌ها، همواره زمینه توجه و خاستگاه فرهنگ‌های گوناگون بوده است، از این رو، نیازمند حفظ برای آینده‌گان و انتقال به آن‌ها است. فرسودگی‌های زیستی، آسیب‌های برگشت‌ناپذیری هستند که به علت استقرار عوامل زیستی گوناگون نظری قارچ، باکتری‌ها، سیانو باکترها، گلستان‌گاه، گیاهان، موریانه‌ها و سایر حشرات بر سطوح آثار تاریخی رخ می‌دهند. در این میان، میراث جهانی تخت جمشید و آثار موجود در عرصه‌های آن از گزند عوامل دخیل در فرسودگی زیستی در امان نبوده و در طی سالیان سال در معرض عوامل فرساینده زیستی قرار گرفته‌اند. بنابراین، هدف از این تحقیق بررسی میدانی حضور کیفی و تنوع عوامل زیستی مخرب این مجموعه تاریخی است تا زمینه را برای تحقیقات بعدی و شروع مباحث فرسودگی زیستی در حفاظت پیشگیرانه و مرمت آثار فراهم کند. در این پژوهش، حضور عوامل مختلفی از جمله جانوران، گیاهان گلدار، قارچ‌ها، گلستان‌گاه، ریز جلبک‌های سبز و باکتری‌های قتوسترنکننده و غیر قتوسترنکننده، به صورت کلی بررسی شد. در ادامه، بر اساس مشاهدات عینی، حضور عوامل فرسودگی زیستی در کف و دیوارهای شمالی، جنوبی، شرقی و غربی بناهای مختلف تخت جمشید به صورت کیفی بررسی شد. بر اساس نتایج بدست آمده، مناطق بررسی شده، به چهار منطقه دلای خطر نسبی خیلی زیاد، زیاد، متوسط و کم درجه‌بندی شدند. در ضمن، تخمین اولیه از تنوع زیستی عوامل مؤثر در فرسودگی زیستی تخت جمشید برای اولین بار ارائه شد و نقاط بحرانی حضور عوامل مخرب تعیین شدند.

واژگان کلیدی: تخت جمشید، فرسودگی زیستی، حفاظت و مرمت، میراث جهانی، نقاط بحرانی، تنوع زیستی

* مسئول مکاتبات: جاده قدیم کرج، سه راه شهریار، بعد از شهرک سعیدآباد، مجتمع تحقیقاتی عصر انقلاب، پژوهشکده زیست‌فناوری و موزه گلستان‌گاه‌های ایران سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، کد پستی: ۳۳۱۳۱۹۳۶۸۵

پست الکترونیکی: sohrabi@irost.org

«این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) است و از آینه نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.»


گیاه‌شناسی، باکتری‌شناسی، قارچ‌شناسی، گل‌شناسی و جلبک‌شناسی می‌تواند نقش مهمی را در مطالعه عوامل فرسودگی زیستی ایفا کند [7]. دانش تاکسونومی و سامانمند مربوط به عوامل فرسودگی زیستی، که در سطح بنای‌های تاریخی وجود دارند، بسیار محدود است [8]. طبقه‌بندی صحیح و علمی این ارگانیسم‌ها و میکروارگانیسم‌ها، اساس مطالعات اکولوژیک و فیزیولوژیک را در زمینه فرسودگی زیستی فراهم می‌کند. هر یک از این عوامل دارای مکانیسم‌های زیستی تکثیر و تولید مثل، استقرار و نیازهای اکولوژیک تخصصی مربوط به خود هستند که تا حد زیادی برای متولیان حوزه میراث تاریخی و فرهنگی ناشناخته محسوب می‌شوند و پیشگیری و کنترل آن‌ها به تحقیقات آزمایشگاهی و دانشگاهی زیادی، نیاز دارد [9].

بی‌تردید در طی گذر سالیان پیاپی، مجموعه تخت جمشید، خارج از تهدیدات عوامل انسانی (جنگ‌ها و چاول‌ها) از گزند عوامل طبیعی غیرزنده دخیل در فرسودگی زیستی، مانند باد، باران، نور، دما و رطوبت و یا عوامل زنده‌ای مانند انواع موجودات زنده، در امان نبوده است. حضور مستمر یا موقت برخی عوامل زیستی ماکروسکوپی مانند جانوران و یا رشد گیاهان آوندی و غیر آوندی مانند خزه‌ها و برخی عوامل میکروسکوپی نظیر قارچ‌ها و گل‌شنگ‌ها، سیانوباكترها و باکتری‌های غیر فتوسنتزکننده، نقوش هنری ریزودرست حجاری شده در دیوارها و نقش برجهسته‌ها را مورد تخریب و آماج حمله خود قرار می‌دهند. آثار فرسودگی زیستی تدریجی که در گذر زمان ایجاد شده، بر پیکرۀ بسیاری از نقوش مشهود است.

جریان حیات و بقا، تنوع زیستی ارگانیسم‌ها و فرآیندهای مرتبط در سطح سنگ بسیار گسترده‌تر از آن است که بشر پیش از آن تصور می‌کرد [10]. سنگ به عنوان یک ماده اولیه بادوام از زمان‌های پیش از تاریخ و شکل‌گیری تمدن‌ها، مورد توجه بشر قرار گرفته و همواره از آن در طراحی و ساخت بنایها استفاده شده است [11]. با شکل‌گیری تمدن‌ها و گسترش سکونت‌گاه‌ها، حفاظت از زیبایی و عظمت بنای‌های تاریخی ضرورت پیدا کرد [12].

۱. مقدمه

وقوع پدیده فرسودگی زیستی یا تخریب توسط عوامل زیستی، یکی از اتفاقات آرام و نامحسوس و در عین حال خط‌نماک در سطوح آثار و بنای‌های تاریخی مستقر در فضاهای روباز جهان به شمار می‌آید [1]. این پدیده اغلب، به عنوان یک فرآیند فرسایشی برگشت‌ناپذیر پس از اثرات تخریبی اولیه و توأم با عوامل فیزیکی و شیمیایی و زیستی در نظر گرفته می‌شود. به عبارتی دیگر، فرسودگی زیستی، تحت عنوان آسیب فیزیکی و شیمیایی حاصل از عوامل زیستی شناخته می‌شود که برگشت‌ناپذیر است و علت اصلی آن، استقرار عوامل زیستی گوناگون مانند گیاهان آوندی و غیر آوندی، جانوران، قارچ‌ها، باکتری‌ها و گل‌شنگ‌ها بر سطوح آثار تاریخی، است [2]. فرسودگی زیستی، به عنوان یک تهدید جدی و نامحسوس، آثار به جای مانده از تمدن‌های بشری را در فضاهای روباز با مشکل حفاظت و نگهداری مواجه می‌کند. گسترش مرزهای دانش در حوزه‌های میراث تاریخی و فرهنگی و نفوذ شاخه‌های مختلف علوم پایه، بنیادی و کاربردی مدرن، حتی در کشورهایی که پیشینه اندکی از ذخایر و میراث گران‌بهای تاریخی و فرهنگی دارند، جالت توجه و تحسین برانگیز است. این در حالی است که سهم تولید علوم پایه مرتبط با میراث فرهنگی در کشور ما بسیار ناچیز است و روزبه روز نیاز به ظرفیتسازی و توسعه علوم مدرن، در این زمینه احساس می‌شود. تنها حفظ آثار تاریخی و فرهنگی قرون گذشته و مرتبط کردن آن با علوم پایه و کاربردی، تضمین کننده آینده روش‌شن در حفاظت از میراث فرهنگی بر کشورها است. منابع متعددی در این خصوص، منتشر شده‌اند که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به موارد پیروروتی و همکاران ۲۰۰۴؛ آرینو و سایز-جیمز ۱۹۹۶؛ رایزو و همکاران ۲۰۰۹؛ سنت کالیر و سیوارد ۲۰۰۴ و شرر و اورتگا ۲۰۰۹ [۱,۳-۶] اشاره کرد. به علاوه، هم‌افزایی عوامل متعدد دخیل در تخریب آثار باستانی، موجب ویرانی سریع‌تر آن‌ها شده است. از مهم‌ترین شاخه‌های علوم پایه، دانش زیست‌شناسی است که با گرایش‌ها و شاخه‌های تخصصی در علوم مختلف از جمله جانور‌شناسی، حشره‌شناسی، پرنده‌شناسی،



شکل ۱: نقشهٔ صفحهٔ تخت جمشید و موقعیت جغرافیایی آن. ۱- پلکان ورودی؛ ۲- دروازهٔ ملل؛ ۳- خیابان سپاهیان؛ ۴- دروازهٔ ناتمام؛ ۵- کاخ سی و دو ستون؛ ۶- کاخ صد ستون؛ ۷- خزانه‌داری؛ ۸- کاخ ملکه (حرمسرا و موزه)؛ ۹- کاخ 'D'؛ ۱۰- کاخ هدیش، ۱۱- کاخ تجر؛ ۱۲، H؛ ۱۳- کاخ شورا مرکزی؛ ۱۴- کاخ آپادانا

Fig.1: The map of Persepolis and its geographical location. 1) Main stairway; 2) The Gate of Nations; 3) Sepahian Street; 4) The Unfinished Gate; 5) 32-columned Hall; 6) Hall of a Hundred Columns; 7) Treasury; 8) Queen's palace (harem and museum); 9) Palace 'D'; 10) Hadish Palace; 11) Palace 'H'; 12) Thatcher Palace; 13) Central Palace; 14) Apadana Palace.

اصلالت این آثار ماندگار غیرقابل جایگزین، منحصر به فرد و غیرقابل برگشت است [13].

فرسودگی زیستی بسترهای سنگی، توسط گروههای خاصی از ارگانیسم‌ها ایجاد نمی‌شود، بلکه به تعامل بین

نگهداری و حفاظت و مرمت سنگ‌های به کار رفته در بنایها همواره یکی از چالش‌های جدی بشر بوده است، هوازدگی و فرسودگی سنگ در طی سالیان دراز، موجب از بین رفتن آثار تاریخی گران‌بهای بشری شده است چراکه

۲-۲. مشاهدات میدانی

مشاهدات میدانی و مستند نگاری این تحقیق، از سال‌های ۲۰۰۵-۲۰۱۹ میلادی، به صورت تصادفی در مجموعه میراث جهانی تخت جمشید بر پایه نقشه‌های تهیه شده در انتشارات هرتسفیلد و اشمیت [16-18] صورت پذیرفت (شکل ۱). مشاهدات میدانی، بر اساس نمونه‌برداری با روش‌های غیر تخریبی و با استفاده از روش مستندنگاری و آسیب‌نگاری تصویری با دوربین سونی مدل‌های DSC-HX1، ۷۷۷ و دوربین Canon PowerShot SX ۶۰، HS بدون استفاده از فلاش نوری، تهیه شد.

۲-۳. مشاهدات میکروسکوپی نوری

در این تحقیق، برای تشخیص وجود و حضور برخی قارچ‌ها (شکل ۵)، گلسنگ‌ها، سیانوباکتری‌ها و خزه‌ها در سطوح سنگ‌های تاریخی تخت جمشید و همچنین مشاهده بخشی از مورفو‌لوزی و صفات ظاهری آن‌ها از استریو میکروسکوپ نوری مدل ام وايلد ۵ با بزرگنمایی ۱۴-۱۶۰ برابر و میکروسکوپ نوری زایس مدل ۹۹۰-۱۴۰ با بزرگنمایی ۱۲۵۰ برابر، استفاده شد. در برخی موارد، بخشی از تال گلسنگ به اندازه چند میلی‌متر برای مشاهده در زیر میکروسکوپ از پیکره گلسنگ‌های درشت بدون آسیب زدن به بستر جدا شد.

۲-۴. مشاهدات میکروسکوپ الکترونی

در این تحقیق، برای تشخیص حضور و فعالیت برخی قارچ‌ها و سیانوباکتری‌ها در سطوح سنگ‌های تاریخی و بررسی میزان عمق نفوذ آن‌ها، از میکروسکوپ الکترونی استفاده شد. ابتدا جهت تهیه مقطع از سطح سنگ، قسمتی از سنگ معدن خارج از محوطه باستانی برداشت و سپس توسط دستگاه مقطع‌گیری برش داده شد. سنگ، روی پودرهای مخصوص از درشت تا ریز به ترتیب و با حرکت ویژه دست و در همه جهات به طور کامل سایش داده شد تا سطحی صاف و صیقلی به دست آید. نمونه‌ها توسط دستگاه میکروسکوپ الکترونی روشی نشر میدانی (FE-SEM) مستقر در آزمایشگاه مرجع سازمان ().

گروه‌های همزیست مختلف بستگی دارد [8]. علاوه بر عوامل محیطی که موجب فرسودگی زیستی می‌شوند، خواص ذاتی مواد نیز در این امر دخالت دارند [14]. عدم توجه به شناسایی و اطلاع دقیق از بوم‌شناسی تاکسون‌های دخیل و نحوه تعامل آن‌ها در محیط و بررسی جایگاه آن‌ها در تشدید فرسودگی زیستی می‌تواند تهدید جدیدی برای آینده نقوش و سنگ‌های ارزشمند این میراث جهانی تلقی شود. در حال حاضر هدف اصلی این مطالعه، تهیه گزارش میدانی از حضور مؤثر عوامل زیستی دخیل در فرسودگی زیستی در سطوح تاریخی میراث جهانی تخت جمشید است. هدف دوم، ارائه دیدگاه علمی مؤثر در آشنا کردن مرمتگران با تنوع این عوامل در بسترهای سنگی میراث جهانی تخت جمشید و آگاهی بخشی به کارشناسان فنی در جهت پایش و حفاظت پیشگیرانه است.

۲. مواد و روش‌ها

۲-۱. موقعیت جغرافیایی تخت جمشید

تخت جمشید در مرکز استان فارس، ۲۰ کیلومتری شمال مرودشت و تقریباً در شصت کیلومتری شیراز قرار دارد و ارتفاع آن از سطح دریا هزار و ۷۷۰ متر است. ضلع شرقی این مجموعه کاخ‌ها بر کوه رحمت و سه طرف دیگر، در درون جلگه مرودشت قرار دارد (شکل ۱). تخت جمشید بر سکوی سنگی که ارتفاع آن بین هشت تا هجده متر بالاتر از سطح دشت مرودشت است، واقع شده است. این مجموعه میراث جهانی بر اساس تعاریف مختلف معماری از بناها و فضاهای مختلف نظیر پلکان و روبدی، دروازه ملل، خیابان سپاهیان، کاخ آپادانا، کاخ صد ستون، کاخ مرکزی یا کاخ شورا، کاخ هدیش، کاخ تچر، خزانه‌داری، دروازه ناتمام، کاخ ملکه یا موزه، کاخ دال و ... تشکیل شده است. همچنین برخی آثار تاریخی مانند نقش رستم (پنج کیلومتری شمال شرقی تخت جمشید)، نقش رجب (در سه کیلومتری شمال شرقی تخت جمشید) در کوه رحمت) و شهر استخر (در پنج کیلومتری شمال تخت جمشید) از مهم‌ترین آثار باستانی هخامنشی و سasanی هستند که در نزدیکی تخت جمشید قرار دارند [15,16].

تاریخی می‌شوند. عوامل میکروسکوپی شناسایی شده در این تحقیق، شامل قارچ‌ها، گلسنگ‌ها، جلبک‌ها و سیانوباکتری‌ها هستند.

پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، موردمطالعه قرار گرفتند. تصاویر با استفاده از MIRA2 TESCAN SEM در ولتاژ 15.00kv تصویربرداری شدند.

۳. نتایج

۳-۱. گیاهان

آسیب‌های ناشی از گیاهان آوندی مانند گیاهان گل‌دار و گیاهان غیر آوندی مانند خزه‌ها (شکل ۲) در بنایا یا اماکن باستان‌شناسی به خوبی شناخته شده هستند. میران تأثیر آن‌ها، به اشکال بیولوژیکی خاص و یا ویژگی‌های دستگاه‌های ریشه‌ای و نوع استقرار آن‌ها مرتبط است. به عبارتی دیگر، گیاهان از جمله تهدیدات جدی در موضوع حفاظت و مرمت بنای‌های تاریخی به شمار می‌آیند. زیرا، از یک سو با روش‌های فیزیکی مانند رشد ریشه‌ها و نفوذ آن‌ها به اعماق پی یا سطح آثار، آسیب‌های فیزیکی و بصری را سبب می‌شوند و از سوی دیگر زمینه را برای نفوذ آب و سایر ارگانیسم‌ها فراهم می‌آورند. گرده‌های گیاهی (شکل ۴ تصویر ۶)، نیز مواد آلی موردنیاز را برای جذب سایر عوامل بیولوژیک نظیر حشرات فراهم می‌کنند که مجموع این عوامل سبب اجتماع دوباره عوامل میکروبی دیگر ایجاد کننده فرسودگی زیستی خواهند شد. متأسفانه محوطهٔ میراث جهانی تخت جمشید، به دلیل موقعیت قرارگیری آن در فضای باز، از این گزند رشد طبیعی گیاهان در محوطهٔ و سطوح آثار سنگی در امان نیست و با مشاهدات میدانی فصلی که از این منطقهٔ تاریخی صورت گرفته است، رشد گیاهان آوندی و غیر آوندی در میان سنگ‌های تاریخی و حتی برخی شکاف دیوارها به وضوح قابل مشاهده هستند (شکل ۲ تصاویر ۱-۵).

۳-۲. جانوران

جانوران نقش مهمی را در بحث فرسودگی زیستی ایفا می‌کنند. زیرا به صورت مستقیم و غیرمستقیم، به این پدیده دامن می‌زنند. جانوران، از یک سو با لانه گزینی، نظیر لانهٔ پرنده‌گان، و عوارض ناشی از تجمع فضولات یا اجسام مرده آن‌ها (شکل ۳-پ)، سبب فرسودگی

۴-۲. کشت باکتری‌ها

جهت اثبات حضور باکتری‌های هتروتروف، از روش کشت‌های روتین باکتریایی استفاده شد. به این منظور از محیط‌های کشت باکتریایی لوریا برتانی (LB) و نوترینت آگار (NA)، استفاده شد. این محیط‌های کشت، مواد مغذی لازم را جهت رشد باکتری‌های هتروتروف در محیط آزمایشگاهی، فراهم می‌کنند. به همین علت برای مطالعهٔ حضور باکتری‌ها در نواحی بیوپیت دار سنگ این محیط کشت استفاده شد. نمونه‌ها با استفاده از فیلدوپلاتین استریل از نواحی بیوپیت دار جداسازی شدند و در محیط اسلنت لوریا برتانی و پلیت‌های نوترینت آگار، کشت داده شدند. پس از سه هفته انکوباسیون محیط‌های کشت در دمای ۲۷°C، کلونی‌های تشکیل شده بر روی محیط‌های کشت از نظر مورفولوژیکی مورد بررسی قرار گرفتند و درنهایت پس از خالص‌سازی کلونی‌ها، رنگ آمیزی گرم به منظور بررسی جمعیت میکروبی از نظر شکل و ساختار انجام شد.

۶-۲. طبقه‌بندی ارگانیسم‌های دخیل در

فرسودگی زیستی

عوامل زیستی دخیل در فرسودگی زیستی، به دو گروه ماکروارگانیسم‌ها و میکروارگانیسم‌ها طبقه‌بندی شدند. طبقه‌بندی و تقسیم گروهی این عوامل، بر اساس منابع علمی [۳,۶,۷,۱۹,۲۰] صورت گرفت. عوامل فرسودگی زیستی درشت یا ماکرو شناسایی شده در تخت جمشید، شامل گیاهان آوندی و غیر آوندی و جانورانی مانند پرندۀ‌ها، حلزون‌ها و خزندگان هستند. اصطلاح «میکروارگانیسم» طیف گسترده‌ای از اشکال زندگی از جمله باکتری‌ها، سیانوباکتری‌ها، جلبک‌ها، گلسنگ‌ها و قارچ‌ها را شامل می‌شود. همهٔ میکروارگانیسم‌های ذکر شده، ویژگی‌های اکولوژیکی متفاوتی دارند و سبب ایجاد خسارت‌های مختلف در مواد آلی و معدنی آثار

محوطه تاریخی تخت جمشید از مشکل‌سازترین جانوران می‌توان به برخی پرندگان، گروهی از مارمولک‌ها و سمورها اشاره کرد که هر یک بهنوبه خود سبب گسترش فرسودگی زیستی و تأثیر غیرمستقیم بر قسمت‌های مختلف بنا می‌شوند.

می‌شوند. از سوی دیگر، فضولات آن‌ها مواد آلی موردنیاز را برای جایگزینی سایر ارگانیسم‌های میکرو، نظیر باکتری‌ها، قارچ‌ها و گل‌سنگ‌ها فراهم می‌کنند. جانوران با تحرک و راه رفتن در میان بنایها سبب انتقال برخی از عوامل میکروبی در قسمت‌های مختلف می‌شوند. در




شکل ۲. نمایی از فرسودگی زیستی در بخش‌های مختلف تخت جمشید توسط گیاهان؛ ۱) پایه ستون مربوط به یکی از ستون‌های کاخ خزانهداری؛ ب ۲) پلکان‌های ورودی؛ ۳) گیاهان روی دیوار پلکان ورودی؛ ۴) محوطه شمالی کاخ H؛ ۵) گیاهان اطراف کاخ تجر؛ ۶) گیاهان یک‌ساله اطراف کاخ صد ستون؛ ۷) خزه‌های روی سنگ‌های محوطه کاخ آپادانا؛ ۸) خزه‌های کاخ دال؛ ۹) خزه‌های روی سنگ‌های محوطه کاخ آپادانا

Fig 2: The View of biodegradation in different parts of Persepolis by plants. 1) The base of the column in the Treasury Palace; 2) The entrance stairs; 3) The plants on the wall of the entrance stairs; 4) The northern area of the palace; H; 5) The plants around Thatcher Palace; 6) Annual plants around the palace of Hundred Columns; 7) Moss of Dal Palace; 8) Moss on the rocks of Apadana Palace.

بنابراین سلول‌های آن‌ها رنگی دیده می‌شوند. برخلاف کیموتروف‌ها، فتوتروف‌ها به مواد شیمیایی به عنوان منبع انرژی احتیاج ندارند. این‌یک مزیت متابولیک مؤثر است. زیرا رقابت با موجودات کیموتروف بر سر منابع انرژی مطرح نیست و نور خورشید در بسیاری از زیستگاه‌های میکروبی روی زمین در دسترس است [21]. از جمله فتوتروف‌های مهمی که سبب فرسودگی زیستی در سطح بنای تاریخی تخت جمشید می‌شوند، می‌توان به سیانوباکترها، جلبک‌ها و خزه‌ها اشاره کرد.

۳-۳. میکروارگانیسم‌ها

اصطلاح «میکروارگانیسم» طیف گسترده‌ای از اشکال زندگی، از جمله باکتری‌ها، سیانوباکتری‌ها، جلبک‌ها، گلسنگ‌ها و قارچ‌ها، را شامل می‌شود. همه میکروارگانیسم‌های ذکر شده، خاصیت اکولوژیکی مختلفی دارند و سبب ایجاد خسارت‌های مختلف در مواد آلی و معدنی میراث فرهنگی می‌شوند. میکروارگانیسم‌های فتوتروف حاوی رنگ‌ریزه‌هایی هستند که به آن‌ها اجازه می‌دهد تا انرژی نوری را به انرژی شیمیایی تبدیل کنند و



شکل ۳. تصاویری از عوامل زیستی در مقیاس میکروارگانیسم‌ها که در فرسودگی زیستی تخت جمشید نقش مهمی دارند: تصویر (۱) حضور مارمولک‌ها در تخت جمشید؛ ۲ و ۴-۵ و ۷) لانه‌سازی حشرات مختلف در سطح سنگ‌ها؛ (۳) حضور پرنده‌گان و لانه‌سازی و گاه‌آلاشه اجسام آن‌ها در میان سنگ‌ها؛ (۶) فعالیت‌های انسانی و عوارض ناشی از آن؛ (۸-۹) حرکت حلزون‌ها روی سنگ‌های باستانی

Fig 3: Images of macro-scale biological factors that play an important role in the biodeterioration of Persepolis: 1) The presence of lizards in Persepolis; 2, 4-5, 7) The nesting of various insects on the surface of rocks; 3) The presence of birds and their nesting activities among the rocks; 6) Human activities and their consequences; 8-9) The movement of snails on the historic rock surfaces.

دمای بالا هستند، جداسازی باکتری‌ها با رنگ‌دانه‌های مختلف در نمونه‌های مورد مطالعه امری دور از ذهن نیست. زیرا این رنگ‌دانه‌ها منجر به مقاومت باکتری‌ها در مقابل اثرات ضرر UV نور خورشید می‌شوند. تولید رنگ‌دانه‌ها توسط این گروه از باکتری‌ها امر بسیار مهم و قابل توجه در بحث میراث فرهنگی است. زیرا این امر، منجر به بروز آسیب‌های دیداری در بنا می‌شوند. نتایج حاصل از مطالعات میکروب‌وسکوبی حاکی از این بود که بیشتر گروه باکتری‌های جداسازی شده کوکسی و باسیل گرم مثبت هستند. در عین حال، برخی سویه‌های باکتری گرم منفی نیز در این مطالعه جداسازی شد. مطالعات تکمیلی نشان داد، اغلب سویه‌های باکتری جداسازی شده در این مطالعه، به جنس‌های باکتریایی میکروکوکوس، آرتربو باکتر و باسیلوس تعلق داشتند. میکروکوکها و آرتربو باکترها، باکتری‌های گرم مثبت با رنگ‌دانه‌های مختلف از جنس کارتوفیتید هستند که قدرت بسیار بالایی در مقاومت به اشعه UV دارند. باسیلوس‌ها به دلیل توانایی آن‌ها در تولید اسپور و مقاومت به شرایط محیطی سخت، به وفور از نمونه‌های مختلف محیطی جداسازی می‌شوند.

۳-۵. سیانوباكتری‌ها

سیانوباكتری‌ها در طیف گسترده‌ای از زیستگاه‌های زمینی، از جمله بنای‌های جدید یا قدیمی رشد می‌کنند. نقش سیانوباكترها در تخریب بنای‌های تاریخی، موضوع مطالعات اخیر دانشمندان فعال در زمینه میکروبیولوژی میراث فرهنگی بوده است. سیانوباكترها هم قادر هستند بیوپلیم‌های ضخیم را تشکیل دهند و هم دارای رنگ‌دانه‌های محافظه هستند. سیانوباكترهای کازمواندولیتیک با ایجاد فشار از داخل سنگ، با مکانیسم‌هایی نظیر جذب آب، گسترش توده سلولی درون سنگ و جذب کربنات کلسیم در اطراف خود، سبب تخریب سنگ‌های آهکی می‌شوند. شکاف‌هایی که درنتیجه این امر به وجود می‌آیند، سبب نفوذ گردوغبار، حشرات و قارچ‌ها به درون سنگ می‌شود که به‌نوبه خود فشار وارد بـ سنگ را

۴-۴. باکتری‌ها


میکروگانیسم‌ها نقشی مهم و کلیدی، در زیستگاه‌های مختلف زمینی دارند [22]. یو باکترها یا باکتری‌ها، ارگانیسم‌هایی با توانایی عملکردهای متابولیک بالا هستند که در گروه پروکاریوت‌ها طبقه‌بندی می‌شوند. بسیاری از شاخه‌باکتری‌ها تنها از طریق توالی‌های محیطی شناخته شده‌اند. برخی از شاخه‌ها با ویژگی‌های فنوتیپی منحصر به‌فردي مانند، مورفولوژي اسپیروکتها یا فیزیولوژي خاص سیانوباكترها، شناخته شده‌اند، اما اغلب گروه‌های عمده باکتری‌ها شامل گونه‌هایی است که اگرچه دقیقاً به یک تبار فیلوزتیکی منسوب هستند، ولی تشابهات فنوتیپی برجسته‌ای ندارند [23]. این حقیقت که میکروگانیسم‌ها در طبیعت، از لحاظ زیست‌محیطی نقش مهم و حیاتی را در بحث فرسودگی ایفا می‌کند، به خوبی شناخته شده است. این ارگانیسم‌ها جزء اصلی چرخه‌های طبیعی نظیر چرخه کربن، چرخه نیتروژن و چرخه گوگرد هستند [24]. عوامل محیطی مختلف در رشد و فعالیت میکروگانیسم‌ها تأثیر داشته‌اند که مهم‌ترین آن‌ها شامل: دسترسی به آب، اکسیژن، دمای مناسب، نور (محدود به فتوتروف‌ها) و pH است. هرچند، بسیاری از میکروگانیسم‌ها در طبیعت، خود را با شرایط سازگار کردن اما محدودیت‌های خاصی برای گونه‌های مختلف طرح است.

باکتری‌ها قادر به کلونیزه شدن در سطح آثار تاریخی هستند و می‌توانند در شرایط دشوار به فرم‌های مقاوم نظیر اسپور، تبدیل شوند و به حالت خفته در آیند، در این شرایط باکتری از لحاظ متابولیک غیرفعال است و زمانی که شرایط دوباره برای رشد آن‌ها فراهم شود، به حالت فعال درمی‌آیند و به فعالیت‌های متابولیک خود در سطح آثار تاریخی ادامه می‌دهند. تاکنون باکتری‌های فراساینده آثار تخت جمشید به صورت دقیق موردمطالعه قرار نگرفته است.

در مطالعه حاضر، انواع باکتری‌های محیطی با کلونی‌های صورتی، کرم، سفید، نارنجی و زرد با اندازه و مورفولوژی‌های متنوع جداسازی شد. با توجه به این که سطوح سنگ‌ها اغلب در معرض نور شدید خورشید و

چالش در تخت جمشید مواجه هستیم. هرگونه گلسنگ زدایی در منطقه بدون در نظر گرفتن جمعیت باکتریایی ممکن است آسیب‌های جدی را به سنگ وارد کند. زیرا با حذف گلسنگ‌های سطح سنگی، شرایط برای رشد و گسترش جمعیت سیانوباکترها و باکتری‌های اندولیتیک یا به‌اصطلاح درون سنگی، فراهم می‌شود. باکتری‌های مولد پیگمنت یا رنگدانه‌های صورتی نیز یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در تخت جمشید هستند، زیرا با حذف برخی عوامل بدون مطالعه، ممکن است به گسترش جمعیت این باکتری‌ها دامن زده شود. بنابراین، پیش از هرگونه اقدام جهت گلسنگ زدایی، مطالعه دقیق درباره این میکروارگانیسم‌ها ضروری است. در این مطالعه، تلاش‌هایی جهت کشت و بررسی میکروسکوپی این گونه‌ها انجام شده که برای تأیید گونه دقیق، مطالعات بعدی در سطح مولکولی نیاز است.

تشدید می‌کند. سیانوباکترها به علت داشتن رنگ‌ریزه‌ها، تغییرات رنگی را در سطح سنگ ایجاد می‌کنند. در تخت جمشید پس از بارش باران در بخش‌هایی از دیوارها تغییرات رنگ، به صورت سیاه شدن سطح سنگ مشاهده می‌شود که یکی از علل اصلی این پدیده، حضور سیانو باکترهای فتوسنتز کننده دارای کلروفیل است. سیانوباکترها جمعیت منحصر به‌فردی از باکتری‌ها هستند که به علت شرایط آب و هوایی و اقلیمی حاکم بر منطقه تخت جمشید به حالت VBNC تبدیل شده‌اند. این استراتژی در باکتری‌ها به حالتی گفته می‌شود که باکتری با قرار گرفتن در شرایط سخت محیطی به فرم کوکوئید یا غیرقابل کشت تبدیل می‌شود و مطالعات بر پایه کشت را برای محققان دشوار می‌کند. نمونه‌هایی از کوکوئید شدن سیانوباکترها در بنای‌های تاریخی توسط Crispim و همکاران توصیف شده است [25]. متأسفانه ما نیز با این



شکل ۴: ۱-۲) نمایی از سطوح بیرونی پیت‌های ناشی از رشد گلسنگ *Bagliettoa* (3-۵) تصاویر میکروسکوپ الکترونی (SEM) از بیوپیت‌ها؛ ۶) حضور گرددهای گیاهی در درون پیت‌ها

Fig. 4: 1-2) View of the outer surfaces of biopits from the growth of *Bagliettoa* lichen; 3-5) The Scanning Electron Microscopy (SEM) images of biopits; 6) The presence of plant pollen inside the biopits.


در میراث جهانی تخت جمشید نمونه‌هایی از قارچ‌های مرستماتیک میکروسکوپی و مخمri سیاه دیده می‌شود، که نمونه‌ای از آن‌ها در آزمایشگاه کشت داده شده و در شکل ۵ تصاویر ۶-۴ قابل مشاهده است. تحقیقات در این خصوص ادامه دارد و جنس‌ها و گونه‌های مختلفی از قارچ‌ها از روی سطوح آثار سنگی در حال جداسازی است.

۷-۳. گلسنگ‌ها

گلسنگ‌ها، در سراسر سطح خشکی جهان پراکندگی دارند، به طوری که حدود هشت درصد سطح خشکی‌ها، با

۶-۳. قارچ‌ها

قارچ‌ها موجودات هتروتروفیک یوکاریوتی هستند که با دیواره سلولی سخت خود که از ماده کیتین ساخته شده، شناخته می‌شوند. آن‌ها به فرم انروابی مستقل قارچ‌ها تعلق دارند که این فرم انروابی، حدود ۸۰۰۰ گونه شناخته شده را دربرمی‌گیرد و حدوداً یک و نیم میلیون گونه از آن‌ها ممکن است وجود داشته باشد [36]. قارچ‌ها سلسه مستقلی با تبار زایی متمایزی از سایر ارگانیسم‌های دیگر را تشکیل می‌دهند و در این خصوص بیشترین قربت تبار زایی را با جانوران دارند.



شکل ۵: تصاویر مربوط به کشت‌های انجام شده از بخش‌های مختلف میراث جهانی تخت جمشید. تصویر (۱) نمونه کشت از باکتری‌ها در محیط کشت مغذی؛ (۲) باکتری‌های موکوئیدی مولد رنگ‌دانه‌های صورتی مایل به بنفش که در شرایط میکروآئروفیل کشت داده شده‌اند؛ (۳) اسلالیه‌های میکروسکوپی تهیی شده از کشت که نشانگر کوکسی‌های گرم مثبت هستند؛ (۴) باوپیت‌ها ناشی از فعالیت قارچ‌های سیاه؛ (۵) کشت مربوط به قارچ‌های مرستماتیک یا قارچ‌های سیاه؛ (۶) تصویر میکروسکوپی نوری که نشان‌دهنده کنیدی‌های قارچی حاصل از کشت است.

Fig 5: Images related to cultivations carried out in different parts of Persepolis World Heritage. 1) Culture sample of bacteria in nutrient culture medium; 2) Mucoid bacteria producing pinkish-purple pigments cultured under microaerophilic conditions; 3) Microscopic slides prepared from imaginary culture showing gram-positive cocci. 4) Biopits Due to the activity of black fungi; 5) The culture related to meristematic fungi or black fungi; 6) Light microscope image showing fungal conidia from culture.

تخمینی آثار استفاده می‌کنند. این تخمین قدمت، با استفاده از نرخ خاص فرض شده از میزان توسعه اندازه شعاعی یک گلسنگ حلقوی رشد یافته روی آثار در طول زمان به دست می‌آید [28] از این رو می‌توان با اندازه‌گیری شعاع بزرگ‌ترین گلسنگ دایره‌ای شکل که روی یک سطح تاریخی رشد کرده، به منظور تعیین مدت‌زمانی که آن سنگ در معرض رشد گلسنگ قرار گرفته استفاده کرد. گلسنگ‌ها را می‌توان در سطوح سنگ‌های قدیمی تا حداقل ده هزار سال رؤیت کرد، ده هزار سال درواقع حداقل سن تخمینی است که این فن باستان‌سنجی با استفاده از گلسنگ‌ها برای ما فراهم می‌کند. طبق برآوردها دقیق این روش با ۱۰٪ خطأ همراه است [36].


در میراث جهانی تخت جمشید نیز رشد انواع گلسنگ‌های سطح سنگی و درون سنگی از قطر ۱ mm تا ۲۰ cm مشهود است. هر یک این گلسنگ‌ها نرخ تخریب [37] متعددی دارند و سبب تخریب و محو شدن بسیاری از نقوش شده‌اند. در این راستا، یک اطلس مصوّر گونه‌های گلسنگی به همراه نقشه‌های پراکنش گونه‌های گلسنگی تهیه شده است. این کتاب مرجع بهزودی در قالب یک کتاب مستقل از طریق پایگاه میراث جهانی تخت جمشید منتشر خواهد شد. علاوه بر این فهرست گونه‌های گلسنگی بر حسب جنس و گونه و خانواده آن‌ها نیز در یک مقاله مستقل همراه با داده‌های اکولوژیکی آن‌ها منتشر خواهد شد. بنابراین، در این مقاله، اطلاعات توصیفی گلسنگ‌های میراث جهانی تخت جمشید ارائه نمی‌شود.

در این پژوهش، حضور عوامل مختلفی از جانوران، گیاهان آوندی و غیر آوندی، قارچ‌ها، گلسنگ‌ها، ریز جلبک‌های سبز و باکتری‌های فتوستتر کننده و غیر فتوستتر کننده به صورت کلی در نقاط چهارده بخش معین شده است. ۱- پلکان ورودی؛ ۲- دروازه مل؛ ۳- خیابان سپاهیان؛ ۴- دروازه ناتمام؛ ۵- کاخ سی و دو ستون؛ ۶- کاخ صد ستون؛ ۷- خزانه‌داری؛ ۸- کاخ ملکه (حرمسرا و موزه)؛ ۹- کاخ دال؛ ۱۰- کاخ هدش، ۱۱- کاخ H، ۱۲- کاخ تچر، ۱۳- کاخ شورا مرکزی، ۱۴- آپادانا. حضور عوامل فرسودگی زیستی در سطح زمین و در جهات مختلف دیوارهای (شمالي، جنوبي، شرقى و

گلسنگ پوشیده شده‌اند [26]. شواهد موجود در سنگواره‌ها و مطالعات فیلوجنی نشان می‌دهند که قدیمی‌ترین فسیل آن‌ها به حدود ۶۰۰ میلیون سال پیش بازمی‌گردد [27]. این موجودات زنده از تعامل و هم‌زیستی یک شریک قارچی (مايكوبيونت) و یک شریک فتوستتر کننده (فتوبيونت)، که ممکن است آن شریک یک‌گونه سیانوباكتری و یا جلبک‌های سبز باشند، تشکیل یافته‌اند و در تمام گلسنگ‌ها، قارچ یک تال یا بستره گلسنگی را تشکیل می‌دهد [28]. ایجاد رابطه هم‌زیستی بین یک قارچ و حداقل یک میکروارگانیسم فتوستتر کننده، منجر به شکل‌گیری گلسنگ می‌شود [29]. ارگانیسمی که تفاوت‌های قابل توجهی با شرکای تشکیل‌دهنده‌اش دارد و همین تفاوت‌ها کمک می‌کنند تا بتوانند در محیط‌های با شرایط افراطی زندگی کنند. گلسنگ‌ها در مناطقی رشد می‌کنند که بسیاری از میکروارگانیسم‌ها قادر رشد و زندگی در آن را ندارند و این مسئله، سبب می‌شود که نقش آن‌ها در چرخه ماده و انرژی در این مناطق پررنگ گردد [30] رشد فزاینده گلسنگ، سبب فروپاشی زیستی بستر آن در سطوح سنگ‌ها می‌شود [31]. این ارگانیسم‌ها نقش مهمی در فرایند خاک‌زایی دارند [32] و نقش قابل توجهی در تغییر چهره زمین و تبدیل آن به شکل کنونی داشته‌اند [33]. واژه خاک‌زایی به فرایند تولید خاک اطلاق می‌شود که در طبیعت فرایندی کاملاً طبیعی و مفید است. اما این پدیده، در میراث فرهنگی و آثار تاریخی سنگی امری نامطلوب است و باعث تخریب آثار می‌شود و ادامه آن به خطیری جدی در حفاظت و مرمت آن‌ها، تبدیل می‌شود [34] درواقع، با توجه به مطالبی که ذکر شد، می‌توان گفت گلسنگ‌ها در فرسودگی زیستی آثار باستانی سنگی نقش انکارناپذیری دارند و نوع گلسنگ و ترکیب شیمیایی و ساختار بستر سنگی در میزان فرسایش این آثار تأثیر بسزایی دارد [8,35].

درست است که گلسنگ‌ها به تخریب کنندگان آثار باستانی شهرت دارند ولی گاهی مزایای بسیار خوبی را هم در تشخیص و تخمین سن حدودی آثار به ما می‌دهند. از اندازه شعاع و قطر رشد گلسنگ‌های مدور، می‌توان در مطالعات باستان‌سنجی استفاده کرد. در علم باستان‌سنجی از نرخ رشد گلسنگ‌ها برای تعیین قدمت حدودی و

غربی) بنایی مختلف تخت جمشید به صورت کیفی



شکل ۶: تصویرهای ۱-۶) نمایی نزدیک حضور گلشنگ‌های سطح سنگی و درون سنگی در سطوح سنگ‌های تاریخی تخت جمشید
Fig 6: Pictuers 1-6) A close-up epilithic and endolithic lichens on the surface of the historic rock surfaces of Persepolis.

عوامل دخیل در فرسودگی زیستی در رابطه با نیازهای غذایی و خصوصیات متابولیکی، واکنش‌های متفاوتی به مواد و الگوهای مختلفی از اجتماع‌پذیری نشان می‌دهند و انواع مختلفی از آسیب‌ها را به وجود می‌آورند. مکانیسم‌های مختلفی در مباحث فرسودگی زیستی بسترها سنگی مطرح می‌شوند که شامل: فرایندهای

موردنرسی قرار گرفتند. بر اساس نتایج به دست آمده از مشاهدات میدانی، مناطق بررسی شده به چهار منطقه دارای خطر نسبی خیلی زیاد، زیاد، متوسط و کم درجه‌بندی شدند.

۴. بحث

فیزیکی یا مکانیکی است که سبب چسبندگی ذرات و یا از هم گسترشی آن‌ها می‌شود [38] و فرایندهای دیگر،

جدول ۱: حضور عوامل زیستی دخیل در فرسودگی زیستی تخت جمشید بر اساس موقعیت و وضعیت کیفی مشاهده میدانی

Table1: the presence of biological agents that are involved in the biodeterioration of Persepolis world heritage site, based on the position and qualitative field observations.

ردیف	موقعیت	وضعیت	خطر نسبی تأثیر عوامل				مهمنترین عوامل زیستی دخیل در فرسودگی زیستی (قارچ‌ها، سیانوباکتری‌ها و باکتری‌ها، گلشنگ‌ها، خزه‌ها و برخی گیاهان علفی و بوته‌ای)
			زیستی	موضعی	زندگی	زیستی	
آزادنا	جنوبی	رو باز	سیانوباکتری‌ها و باکتری‌ها				
	شمالي	رو باز	گلشنگ‌ها قارچ‌ها سیانوباکتری‌ها، خزه‌ها، گیاهان				
	شرقی	رو باز	سیانوباکتری‌ها و باکتری‌ها، گلشنگ‌ها				
	غربی	رو باز	گلشنگ‌ها، سیانوباکتری‌ها و باکتری				
	سطح	رو باز	گیاهان				
	زمین	رو باز	قارچ‌ها، سیانوباکتری‌ها و باکتری‌ها				
	شمالي	رو باز	قارچ‌ها، سیانوباکتری‌ها و باکتری‌ها، گلشنگ‌ها، خزه‌ها				
	شرقی	پو.شیده	باکتری‌ها				
	غربی	رو باز	سیانوباکتری‌ها و باکتری‌ها				
	سطح	رو باز	گیاهان				
کاخ‌های پیش	جنوبی	رو باز	قارچ‌ها، سیانوباکتری‌ها و باکتری‌ها، گلشنگ‌ها، گیاهان، خزه‌ها				
	شمالي	رو باز	قارچ‌ها، سیانوباکتری‌ها و باکتری‌ها، گلشنگ‌ها، گیاه، خزه‌ها				
	شرقی	رو باز	قارچ‌ها، سیانوباکتری‌ها و باکتری‌ها، ریز جلبک‌ها، گلشنگ‌ها، خزه‌ها				
	غربی	رو باز	قارچ‌ها، سیانوباکتری‌ها و باکتری‌ها، ریز جلبک‌ها، گلشنگ‌ها				
	سطح	رو باز	گیاهان علفی				
	زمین	رو باز	قارچ‌ها، سیانوباکتری‌ها و باکتری‌ها، ریز جلبک‌ها				
	شمالي	پو.شیده	باکتری‌ها				
	شرقی	رو باز	قارچ‌ها، سیانوباکتری‌ها و باکتری‌ها، ریز جلبک‌ها، گلشنگ‌ها				
	غربی	رو باز	قارچ‌ها، سیانوباکتری‌ها و باکتری‌ها، ریز جلبک‌ها، گلشنگ‌ها				
	سطح	رو باز	گیاهان				
کاخ‌شورا	جنوبی	رو باز	قارچ‌ها، سیانوباکتری‌ها و باکتری‌ها، ریز جلبک‌ها				
	شمالي	پو.شیده	قارچ‌ها، سیانوباکتری‌ها و باکتری‌ها، ریز جلبک‌ها، گلشنگ‌ها				
	شرقی	رو باز	قارچ‌ها، سیانوباکتری‌ها و باکتری‌ها، ریز جلبک‌ها، گلشنگ‌ها				
	غربی	رو باز	قارچ‌ها، سیانوباکتری‌ها و باکتری‌ها، ریز جلبک‌ها				
	سطح	رو باز	گیاهان				
	زمین	رو باز	قارچ‌ها، سیانوباکتری‌ها و باکتری‌ها، ریز جلبک‌ها				
	شمالي	رو باز	قارچ‌ها، سیانوباکتری‌ها و باکتری‌ها، ریز جلبک‌ها، گلشنگ‌ها، خزه‌ها				
	شرقی	رو باز	قارچ‌ها، سیانوباکتری‌ها و باکتری‌ها، ریز جلبک‌ها، گلشنگ‌ها				
	غربی	رو باز	قارچ‌ها، سیانوباکتری‌ها و باکتری‌ها، ریز جلبک‌ها، گلشنگ‌ها				
	سطح	رو باز	گیاهان				
صدستون	جنوبی	رو باز	قارچ‌ها، سیانوباکتری‌ها و باکتری‌ها، ریز جلبک‌ها				
	شمالي	رو باز	قارچ‌ها، سیانوباکتری‌ها و باکتری‌ها، ریز جلبک‌ها، گلشنگ‌ها، خزه‌ها				
	شرقی	رو باز	قارچ‌ها، سیانوباکتری‌ها و باکتری‌ها، ریز جلبک‌ها، گلشنگ‌ها				
	غربی	رو باز	قارچ‌ها، سیانوباکتری‌ها و باکتری‌ها، ریز جلبک‌ها، گلشنگ‌ها				
	سطح	رو باز	گیاهان				
	زمین	رو باز	قارچ‌ها، سیانوباکتری‌ها و باکتری‌ها، ریز جلبک‌ها				
	شمالي	رو باز	قارچ‌ها، سیانوباکتری‌ها و باکتری‌ها، ریز جلبک‌ها، گلشنگ‌ها				
	شرقی	رو باز	قارچ‌ها، سیانوباکتری‌ها و باکتری‌ها، ریز جلبک‌ها، گلشنگ‌ها				
	غربی	رو باز	قارچ‌ها، سیانوباکتری‌ها و باکتری‌ها، ریز جلبک‌ها، گلشنگ‌ها				
	سطح	رو باز	گیاهان				
دنداری	جنوبی	رو باز	قارچ‌ها، سیانوباکتری‌ها و باکتری‌ها، ریز جلبک‌ها				
	شمالي	رو باز	قارچ‌ها، سیانوباکتری‌ها و باکتری‌ها، ریز جلبک‌ها، گلشنگ‌ها				
	شرقی	رو باز	قارچ‌ها، سیانوباکتری‌ها و باکتری‌ها، ریز جلبک‌ها، گلشنگ‌ها				
	غربی	رو باز	قارچ‌ها، سیانوباکتری‌ها و باکتری‌ها، ریز جلبک‌ها، گلشنگ‌ها				
	سطح	رو باز	گیاهان، عوامل انسانی				

						زمین	
	✓			قارچ‌ها، سیانوباکتری‌ها و باکتری‌ها		رو باز	جنوبی
		✓		قارچ‌ها، سیانوباکتری‌ها و باکتری‌ها، ریز جلبک‌ها		رو باز	شمالی
✓				قارچ‌ها، سیانوباکتری‌ها و باکتری‌ها، ریز جلبک‌ها		رو باز	شرقی
	✓			قارچ‌ها، سیانوباکتری‌ها و باکتری‌ها، ریز جلبک‌ها		رو باز	غربی
	✓			گیاهان		رو باز	سطح زمین

می‌توانند از مواد آلی موجود در طبیعت دریافت کنند. به این ترتیب، اتوترووف‌ها (اعم از برخی باکتری‌ها، جلبک‌ها، گلسنگ‌ها، خزه‌ها و گیاهان آوندی) می‌توانند روی بسترها غیر آلی کلونیزه شوند. در حالی که هتروترووف‌ها (اظییر تعداد زیادی از باکتری‌ها و قارچ‌ها) تنها در بسترها حاوی مواد آلی قادر به رشد و ادامه حیات هستند زیرا، می‌توانند از مواد آلی آن‌ها به عنوان منبع انرژی استفاده کنند.

۵. نتیجه‌گیری

مجموعه‌تاریخی میراث جهانی تخت جمشید یکی از ارزشمندترین بناهای سنگی موجود در جهان است که متأسفانه با گذر زمان، در معرض فرسودگی و تخریب عوامل مختلف محیطی زنده و غیرزنده قرار گرفته است. از مهم‌ترین عوامل زنده‌ای که نقوش و کتیبه‌های سنگی موجود در تخت جمشید را با خطرات فرسودگی زیستی مواجه می‌کنند، حضور و رشد گلسنگ‌ها است. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهند که بیش از بیست گونه گلسنگی تنها در روی کتیبه‌های خط میخی کاخ H رشد کرده است. ادامه این روند رشد طبیعی، موجب تحریک فرسودگی زیستی کتیبه‌ها و از بین رفتن نقوش و خطوط میخی شده‌اند.

بر اساس بررسی‌های میدانی ما در میراث جهانی تخت جمشید و همچنین مقایسه مطالعات مشابه در سایر نقاط جهان، تخمین زده می‌شود، این سطوح سنگ‌های تاریخی مجموعه، دارای تنوعی گونه‌ای در حدود پانزده گونه گیاهان آوندی، پنج گونه از گیاهان غیر آوندی (خزه‌ها) اغلب در سطح یا شکاف سنگ‌ها، بین شانزده تا بیست گونه مختلف پرندگان، سه تا پنج گونه حلوون و دو تا

شامل فرآیندهای شیمیایی است که به نوبه خود، سبب دگرگونی و ترا دیسی بسترها سنگی می‌شود. فرآیندهای فیزیکی و شیمیایی در سطوح سنگ‌ها اغلب، به صورت هم‌زمان رخ می‌دهند، هرچند ممکن است یکی بر دیگری غالب شود [39,40]. به این نکته نیز باید توجه شود که تفاوت ملموسی بین فرآیندهای غیر زیستی فرسودگی (تأثیر دما، هوازدگی، رطوبت و...) از لحاظ فیزیکی و شیمیایی وجود ندارد. مکانیسم‌های مختلفی وجود دارند که منجر به فرسودگی زیستی در سطح سنگ‌ها می‌شوند. فرآیندهای فیزیکی و مکانیکی سبب کاهش چسبندگی و افزایش گستگی کانی‌ها می‌شوند و فرآیندهای شیمیایی منجر به دگرگونی و تغییر یا تجزیه لاشه‌های زیرین می‌شوند. این فرآیندها اغلب، هم‌زمان اتفاق می‌افتد اما امکان غلبه یکی بر دیگری با توجه به عواملی چون وضعیت محیطی، نوع بستر و اجتماعات زنده، وجود دارد. عوامل فرسودگی شیمیایی و فیزیکی و زیستی را نمی‌توان به روشنی از هم تفکیک کرد. زیرا هر فرآیند فیزیکی و شیمیایی می‌تواند بر فعالیت میکرووارگانیسم‌ها تأثیرگذار باشد. جهت درک بهتر فرآیند فرسودگی زیستی باید در درجه اول به این نکته اشاره کرد که عامل بیولوژیکی از استقرار در بستر خود چه استفاده‌ای می‌کند. ۱) استفاده از بستر به عنوان یک منبع غذایی (۲) استفاده از بستر تنها به عنوان یک تکیه‌گاه جهت رشد و گسترش؛ بنابراین بحث مهم دیگری که در این زمینه مطرح می‌شود، بحث تشخیص اتوترووف‌ها از هتروترووف‌ها است. گروه اول (اتوترووف‌ها) ارگانیسم‌هایی را شامل می‌شوند که قادر هستند مواد آلی ضروری برای رشد خود را، خود تولید کنند. گروه دوم (هتروترووف‌ها) میکرووارگانیسم‌هایی هستند که مواد ضروری خود را

و قارچ‌های میکروسکوپی گلسنگ‌های درون سنگی دخیل در فرسودگی زیستی تخت جمشید نقش داشته باشند که برای شناسایی دقیق آن‌ها مطالعات متازنومیکسی نیاز است.

بر اساس آخرین اطلاعات جمع‌آوری شده توسط تیم تحقیقاتی فرسودگی زیستی میراث جهانی تخت جمشید، تعداد و نوع گونه‌های گلسنگی در تخت جمشید نسبت به سال‌های گذشته افزایش پیداکرده است. این امر بسیار نگران کننده است و نشان‌دهنده فراهم شدن شرایط مناسب از طریق عوامل مختلفی مانند تغییرات اقلیمی، تأثیر عوامل انسانی (توسعه جاده‌ها و فعالیت شرکت پتروشیمی مرودشت) برای رشد برخی گونه‌های جدید در مجموعه تخت جمشید است. لازم به توضیح است که گلسنگ‌ها علاوه بر آثار مخربی که در سطوح سنگ‌ها دارند، ممکن است برخی از گونه‌های موجود از آن‌ها، در طی توالی اکولوژیکی مشخص در سطوح سنگ‌ها استقرار کرده باشد به همین علت حفظ و کنترل رشد آن‌ها شاید در کنترل چرخه استقرار برخی گونه‌های مخرب و فرستطلبه تأثیر داشته باشند.

اما پیش از ظهور گلسنگ‌ها، اولین مرحله در بحث کلونیزاسیون روی سنگ استقرار و ظهور رنگدانه‌های ناشی از فعالیت زیستی گلسنگ‌ها و سیانو باکتری‌های مرتبط روی سنگ و ایجاد تغییر رنگ روی آن است؛ که علت اصلی آن بیشتر سیانو باکترها فتوسترنز کننده هستند. مطالعه و کنترل این میکروارگانیسم‌های فتوسترنز کننده نقش مهمی در کنترل و پیشگیری از روند روبرو به رشد تهاجم گلسنگ‌ها خواهد داشت. شناسایی میکروارگانیسم‌هایی مانند قارچ‌ها، گلسنگ‌ها، جلبک‌ها و سیانو باکترها از طریق روش‌های دی‌ان‌ای بارکدینگ نیز روش بسیار معتبری است که همواره تأثیر مستقیم این عوامل بر نقوش ظریف از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. همه این عوامل منجر به فرسایش تدریجی این نقوش و محو تدریجی می‌شوند.

سپاسگزاری

از مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی و بین‌المللی علوم و تحقیقات و فناوری برای حمایت از این تحقیق در قالب

چهار گونه خزندۀ، سی‌الی چهل گونه حشره باشند. در خصوص حضور میکروارگانیسم‌ها در سطوح تاریخی تخت جمشید برآورد تخمینی به این صورت است که حضور بیش از بیست سویه باکتریایی هتروتروف غیر فتوسترنز کننده سنگ‌زی و ده سویه فتوسترنز کننده (سیانو باکتری) سنگ‌زی، در حدود صد و سی تاکسون از قارچ‌های گلسنگی و بیست گونه از قارچ‌ها غیر گلسنگی، هجدۀ تاکسون جلبک سبز می‌تواند در فرسودگی زیستی نقش داشته باشد. نتایج به دست آمده، تخمینی است و زمینه را برای مطالعات دقیق‌تر جهت پایش عوامل دخیل در فرسودگی زیستی فراهم می‌آورد که یکی از ضروریات این پایگاه میراث جهانی است.

پیشنهادها و مسیر پیش رو

یکی از گام‌های اصلی در ادامه مطالعات عوامل زیستی دخیل در فرسودگی زیستی تخت جمشید که از سال ۱۳۸۳ شمسی شروع شده و تاکنون ادامه دارد، ایجاد پایلوتی برای تحقیقات گلسنگ‌زدایی و همجنین دفتری برای پایش مستمر حضور عوامل ماکروسکوپی شناسایی شده مانند انواع گیاهان گل‌دار بوته‌ای و علفی، گیاهان بی‌گل مانند خزه‌ها و جانورانی مانند پرنده‌های ساکن روی سنگ‌ها (کبوترها، قمری‌ها، کlag‌ها و گنجشک‌ها) و خزندگان و انواع حشرات و حمزون‌های سطح سنگ‌ها است. تهیه اطلس شناسایی هریک از عوامل دخیل در فرسودگی زیستی می‌تواند در پیشبرد ایده حفاظت پیشگیرانه کمک مؤثری داشته باشد؛ بنابراین تأسیس یک مرکز دائمی پایش فرسودگی زیستی در تخت جمشید یک ضرورت است.

از طرفی با توجه به اقلیم و آب‌وهوای حاکم بر محوطه تخت جمشید، بحث تغییر فرم رویشی درون سنگی گلسنگ‌ها و سیانو باکتری‌ها به صورت جدی بین پژوهشگران مطرح شده است. چراکه در اقلیم گرم و خشک، ارگانیسم‌ها جهت فرار از شرایط دشوار محیطی، به بخش‌های داخلی سنگ، نفوذ می‌کنند و آسیبی که به سنگ وارد می‌کنند، به مراتب بیشتر است. با توجه به مطالعات مشابه در اروپا [41] تخمین زده می‌شود که سویه‌های مختلف سیانو باکتری و باکتری‌های هتروتروف ۱۳۹۹ | سال ششم، شماره اول، بهار و تابستان ۱۴۰

میراث جهانی تخت جمشید که در طی بررسی میدانی عوامل فرسودگی زیستی در محدوده میراث جهانی از سال ۱۳۸۳-۱۳۹۹ همیشه همراه و پشتیبان تحقیقات ما بوده‌اند، تشکر و قدردانی می‌شود.

طرح «بررسی نقش قارچ‌ها و گلشنگ‌ها در فرسودگی زیستی سطوح سنگ‌های تاریخی پایگاه میراث جهانی تخت جمشید» با شناسه ۸۲۴ تشرک و قدردانی می‌شود. همچنین، از کلیه نیروهای حراست و حفاظت فیزیکی

References

- [1] Piervittori R, Salvadori O, Seaward MRD. Lichens and Monuments. In: St.Clair L, Seaward M, editors. Biodeterioration of Stone Surfaces Lichens and Biofilms as Weathering Agents of Rocks and Cultural Heritage. Dordrecht: Springer Netherlands; 2004. p. 241–82.
- [2] Pangallo D, Bučková M, Kraková L, Puškárová A, Šaková N, Grivalký T, et al. Biodeterioration of epoxy resin: A microbial survey through culture-independent and culture-dependent approaches. *Environ Microbiol*. 2015;17(2):462–79.
- [3] Ariño X, Saiz-Jimenez C. Biological diversity and cultural heritage. *Aerobiologia* (Bologna). 1996;12(1):279–82.
- [4] Ríos ADL, Cámara B, Ángeles M, Rico VJ, Galván V, Ascaso C, et al. Deteriorating effects of lichen and microbial colonization of carbonate building rocks in the Romanesque churches of Segovia (Spain). *Sci Total Environ*. 2009;407(3):1123–34.
- [5] St.Clair L, Seaward M, editors. Biodeterioration of Stone Surfaces: Lichens and Biofilms as Weathering Agents of Rocks and Cultural Heritage. Dordrecht: Springer Netherlands; 2004. 292 p.
- [6] Scheerer S, Ortega-Morales O, Gaylarde C. Microbial Deterioration of Stone Monuments—An Updated Overview. In: Laskin AI, Sariaslani S, Gadd GM, editors. Advances in Applied Microbiology. 2009. p. 97–139.
- [7] Caneva G, Nugari M, Salvadori O, editors. Plant biology for cultural heritage: biodeterioration and conservation. 1st ed. Los Angeles, California, USA: Getty Conservation Institute; 2008. 400 p.
- [8] Cutler N, Viles H. Eukaryotic Microorganisms and Stone Biodeterioration. *Geomicrobiol J*. 2010 Sep;27(6–7):630–46.
- [9] Tiano P. Biodeterioration of Stone Monuments a Worldwide Issue. Open Conf Proc J. 2016 Apr 8;7(suppl 1: M3):29–38.
- [10] Gorbushina AA. Life on the rocks. *Environ Microbiol*. 2007;9(7):1613–31.
- [11] Fernandes P. Applied microbiology and biotechnology in the conservation of stone cultural heritage materials. *Appl Microbiol Biotechnol*. 2006;73(2):291–6.
- [12] Eaton LK. A History of Architecture: Settings and Rituals Spiro Kostof. *J Soc Archit Hist*. 2006;47(1):75–6.
- [13] De Los Ríos A, Ascaso C. Contributions of in situ microscopy to the current understanding of stone biodeterioration. *Int Microbiol*. 2005;8(3):181–8.
- [14] Sterflinger K, Little B, Pinar G, Pinzari F, de los Ríos A, Gu J-D. Future directions and challenges in biodeterioration research on historic materials and cultural properties. *Int Biodeterior Biodegradation*. 2018;129:10–2.
- [15] Shahbazi AS. The authoritative guide to Persepolis. Safiran Publishing Company, Tehran; 2004.
- [16] Schmidt EF. Persepolis I: Structures, Reliefs, Inscriptions. 1st ed. Chicago, USA: The University of Chicago Press; 1953. 297 p.
- [17] Herzfeld E. Prehistoric Persia I: A Neolithic Settlement at Persepolis; Remarkable New Discoveries. 1929.
- [18] Schmidt EF. Persepolis II: Contents of the Treasury and Other Discoveries. Chicago, USA: The University of Chicago Press; 1957.
- [19] Sterflinger K. Fungi: Their role in deterioration of cultural heritage. *Fungal Biol Rev*. 2010;24(1–2):47–55.
- [20] Biswas J, Sharma K, Harris KK, Rajput Y. Biodeterioration agents: Bacterial and fungal diversity dwelling in or on the prehistoric rock-paints of Kabra-pahad ,

- India. *Iran J Microbiol.* 2013;5(3):309–14.
- [21] Bryant DA, Frigaard N-U. Prokaryotic photosynthesis and phototrophy illuminated. *Trends Microbiol.* 2006;14(11):488–96.
- [22] González JM, Sáiz-Jiménez C. Application of molecular nucleic acid-based techniques for the study of microbial communities in monuments and artworks. *Int Microbiol.* 2005;8(3):189–94.
- [23] Hugenholtz P, Goebel BM, Pace NR. Impact of culture-independent studies on the emerging phylogenetic view of bacterial diversity. Vol. 180, *Journal of Bacteriology*. 1998. p. 4765–74.
- [24] Cámará B, De los Ríos A, Urizal M, Álvarez de Buergo M, Varas MJ, Fort R, et al. Characterizing the Microbial Colonization of a Dolostone Quarry: Implications for Stone Biodeterioration and Response to Biocide Treatments. *Microp Ecol.* 2011;62(2):299–313.
- [25] Crispim CA, Gaylarde CC. Cyanobacteria and Biodeterioration of Cultural Heritage: A Review. *Microp Ecol.* 2005;49(1):1–9.
- [26] Chen J, Blume HP, Beyer L. Weathering of rocks induced by lichen colonization - A review. *Catena.* 2000;39(2):121–46.
- [27] Grube M, Cardinale M, de Castro JV, Müller H, Berg G. Species-specific structural and functional diversity of bacterial communities in lichen symbioses. *ISME J.* 2009 Sep 25;3(9):1105–15.
- [28] O'Neal MA, Legg NT, Hanson B, Morgan DJ, Rothgeb A. Lichenometric dating of rock surfaces in the northern cascade range, USA. *Geogr Ann Ser A Phys Geogr.* 2013;95(3):241–8.
- [29] Wedin M, Maier S, Fernandez-brime S, Cronholm B, Westberg M, Grube M. Microbiome change by symbiotic invasion in lichens. *Environ Microbiol.* 2016;18(5):1428–39.
- [30] Ariño X, Gomez-Bolea A, Saiz-Jimenez C. Lichens on ancient mortars. *Int Biodeterior Biodegradation.* 1997;40(2–4):217–24.
- [31] Banfield JF, Barker WW, Welch SA, Taunton A. Biological impact on mineral dissolution: Application of the lichen model to understanding mineral weathering in the rhizosphere. *Proc Natl Acad Sci.* 1999 Mar 30;96(7):3404–11.
- [32] Belnap J, Büdel B, Lange OL. Biological Soil Crusts: Characteristics and Distribution. In: Belnap J, Lange OL, editors. *Biological Soil Crusts: Structure, Function, and Management Ecological Studies (Analysis and Synthesis)*. Springer, Berlin, Heidelberg; 2001. p. 3–30.
- [33] Corenblit D, Steiger J. Vegetation as a major conductor of geomorphic changes on the Earth surface: toward evolutionary geomorphology. *Earth Surf Process Landforms.* 2009;34(6):891–6.
- [34] Cappitelli F, Sorlini C. Microorganisms Attack Synthetic Polymers in Items Representing Our Cultural Heritage. *Appl Environ Microbiol.* 2008;74(3):564–9.
- [35] Sohrabi M, Favero-Longo SE, Pérez-Ortega S, Ascaso C, Haghigat Z, Talebian MH, et al. Lichen colonization and associated deterioration processes in Pasargadae, UNESCO world heritage site, Iran. *Int Biodeterior Biodegradation.* 2017;117:171–82.
- [36] Benedict JB. A Review of Lichenometric Dating and Its Applications to Archaeology. *Am Antiq.* 2009;74(1):143–72.
- [37] Gazzano C, Favero-Longo SE, Matteucci E, Roccardi A, Piervittori R. Index of Lichen Potential Biodeteriogenic Activity (LPBA): A tentative tool to evaluate the lichen impact on stonework. *Int Biodeterior Biodegradation.* 2009;63(7):836–43.
- [38] Seaward MRD. Lichens as Agents of Biodeterioration. In: Upreti DK, Divakar PK, Shukla V, Bajpai R, editors. *Recent Advances in Lichenology*. New Delhi: Springer India; 2015. p. 189–211.
- [39] Adamo P, Violante P. Weathering of rocks and neogenesis of minerals associated with lichen activity. *Appl Clay Sci.* 2000;16(5–6):229–56.
- [40] Viles HA, Cutler NA. Global environmental change and the biology of heritage structures. *Glob Chang Biol.* 2012;18(8):2406–18.
- [41] Dyda M, Decewicz P, Romaniuk K, Wojcieszak M, Skłodowska A, Dziewit L, et al. Application of metagenomic methods for selection of an optimal growth medium for bacterial diversity analysis of microbiocenoses on historical stone surfaces. *Int Biodeterior Biodegradation.* 2018;131:2–10.

