

اطلاعات به صورت مشاهده، معاینه و مصاحبه بود.
علاوه بر اطلاعات دموگرافیک و بالینی بیمار وضعیت
دهان و دندان نیز بررسی شد.

یافته‌ها: میانگین (انحراف معیار) DMF در کل افراد $\pm 9/9$ و $11/44$ در افراد دارای دندان $\pm 2/6$. میانگین (انحراف معیار) NIDCR $34/5 \pm 25/4$ بود. $45/8\%$ بیماران بدون دندان استفاده شبانه از پروتز داشتند. $54/2\%$ از بیماران بدون دندان لقی پروتز فک پایین داشتند. $37/5\%$ از بیماران بدون دندان دارای ضایعات دنچر استomatیت در فک بالا بودند. از نظر درگیری فورکا در دندان‌های مورد نظر $41/5$ درصد درگیری فورکا در درجه یک و $26/8$ درصد فورکا در درجه دو داشتند. $51/2$ درصد افراد مشکلی از نظر درگیری فورکا و فورکا نداشتند. از لحاظ آماری بین درگیری فورکا و مدت دیالیز ارتباط معنی‌داری مشاهده نشد ($P=0.654$). از نظر جرم فقط $11/1$ درصد از افراد جرم نداشتند و $88/9$ درصد دارای جرم زیر لشه‌ای و $62/2$ درصد فقط دارای جرم بالای لنه بودند. از لحاظ دفعات مسواک زدن حدود یک سوم افراد مسواک نمی‌زنند یا گاهی اوقات مسواک می‌زنند. از نظر روش مسواک زدن نیمی از افراد روش افقی را برای مسواک زدن به کار می‌برند. ارتباط معنی‌داری بین DS در فک بالا و استفاده شبانه از پروتز یافت نشد.

نتیجه‌گیری: بیماری کلیه و دیالیز اثری در پوسیدگی دندان ندارد و باعث تشدید آن نمی‌شود که احتمالاً به دلیل خاصیت آنتی باکتریال اوره بزاق در این افراد می‌باشد. در این خصوص لزوم مطالعات بیشتر در سطح جامع و گسترشده‌تر و با توجه به رژیم‌های غذایی و دارویی ضروری به نظر می‌رسد.

کلمات کلیدی: پوسیدگی، بیماری‌های لنه، بیماران دیالیزی.

فراوانی پوسیدگی دندان و بیماری‌های لنه در بیماران دیالیزی کلینیک تخصصی دندانپزشکی و دیالیز مجتمع دارویی و درمان هلال ایران

حامد فرساد^۱، خدیجه حیدری^۲، نادر اویسی^۳، سعیرا طبیبان^۴، سید صمد آقامیری^۵، نفیسه معمار کرمانی^۶

- نویسنده مسئول: MD، معاون پژوهش مؤسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایران

Email: hfar48@yahoo.com

۲- پژوهشگر جمعیت هلال احمر

۳- کارشناس ارشد، مدیر امور پژوهشی مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال ایران

۴- پژوهشگر جمعیت هلال احمر، فوق تخصص بیماری کلیه و فشارخون

۵- MD، رئیس مؤسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایران

۶- MD متخصص دندانپزشکی - کلینیک تخصصی دندانپزشکی مجتمع دارویی و درمان هلال ایران

تاریخ پذیرش: ۹۰/۱۲/۱۵ تاریخ وصول: ۹۱/۴/۱۰

چکیده

مقدمه: با توجه به اهمیت بهداشت دهان و دندان در ارتقای سلامت بیماران دریافت کننده دیالیز و لزوم توجه بیشتر دندانپزشکان و مسئولان وزارت بهداشت در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی برای این قشر خاص، در این مطالعه فراوانی و وضعیت پوسیدگی لنه و دندان در بیماران دیالیزی مرکز هلال احمر تهرانپارس بررسی شد.

روش‌ها: این مطالعه مقطعی در سال ۱۳۸۴ در ۶۹ بیمار همودیالیزی مرکز هلال احمر تهرانپارس به روش نمونه‌گیری سرشماری انجام شد. روش جمع آوری

مقدمه

مراجعین دیالیزی به بخش دندانپزشکی نسبت به دیگر مراکز موجود در کشور بود. تمامی افرادی که در این مرکز تحت درمان با دیالیز بودند وارد این تحقیق شدند. اهداف و ضرورت‌های انجام این طرح برای بیماران مطرح و از همه بیماران رضایت‌نامه کتبی برای شرکت در مطالعه اخذ شد.

اطلاعات دموگرافیک (شامل سن، جنس و تحصیلات) و اطلاعات بالینی بیمار (شامل مدت درمان دیالیز، سابقه پیوند کلیه، بیماری‌های سیستمیک، داروهای مصرفي و علت بیماری کلیوی) را یک پرستار ثبت کرد. بررسی وضعیت دهان و دندان بیماران و تمامی معاینات با استفاده از وسایل استریل روی یونیت دندانپزشکی با نور کافی و با استفاده از پرروب پریو دونتال هوفردی و آینه دندانپزشکی انجام شد. همچنین موارد زیر بررسی و توسط دستیار ثبت گردید.

همه دندان‌ها بجز دندان عقل از لحاظ پوسیدگی دندانی (D)، فقدان دندانی (M) و پرکردگی (F) بررسی شدند و برای هر دندان یک عدد منظور گردید. دندانی که نیاز به کشیدن داشت نیز در گروه M قرار داده شد. همه اعداد با هم جمع شد و عدد بدست آمده به عنوان شاخص DMFT در نظر گرفته شد.

برای بررسی خوتویری لشه از شاخص انتیتویی ملی تحقیقات دندانپزشکی و کرانیوفاشیال استفاده شد^(۴). ارزیابی بیماری پریو دونتال توسط شاخص انتیتویی ملی تحقیقات دندانپزشکی و کرانیوفاشیال دارای سه قسمت بررسی ارزیابی تخریب پریو دونتال، ارزیابی لثه‌ای و ارزیابی جرم می‌باشد. بررسی تخریب پریو دونتال شامل ارزیابی از دست رفتان چسبندگی پریو دونتال و درگیری ناحیه فوکا می‌باشد. در ارزیابی لثه‌ای سطوح فاسیالی و میو فاسیالی دندان‌ها در دو نیمة فکی به صورت تصادفی انتخاب و یکی از دو فک

بیماری‌هایی کلیوی از لحاظ تعداد بیماران مبتلا در رده چهارم امراض بشری قرار دارند و سالیانه ۱۰ تا ۱۵ درصد بر تعداد بیماران دیالیزی افزوده می‌گردد. تظاهرات این بیماری می‌تواند در سیستم‌های قلب و عروق، گوارش، سیستم عصبی عضلانی، خون و پوست مشاهده شود. این اثرات شامل فشار خون بالا، بی‌اشتهای، التهاب گسترده سیستم گوارشی، زخم اثنی عشر و التهاب مخاط دهان می‌باشد^(۱).

در بیماران دیالیزی عفونت‌های دهانی می‌تواند منجر به سپتی سمی، اندوکاریت یا اندراتریت فیستول دیالیزی یا کاتتر پریتونئال شود. به علاوه این بیماران مستعد برخی از مشکلات دهانی- دندانی مانند بیماری پریو دونتال، باریک شدن پالپ چمبر، از دست رفتن لامینا دور، اختلالات مینای دندان‌ها، از دست دادن زودرس دندان‌ها و خشکی دهان می‌باشند. همچنین بیماری که قصد پیوند کلیه دارد مصرف داروهای اینمنو ساپرسیو ممکن است وی را مستعد انتشار عفونت از طریق دهان کند^{(۲) و (۳)}.

با توجه به اهمیت بهداشت دهان و دندان در ارتقای سلامت بیماران دیالیزی و لزوم توجه بیشتر دندانپزشکان و مسئولان در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی برای این قشر خاص، در این مطالعه فراوانی و وضعیت پوسیدگی لشه و دندان در بیماران دیالیزی مرکز هلال‌احمر تهرانپارس بررسی شد.

روش‌ها

این مطالعه توصیفی مقطعی در سال ۱۳۸۴ در ۶۹ بیمار همودیالیزی مرکز هلال‌احمر تهرانپارس به روش نمونه‌گیری سرشماری انجام شد. انتخاب این مرکز به دلیل مجاورت کلینیک دیالیز و کلینیک دندانپزشکی مرکز هلال‌احمر تهرانپارس و تعداد نسبتاً بالای

صورت عدم درگیری فورکا، درجهٔ یک در صورت وجود درگیری نسبی فورکا اما عدم امکان عبور پرروب از فورکیشن و درجهٔ دو درگیری فورکا در صورتی که امکان عبور سوند از بین ریشه‌ها و از میان درگیری در نظر گرفته می‌شد. در مورد افراد بدون دندان وجود ضایعهٔ دنچر استوماتیت در فک بالا و لقی پروتز فک پایین بررسی شد.

همچنین بیماران نحوهٔ مسوак زدن خود را بر روی مدل نشان می‌دادند و بر اساس آن در یکی از سه گروه رول، افقی و سایر طرق قرار داده می‌شدند. پس از تکمیل فرم، روش صحیح مسواك زدن به بیماران آموزش داده شد. در ارتباط با دفعات مسواك زدن بیمار و همچنین سایر روش‌های رعایت بهداشت با استفاده از نخ دندان و خلال نیز از بیماران سؤال شد. از بیماران بدون دندان در مورد استفادهٔ شبانه از پروتز سؤال شد.

آنالیز آماری با استفاده از نرم افزار SPSS 13 انجام شد. تست آماری t مستقل و ANOVA و ضریب همبستگی پیرسون و اسپرمن برای مقایسهٔ بروز روابط استفاده شد. $P < 0.05$ به عنوان سطح معنی‌داری تلقی گردید.

یافته‌ها

از ۷۸ بیمار معرفی شده از بخش دیالیز، ۶ بیمار به علت تمایل نداشتن به همکاری از مطالعهٔ خارج شدند و در نتیجهٔ ۶۹ بیمار (۲۵ زن و ۴۴ مرد) با میانگین (انحراف معیار) سنی 53.2 ± 17.1 سال در این مطالعه شرکت کردند. ۴۵ نفر (۶۵٪) دارای دندان بودند. ۱۸ نفر (۲۶٪) تحصیلات دیپلم و بالاتر از دیپلم داشتند. ۶۴ نفر (۹۲٪) از روش همودیالیز فیستول، ۴ نفر (۵٪) از روش گرافت و ۱ نفر (۱٪) از روش کاتتر پریتونال استفاده می‌کردند. مدت دیالیز، سابقهٔ بیوند،

بالا و نیز یکی از دو فک پایین برای خونریزی بررسی شدند. در صورت وجود جرم بالای لشه‌ای و زیر لشه‌ای با هم عدد ۲ و در صورت وجود جرم فوق لشه‌ای عدد یک و در صورت نداشتن جرم عدد صفر در نظر گرفته شد.

برای بررسی وضعیت سلامت لشه نیز از شاخص^۱ GI استفاده شد. در این شاخص لشهٔ نرمال عدد صفر، التهاب ملایم (تغییر مختصر در رنگ و ادم و نداشتن خونریزی هنگام پرروب) عدد یک، التهاب متوسط (قرمزی، ادم، براق شدن لشه، خونریزی به هنگام پرروب) عدد دو، التهاب شدید (قرمزی کاملاً مشخص، ادم، زخمی شدن، تمایل به خونریزی خودبه‌خودی) عدد سه تعلق می‌گیرد. سپس اعداد به دست آمدهٔ همهٔ دندان‌ها با یکدیگر جمع و بر تعداد دندان‌ها تقسیم می‌گردد. اگر عدد به دست آمده بین ۰/۱ تا ۱ باشد التهاب خفیف، اگر بین ۱/۱ تا ۲ باشد التهاب متوسط و اگر بین ۲/۱ تا ۳ باشد التهاب شدید است (۴).

^۱ در محل‌های فاسیال و مزیوفاسیال دندان‌ها در دو کوادرانت ماگزیلا و مندیبل به‌طور تصادفی انتخاب شد و با استفاده از روش محاسبهٔ غیر مستقیم رمفورد اندازه‌گیری و بر حسب میلی‌متر بیان شد. درگیری فورکا نیز در ۱۰ دندان بررسی شد که مولرهای اول و دوم ماگزیلا و مندیبل و پر مولرهای اول ماگزیلا را شامل می‌شد. این بررسی نیازمند استفاده از سوند شمارهٔ ۱۷ برای دندان‌های ماگزیلا و سوند Cowhorn شمارهٔ ۳ برای دندان‌های مندیبل بود. میزان درگیری فوکا در مزیال، فاسیال و دیستال مولرهای ماگزیلا، مزیال و دیستال پر مولرهای فاسیال و لینگوال مولرهای مندیبل بررسی شد. درجهٔ صفر در

¹ Gingival Index

² Periodontal Loss of attachment

از نظر درگیری فورکا در دندان‌های مورد نظر ۴۱٪ درگیری فورکا درجه یک و ۲۶٪ درگیری فورکا درجه دو داشتند و ۵۱٪ افراد نیز درگیری فورکا نداشتند (درجه صفر). از لحاظ آماری بین درگیری فورکا و مدت دیالیز ارتباط معنی‌داری مشاهده نشد ($P=0.654$). از نظر جرم ۱۱٪ از افراد جرم نداشتند، ۸۸٪ دارای جرم زیر لثه و جرم بالای لثه بودند. ارتباط آماری معنی‌داری بین شاخص جرم و مدت دیالیز یافت نشد ($P=0.827$). ۵ نفر (۰٪) مسوک نمی‌زدند و ۲۴ نفر (۳۶٪) روش مسوک زدن افقی را انجام می‌دادند. میزان خونریزی پس از پروب در این مطالعه ۱۰۰ درصد بود.

بحث

میانگین پوسیدگی دندانی (D) در تحقیق حاضر به نتایج طرح اداره سلامت دهان و دندان در کل کشور (D=۳/۲) نزدیک است^(۵). از نظر دندان‌های پر شده نیز این نزدیکی مشاهده می‌شود. لذا به نظر می‌رسد میزان پوسیدگی در بیماران دیالیزی به حدی که انتظار می‌رود بالاتر از میانگین پوسیدگی دندانی در کل کشور نیست^(۵). در مطالعه حاضر، میزان دندان‌های کشیده شده در گروه ۳۵-۴۴ ساله کمتر از کل کشور بود؛ در حالی که از نظر دندان‌های پرشده نیز مشابه تحقیق اداره سلامت دهان و دندان در کل کشور می‌باشد.

در مطالعه‌ای که توسط Judith و همکارانش در مورد ۱۴۷ بیمار همودیالیزی انجام شد، میزان دندان‌های پوسیده بسیار پایین گزارش شده است^(۶). همچنین شاخص DMFT به دست آمده در تحقیقی در بیماران دیالیزی در ۵ بیمارستان تهران نزدیک به تحقیق حاضر گزارش شده است^(۶). همچنین میانگین شاخص DMFT در بیماران دیالیزی اردنسی ۸/۵ گزارش شده است که از نتایج مطالعه حاضر کمتر

علت ESRD، بیماری‌های سیستمیک و داروهای مصرفی در جدول شماره ۱ ذکر شده است.

میانگین (انحراف معیار) DMFT در کل افراد $11/44 \pm 2/6$ و افراد دارای دندان $4/9 \pm 2/2$ بود. میانگین شاخص DMFT به تفکیک تحصیلات، جنس و مدت دیالیز در جدول شماره ۲ ذکر شده است. همان‌طور که در جدول شماره ۲ ملاحظه می‌شود در افراد دارای دندان، میانگین شاخص DMFT زنان بیشتر از مردان بود و همچنین از لحاظ آماری ارتباط معنی‌داری بین DMFT و میزان تحصیلات به دست آمد ($P=0.002$)، ANOVA و بین میانگین DMFT در دو جنس ($P=0.553$) و مدت زمان دیالیز ($P=0.555$) ارتباط معنی‌داری یافت نشد.

میانگین (انحراف معیار) شاخص NIDCR $34/5 \pm 25/4$ بود و از لحاظ آماری بین شاخص NIDCR در دو جنس ($P=0.504$) و مدت دیالیز ($P=0.333$) ارتباط آماری معنی‌داری مشاهده نشد. میانگین (انحراف معیار) Gingival index $1/35 \pm 0/36$ بود. ۸۲٪ بیماران دارای التهاب متوسط لثه و ۱۷٪ نیز دارای التهاب خفیف لثه بودند.

در بررسی شاخص PAL هشتاد درصد افراد attachment loss کمتر سه میلی‌متر و ۶۸٪ درصد بیشتر از ۴ میلی‌متر و ۳۱٪ بیشتر از ۷ میلی‌متر داشتند. از لحاظ آماری بین PAL و میزان تحصیلات ارتباط آماری معنی‌داری مشاهده شد ($P=0.008$). ۴۵٪ بیماران بدون دندان استفاده شبانه از پروتز را ذکر کردند. همچنین ۵۴٪ بیماران بدون لقی پروتز فک پایین و ۳۷٪ از بیماران بدون دندان نیز دارای ضایعات دنچر استوماتیت در فک بالا بودند.

منجر به ضعف سیستم ایمنی ناشی از افزایش توکسین‌ها می‌گردد، میزان هنوز قادر است به تغییرات باکتریایی پاسخ دهد (۲ و ۵ و ۸).

با توجه به وضعیت پریودنتیت و ژنژیوت بالا در این افراد و رعایت نکردن بهداشت و اینکه احتمال پیوند کلیه در این بیماران وجود دارد توصیه می‌شود علاوه بر آموزش‌های بهداشتی در دوران نسبتاً طولانی همدویالیز، بیماران بهصورت مداوم تحت درمان‌های پریودنتال و پوسیدگی‌های دندانی نیز قرار گیرند. همچنین دندانپزشکان باید مجموعه‌ای از مشکلات از قبیل دیابت، فشار خون بالا، استئو دیستروفی کلیوی، ضعف سیستم ایمنی، وجود پروتزر غیر دندانی در بدن، مصرف داروهای ضد فشار خون، ضد انعقاد و ضد پلاکت و نیز محدودیت در مصرف مایعات در رژیم غذایی را نیز در درمان بیماران دیالیزی مد نظر گیرد.

نتیجه‌گیری

بیماری کلیه و دیالیز اثری در پوسیدگی دندان ندارد و باعث تشدید آن نمی‌شود که احتمالاً به دلیل خاصیت آنتی‌باکتریال اوره بزاق در این افراد می‌باشد. در این خصوص لزوم مطالعات بیشتر در سطح جامع و گستردگر و با توجه به رژیم‌های غذایی و دارویی ضروری به نظر می‌رسد.

است و این در حالی است که سن افراد در این مطالعه کمتر از افراد مطالعه حاضر بود (۷).

بر اساس نتایج مطالعه حاضر، بیماری کلیه و دیالیز اثری در پوسیدگی دندان ندارد و باعث تشدید آن نمی‌شود که احتمالاً به دلیل خاصیت آنتی‌باکتریال اوره بزاق در این افراد می‌باشد (۲). همچنین تفاوت نتایج مطالعه حاضر با تحقیقات انجام شده در کشورهای دیگر را می‌توان به دلیل تفاوت وضعیت بهداشتی- تغذیه‌ای، بیماری‌های سیستمیک و خصوصیات دموگرافیک این گروه بیماران دانست (۸). همچنین بالا بودن شاخص DMFT در مطالعه حاضر به علت بالا بودن درصد افراد بدون دندان (۷۴/۷۸٪) در این مطالعه بود و علت افزایش میانگین DMFT در افراد دارای دندان نیز بالا بودن میزان دندان‌های کشیده شده یا از دست رفته بود.

در تحقیقی در بیماران دیالیزی ۹۹٪ بیماران ژنژیوت را گزارش کرده بودند که مشابه نتایج مطالعه حاضر است، به طوری که از نظر ایندکس خونریزی لثه همه بیماران حداقل در یک یا چند نقطه خونریزی داشتند و جرم زیر لثه‌ای در ۸۸/۹ درصد از افراد یافت شد (۲).

در مطالعه حاضر بیشتر افراد روش افقی را برای مسوک زدن بکار می‌برند که از لحاظ پریودنتال یک روش مخرب محسوب می‌گردد. همچنین میزان خونریزی پس از پروب در این مطالعه ۱۰۰ درصد بود که علت آن را می‌توان به میزان بالای داروهای مصرفی ضد انعقاد در بیماران دیالیزی مرتبط دانست (۲).

در تحقیق حاضر بین مدت دیالیز و وضعیت پریودنتال رابطه‌ای مشاهده نشد که مشابه چند تحقیق انجام شده در سایر کشورها بود. این یافته‌ها نشان می‌دهد که با وجود وضعیت اورمیک در این بیماران که

References

1. Bennett JC & Plum F (eds), *Cecil's Textbook of Medicine*, 20th ed, London, Saunders; 1996: Part X:511-50
2. Judith T, Klassen Bsc, Brenda M, Krasko, *The dental health status of dialysis patients*. *J Can Dens Assoc* 2002; 68(1):34-8
3. Atassi F, AL-Shammary RA, AL-Ghamdisi, *Gingival health among individual on hemodialysis in Saudi population*, *Saudi Dental j* 2001; 13(2):82-86
4. Newman M, Takie H, Carranza F, Carranzas Clinical Periodontology, 9thed. London, Sounders, 2000, pp: 80-85
5. National research plan of studying the dental health in the age group of 15-19 & 35-44 years old, Department of Oral Health and Center for Dental Research-School of dentistry Shahid Beheshti university, 2001-09-01
6. Sahebjamee M, Babak F, *Dental Considerations in patients with renal failure in dentistry before and after kidney transplantation*, Faculty of Dentistry of Tehran University, 3608 thesis, 1997
7. Al-wahdani A, Al-Omari MA, *Dental disease in a Jordanian population on renal dialysis*. *Quintessence int.* 2003 may; 34(5)
8. Tohidast Z, Shakouri M.R, *Dental considerations in patients with chronic renal failure*, Thesis No. 1034, Faculty of Dentistry, Tehran University of Medical Sciences

جدول شماره ۱ - خصوصیات بالینی بیماران

خصوصیات مدت دیالیز	(%) فراوانی
کمتر از ۱ سال	۹ (۱۳/۰)
۱-۳ سال	۳۱ (۴۴/۹)
بیشتر از ۳ سال	۲۹ (۴۲/۰)
سابقه پیوند ESRD علت	۱۱ (۱۵/۹)
دیابت	۲۴ (۳۴/۸)
فسار خون بالا	۳۲ (۴۶/۴)
کلیه پلی سیستیک	۷ (۱۰/۱)
مادرزادی	۱ (۱/۴)
سندروم نفروتیک	۴ (۵/۸)
ناشنخته یا سایر عامل	۱۸ (۲۲/۰)
بیماری هایی سیستمیک	
گواتر	۱ (۱/۴)
فسار خون بالا	۲۰ (۲۹/۰)
بیماری های ریوی	۴ (۵/۸)
بیماری های قلبی	۴ (۵/۸)
پاراتیروئیدیسم	۲ (۲/۹)
سایر بیماری ها	۲۲ (۳۱/۹)
داروهای مصرفی	
Rocatrol	۷ (۱۰/۰)
Heparin	۶۹ (۱۰۰/۰)
Cap caco3	۷۸ (۹۸/۷)
NSAIDS	۵ (۷/۲)
Predinsolon	۱ (۱/۴)

جدول شماره ۲ - میانگین شاخص DMFT در بیماران

خصوصیات	میانگین شاخص DMFT
زنان	۱۸/۲
مردان	۱۷/۶
زنان دارای دندان	۱۲/۶۹
مردان دارای دندان	۱۰/۷۶
بیماران سنین ۳۵-۴۴ سال	۱۱/۵۷
مدت دیالیز کمتر از ۱ سال	۱۸/۳۳
مدت دیالیز ۱-۳ سال	۱۸/۴۲
مدت دیالیز بیشتر از ۳ سال	۱۵/۸۶

The prevalence of tooth decay and gum diseases in dialysis patients in dental & dialysis clinic of Helal Complex drug therapy Crescent

Corresponding author: Hamed Farsad, MD-MPH, Research Deputy of Iran Helal Institute of Applied Science & Technology, Iran Email: hfar58@yahoo.com

Khadijeh Heidari, Researcher of Red Crescent society, Iran

Nader Oveisi, MA in Environment, Director of research affairs in Iran Helal Institute of Applied Science & Technology, Iran

Samira Tabiban, Researcher of Red Crescent society, Specialist in Nephrology and Hypertension, Iran

Seyyed Samad Aghamiri, MD, Head of Iran Helal Institute of Applied Science & Technology, Iran

Nafiseh Memar Kermani, Dental specialists, dental clinic of Helal Complex drug therapy Crescent, Iran

Received: ۱۳۹۰-۷-۷

Accepted: ۱۳۹۰-۷-۲۰

Abstract

Introduction:

Considering the importance of dental health of patients' receiving dialysis and necessity of dentists and health officials' more attention to decisions and planning for such patients, this study aims to investigate the prevalence and status of tooth decay and gum diseases in dialysis patients in Red Crescent Center of Tehranpars.

Methods:

In this cross-sectional study, a total of ۷۹ adult HD patients were evaluated in Red Crescent Center of Tehranpars by sampling in ۱۳۹۰. Data was collected through observation; interview and examination. The dental health status of patients was undertaken, in addition to their clinical and demographic characteristic.

Findings:

According to the results, the mean (SD) of DMF was $17/2 \pm 9/9$ in all cases and were $11/44 \pm 1/7$ in dentate ones; the mean of NIDCR was $24/0 \pm 20/5$; also $74/0\%$ of edentulous patients used of prosthetic devices at night; $54/0\%$ of edentulous patients had mobility prosthesis in the lower jaw; $24/0\%$ of the edentulous patients were with denture stomatitis lesions in the upper jaw. Regarding the furcation-involved teeth $21/0\%$ and $27/8\%$ of respondents had grade I and II respectively. Statistically, there was no significant correlation between furcation-involvement and duration of dialysis ($P=0,704$). Given the dental plaque, $11/1\%$ of patients had no calculus, $44/9\%$ and $72/2\%$ of participants had sub gingival calculus and supra gingival calculus respectively. About a third, brush their teeth sometimes or infrequently; and a half of the respondents brush their teeth horizontally. At the end, no significant correlation was observed between DS in upper jaw and using of prosthetic devices at night.

Conclusion:

Due to antibacterial properties of saliva urea in these patients, kidney disease and dialysis has no effect on tooth decay and will not exacerbate the disease. Therefore, it is necessary to do further studies comprehensively regarding dietary and drug regimens.

Keywords: tooth decay, gum diseases, dialysis patients