

Comparing the effectiveness of emotion-focused therapy and schema therapy on self-efficacy and its components in addicts undergoing methadone maintenance treatment: A clinical trial study

Bita Salasi¹, Mohammad Arash Ramezani², Faezeh Jahan³

1-PhD Student, Department of Psychology, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.

2- Assistant Professor, Department of Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran (Corresponding Author). E-mail: Arash98@gmail.com

3- Assistant Professor, Department of Psychology, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.

Received: 18/10/2022

Accepted: 15/03/2023

Abstract

Introduction: Addiction treatment is one of the challenges facing mental health studies, leading to failure if psychological components are not considered.

Aim: The present study aimed to compare the effectiveness of emotion-focused therapy and schema therapy on the self-efficacy of addicts undergoing methadone maintenance treatment.

Method: The research was a quasi-experimental study with a pretest-posttest control group design. The study population included all addicts undergoing methadone maintenance treatment in de-addiction clinics in district 5 of Tehran during 2021-2022, of which 3 clinics and 54 patients were purposefully selected, based on the inclusion and exclusion criteria and placed randomly in two experimental groups and one control group. The research instrument was Sherer's General Self-efficacy Scale (1982). The data were analyzed using repeated measures ANOVA and Bonferroni post hoc test through SPSS-26.

Results: The results showed that schema therapy significantly affected self-efficacy ($P<0.001$, $F(1,167, 32.687)=43.881$). Emotion-focused therapy also improved significantly self-efficacy ($P<0.001$, $F(2, 56)=29.048$). Moreover, the results from comparing the two treatment methods indicated that in the post-test stage, emotion-focused therapy was more effective in improving self-efficacy and the component "coping with obstacles" in addicts undergoing methadone maintenance treatment than schema therapy.

Conclusion: Considering the effectiveness of both treatments on self-efficacy and its components, it is suggested that therapists of addicts, especially patients treated with methadone, use these treatment methods to treat clients. Additionally, as emotion-focused therapy had a relative superiority, it can be used especially to improve coping with obstacles.

Keywords: Schema therapy (SCT), Emotion-focused therapy (EFT), Addiction treatment, Methadone maintenance treatment, Self-efficacy

How to cite this article: Salasi B, Ramezani MA, Jahan F. Comparing the effectiveness of emotion-focused therapy and schema therapy on self-efficacy and its components in addicts undergoing methadone maintenance treatment: A clinical trial study. Shenakht Journal of Psychology and Psychiatry. 2023; 10(1): 139-154. URL: <http://shenakht.muk.ac.ir/article-1-1853-en.pdf>

مقایسه اثربخشی درمان هیجانمدار و طرحواره درمانی بر خودکارآمدی و مولفه‌های آن در معتادین با درمان نگهدارنده متادون، یک مطالعه کارآزمایی بالینی

بیتا ثلاثی^۱، محمد آرش رمضانی^۲، فائزه جهان^۳

۱. دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

۲. استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران (مؤلف مسئول). ایمیل: Arash98@gmail.com

۳. استادیار، گروه روانشناسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

تاریخ پذیرش مقاله: ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

تاریخ دریافت مقاله: ۱۴۰۱/۰۷/۲۶

چکیده

مقدمه: درمان اعتیاد یکی از چالش‌های حوزه مطالعات سلامت روان است که بدون توجه به مولفه‌های روانشناسی به شکست می‌انجامد.

هدف: هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی درمان هیجانمدار و طرحواره درمانی بر خودکارآمدی معتادین با درمان نگهدارنده متادون بود.

روش: مطالعه حاضر از نوع شبه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش شامل معتادین تحت درمان نگهدارنده متادون در کلینیک‌های ترک اعتیاد منطقه ۵ تهران طی سال‌های ۱۴۰۰-۱۴۰۱ بود. که از این میان ۳ کلینیک و ۵۴ بیمار به صورت هدفمند و براساس معیارهای ورود و خروج به پژوهش انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل جایدهی شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه خودکارآمدی شر (۱۹۸۲) بود. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرنی به کمک نرم‌افزار SPSS نسخه ۲۶ تحلیل شدند.

یافته‌ها: یافته‌های این پژوهش نشان داد که طرحواره درمانی خودکارآمدی را به شکل معناداری تحت تاثیر قرار داده است ($P < 0.001$ ، $F(1/167) = 43/881$ و $F(1/687) = 32/687$). همچنین درمان هیجانمدار نیز خودکارآمدی را در سطح معناداری بهبود بخشیده است ($P < 0.001$ ، $F(2/56) = 29/48$). از سوی دیگر نتایج مقایسه این دو درمان با یکدیگر نشان داد که درمان هیجانمدار بر بهبود متغیر خودکارآمدی و مولفه «رویارویی با موانع» در معتادین با درمان نگهدارنده متادون در مرحله پس آزمون اثربخشی بالاتری نسبت به طرحواره درمانی داشته باشد.

نتیجه‌گیری: با توجه به اثربخشی هر دو درمان بر خودکارآمدی و مولفه‌های مربوط به آن، به درمانگران حوزه اعتیاد به ویژه بیماران تحت درمان با متادون پیشنهاد می‌شود از روش‌های درمانی حاضر جهت درمان مراجعین استفاده کنند و در این میان با توجه به اینکه درمان هیجانمدار برتری نسبی نشان داده است از این درمان به ویژه می‌توان برای بهبود رویارویی با موانع استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها: طرحواره درمانی، درمان هیجانمدار، درمان اعتیاد، درمان نگهدارنده با متادون، خودکارآمدی

مقدمه

صرف کنندگان نیاز ما را به استفاده از درمان‌های اثربخشی که سبب کاهش دوز مصرفی و همچنین در پایان مداخلات روانشناختی ترکی کامل متادون شود، بسیار توجیه می‌کند. طیف وسیعی از مطالعات انجام شده پیشنهاد می‌کنند که صرف مواد مخدر غیرقانونی ممکن است قابلیت‌های خودکارآمدی^۸ افراد را مختل کند (کالکاترا و همکاران، ۲۰۱۹؛ دهمی‌یر، استال و بایرت^۹، ۲۰۱۶). در مقابل می‌توان گفت که خودکارآمدی یک مولفه محافظتی است و سبب می‌شود فرد برای درمان اعتیاد انگیزه‌مند شود در نتیجه در این زمینه یک مولفه محوری است (محترار محمد، صالح حسن و محمود عبدالمنعم، ۲۰۲۲).

مفهوم خودکارآمدی توسط آلفرد بندورا^{۱۰} بیان شده است، خودکارآمدی با اعتقاد و باور مسلم فرد از توانمندی برای انجام دادن عملی خاص تعريف می‌شود (بشر پور و احمدی، ۲۰۲۰؛ خوشوقت، نادری، صفرزاده و علیزاده، ۲۰۲۱). برخی مطالعات نیز معتقدند که خودکارآمدی ارتباط نزدیکی با سلامت جسمی و روانی (شورارتز^{۱۱}، ۲۰۱۴)، عملکرد تحصیلی (حیات، شاطری، امینی و شکرپور، ۲۰۲۰) و مهارت‌های شغلی دارد (سیدی، گارانتی و ساداکا^{۱۲}، ۲۰۲۲). در پژوهشی محققان به بررسی ارتباط بین خودکنترلی و خودکارآمدی با اختلال صرف مواد پرداخته و نتایج خبر از ارتباط قوی و معنادار بین خودکارآمدی بالا و کاهش میزان تخریب در اختلال صرف مواد دارد (یانگک، ژو، سائو، ژای و ان^{۱۳}، ۲۰۱۹). خودکارآمدی نتایج درمان‌های دارویی را بهبود

صرف مواد مخدر در سال‌های اخیر یکی از جدی‌ترین معضلات بشری است، به نحوی که از آن به عنوان پدیده‌ای منجر به تحلیل پایه‌های بنیادی جوامع بشری یاد می‌کنند. اختلالات صرف مواد^۱ مجموعه‌ای از علائم شناختی، رفتاری و فیزیولوژیکی است که نشان‌دهنده تداوم صرف ماده از سوی فرد به رغم مشکلات چشمگیر مرتبط با ماده است (روهر^۲، ۲۰۱۳). بیشتر از ۶۸٪ از مرگ‌ومیر مرتبط با مواد مخدر شامل مواد افیونی بوده است که افزایش قابل توجهی از مرگ‌ومیر در حدود ۴۰۰۰۰۰ هزار نفر بر اثر استفاده بیش از اندازه از مواد غیرقانونی بدون نسخه را شامل شده است (سی‌سنه^۳، ۲۰۱۹). شواهد آماری ثبت شده در ایران خبر از وجود ۱۲۰۰۰۰۰ نفر معتاد دائمی و ۸۰۰ هزار نفر افراد صرف کننده تفتنی می‌دهد که سالانه ۱۷۳۰۰۰۰۰ میلیون تومان سرمایه ملی را از کشور خارج می‌کند (آلاؤ^۴، محمد، کاظمی تبار، برومبرگ^۵، کارسیا^۶ و همکاران، ۲۰۲۲). درمان‌های نگهدارنده با داروهای آگونیست یکی از شایع‌ترین درمان‌ها برای بیماران معتاد با رفتارهای پرخطر است (سیدفاطمی، پیروی و جلالی، ۲۰۱۴). سازمان بهداشت جهانی نزدیک به یک دهه است که متادون را به عنوان یک داروی ضروری شناخته است (کالکاترا، باچ، چادی، چادی، کیمل و همکاران^۷، ۲۰۱۹).

علیرغم فواید بسیار گفته شده، عوارض ناشی از صرف طولانی مدت و مشکلات هم‌زمان با بیماری‌های زمینه‌ای

⁸- Self-efficacy

⁹- Demeyer, Staal & Beyaert

¹⁰-Bandura

¹¹- Schwarzer

¹²- Saidy, Garanti & Sadaka

¹³- Yang, Zhou, Cao, Xia & An

¹- Substance Use Disorders (SUD)

²- Roehr

³- Csete

⁴- Alawa

⁵- Bromberg

⁶- Garcia

⁷- Calcaterra, Bach, Chadi, Chadi, Kimmel & et al

پژوهش‌های متفاوت اثربخشی درمان هیجان‌مدار بر خود انتقادی و علائم بالینی قابل توجه افسردگی و اضطراب (استیگلر، مولد و چنس^۷، ۲۰۱۸)، زنان مبتلا به اختلال پرخوری^۸ (گیلستتی، استرودل و کینگ^۹، ۲۰۱۸) ناراضایی از تصویر بدنی در افرادی با علائم اختلالات خوردن (رضایی، محمدخانی و جعفری روشن، ۲۰۲۱)، کاهش خود انتقادی و افزایش شفقت به خود (دالگلیش^{۱۰}، ۲۰۱۳)، مشکلات در تنظیم هیجان و سبک زندگی ارتقای سلامت زنان چاق (یعقوبی، بیاضی، بابایی و اسدی، ۲۰۲۰) به اثبات رسیده است. همچنین نتایج تحقیق گولدمن و گرینبرگ^{۱۱} (۲۰۱۵) حاکی از آن بود که درمان هیجان‌مدار را می‌توان به طور موفقیت‌آمیزی برای درمان اختلالات شخصیت که در بیماری اعتیاد موج می‌زند، استفاده کرد اما بایستی توجه و حضور کامل درمانگران به ظرفیت‌های هیجانی مراجعین برای تنظیم، تأمل یا ذهنی کردن هیجاناتشان لحاظ گردد و در واقع تکنیک‌های درمان متمرکز بر هیجان می‌تواند به سازماندهی هیجان‌های افراد مبتلا به اختلال شخصیت کمک زیادی کند.

درمان دیگر مورد توجه در این پیوستار، طرحواره درمانی^{۱۲} است. یانگ با تلفیق مداخلات روانشناختی، تجربی و الگو شکنی رفتاری جهت درمان وسیعی از اختلالات روانشناختی، طرحواره درمانی را ابداع کرد. طرحواره درمانی مدلی فراتشخصی است و کاربرد آن برای اختلالات شخصیت اجتنابی، مرزی، خودشیفته، اضطراب اجتماعی، اختلالات خوردن، اختلال استرس

می‌بخشد (فرید^۱ و همکاران، ۲۰۱۳؛ جونز، جک، کیربی، کیربی، ویلسون و مورفی^۲، ۲۰۲۱). از آنجاکه بیشتر مطالعات انجام شده در زمینه خودکارآمدی در جامعه دانشجویان و گروه‌های دیگر انجام شده است (معنوی پور و سعیدیان، ۲۰۱۶؛ این‌گار و استین‌هرت^۳، ۲۰۱۷)؛ و تعداد کمی با بیماران مبتلا به اختلال مصرف مواد، به‌ویژه معتادین با درمان نگهدارنده متادون سروکار داشتند، به نظر می‌رسد ارزش بالقوه‌ای در ارزیابی ارتباط بین خودکارآمدی و اختلال مصرف در افراد با درمان نگهدارنده متادون وجود دارد.

با توجه به مطالبی که گفته شد، به نظر می‌رسد عوامل روانشناختی بسیاری در میل به مصرف مواد و همچنین بازگشت پس از ترک، تأثیرگذار هستند؛ بنابراین مداخلاتی که به وجود روانشناختی فرد پردازند در چندین دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است. از جمله این درمان‌ها، درمان هیجان‌مدار و طرحواره درمانی است. درمان هیجان‌مدار^۴ درمانی انسان‌گرا و تجربی است، در این درمان تمرکز درمانگر نه تنها به آگاهی درآوردن محتواهای ذهنی است که از جانب مراجع مورد انکار یا تحریف قرار گرفته است، بلکه ایجاد معنی تازه متأثر از تجربه بدنی مراجع را نیز در نظر می‌گیرد (گرینبرگ^۵، ۲۰۱۴).

درمان هیجان‌مدار با هدف کمک به مراجعت برای آگاهی از هیجاناتشان و استفاده مفید از هیجان‌هایشان طراحی شده است. هیجانات وضعیت اساسی پردازش در عمل را تعیین می‌کند (الیوت و شاهار^۶، ۲۰۱۷). در

⁷- Stiegler, Molde & Schanche

⁸- Binge-eating disorder

⁹- Glisenti, Strodl & King

¹⁰- Dalgleish

¹¹- Goldman & Greenberg

¹²- Schema Therapy

¹- Fareed

²- Jones, Jack, Kirby, Wilson & Murphy

³- Ein-Gar & Steinhart

⁴- Emotional Focused Therapy (EFT)

⁵- Greenberg

⁶- Elliott & Shahar

بوده است، با این وجود پیشینه پژوهشی مرتبط با افراد تحت درمان نگهدارنده با متادون در درمان هیجان‌مدار یافت نشد؛ به علاوه در خصوص بررسی مقایسه‌ای دو روش طرحواره درمانی و درمان هیجان‌مدار در گروه مذکور خلاً پژوهشی احساس می‌شود که این امر لزوم پژوهش و بررسی بر روی مقایسه اثربخشی این مداخلات را مورد تائید قرار می‌دهد. نتایج این مداخلات می‌تواند به درمانگران کمک کند تا روش‌های مؤثرتری را برای درمان انتخاب کنند؛ بنابراین پژوهش حاضر در نظر دارد تا به این پرسش پاسخ دهد که آیا از نظر اثربخشی بین درمان هیجان‌مدار و طرحواره درمانی بر بهبود خودکارآمدی و مولفه‌های آن در معتادین با درمان نگهدارنده متادون تفاوت معناداری وجود دارد؟

روش

پژوهش حاضر به لحاظ رویکرد جزء تحقیقات آینده‌نگر، به لحاظ هدف تحقیق در زمرة تحقیقات کاربردی و به لحاظ روش تحقیق شبه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با دو گروه آزمایش (آزمایش ۱ = درمان هیجان‌مدار، آزمایش ۲ = طرحواره درمانی)، یک گروه گواه و پیگیری سه‌ماهه بود. جامعه پژوهش شامل تمامی کلینیک‌های ترک اعتیاد منطقه ۵ تهران در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰ بود، که به روش تصادفی خوش‌ای چندمرحله‌ای بطور تصادفی ۱۰ کلینیک و در نهایت ۳ کلینیک انتخاب شدند. شرکت کنندگان پژوهش از این کلینیک‌ها انتخاب و بطور تصادفی در گروه‌های آزمایش و کنترل گمارده شدند. حجم استفاده شده برای نمونه‌ها با توجه به روش تحقیق آزمایشی در هر گروه ۱۵ نفر و در کل ۴۵

پس از سانجه و اختلال مصرف مواد مورد ارزیابی قرار گرفته است و اثربخشی آن تائید شده است (یانگ^۱، ۱۹۹۹). یانگ^۱ معتقد است، طرحواره‌های ناسازگار اولیه از مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری مشکلات شخصیتی و اختلالات روانی می‌باشند که در نتیجه تجارت دوران کودکی شکل می‌گیرند (هاواک و پروونچر^۲، ۲۰۱۱). شواهدی دال بر اثربخشی طرحواره درمانی در افرادی با اختلالات شخصیت و رفتارهای پیچیده بسیار گسترده است (ون ویجک هربرینک و آرنتز، برویز، رولوفس و برنستین^۳، ۲۰۲۱). طرحواره درمانی در اختلالات مختلفی از جمله افسردگی، اضطراب، اختلال شخصیت خودشیفته، اختلال شخصیت مرزی، اختلال شخصیت وسوسی-اجباری و در ناسازگاری بین زوجین، باعث بهبودی بیماران شده است (سمپتگوی، کارمن، آرنتز و بکر^۴، ۲۰۱۳؛ دیکوت و آرنتز^۵، ۲۰۱۴؛ هوپود، پینکوز و ورایت^۶، ۲۰۱۹). در مطالعه‌ای دیگر روشن شد که شواهدی مرتبط با باورهای افراد مصرف کننده الكل و دیگر مواد وجود دارد و آن‌ها از طرحواره‌های ناسازگار اولیه رنج می‌برند و به این نتیجه رسیدند که طرحواره درمانی به کاهش طرحواره‌های ناسازگار اولیه کمک می‌کند (شوری، استوارت و اندرسون^۷، ۲۰۱۴). همچنین پژوهش ثلاثی و شوقي (۱۴۰۱) با بررسی بیماران با درمان نگهدارنده متادون نشان داد که طرحواره‌های ناسازگار اولیه با شدت اعتیاد رابطه دارند.

با توجه به پیشینه پژوهشی، هر دو درمان بر بسیاری از مشکلات روانشناختی در گروه‌های مختلف تأثیرگذار

¹- Young

²- Hawke & Provencher

³- Van-Wijk-Herbrink, Arntz, Broers, Roelofs & Bernstein

⁴- Sempertegui, Karreman, Arntz & Bekker

⁵- Dickhaut & Arntz

⁶- Hopwood, Pincus & Wright

⁷- Shorey, Stuart & Anderson

داشته و هیچگونه ماده دیگری مصرف نکرده باشند، دریافت تشخیص تنها مصرف درمان نگهدارنده با متادون توسط پزشک کلینیکی، تمایل آزادانه به شرکت در جلسات درمانی، سطح تحصیلات حداقل اول متوسطه، حداقل سن ۱۸ و حداکثر ۵۴ سال بود. ملاک‌های خروج نیز شامل: ابتلاء به اختلال‌های دیگر (نظیر اسکیزوفرنی، دوقطبی، اختلال وسوساً)، مصرف الكل، مصرف مواد دیگر، مصرف داروهای ضد افسردگی، انصراف از شرکت در جلسات درمانی و همچنین عدم ابتلاء به بیماری‌های جسمی زمینه‌ای مانند بیماران قندی، بیماران قلبی و سلطانی و کبدی و بیمارانی که هم‌زمان داروهایی که با مصرف متادون خطر اور دوز رو بالا می‌بردند، بود. افراد گروه‌های آزمایش و کنترل در مرحله پیش‌آزمون پرسشنامه خودکارآمدی را تکمیل و داده‌های بدست آمده ثبت شد. سپس روی گروه آزمایشی اول به مدت ۱۲ جلسه ۹۰ دقیقه‌ای (هفت‌های یکبار) براساس پروتکل طرحواره درمانی یانگ، کلوسکو و ویشاو^۱ (۲۰۰۳) بسته آموزشی طرحواره درمانی، و روی گروه آزمایشی دوم ۱۲ جلسه ۹۰ دقیقه‌ای (هفت‌های یکبار) براساس پروتکل درمان هیجان‌مدار گرینبرگ (۲۰۰۴) بسته آموزشی درمان هیجان‌مدار اجرا و گروه کنترل هیچگونه درمان روانشناختی را دریافت نکرد. پس از خاتمه جلسات هفتگی، در مرحله پس‌آزمون مجدداً گروه‌های آزمایش و کنترل پرسشنامه خودکارآمدی را تکمیل و داده‌های بدست آمده ثبت شد. بار دیگر در پایان دوره ۹۰ روزه، در مرحله پیگیری افراد شرکت‌کننده در هر ۳ گروه توسط پرسشنامه خودکارآمدی ارزیابی و داده‌های بدست آمده ثبت شد. شایان ذکر است ارزیابی توسط همکاری

نفر انتخاب شدند. براساس نرم‌افزار جی‌پاور^۲ با روش آنالیز واریانس و با در نظر گرفتن مقدار اندازه اثر متوسط ۰/۵ (کوهن، ۱۹۹۲)، سطح احتمال خطای نوع اول ۵ درصد و سطح احتمال خطای نوع دوم ۲۰ درصد، حجم نمونه برابر ۴۵ نفر بدست آمد که در هر گروه ۱۵ نفر توزیع شدند. با در نظر گرفتن ریزش ۲۰ درصد حجم نمونه در هر گروه ۱۸ نفر برآورد شد. از همین رو نمونه مورد مطالعه شامل ۵۴ نفر از مراجعین که درمان نگهدارنده با متادون گرفته و در بازه زمانی اجرای پژوهش به کلینیک‌های ترک اعتیاد منطقه ۵ تهران مراجعه کرده بودند، به روش نمونه‌گیری خوشای چندمرحله‌ای، ابتدا از لیست کل کلینیک‌های ترک اعتیاد منطقه ۵ تهران، به‌طور تصادفی ۱۰ کلینیک و سپس ۳ کلینیک به‌طور تصادفی، انتخاب شدند (کلینیک‌های آینده بهتر، پرديس تهران و سفیر) و پس از همتاسازی از نظر سن، تحصیلات و جنسیت، به صورت تصادفی ساده در سه گروه طرحواره درمانی، درمان هیجان‌مدار و گروه گواه گمارده شدند. پس از احتساب ریزش و حذف داده‌های پرت، نهایتاً ۱۸ نفر برای گروه آزمایش اول ۱۸ نفر برای گروه آزمایش دوم و ۱۸ نفر برای گروه کنترل گمارش تصادفی شدند. در طول فرآیند درمان ریزش نمونه‌ها درنهایت باعث شد که در هر گروه ۱۵ نفر تا پایان درمان باقی بمانند.

ملأک‌های ورود به پژوهش عبارت بودند از افرادی که مصرف اصلی آن‌ها مواد: هروئین، تریاک، شیره و کراک به مدت ۵ تا ۱۰ سال باشد و فقط شیوه مصرف آن‌ها تدخینی باشد، افراد حاضر در پژوهش همگی بایستی به مدت یکسال بر روی درمان نگهدارنده با متادون قرار

²- Yang, Klosko & Weishaar

¹- GPOWER

به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در بخش اول ویژگی های جمعیت شناختی با استفاده از روش های آمار توصیفی، و در بخش دوم برای استنباط از داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر استفاده شد؛ و محاسبات آماری با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۲۶ صورت گرفت. در جدول ۱ خلاصه جلسات جلسات طرحواره درمانی و در جدول ۲ خلاصه جلسات درمان هیجان مدار ارائه شده است.

انجام شد که در جریان پژوهش نبود و اطلاعی از گروه های آزمایش و کنترل نداشت. همچنین با همکار پژوهشگر درباره نحوه و شیوه اجرا هماهنگی های لازم انجام و اگر آموزشی در مورد اجرای ابزارهای مورد نظر نیاز داشت به ایشان ارائه شد. جهت رعایت ملاحظات اخلاقی در پژوهش، داوطلبانه و اختیاری بودن شرکت افراد در پژوهش، تشریح حقوق و وظایف طرفین، محترمانه نگه داشتن اطلاعات بدست آمده در طی اجرای پژوهش و خروج آزادانه از پژوهش مدنظر قرار گرفت.

جدول ۱ خلاصه جلسات طرحواره درمانی (یانگ، کلسو و ویشار، ۲۰۰۳)

جلسه	محتوای جلسه
اول	بیان اهداف پژوهش، مروری بر ساختار جلسات، آموزش مفهوم طرحواره، تعریف مختصر طرحواره درمانی، بیان ارتباط بین طرحواره درمانی با تنظیم هیجانی و سوء مصرف مواد مخدر، برقراری رابطه با مراجعین و فراهم سازی زمینه اعتماد و تأکید بر رازداری، پاسخگویی به سوالات و شباهت آزمودنی ها، تکمیل پیش آزمون آموزش نیازهای هیجانی اساسی اولیه، معرفی طرحواره های ناسازگار و حوزه های مربوط به هر کدام، توضیح ریشه های تحولی طرحواره و آموزش پیرامون عملکرد طرحواره ها
دوم	توضیح و آموزش سبک های مقابله ای، توضیح و آموزش انواع ذهنیت های طرحواره ای، ایجاد آمادگی در افراد جهت سنجش و تغییر طرحواره ها
سوم	ستجش هر کدام از طرحواره های فرد و دادن بازخورد، بررسی پرسشنامه ها و آشنا کردن آنها با طرحواره هایشان و تأثیر هر کدام بر زندگی افراد
چهارم	معرفی راهبردهای شناختی، هیجانی و الگو شکنی رفتاری، ایجاد انگیزه جهت تغییر طرحواره ها و آمادگی برای تغییر طرحواره ها، کمک به بیمار در تعجبه کردن هیجان های مرتبط با طرحواره، بررسی تکالیف خانگی
پنجم	تعریف جدید از شواهد تائید کننده طرحواره، ارزیابی مزايا و معایب طرحواره ها، ارزیابی مزايا و معایب سبک های مقابله ای، تمرین برقراری گفتگو بین جنبه سالم و جنبه طرحواره
ششم	معرفی مجدد راهبردهای تجربی و ارائه منطق استفاده از راهبردهای تجربی، آموزش روش تصویر سازی ذهنی و اجرای آن در جلسه، نوشن نامه به والدین و توضیح منطق استفاده از این تکنیک، ارائه تکلیف خانگی با موضوع نوشن نامه به والدین
هفتم	توضیح مجدد و آموزش سبک های مقابله ای و تأثیر آنها در تداوم طرحواره ها، تعین رفتارهای خاص فرد به عنوان آماج احتمالی تغییر، اولویت بندی رفتارها جهت الگو شکنی رفتاری
هشتم	ایجاد انگیزه جهت تغییر رفتارهای تداوم بخش طرحواره، آموزش تمرین رفتارهای سالم از طریق تکنیک تصویر سازی ذهنی، بررسی و آموزش غلبه بر موانع تغییر رفتار
نهم	برقراری گفتگو بین جنبه طرحواره و جنبه سالم، برقراری گفتگوی خیالی با والدین از طریق تکنیک صندلی خالی، بررسی روش های مؤثر در مدیریت هیجان ها و تکانه ها، آموزش شیوه درست ابراز خشم
دهم	مرور تمرین ها و تکالیف جلسه قبل در زمینه تغییر الگوهای رفتاری ناکارآمد، بررسی روش های مؤثر در ناکامی مرتبط با طرحواره ها و تلاش برای ایجاد سبک مقابله ای سالم برای به حداقل رساندن نقش طرحواره های ناسازگار اولیه و ذهنیت های
یازدهم	

طرحواره‌ای

دوازدهم

تشکر از شرکت و همکاری افراد در پژوهش

جدول ۲ خلاصه جلسات درمان هیجان مدار (گرینبرگ، ۲۰۰۴)

جلسه	محتوای جلسه
اول	برقراری اتحاد و رابطه درمانی از طریق همدلی پیشرفت و فنون حضور خود بودن، معارفه، درک، اکشاف، ردگیری، اعتباربخشی و همدلی آینه‌وار. شرح ساختار و اهداف جلسات، ایجاد انگیزه مشارکت مراجع
دوم	اکشاف مشکل مراجع و بررسی روایت و مشاهده سبک پردازش هیجانی او از طریق گوش دادن به مشکل کنونی و شناسایی تجربه هیجانی در دنک و بر جسته مراجع
سوم	همراهی، مشاهده و کشف طرح‌های پردازش هیجانی مراجع و کوچینگ هیجانی از طریق مراحل شناسایی، آگاهی، پذیرش، تحمل و تنظیم هیجان
چهارم	کشف هیجان اصلی مراجع از طریق بازنمایی تجربه‌ای تروماهای مراجع مرتبط با دلیستگی یا هویت. کار با آسیب پذیری‌ها و کار با مراجعین شکننده
پنجم	کشف و شناسایی هیجانات اولیه، ثانویه و یا ابزاری از طریق کار بر روی نشانگرهای خرد
ششم	ادامه شناسایی، بازنمایی و تنظیم هیجانات اصلی زیربنایی، سازگار/ناسازگار با کمک تکنیک‌های اکشافی و صندلی
هفتم	شناسایی و کار بر روی وقتهای یا انسدادهای دسترسی به هیجانات اولیه و ثانویه و تجربه‌ای
هشتم	ردگیری و شناسایی موضوعات و تصاویر ایزه‌ای از مشکل کنونی و مرتبط کردن آن با تصاویر خود، پدر، مادر یا سایر ایزه‌های احتمالی
نهم	ادامه شناسایی و کار بر روی نشانگرهای مشخص شده و کار با تصاویر باقیمانده از طریق استفاده از هنرهای بیانگر مثل کار با بدن، کار با زبان، حرکت و خودتسکینی
دهم	کوچینگ مراجع در حین بازنمایی ایزه‌ای و کمک به رساندن او به بینش تجربه‌ای
یازدهم	همراهی مستمر با مراجع برای کمک به ارزیابی اینکه چگونه معانی جدید باعث استحکام خود جدید در او می‌شود
دوازدهم	تبیت خود جدید و تعیین به رویدادهای آینده. تبیین معنای جدید، تشخیص راه حل‌های جدید برای حل مشکلات قدیمی، مرور کلی و اخذ بازخورد از مراجع نسبت به مباحث دوره

مقاآمت آن‌ها در رویارویی با مواعظ می‌ستجد. شرر و همکاران (۱۹۸۲)، ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه را ۰/۸۲ گزارش نمودند. روش نمره‌گذاری پرسشنامه به این صورت است که هر سؤال براساس مقیاس ۵ درجه‌ای لیکرت از $1=$ کاملاً مخالفم تا $5=$ کاملاً موافقم) تنظیم می‌شود؛ اما سؤالات $1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15$ به صورت معکوس نمره‌گذاری می‌شوند. این مقیاس توسط اصغر نژاد، قطب‌الدینی، ولی‌الله و خدا پناهی (۱۳۸۵) در ایران اعتباریابی شده است؛ و پایایی آن از طریق آلفای

ابزار مقیاس خودکارآمدی عمومی^۱ (GSES): این مقیاس توسط شرر^۲ و همکاران در سال ۱۹۸۲ ساخته شده که شامل ۱۷ ماده است. این مقیاس برای اندازه‌گیری خودکارآمدی که اختصاص به موفقیت خاصی از رفاقت نداشته باشد طراحی شده است. این مقیاس انتظارات خودکارآمدی آزمودنی‌ها را در سه سطح میل به آغازگری رفتار، میل به تلاش برای تکمیل رفتار و

¹- General Self-Efficacy Scale
²- Sherer

نمونه‌های مورد مطالعه از نظر سطح تحصیلات سیکل: ۴ نفر در گروه طرحواره درمانی، ۶ نفر در گروه درمان هیجان‌دار و ۸ نفر در گروه گواه؛ از نظر جنسیت مرد: ۸ نفر در گروه طرحواره درمانی، ۹ نفر در گروه درمان هیجان‌دار و ۸ نفر در گروه گواه؛ و از نظر وضعیت تأهل: ۹ نفر در گروه طرحواره درمانی، ۷ نفر در گروه درمان هیجان‌دار و ۶ نفر در گروه گواه متاهل بودند.

میانگین و انحراف معیار نمره خودکارآمدی در سه گروه؛ طرحواره درمانی گروهی، درمان هیجان‌دار و کنترل در متغیر خودکارآمدی در سه مرحله پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری در جدول ۳ آمده است.

کرونباخ ۰/۸۳ گزارش شده است. در پژوهش حاضر نیز جهت سنجش پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار این ضریب برای نمره خودکارآمدی و مؤلفه‌های میل به آغازگری رفار، میل به تلاش برای تکمیل رفار و مقاومت آنها در رویارویی با موانع به ترتیب ۰/۷۹، ۰/۸۴، ۰/۸۳ و ۰/۸۴ بدست آمد.

یافته‌ها

طبق یافته‌های جمعیت‌شناختی پژوهش میانگین سنی معتادین با درمان نگهدارنده متادون گروه طرحواره درمانی $۳۹/۲۰ \pm ۱۰/۰۱$ سال، گروه درمان هیجان‌دار $۳۹/۷۳ \pm ۸/۱۳$ سال و گواه $۳۷/۸۶ \pm ۱۰/۲۵$ سال بود. بیشتر

جدول ۳ شاخص‌های توصیفی متغیر خودکارآمدی و مؤلفه‌های آن در سه گروه پژوهش در سه مرحله زمانی

متغیر	مرحله	درمان هیجان‌دار				طرحواره درمانی				گواه			
		میانگین	انحراف معیار	میانگین	انحراف معیار	میانگین	انحراف معیار	میانگین	انحراف معیار	میانگین	انحراف معیار	میانگین	انحراف معیار
خودکارآمدی	پیش‌آزمون	۵۹/۴۶	۹/۱۴	۵۲/۸۶	۱۱/۹۹	۵۲/۷۳	۱۰/۲۰	۱۱/۳۵	۴/۷۰	۷۳/۷۲	۶/۱۰	۷۹/۱۲	۵۳/۵۳
	پس‌آزمون	۸۰/۱۲	۶/۴۹	۶۸/۵۹	۹/۷۸	۵۳	۱۱/۶۸	۲۳/۲۶	۶/۳۵	۲۳/۷۳	۵/۱۲	۲۷/۱۳	۲۳/۲۶
	پیگیری	۲۷/۱۳	۵/۱۲	۳/۳۵	۲/۱۲	۲۲/۹۲	۶/۳۸	۲۲/۹۲	۵/۳۱	۳/۲۴	۳/۳۵	۳۹/۱۳	۲۲/۹۲
	پیش‌آزمون	۲۰/۰۳	۲/۴۷	۱۸/۶۶	۱۸/۱۳	۱۸/۶۶	۲/۴۴	۱۸/۱۳	۳/۳۷	۱۸/۶۶	۲/۴۲	۲۴/۴۶	۱۸/۶۶
رویارویی با موانع	پیگیری	۲۰/۰۳	۲/۴۷	۲۴/۴۶	۲/۴۲	۲۲/۵۲	۲/۳۸	۱۸/۶۶	۳/۲۷	۲۱/۱۹	۳/۲۶	۱۱/۱۳	۱۱/۳۳
	پیش‌آزمون	۲۰/۰۳	۲/۴۷	۲۴/۴۶	۲/۴۲	۲۲/۵۲	۲/۳۸	۱۸/۶۶	۳/۲۷	۱۱/۳۳	۳/۶۴	۱۰/۴۶	۱۱/۴
	پیش‌آزمون	۲۴/۴۶	۲/۴۷	۲۴/۴۶	۲/۴۲	۲۲/۵۲	۲/۳۸	۱۸/۶۶	۳/۲۷	۱۱/۳۳	۱/۴۰	۱۵/۴۶	۱۱/۹۳
	پیگیری	۱۵/۲	۱/۹۸	۱۵/۲	۱/۴۰	۱۵/۴۶	۳/۷۱	۱۱/۹۳	۲/۸۴	۱۴/۹۹	۲/۸۴	۱۱/۴	۱۱/۴
تکمیل تکلیف	پیگیری	۲۴/۴۶	۲/۴۷	۲۴/۴۶	۲/۴۲	۲۲/۵۲	۲/۳۸	۱۸/۶۶	۳/۲۷	۱۱/۳۳	۱/۴۰	۱۵/۴۶	۱/۴۰
	پیش‌آزمون	۲۰/۰۳	۲/۴۷	۲۰/۰۳	۲/۴۲	۲۰/۰۳	۲/۴۴	۱۸/۶۶	۳/۲۷	۱۱/۳۳	۱/۴۰	۱۵/۴۶	۱/۴۰
	پیش‌آزمون	۱۵/۲	۱/۹۸	۱۵/۲	۱/۴۰	۱۵/۴۶	۳/۷۱	۱۱/۹۳	۲/۸۴	۱۴/۹۹	۲/۸۴	۱/۴۰	۱/۴۰
	پیگیری	۱۵/۲۶	۲/۴۷	۱۵/۲۶	۲/۴۲	۱۵/۴۶	۳/۷۱	۱۱/۹۳	۲/۸۴	۱۴/۹۹	۲/۸۴	۱/۴۰	۱/۴۰
میل به آغازگری	پیگیری	۱۵/۲۶	۱/۹۸	۱۵/۲۶	۱/۴۰	۱۵/۴۶	۳/۷۱	۱۱/۹۳	۲/۸۴	۱۴/۹۹	۲/۸۴	۱/۴۰	۱/۴۰
	پیش‌آزمون	۱۵/۲۶	۱/۹۸	۱۵/۲۶	۱/۴۰	۱۵/۴۶	۳/۷۱	۱۱/۹۳	۲/۸۴	۱۴/۹۹	۲/۸۴	۱/۴۰	۱/۴۰
	پیش‌آزمون	۱۵/۲۶	۱/۹۸	۱۵/۲۶	۱/۴۰	۱۵/۴۶	۳/۷۱	۱۱/۹۳	۲/۸۴	۱۴/۹۹	۲/۸۴	۱/۴۰	۱/۴۰
	پیگیری	۱۵/۲۶	۱/۹۸	۱۵/۲۶	۱/۴۰	۱۵/۴۶	۳/۷۱	۱۱/۹۳	۲/۸۴	۱۴/۹۹	۲/۸۴	۱/۴۰	۱/۴۰

تغییرات مؤید آن است که در گروه‌های آموزش، نمرات پس‌آزمون شرکت‌کنندگان در متغیر خودکارآمدی و مؤلفه‌های آن افزایش داشته است. در جدول ۴ نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر برای بررسی

با توجه به جدول ۳، میانگین نمرات متغیر خودکارآمدی و مؤلفه‌های آن در گروه‌های طرحواره درمانی، درمان هیجان‌دار و گواه در مراحل پس‌آزمون و پیگیری نسبت به مرحله پیش‌آزمون تغییرات معناداری داشته است. این

تاثیر تفاوت طرحواره درمانی و درمان هیجانمدار بر خودکارآمدی و مؤلفه‌های آن ارائه شده است.

جدول ۴ نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر برای بررسی تفاوت گروه‌ها در متغیر خودکارآمدی و مؤلفه‌های آن در دو مرحله پس‌آزمون و پیگری

متغیر	منبع تغییرات	آزمایش	میانگین مجدور خطای	میانگین مجدور	درجه آزادی	F	معناداری	سطح	مجدور اتا
خودکارآمدی	گروه‌ها	۱۵۴۶/۶۸۹	۲۰۴/۶۲۴	(۲،۴۲)	۷/۵۵۹	۰/۰۰۲	۰/۲۶۵	۰/۰۰۲	۰/۲۶۵
	مراحل	۳۴۹۴/۴۹۲	۴۱/۲۹۵	(۱/۴۶۶، ۶۱/۵۹۰)	۸۴/۶۲۲	<۰/۰۰۱	۰/۶۶۸	<۰/۰۰۱	<۰/۰۰۱
	تعامل مراحل با گروه	۸۵۲/۹۲۳	۴۱/۲۹۵	(۲/۹۳۳، ۶۱/۵۹۰)	۲۰/۶۵۴	<۰/۰۰۱	۰/۴۹۶	<۰/۰۰۱	<۰/۰۰۱
	گروه‌ها	۵۰۴/۰۲۲	۵۸/۸۹۷	(۲،۴۲)	۸/۵۵۸	۰/۰۰۱	۰/۲۹۰	۰/۰۰۱	۰/۰۰۱
رویارویی با موانع	مراحل	۹۷۵/۵۰۸	۱۱/۳۳۳	(۱/۵۹۳، ۶۶/۹۲۶)	۸۶/۰۸۰	<۰/۰۰۱	۰/۶۷۲	<۰/۰۰۱	<۰/۰۰۱
	تعامل مراحل با گروه	۲۹۱/۱۱۸	۱۱/۳۳۳	(۳/۱۸۷، ۶۶/۹۲۶)	۲۵/۶۸۹	<۰/۰۰۱	۰/۵۵۰	<۰/۰۰۱	<۰/۰۰۱
	گروه‌ها	۲۶/۴۹۶	۱۶/۰۵۸	(۲،۴۲)	۱/۶۵۰	۰/۰۰۴	۰/۰۷۳	۰/۰۰۴	۰/۰۰۴
	مراحل	۱۰۶/۱۴۷	۴۰/۰۴۴	(۱/۸۷۶، ۷۸/۷۹۰)	۲۶/۲۴۸	<۰/۰۰۱	۰/۳۸۵	<۰/۰۰۱	<۰/۰۰۱
تمکیل تکلیف	تعامل مراحل با گروه	۱۹/۰۸۰	۴۰/۰۴۴	(۳/۷۵۲، ۷۸/۷۹۰)	۴/۷۱۸	۰/۰۰۲	۰/۱۸۳	۰/۰۰۲	۰/۰۰۲
	گروه‌ها	۱۷۳/۹۵۶	۲۰/۳۷۷	(۲،۴۲)	۸/۵۳۷	۰/۰۰۱	۰/۲۸۹	۰/۰۰۱	۰/۰۰۱
	مراحل	۱۹۵/۱۷۶	۳/۹۹۵	(۱/۴۵۷، ۶۱/۱۸۱)	۴۸/۸۵۰	<۰/۰۰۱	۰/۵۳۸	<۰/۰۰۱	<۰/۰۰۱
	تعامل مراحل با گروه	۳۹/۷۸۶	۳/۹۹۵	(۲/۹۱۳، ۶۱/۱۸۱)	۹/۹۵۸	<۰/۰۰۱	۰/۳۲۲	<۰/۰۰۱	<۰/۰۰۱
میل به آغازگری	گروه‌ها	۲۶/۴۹۶	۱۶/۰۵۸	(۲،۴۲)	۱/۶۵۰	۰/۰۰۴	۰/۰۷۳	۰/۰۰۴	۰/۰۰۴
	مراحل	۱۰۶/۱۴۷	۴۰/۰۴۴	(۱/۸۷۶، ۷۸/۷۹۰)	۲۶/۲۴۸	<۰/۰۰۱	۰/۳۸۵	<۰/۰۰۱	<۰/۰۰۱

می‌دهد که حداقل بین یکی از گروه‌های آزمایش (دو گروه درمانی) و گروه کنترل در متغیر خودکارآمدی تفاوت معناداری وجود دارد. جهت بررسی اثربخشی آموزش طرحواره درمانی و درمان هیجانمدار و مقایسه بین این دو روش از آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد تکمیل تکلیف ($F=۰/۱۸۳$, $p=۰/۰۰۲$) و میل به آغازگری ($F=۰/۳۲۲$, $p=۰/۰۰۱$) و بوده که در سطح $0/05$ معنی‌دار است. این نتیجه نشان

همانطور که در جدول ۴ نشان داده شده است، میزان F اثر تعامل مراحل و گروه برای متغیر خودکارآمدی $F=۲۰/۶۵۴$, $p=۰/۰۰۱$, $\eta^2=۰/۴۹۶$, $\eta^2=۰/۰۰۱$, $p<۰/۰۰۱$, $F=۲۵/۶۸۹$, $p<۰/۰۰۱$, $\eta^2=۰/۵۵۰$, $p=۰/۰۰۲$, $F=۴/۷۱۸$, $p=۰/۰۰۲$, $\eta^2=۰/۱۸۳$, $p=۰/۰۰۲$ ، مؤلفه‌های

میل به آغازگری ($F=۹/۹۵۸$, $p<۰/۰۰۱$, $\eta^2=۰/۰۳۲۲$, $p=۰/۰۰۱$, $\eta^2=۰/۰۰۱$) و

بوده که در سطح $0/05$ معنی‌دار است. این نتیجه نشان

جدول ۵ نتایج آزمون مقایسه‌ای زوجی براساس تعديل بونفرونی در متغیر خودکارآمدی و مؤلفه‌های آن در سه مرحله پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگری

متغیر	مراحل	پس‌آزمون	پیگری	درمان هیجانمدار	طرحواره درمانی	اختلاف میانگین	مقدار احتمال	اختلاف میانگین	مقدار احتمال
خودکارآمدی	پیش‌آزمون	-۱۹/۶۶۷*	-۲۰/۶۶۷*	<۰/۰۰۱	-۲۰/۸۶۷*	<۰/۰۰۱	<۰/۰۰۱	-۲۰/۸۶۷*	<۰/۰۰۱
	پیگری	-۲۰/۶۶۷*	-۱۵/۷۳۳*	<۰/۰۰۱	-۱۵/۷۳۳*	<۰/۰۰۱	<۰/۰۰۱	-۱۵/۷۳۳*	<۰/۰۰۱

متغیر	مراحل	طرحواره درمانی				درمان هیجان‌مدار	
		اختلاف میانگین	مقدار احتمال	اختلاف میانگین	مقدار احتمال		
رویارویی با موانع	پس آزمون	-۱	-۰/۰۰۳	۵/۱۳۳*	<۰/۰۰۱	-۱۲*	<۰/۰۰۱
		-۱۱*	<۰/۰۰۱	-۸/۶۶۷*	<۰/۰۰۱	-۸/۶۶۷*	<۰/۰۰۱
		-۱	۰/۰۰۱	۰/۷۲۰	۰/۰۰۱	۰/۳۳۳	۰/۰۰۱
		-۳/۹۳۳	<۰/۰۰۱	-۳/۸۶۷	<۰/۰۰۱	-۳/۸۶۷	<۰/۰۰۱
	پیش آزمون	-۱	-۰/۰۱۱	-۲/۵۳۳	<۰/۰۰۱	-۵	<۰/۰۰۱
		-۰/۰۶۷	۰/۰۷۸	۱/۱۳۳*	<۰/۰۰۱	-۴	<۰/۰۰۱
		-۴/۰۶۷	۰/۰۷۸	-۴/۱۳۳	<۰/۰۰۱	-۴/۵۳۳	<۰/۰۰۱
		-۰/۰۶۷	۰/۰۷۶	-۰/۰۶۷	<۰/۰۷۶	-۰/۰۶۷	۰/۰۷۶
تکمیل تکلیف	پیش آزمون	پیگیری	پس آزمون	پیگیری	پس آزمون	پیش آزمون	پس آزمون
		پس آزمون	پس آزمون	پس آزمون	پس آزمون	پیگیری	پیگیری
	پیش آزمون	پس آزمون	پس آزمون	پس آزمون	پس آزمون	پیگیری	پیگیری
		پیگیری	پیگیری	پیگیری	پیگیری	پس آزمون	پس آزمون
میل به آغازگری	پس آزمون	پس آزمون	پس آزمون	پس آزمون	پس آزمون	پیش آزمون	پیش آزمون
		پیگیری	پیگیری	پیگیری	پیگیری	پس آزمون	پس آزمون

یافته‌های حاصل از این فرضیه نشان داد که دو روش طرحواره درمانی و درمان هیجان‌مدار بر متغیر خودکارآمدی و مؤلفه‌های آن در معتادین با درمان نگهدارنده متادون اثربخش بودند، و همچنین در طول زمان (سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری) دو روش درمانی نسبت به یکدیگر اثربخشی یکسانی بر متغیر خودکارآمدی و مؤلفه‌های آن در معتادین با درمان نگهدارنده متادون داشتند. اما درمان هیجان‌مدار بر متغیر خودکارآمدی و رویارویی با موانع در معتادین با درمان نگهدارنده متادون نسبت به طرحواره درمانی در مرحله پس آزمون اثربخشی بالاتری داشته است.

از منظر اثربخشی طرحواره درمانی بر خودکارآمدی و مؤلفه‌های مرتبط با سلامت روان مشکلات اعیادی یافته‌های این پژوهش با یافته‌های پورپشنگ و موسوی (۲۰۲۱)؛ بهرام آبادیان، مجتبایی و ثابت (۲۰۲۱)؛ فرزانه، موسی‌زاده و نظری (۲۰۲۲) و فتاحی و دهقانی (۱۳۹۷) همسو بود. همچنین از نظر اثربخشی درمان هیجان‌مدار بر خودکارآمدی و مؤلفه‌های مرتبط با سلامت روان در مشکلات اعیاد یافته‌های پژوهش حاضر با یافته‌های

نتایج آزمون تعديل بونفرونی نشان داد، در گروه طرحواره درمانی تفاوت معناداری بین دو مرحله پس آزمون و پیگیری در متغیر خودکارآمدی و مؤلفه‌های آن در معتادین با درمان نگهدارنده متادون مشاهده شد؛ به‌طوری‌که میانگین نمرات متغیر خودکارآمدی و مؤلفه‌های آن در مرحله پس آزمون در همسنجی با پیش آزمون افزایش معنادار و این افزایش تا مرحله پیگیری تداوم داشته است. همچنین نتایج آزمون تعديل بونفرونی نشان داد، در گروه درمان هیجان‌مدار تفاوت معناداری بین دو مرحله پس آزمون و پیگیری در متغیر خودکارآمدی و مؤلفه رویارویی با موانع در معتادین با درمان نگهدارنده متادون مشاهده شد که نشان دهنده عدم پایداری درمان هیجان‌مدار است؛ اما در مؤلفه‌های تکمیل تکلیف و میل به آغازگری پایدار بود.

بحث

هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی درمان هیجان‌مدار و طرحواره درمانی بر خودکارآمدی و مؤلفه‌های آن در معتادین با درمان نگهدارنده متادون بود. به‌طور کلی

نتایج پژوهش حاضر اثربخشی آن را درباره افراد تحت درمان متادون نیز نشان داد.

از دیگر نتایج پژوهش درمان هیجانمدار در مقایسه با طرحواره درمانی عملکرد بهتری در بهبود رویارویی با موانع در معادین داشته است. در تبیین این موضوع می‌توان چنین استدلال کرد که آشفتگی هیجانی به عنوان یک مکانیسم اساسی در ایجاد و حفظ اختلالات مصرف مواد مطرح شده است و بیمارانی که به دنبال این درمان هستند، اغلب سطوح بالایی از احساسات منفی و یا سطوح پایینی از احساسات مثبت را تجربه می‌کنند (کانگ، فیربرین و آریس^۴، ۲۰۱۹). در نتیجه در روبه رو شدن با هیجانات خود و همچنین غلبه بر موانع محیطی مشکلات جدی دارند و این موضوع می‌تواند تبیین کننده مکانیسم اثر درمان هیجانمدار باشد، چرا که درمان هیجانمدار، نقش بر جسته‌ای را به درک، کاوش و تجربه هیجان‌ها به منظور افزایش شکوفایی و ارتقای رفتارهای انطباقی انسان می‌دهد. این خود هیجان‌ها نیستند که معمولاً تنها مانع برای شکوفایی انسان هستند بلکه بیشتر اوقات این عدم مدیریت هیجان‌ها است که بیشتر از همه مشکل‌ساز می‌شود.

درمان هیجانمدار ادعا می‌کند که هیجانات با نیازهای اساسی انسان مرتبط هستند و دسترسی به برخی از هیجان‌های مثبت می‌تواند نقش مهمی را در استفاده از هیجانات برای اهداف انطباقی ایفا کند. در دیدگاه نظریه پردازان درمان هیجانمدار، هیجانات بخش غنی از بافت پیچیده زندگی انسان‌ها را تشکیل می‌دهند و این به معنای این است که انسان بودن کامل به معنای تجربه عمیق هیجانات است (گرینبرگ، ۲۰۱۴). تکنیک‌های

امینی، لطفی، فاطمی‌تبار و بهرامپور (۲۰۲۰) و هلاموا، کانوسکی، واسوا و کوبیلی^۱ (۲۰۲۱) همسو بود.

در تبیین اثربخشی طرحواره درمانی بر خودکارآمدی می‌توان گفت که طرحواره درمانی یک مداخله ویژه بیماری‌های مزمن است که به شکل بلندمدت حضور داشته و از طرحواره‌های ناسازگار اولیه افراد اثر پذیرفته است و چون تمرکز خود را بر بهبود این طرحواره‌ها قرار می‌دهند در نتیجه تغییرات عمیق‌تری را به نسبت درمان‌های شناختی - رفتاری ایجاد می‌کنند (پیترز، ون پاسل و کرانز^۲، ۲۰۲۲). تحقیقات پیشین حاکی از آن است که طرحواره‌های ناسازگار اولیه در میان افراد می‌تواند خودکارآمدی آنان را عمیقاً به شکل منفی تحت تأثیر قرار دهد و در نتیجه احتمال گرایش به اعتیاد و عود مصرف را در آنان بالا بيرد، به عنوان مثال پژوهش آلوی، وراسترو، رانیا، ساکو، فرناندز آراندا و همکاران^۳ (۲۰۲۰) نشان داد که طرحواره‌های ناسازگار اولیه در میان جوانان می‌توانند پیش‌بینی کننده پتانسیل اعتیاد در میان آن‌ها باشد به ویژه طرحواره‌های طرد - بریدگی، خودمختاری / عملکرد مختل، محدودیت‌های مختل، دیگر جهت‌گیری پتانسیل اعتیاد‌پذیری بالاتر را به همراه داشتند. همچنین نتایج رگرسیون نشان داد که طرحواره‌های گسترشگی / طرد، مختل شدن خودمختاری و عملکرد غیرجهت‌دار بالاترین پتانسیل پیش‌بینی شده اعتیاد را به همراه دارند. در نتیجه این موضوع نشان می‌دهد اگر بخواهیم به خودمختاری و خودکارآمدی بهتر افراد کمک کنیم تا احتمال گرایش به اعتیاد و یا بازگشت به مواد در آن‌ها کاهش یابد باید سراغ طرحواره‌های ناسازگار آن‌ها برویم و این کاری است که طرحواره درمانی انجام داده است و

¹- Halamová, Kanovský, Varšová & Kupeli

²- Peeters van Passel & Krans

³- Aloi, Verrastro, Rania, Sacco, Fernández-Aranda & et al

⁴- Kang, Fairbairn & Ariss

این دو درمان را در افزایش خودکارآمدی معتادین با درمان نگهدارنده متادون مدنظر قرار دهند. در این میان با توجه به اینکه درمان هیجان‌دار در مقایسه با طرحواره درمانی یک برتری نسبی در بهبود مولفه رویارویی با موانع نشان داد، بنابراین توصیه می‌شود که در این زمینه از این درمان استفاده شود.

محدود شدن مطالعه به یک شهر (شهر تهران) و استفاده از ابزار خودگزارشی از محدودیت‌های این تحقیق بود که توصیه می‌شود تعمیم نتایج بدست آمده روی سایر معتادین با درمان نگهدارنده متادون با احتیاط انجام شود. بر این اساس پیشنهاد می‌شود جهت تعمیم‌پذیری و مقایسه نتایج، پژوهش حاضر در سایر شهرها تکرار، و همچنین توصیه می‌شود نتایج این پژوهش با سایر درمان‌های نگهدارنده نظری شربت اوپیوم و قرص بوپرورفین و درمان‌های روانشناختی دیگر نیز مقایسه شود.

سپاسگزاری

این مطالعه بخشی از رساله دکترای دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان به شماره کدالخلاق IR.IAU.REC.1401.035 کارآزمایی بالینی ایران با کد IRCT20220807055632N1 بدون دریافت هیچگونه کمک مالی از موسسه یا سازمانی انجام شد. هیچکدام از نویسنده‌گان این مطالعه و یا دستگاه‌ها تعارض منافعی برای انتشار این مقاله ندارند. بدینوسیله از تمامی شرکت کنندگان محترم در این مطالعه نهایت تشکر و قدردانی به عمل می‌آید.

References

هیجان‌دار برای تبدیل حالت‌های هیجانی مشکل‌ساز و تجربیات نامطلوب به هیجان‌ها و اعمال سازگار مطلوب طراحی شده‌اند (گرکوسی، مسینا، آمودئو، لاپوماردا، کرسکتینی و همکاران^۱، ۲۰۲۰). بسیاری از افراد سال‌های های زیادی از زندگی خود هیجاناتشان را سرکوب و یا از هیجاناتشان فرار کرده‌اند، زیرا بسیاری از احساسات آن‌ها تجربه‌های دردناک سبک دلستگی و الگوهای هیجانی عمیقاً درهم تنیده‌ای بوده است (ویلن من، اسچیندر، پارکینسون، کوردا، ون کانل و همکاران^۲، ۲۰۰۴). در نتیجه وقتی افراد در طول این درمان آموختند که چگونه به جای اجتناب و یا سرکوب هیجانات با آن‌ها روبرو شوند رفتارهای انطباقی‌تر بروز می‌یابد و به جای فرار از موانع واقعی زندگی روزمره بهتر با هیجانات خود روبرو می‌شوند، و در نتیجه موانع و چالش‌ها را هم به شکل فعلانه‌تر و مواجهه‌ای‌تر حل می‌کنند.

نتیجه‌گیری

از یافته‌های این پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که هر دو روش درمانی؛ طرحواره درمانی و درمان هیجان‌دار مداخلات سودمندی برای افزایش خودکارآمدی و مولفه‌های آن در معتادین با درمان نگهدارنده متادون هستند و اثرات این دو درمان نسبتاً پایدار بود. در مقام مقایسه بین طرحواره درمانی و درمان هیجان‌دار تفاوت معناداری جز در مرحله پیگیری که درمان هیجان‌دار اثرات طولانی‌تری نسبت به طرحواره درمانی داشت، مشاهده نشد. بنابراین، با توجه به تایید اثربخشی طرحواره درمانی و درمان هیجان‌دار بر خودکارآمدی معتادین با درمان نگهدارنده متادون پیشنهاد می‌شود که درمان‌گران،

¹- Grecucci, Messina, Amodeo, Lapomarda, Crescentini & et al

²- Weilenmann, Schnyder, Parkinson, Corda, von Känel & et al

- Alawa J, Muhammad M, Kazemitabar M, Bromberg DJ, Garcia D, Khoshnood K, Ghandour L. (2022). Medication for opioid use disorder in the Arab World: A systematic review. *The International journal on drug policy*, 102, 103617.
- Aloi M, Verrastro V, Rania M, Sacco R, Fernández-Aranda F, Jiménez-Murcia S, De Fazio P, Segura-Garcia C. (2020). The Potential Role of the Early Maladaptive Schema in Behavioral Addictions among Late Adolescents and Young Adults. *Frontiers in psychology*, 10, 1-10.
- Amini M, Lotfi M, Fatemitarab R, Bahrampoori L. (2020). The effectiveness of emotion-focused group therapy on the reduction of negative emotions and internet addiction symptoms. *Practice in Clinical Psychology*, 8(1), 1-8.
- Asgharanjad T, Ahmadi M, Farzad V, Khodapanahi MK. (2005). A study of the psychometric properties of Scherer's general self-efficacy scale. *Psychology Quarterly Journal*, 10(3), 262-274. (In Persian)
- Bahramabadian F, Mojtabaei M, Sabet M. (2021). Comparison of the efficacy of acceptance and commitment -based therapy and schema therapy on self-efficacy and craving for change in addicts. *J of Psychological Science*, 20, 1849-1863. (In Persian)
- Basharpoor S, Ahmadi S. (2021). The Pattern of Structural Relationships Executive Function, Ego Resilience, and Moral Identity in Predicting Self-Efficacy for Quitting People Drug Dependents: The Mediating Role of Mindfulness. *Journal of Military Caring Science*, 8(2), 169-182. (In Persian)
- Calcaterra S, Bach P, Chadi A, Chadi N, Kimmel S, Morford K, Samet J. (2019). Methadone matters: what the United States can learn from the global effort to treat opioid addiction. *Journal of general internal medicine*, 34(6), 1039-1042.
- Csete J. (2019). Criminal justice barriers to treatment of opioid use disorders in the United States: the need for public health advocacy. *American journal of public health*, 109(3), 419-422.
- Dalgleish T. (2013). Examining predictors of change in emotionally focused couple's therapy [Dissertation]. Ottawa: School of Psychology Faculty of Social Sciences, University of Ottawa.
- Demeyer A, Staal J, Beyaert R. (2016). Targeting MALT1 proteolytic activity in immunity, inflammation and disease: good or bad? *Trends in molecular medicine*, 22(2), 135-150.
- Dickhaut V, Arntz A. (2014). Combined group and individual schema therapy for borderline personality disorder: a pilot study. *Journal of behavior therapy and experimental psychiatry*, 45(2), 242-251.
- Ein-Gar D, Steinhart Y. (2017). Self-control and Task Timing Shift Self-efficacy and Influence Willingness to Engage in Effortful Tasks. *Frontiers in psychology*, 8, 1-14.
- Elliott R, Shahar B. (2017). Emotion-focused therapy for social anxiety (EFT-SA). *Person-Centered & Experiential Psychotherapies*, 16(2), 140-158.
- Fareed A, Vayalapalli S, Scheinberg K, Gale R, Casarella J, Drexler K. (2013). QTc interval prolongation for patients in methadone maintenance treatment: a five years follow-up study. *The American journal of drug and alcohol abuse*, 39(4), 235-240.
- Farzaneh S, Mousazadeh T, Nazarzadeh V. (2022). Comparison of the effectiveness of acceptance and commitment-based therapy and schema therapy on the self-efficacy and Self compassion of women after hysterectomy. *Women and Family Studies*, 15(57), 55-74. (In Persian)
- Fattahi A, Dehghani A. (2019). Effectiveness of Schema Therapy in Emotion Regulation, Self-efficacy, and Temptation in Male Members of Narotics Anonymous (NA) Association. *Journal of Research on Addiction*, 12(48), 185-202. (In Persian)
- Glisenti K, Strodl E, King R. (2018). Emotion-focused therapy for binge-eating disorder: A review of six cases. *Clinical psychology & psychotherapy*, 25(6), 842-855.

- Goldman RN, Greenberg LS. (2015). Case formulation in emotion-focused therapy: Co-creating clinical maps for change: American Psychological Association.
- Grecucci A, Messina I, Amodeo L, Lapomarda G, Crescentini C, Dadomo H, Panzeri M, Theuninck A, Frederickson J. (2020). A Dual Route Model for Regulating Emotions: Comparing Models, Techniques and Biological Mechanisms. *Frontiers in psychology*, 11, 1-13.
- Greenberg L. (2014). The therapeutic relationship in emotion-focused therapy. *Psychotherapy, 51*(3), 350.
- Greenberg LS. (2004). Emotion-focused therapy. *Clinical Psychology & Psychotherapy: An International Journal of Theory & Practice, 11*(1), 3-16.
- Halamová J, Kanovský M, Varšová K, Kupeli N. (2021). Randomised controlled trial of the new short-term online emotion focused training for self-compassion and self-protection in a nonclinical sample. *Current psychology (New Brunswick, N.J.)*, 40(1), 333-343.
- Hawke LD, Provencher MD. (2011). Schema theory and schema therapy in mood and anxiety disorders: A review. *Journal of cognitive psychotherapy, 25*(4), 257-276.
- Hayat AA, Shateri K, Amini M, Shokrpour N. (2020). Relationships between academic self-efficacy, learning-related emotions, and metacognitive learning strategies with academic performance in medical students: a structural equation model. *BMC medical education, 20*(1), 76.
- Hopwood CJ, Pincus AL, Wright AG. (2019). The interpersonal situation: Integrating personality assessment, case formulation, and intervention. Using basic personality research to inform personality pathology, 94-121.
- Jones S, Jack B, Kirby J, Wilson TL, Murphy PN. (2021). Methadone-Assisted Opiate Withdrawal and Subsequent Heroin Abstinence: The Importance of Psychological Preparedness. *The American journal on addictions, 30*(1), 11-20.
- Kang D, Fairbairn CE, Ariss TA. (2019). A meta-analysis of the effect of substance use interventions on emotion outcomes. *Journal of consulting and clinical psychology, 87*(12), 1106-1123.
- Khoshvaght N, Naderi F, Safarzadeh S, Alizadeh M. (2021). The Effects of Compassion-focused Therapy on Anxiety and Depression in the Mothers of Children with Cerebral Palsy. *Archives of Hygiene Sciences, 10*(3), 225-234.
- Manavipour D, Saeedian Y. (2016). The role of self-compassion and control belief about learning in university students' self-efficacy. *Journal of Contextual Behavioral Science, 5*(2), 121-126.
- Mohamed S, Hassan S, Abdelmonem R. (2022). Relationship between Self-Efficacy, Social Support and Treatment Motivation among Addict Patients. *Minia Scientific Nursing Journal, 12*(1), 106-113.
- Peeters N, van Passel B, Krans J. (2022). The effectiveness of schema therapy for patients with anxiety disorders, OCD, or PTSD: A systematic review and research agenda. *The British journal of clinical psychology, 61*(3), 579-597.
- Pourpashang M, Mousavi S. (2021). The Effects of Group Schema Therapy on Psychological Wellbeing and Resilience in the Clients under Substance Dependence Treatment. *Journal of Client-Centered Nursing Care, 7*(2), 159-166.
- Rezaee M, Mohammadkhani P, Jafari Roshan M. (2021). Comparison of the Effectiveness of Mindfulness-Based Cognitive Therapy and Emotion-Based Therapy on Body Image Dissatisfaction in People with Eating Disorder Symptoms. *Journal of Psychological Studies, 17*(3), 95-114. (In Persian)
- Roehr B. (2013). American psychiatric association explains DSM-5. *Bmj, 346*.
- Saidy J, Garanti Z, Sadaka R. (2022). Technostress Creators and Job Performance among Frontliners: Theorizing the Moderating Role of Self-Efficacy. *Frontiers in psychology, 13*, 827027.

- Salasi B, Shoghi B. (2022). The Effectiveness of Schema Therapy on Early Maladaptive Schemas, Emotional Regulation and Consumed Methadone Dose in Patients Undergoing Methadone Maintenance Treatment. *Research in Clinical Psychology and Counseling*, 12(1), 79-99. (In Persian)
- Schwarzer R. (2014). Self-efficacy: thought control of action. Those with high social self-efficacy invest more effort and persist at relationships: Taylor & Francis, Washington, DC.
- Sempétegui GA, Karreman A, Arntz A, Bekker MH. (2013). Schema therapy for borderline personality disorder: A comprehensive review of its empirical foundations, effectiveness and implementation possibilities. *Clinical psychology review*, 33(3), 426-447.
- Seyedfatemi N, Peyrovi H, Jalali A. (2014). Relapse experience in Iranian opiate users: a qualitative study. *International journal of community based nursing and midwifery*, 2(2), 85-93.
- Shorey RC, Stuart GL, Anderson S. (2014). Differences in early maladaptive schemas between a sample of young adult female substance abusers and a non-clinical comparison group. *Clinical Psychology & Psychotherapy*, 21(1), 21-28.
- Stiegler JR, Molde H, Schanche E. (2018). Does an emotion-focused two-chair dialogue add to the therapeutic effect of the empathic attunement to affect? *Clinical psychology & psychotherapy*, 25(1), 86-95.
- Van Wijk-Herbrink MF, Arntz A, Broers NJ, Roelofs J, Bernstein DP. (2021). A schema therapy based milieu in secure residential youth care: Effects on aggression, group climate, repressive staff interventions, and team functioning. *Residential Treatment for Children & Youth*, 38(3), 289-306.
- Weilenmann S, Schnyder U, Parkinson B, Corda C, von Känel R, Pfaltz MC. (2018). Emotion Transfer, Emotion Regulation, and Empathy-Related Processes in Physician-Patient Interactions and Their Association with Physician Well-Being: A Theoretical Model. *Frontiers in psychiatry*, 9, 1-18.
- Yaghoubi R, Bayazi MH, Babaei M, Asadi J. (2020). Comparison of the Effectiveness of Emotion-Focused Therapy Group and Schema Group Therapy on the Difficulties in Emotion Regulation and Health Promoting Lifestyle of Obese Women. *International Journal of Health Studies*, 6(4), 1-7.
- Yang C, Zhou Y, Cao Q, Xia M, An J. (2019). The Relationship between Self-Control and Self-Efficacy among Patients with Substance Use Disorders: Resilience and Self-Esteem as Mediators. *Frontiers in psychiatry*, 10, 1-10.
- Yang D, Klosko S, Weishaar E. (2003). Schema Therapy: A Practitioner's Guide: Publishing house: The Guilford Press.
- Young JE. (1999). Cognitive therapy for personality disorders: A schema-focused approach (3rd ed.). Professional Resource Press/Professional Resource Exchange.