

اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر استرس ادراک شده، خلق منفی، خودکارآمدی و ادراک درد در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید

* نازآفرین پاکنها^۱، مجید صفاری نیا^۲

۱. دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

۲. استاد، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

(تاریخ دریافت مقاله: ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ – تاریخ پذیرش: ۱۴۰۰/۰۲/۰۲)

The Effectiveness of Mindfulness-Based Stress Reduction on Perceived Stress, Negative Mood, Self-Efficacy and Pain Perception in Patients with Rheumatoid Arthritis

* Nazafarin Paknahad¹, Mahid Saffarinia²

1. Ph.D Student of Health Psychology, Department of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran.

2. Professor, Department of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran.

Original Article

(Received: May. 30, 2021 - Accepted: Apr. 22, 2023)

مقاله پژوهشی

چکیده

Objective: The purpose of this study was to investigate the effectiveness of mindfulness-based stress reduction on perceived stress, negative mood, self-efficacy, and pain perception in patients with rheumatoid arthritis. **Method:** This was a quasi-experimental study with pre-test and post-test with control group. The statistical population of this study included all patients with rheumatoid arthritis referred to Tehran Shariati hospital. A sample of 40 patients (20 females and 20 males) was selected with targeted sampling from this population and were randomly assigned into experimental (10 male and 10 female) and control (10 male and 10 female) groups. In this intervention, the experimental group underwent mindfulness-based stress reduction program during 8 sessions for 2 months, 2 hours per week, and the control group was placed on the waiting list. The experimental and control groups also completed the Perceived Stress Scale by Cohen et al (1983), the Depression, Anxiety and Stress Scale by Lovibond & Lovibond (1995), the Self-efficacy Scale by Sherer et al (1982), and the McGill pain questionnaire by Melzack (1975) at pre-test and post-test. Multivariate analysis of covariance was used to analyze the data. **Findings:** The results showed that in the post-test phase, mindfulness-based stress reduction treatment significantly ($p<0.001$) increased self-efficacy and significantly ($p<0.001$) reduced perceived stress, negative mood, and pain perception in patients with rheumatoid arthritis. **Conclusion:** Mindfulness-based stress reduction can be effective in increasing self-efficacy and decreasing perceived stress, negative mood, and pain perception in these patients.

Keywords: Mindfulness-Based Stress Reduction, Perceived Stress, Negative Mood, Self-efficacy, Pain Perception, Rheumatoid arthritis.

مقدمه: هدف از این مطالعه بررسی اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر استرس ادراک شده، خلق منفی، خودکارآمدی و ادراک درد در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید بود. روش: پژوهش نیمه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل تمامی بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی تهران بود. از این جامعه، نمونه‌ای به حجم ۴۰ نفر (۲۰ زن و ۲۰ مرد) هادفمندانه انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (۱۰ مرد و ۱۰ زن) و گروه کنترل (۱۰ مرد و ۱۰ زن) گمارده شدند. گروه آزمایش تحت برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی در طول ۸ جلسه به مدت ۲ ماه، هفتگه ای یک جلسه ۲ ساعته و گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفت. همچنین گروه‌های آزمایش و کنترل، مقیاس استرس ادراک شده کوهن و همکاران (۱۹۸۳)، مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس لوى بوند و لوى بوند (۱۹۹۵)، مقیاس خودکارآمدی شر و همکاران (۱۹۸۲) و پرسشنامه درد مک گیل ملزاک (۱۹۷۵) را در مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون تکمیل کردند. برای تعزیزی و تحلیل داده‌ها از تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که در مرحله پس‌آزمون، درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی باعث افزایش معنی دار ($p<0.001$) خودکارآمدی و کاهش معنی دار ($p<0.01$) استرس ادراک شده، خلق منفی و ادراک درد در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید شد. نتیجه گیری: کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی می‌تواند در افزایش خودکارآمدی و کاهش استرس ادراک شده، خلق منفی و ادراک درد در این بیماران مؤثر واقع شود.

واژگان کلیدی: کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی، استرس ادراک شده، خلق منفی، خودکارآمدی، ادراک درد، آرتریت روماتوئید.

*نویسنده مسئول: نازآفرین پاکنها

*Corresponding Author: Nazafarin Paknahad

Email: nazafarin.paknahad@yahoo.com

مقدمه

این بیماری جسمی، افراد مبتلا ممکن است دچار مشکلات روانشناختی نظیر افزایش سطح استرس ادراک شده^۴، خلق منفی^۵ و ادراک درد^۶ و همچنین کاهش خودکارآمدی^۷ شوند.

استرس ادراک شده عبارت است از واکنش بدن به تغییری که مستلزم سازگاری یا پاسخ جسمی، ذهنی یا هیجانی می‌باشد که می‌تواند به وسیله هر عامل یا محرك تنش زا ایجاد گردد (کوهن، کامارک، مرملستین^۸، ۱۹۸۳). مطالعات نشان داده‌اند که استرس ادراک شده می‌تواند در تشید آرتربیت روماتوئید از طریق افزایش شدت درد نقش داشته باشد و کاهش استرس ادراک شده می‌تواند نقش مؤثری در بهبودی این بیماری داشته باشد (بهرامی راد و راضی، ۱۳۹۷). از سوی دیگر، خلق منفی به عنوان بعدی از پریشانی ذهنی و تعامل ناخوشایند با محیط تعریف شده و دربردارنده حالات خلقی گوناگون همچون ترس، خشم، احساس گناه و احساس درماندگی می‌باشد. بنابراین به شدت با استرس و مشکلات سلامت روان همبسته است و نقش مهمی در چندی از اختلالات روانی دارد (گیل، بس، ویت و جونگ^۹، ۲۰۱۷). مطالعات نشان داده‌اند که خلق منفی نظیر اضطراب و افسردگی در بیماران مبتلا به آرتربیت روماتوئید در سطح بالایی می‌باشد (عبدی رحمانی، شیروودی، خلعتبری و حاجی عباسی، ۱۳۹۱). همچنین، احساس خودکارآمدی یک عامل عمدۀ در تفکرات،

آرتربیت روماتوئید^۱ یا روماتیسم مفصلی یک بیماری چند سیستمی مزمن است که به طور تقریبی در دو سوم بیماران به طور تدریجی با خستگی، بی‌اشتهاای، ضعف عمومی و عالیم عضلانی اسکلتی مبهم آغاز شده، هفت‌ها یا ماهها پایدار مانده و هنگامی که چندین مفصل به خصوص مفاصل دست، مچ، زانو و به طور قرینه مبتلا می‌شود، بروز می‌کند. التهاب در مفاصل موجب درد، تورم، خشکی کامل مفاصل همراه با کاهش قدرت عضلانی در عضلات متصل به مفصل درگیر و ناتوانی در حرکت می‌شود. این وضعیت گاهی می‌تواند بسیار دردناک باشد و علاوه بر تأثیر مخبری که بر مفاصل بدن دارد، با تأثیر بر سایر بافت‌ها و ارگانهای بدن باعث کاهش طول عمر و کارایی آنها می‌گردد. در دوره‌هایی از خاموشی نشانه‌هایی مثل تورم، درد، اختلال خواب و ضعف محو و یا ناپدید می‌شوند، اما در سایرین بیماری همیشه فعال است و با زمان پیشرفت می‌کند. درمان‌های موجود در درجه اول بر تسکین درد و کاهش التهاب تمرکز دارد (فیرستاین، باد، گابریل، مک اینز و اودل^۲، ۲۰۱۲). آرتربیت روماتوئید یک بیماری خود ایمنی ناتوان‌کننده و مزمن است که بر روی متغیرهای جسمانی و روانشناختی این بیماران اثرات بسیار وسیعی می‌گذارد. این بیماری ماهیتی مزمن دارد و اغلب با عود و گاهی فروکش خود به خودی همراه می‌باشد (دهانانی، کوینویل، پرون، عبدالل و فولدمان^۳، ۲۰۰۲). بنابراین با توجه به ماهیت مزمن

4. perceived stress

5. negative affect

6. pain perception

7. self-efficacy

8. Cohen, Kamarck & Mermelstein

9. Gill, Bos, Wit, & de Jonge

1. Rheumatoid Arthritis

2. Firestein, Budd, Gabriel, McInnes & O'Dell

3. Dhanani, Quenneville, Perron, Abdolell, & Feldman

با توجه به ارتباط متغیرهای استرس لرکشله، خلق منفی، ادرار درد و خودکارآمدی با بیماری آرتربیت روماتوئید، بررسی اثربخشی برنامه‌های درمانی بر روی این متغیرها دارای اهمیت می‌باشد. از جمله این درمان‌ها، درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی^۵ می‌باشد. این درمان یکی از درمان‌های موج سوم می‌باشد که برای وضعیت‌های پزشکی خاص در بیماران با دردهای مزمن و استرس‌های وابسته به آن تدوین شده است و برای وضعیت‌های ویژه‌ای مانند بیماران مبتلا به سرطان، بیماران قلبی، رماتیسم، افراد با اختلالات گوارشی، مشکلات بلع، خوردن و هضم به کار برده می‌شود (بائرن، اسمیت، هاپکینز، کریتمیر و تونی،^۶ ۲۰۰۶). این درمان روشی دوسویه بین ذهن و بدن است و تکنیک‌های مختلفی را برای افزایش پذیرش محرك نامطلوب یا دردناک آموزش می‌دهد (بائرن،^۷ ۲۰۰۳). درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی با تکرار آموزش مراقبه ذهن‌آگاهی، به افراد یاد می‌دهد که نسبت به تجارب شان کمتر واکنش نشان دهند و کمتر درباره آنها قضاوت کنند؛ در نتیجه قادر خواهند شد که الگوهای همیشگی و ناسازگارانه تفکر و رفتار را شناسایی کرده و آنها را تغییر دهند (کنگ، اسماسکی و رابینز،^۸ ۲۰۱۱).

مطالعات متعددی اثربخشی درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی یا درمان‌های ذهن‌آگاهانه را بر افزایش خودکارآمدی (یوسفی و کریمی‌پور، ۱۳۹۷؛ صناعی، موسی، مردادی، پرهون و صناعی، ۱۳۹۶؛ صدری دمیرچی، محمدی و

احساسات و رفتارهای افراد در شرایط استرس‌زا می‌باشد و توانایی افراد برای مقابله موفقیت‌آمیز با موقعیت‌های چالش‌انگیز مختلف را افزایش می‌دهد (گلارودو، کانها و پیتوگاویا،^۹ ۲۰۱۳). تحقیقات نشان داده‌اند که افزایش خودکارآمدی با تغییرات مثبت در رفتارهای مراقبت از سلامت و افزایش میزان سلامت کلی نقش دارد (تسای،^{۱۰} ۲۰۰۳). به علاوه، درد نوعی تجربه روانی و احساسی ناخوشایند است که با تخریب واقعی یا بالقوه بافت همراه است و به دو صورت حاد و مزمن دیده می‌شود. درد حاد دردی است که شروعی تازه داشته، دوام محدودی دارد و معمولاً علت مشخصی دارد که صدمه یا بیماری است، اما درد مزمن نوعی از درد است که اثر آن برای مدت طولانی، حتی مدت‌ها پس از ترمیم بافت، باقی می‌ماند و به همین دلیل علت آن به سادگی قابل شناسایی نیست (ملزاك و وال،^{۱۱} ۲۰۰۳). ادرار درد عبارت است از نگرشها، باورها و انتظارات بیماران درباره درد. همچنین تحریف‌های شناختی همچون فاجعه آفرینی، احساس درماندگی، ارزیابی بیماران از درد و میزان کنترل بر آن، تفسیر آنها از درد و پیامدهای آن و به طور کلی نظام شناختی و باورهای مرتبط با درد با ادرار درد ارتباط دارد (تورک و گاتچل،^{۱۲} ۲۰۱۸). مطالعات نشان داده‌اند که ادرار درد و خلق منفی در بیماران مبتلا به آرتربیت روماتوئید در سطح بالایی می‌باشد (تكلوی و عظیمی صدیق، ۱۳۹۷؛ رضایی، دوست، مولوی، عابدی و کریمی فر، ۱۳۹۶).

5. Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR)

6. Baer, Smith, Hopkins, Krietemeyer & Toney

7. Keng, Smoski & Robins,

1. Galhardo, Cunha & Pinto Guveia

2. Tsay

3. Melzack & Wall

4. Turk & Gatchel

پاکنهاد و صفاری‌نیا: اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر استرس ادراک‌شده، خلق منفی، خودکارآمدی و ...

دانشجویان (میرزایی و شعیری، ۱۳۹۶) و افراد وابسته به مواد (پیرنیا و همکاران، ۱۳۹۶) انجام شده‌اند و تحقیقی در رابطه با اثربخشی این درمان بر روی متغیرهای ذکر شده در بیماران مبتلا به آرتربیت روماتوئید توسط محقق مشاهده نشده است. بنابراین، بررسی اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر استرس لراکشله، خلق منفی، خودکارآمدی و ادراک درد در بیماران مبتلا به آرتربیت روماتوئید دارای ضرورت می‌باشد. با توجه به نتایج مطالعات انجام شده بر دیگر گروه‌ها، فرضیه ما این است که درمان کاهش استرس لراکشله، خلق منفی، و ادراک درد و همچنین افزایش خودکارآمدی در بیماران مبتلا به آرتربیت روماتوئید می‌شود.

روش

تحقیق حاضر یک طرح نیمه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این تحقیق شامل همه بیماران مبتلا به آرتربیت روماتوئید مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی تهران بود. از این جامعه، نمونه‌ای به حجم ۴۰ نفر (۲۰ زن و ۲۰ مرد) انتخاب شدند و این شرکت کنندگان به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (۱۰ مرد و ۱۰ زن) و گروه کنترل (۱۰ مرد و ۱۰ زن) گمارده شدند. معیارهای ورود به مطالعه عبارت بود از: ابتلا به بیماری آرتربیت روماتوئید بنا به تشخیص پزشک، مایل بودن به شرکت در جلسات آموزشی، عدم ابتلا به اختلال‌های روانی و بیماری‌های جسمی دیگر، سطح تحصیلات حداقل

بدلپور، ۱۳۹۷)، کاهش استرس لراکشله (خسروی و قربانی، ۱۳۹۵؛ سبحانی، باباخانی و آل بویه، ۱۳۹۸؛ رضوی‌زاده تبادکان، جاجرمی و وکیلی، ۱۳۹۷) کاهش خلق منفی نظری افسردگی، اضطراب و استرس (میرزایی و شعیری، ۱۳۹۶؛ سبحانی و همکاران، ۱۳۹۸؛ فرهادی و پسندیده، ۱۳۹۶؛ دهستانی، ۱۳۹۴) کاهش شدت و ادراک درد (روزنزویگ¹، گریسون، ریبل، گرین، جاسر و بیسلی، ۲۰۱۰؛ پیرنیا، تیموری و رحمانی، ۱۳۹۶؛ داودی و نسیمی‌فر، ۱۳۹۱؛ باقری و سجادیان، ۱۳۹۶؛ زارع، محمدی، متقی، افشار و پور کاظم، ۱۳۹۳؛ نسیمی‌فر، داودی و حیدری، ۱۳۹۰؛ ترکش دوز و ثناگوی محرر، ۱۳۹۸) نشان داده‌اند. به هر حال این تحقیقات بر روی والدین دارای کودکان معلول جسمی - حرکتی (یوسفی و کریمی‌پور، ۱۳۹۷) زنان مبتلا به سرطان پستان (صناعی و همکاران، ۱۳۹۶)، جانبازان (صدری دمیرچی و همکاران، ۱۳۹۷) بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (فرهادی و پسندیده، ۱۳۹۶) بیماران مبتلا به فیبرومیالژیا (زارع و همکاران، ۱۳۹۳) دانش‌آموزان (دهستانی، ۱۳۹۴)، زنان مبتلا به دردهای مزمن عضلانی اسکلتی (نسیمی‌فر و همکاران، ۱۳۹۰) نوجوانان مبتلا به لوسمی (ترکش دوز و ثناگوی محرر، ۱۳۹۸) دانشجویان مبتلا به اختلال ملال پیش از قاعده‌گی (باقری و سجادیان، ۱۳۹۶) زنان مبتلا به دیابت (رضوی‌زاده تبادکان و همکاران، ۱۳۹۷) زنان مبتلا به دردهای مزمن عضلانی اسکلتی (داودی و نسیمی‌فر، ۱۳۹۱) زنان مبتلا به فشار خون بالا (خسروی و قربانی، ۱۳۹۵)

1. Rosenzweig, Greeson, Reibel, Green, Jasser & Beasley

متغیری (مانکووا) با استفاده از نرم افزار SPSS ۲۲ استفاده شد.

گروه آزمایش در هشت جلسه هفتگی و هر جلسه ۹۰ دقیقه، تحت درمان گروهی ذهن‌آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر اساس راهنمای کابات زین (۲۰۰۳) قرار گرفتند. جلسات این برنامه درمانی به اختصار در جدول ۱ ارائه شده است.

اول متوسطه. معیارهای خروج عبارت بود از: عدم تمایل به همکاری در پژوهش و بیشتر از دو جلسه غیبت در جلسات آموزشی. در این پژوهش داده‌ها در دو سطح توصیفی و استنباطی تحلیل شدند. در سطح توصیفی از شاخص‌های میانگین و انحراف استاندارد و در سطح استنباطی برای آزمون فرضیه‌های آماری از روش تحلیل کوواریانس چند

جدول ۱. محتوای جلسات ذهن‌آگاهی مبتنی بر کاهش استرس

جلسه	محتوای جلسات
جلسه اول	معارفه و آشنایی اعضای گروه با یکدیگر، بیان مفهوم استرس و تأثیر آنها در ایجاد بیماری، ارائه منطق درمان و انجام پیش‌آزمون و آموزش تکنیک خوردن کشمکش
جلسه دوم	آموزش تمرین اسکن بدن، آموزش تمرین مدلیتیشن در حالت نشسته
جلسه سوم	آموزش تمرین دیدن و شنیدن
جلسه چهارم	انجام مدلیتیشن همراه با تنفس، صدای بدن و افکار.
جلسه پنجم	انجام مدلیتیشن نشسته، آموزش روش‌های کنترل استرس.
جلسه ششم	انجام تمرین فضای تنفسی ۳ دقیقه‌ای، تمرین خلق فکر، انجام تمرینهای مدلیتیشن.
جلسه هفتم	انجام مدلیتیشن چهار بعدی، آموزش آگاهی نسبت به هشیاری لحظه‌ای، تحلیل رویدادهای زندگی.
جلسه هشتم	انجام اسکن بدن، تمرین فضای تنفسی ۳ دقیقه‌ای، بحث در مورد کنار آمدن با موانع انجام تمرینها.

لیکرتی پنج درجه‌ای از ۰ (اصلاً) تا ۴ (خیلی زیاد) نمره‌بندی می‌شود. نمرات این مقیاس بین ۰ تا ۵۶ متغیر است. مقیاس استرس‌درآکشله دو خرده مقیاس را می‌سنجد. الف) خرده مقیاس ادراک منفی از استرس و ب) خرده مقیاس ادراک مثبت از استرس. عامل منفی عدم کنترل و واکنشهای عاطفی منفی، و عامل مثبت سطح توانایی مقابله با استرس‌ Zahāhای بیرونی را در طول یک ماه گذشته را ارزیابی

در این تحقیق برای جمع‌آوری داده‌ها در پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمایش و کنترل پرسشنامه‌های خود گزارش دهی زیر مورد استفاده قرار گرفتند.

مقیاس استرس ادراک شده^۱: این مقیاس توسط کوهن و همکاران (۱۹۸۳) ساخته شده است. این مقیاس ۱۴ آیتم دارد و هر آیتم بر اساس یک مقیاس

1. Perceived Stress Scale (PSS)

پاکنهاد و صفاری‌نیا: اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر استرس ادراک‌شده، خلق منفی، خودکارآمدی و ...

توسط شرر^۳، مادوکس، مرکاردانه، پرندیس-دان، جاکوبس و راجرز (۱۹۸۲) طراحی شده و دو خرده مقیاس خودکارآمدی عمومی و خودکارآمدی اجتماعی دارد. این پرسشنامه ۱۷ سؤال دارد. در این پرسشنامه برای هر سؤال ۵ گزینه پاسخ، پیشنهاد شده است و طبق مقیاس درجه بندی لیکرت درجه بندی می‌شود. نمره بالا به معنای خودکارآمدی بالا و نمره پایین به معنای خودکارآمدی پایین است. شرر و همکاران (۱۹۸۲) آلفای کرونباخ این پرسشنامه را ۰/۸۶ به دست آورده‌اند. اصغرنژاد و همکاران (۱۳۸۵) در یک نمونه ایرانی خصوصیات روانسنجی این مقیاس را قابل قبول و آلفای کرونباخ آن را ۰/۸۳ گزارش کرده‌اند. پرسشنامه درد مک گیل^۴: پرسشنامه درد مک گیل (ملزاك^۵، ۱۹۷۵) پرکاربردترین ابزار استاندارد سنجش درد مزمن است و گزارشی ذهنی از درد را فراهم می‌سازد. سه خرده مقیاس درد حسی و درد عاطفی و نوروپاتیک برای این پرسشنامه در نظر گرفته شده است. این پرسشنامه شامل چهار بعد اصلی و ۲۰ زیر گروه و در مجموع ۷۸ کلمه است. در هر زیر گروه شدت درد از بالا به پایین افزایش می‌باشد، بنابراین پایین‌ترین کلمه بالاترین امتیاز را دارد. بیمار می‌تواند از هر زیر گروه یک کلمه را انتخاب کند. یافته‌ها نشان‌دهنده اعتبار و پایایی قابل قبول این پرسشنامه است. ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه را ۰/۸۵ و ضریب پایایی را بالای ۰/۸۰ به دست آورده‌اند (حمزه‌پور حقیقی و همکاران، ۱۳۹۴).

3. Sherer, Maddux, Mercandante, Prentice-Dunn, Jacobs& Rogers

4. McGill pain questionnaire (MPQ)

5. Melzack

می‌کنند. این مقیاس یک ابزار مناسب برای سنجش تجربه استرس کلی در گروه‌های سنی مختلف است. در ایران، معروفی‌زاده و همکاران (۲۰۱۴) خصوصیات روانسنجی این مقیاس را در جامعه ایرانی ارزیابی و مورد تأیید قرار دادند. این محققین نشان دادند که این مقیاس دارای ساختاری دو عاملی است و ضریب آلفای کرونباخ آن برابر با ۰/۹۰ به دست آمد (معروفی‌زاده و همکاران، ۲۰۱۴).

مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس^۶: این مقیاس ۲۱ آیتمی توسط لوی بوند^۷ و لوی بوند (۱۹۹۵) طراحی شده و افسردگی (۷ آیتم)، اضطراب (۷ آیتم) و استرس (۷ آیتم) را اندازه‌گیری می‌کند. در این مطالعه نمره کلی این مقیاس برای ارزیابی خلق منفی که می‌تواند شامل افسردگی، اضطراب و استرس باشد، مورد استفاده قرار گرفت. در این مقیاس، هر آزمودنی به هر سؤال از صفر (اصلاً) تا ۳ (کاملاً درست) پاسخ می‌دهد. لوی و لوی بوند (۱۹۹۵) آلفای کرونباخ افسردگی، اضطراب و استرس را به ترتیب ۰/۸۱، ۰/۷۳، و ۰/۸۱ گزارش کردند. اصغری و همکاران (۲۰۰۸) ساختار عاملی نسخه فارسی این مقیاس را با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی مورد تأیید قرار دادند، و آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه و عامل‌های افسردگی، اضطراب و استرس را به ترتیب ۰/۹۴، ۰/۸۵، ۰/۸۵، و ۰/۸۷ گزارش کردند. مقیاس خودکارآمدی: این مقیاس برای ارزیابی خودکارآمدی درک شده یا سطح انتظار عمومی بسته به قابلیت‌های فردی برای رفتارهای بیماران

1. Depression, Anxiety and Stress Scale- (DASS)

2. Lovibond & Lovibond

درد در پیشآزمون و پسآزمون در گروههای میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای استرس آزمایش و کنترل در جدول ۲ ارائه شده است.

جدول ۲. استرس ادراکشده، خلق منفی، خودکارآمدی و ادراک ادراکشده، خلق منفی، خودکارآمدی و ادراک

گروههای آزمایش و کنترل

متغیر	گروه	میانگین	انحراف استاندارد
استرس ادراکشده	گروه آزمایش	پیشآزمون	پسآزمون
خلق منفی	گروه آزمایش	۲۸/۴۴	۲۰/۱۸
خودکارآمدی	گروه آزمایش	۴۵/۲۵	۲۰/۱۲
ادراک درد	گروه آزمایش	۲۹/۳۰	۰/۶۹
گروه کنترل	گروه کنترل	۳۰/۳۰	۰/۷۰
ادراکشده	گروه آزمایش	۲۵/۶۰	۶/۵۰
خلق منفی	گروه آزمایش	۲۷/۸۲	۹/۷۸
خودکارآمدی	گروه آزمایش	۲۸/۸۰	۸/۸۹
گروه کنترل	گروه کنترل	۲۸/۱۰	۵/۶۷
خودکارآمدی	گروه آزمایش	۴۵/۲۵	۱۳/۷۰
ادراک درد	گروه آزمایش	۴۹/۳۰	۱۱/۲۰
گروه کنترل	گروه کنترل	۳۰/۳۰	۰/۸۰

متغیرهای پژوهش نشان‌دهنده نرمال‌بودن توزیع این متغیرها بود. از پیشفرضهای انجام تحلیل کوواریانس تساوی کوواریانس‌ها است. این پیش فرض از طریق آزمون باکس مورد بررسی قرار گرفت. جدول ۴ نتایج حاصل از آزمون باکس در مورد همسانی کوواریانس‌های استرس ادراکشده، خلق منفی، خودکارآمدی و ادراک درد را نشان می‌دهد. همان‌طور که در جدول ۴ مشاهده می‌گردد نتایج غیر معنی‌دار نشان‌دهنده پیش فرض تساوی کوواریانسها در تمامی متغیرهای وابسته بود ($p < 0.05$) به عبارت دیگر کوواریانسها یا

مطابق جدول ۱ میانگین نمرات گروه آزمایش در پسآزمون نسبت به پیشآزمون در متغیرهای استرس ادراکشده، خلق منفی، و ادراک درد کاهش یافت و میانگین نمرات خودکارآمدی افزایش یافت. اما میانگین نمرات این متغیرها در گروه کنترل در پسآزمون در مقایسه با پیشآزمون تغییرات چندانی نداشت.

برای بررسی نرمال‌بودن داده‌ها از آزمون کولموگروف - اسپیرنوف استفاده شد که نتایج آن در جدول ۳ نشان داده شده است. نتایج غیر معنی‌دار آزمون کولموگروف - اسپیرنوف برای

پاکنهاد و صفاری‌نیا: اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر استرس ادراک‌شده، خلق منفی، خودکارآمدی و ...

این پیش‌فرض با استفاده از آزمون لوین انجام شد و نتایج آن در جدول ۴ نشان از نتایج غیر معنادار آزمون لوین برای متغیرهای پژوهش بود که نشان‌دهنده همگنی واریانس‌های این متغیرها بود. نتایج تحلیل کوواریانس در جداول ۵ و ۶ نشان داده شده است.

روابط بین متغیرهای وابسته، در جامعه برابر است و بنابراین امکان استفاده از شیوه تحلیل کوواریانس وجود دارد. همچنین پیش‌فرض دیگر اجرای تحلیل کوواریانس، همگنی واریانس است.

جدول ۳. نتایج حاصل از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف

متغیرهای پژوهش	استرس لرکشله	خلق منفی	خودکارآمدی	ادراک درد
کولموگروف-اسمیرنوف	۰/۲۵	۰/۲۳	۰/۶۵	۰/۴۰
سطح معنی‌داری	۰/۲۰	۰/۱۷	۰/۲۴	۰/۱۹

جدول ۴. نتایج حاصل از آزمون باکس در مورد همسانی کوواریانس‌های متغیرهای وابسته در گروه آزمایش و کنترل

متغیر	M	F	سطح معنی‌داری
استرس لرکشله	۳/۴۰	۲/۲۰	۰/۲۲
خلق منفی	۴/۳۰	۳/۳۷	۰/۵۵
خودکارآمدی	۲/۱۱	۲/۰۹	۰/۷۰
ادراک درد	۲/۱۵	۲/۳۰	۰/۷۶

جدول ۵. نتایج آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانس نمرات درون گروهی آزمودنی‌ها

متغیرها	F	سطح معنی‌داری
استرس لرکشله	۱/۹۰	۰/۳۲
خلق منفی	۲/۷۰	۰/۴۲
خودکارآمدی	۵/۹۰	۰/۷۰
ادراک درد	۲/۱۲	۰/۳۹

چندمتغیری حاکی از آن است که تفاوت معنی‌داری بین گروه آزمایش و کنترل در نمرات پس‌آزمون وجود دارد ($F=20/25$, $p<0.001$). و مجازور اتا نیز نشان می‌دهد که ۷۵ درصد واریانس نمرات دو گروه مربوط به عضویت گروهی است.

نتایج آزمون‌های تحلیل کوواریانس چند متغیری با وارد کردن نمرات پیش‌آزمون به عنوان متغیر کنترل در جدول ۶ آمده است. همان‌گونه که مشاهده می‌شود نتایج آزمون لامبدا به عنوان رایج‌ترین آزمون مورد نظر در تحلیل کوواریانس

جدول ۶. خلاصه نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری مربوط به تفاوت بین گروه آزمایش و کنترل

آزمونها	لامبادای ویلکز	مقدار	F	معنی‌داری	تجزیه اتا	توان آماری
		۰/۶۲	۲۰/۲۵	۰/۰۰۱*	۰/۷۵	۰/۸۹

جدول ۷. نتایج تحلیل‌های کوواریانس برای بررسی اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر استرس لراکشله، خلق منفی، خودکارآمدی و ادرارک درد بعد از کنترل اثر پیش‌آزمون

متغیرهای وابسته	مجموع	درجه	میانگین	F	معنی‌داری	تجزیه اتا	تجزیه اثر	اندازه
استرس	۳۹/۳۷۸	۲	۱۵۲/۱۰	۲۰/۷۸	۰/۰۰۱*	۰/۸۰	۰/۹۵	
ادرارک شده	۳۷۰/۷۹	۲	۹۵/۶۵	۲۲/۵۵	۰/۰۰۱*	۰/۸۵	۰/۹۲	
پس‌آزمون	۵۲۱/۳۰	۲	۲۰۰/۱۰	۲۹/۰۹	۰/۰۰۱*	۰/۹۲	۰/۹۸	
ادرارک درد	۲۹۸/۳۵	۲	۹۹/۰۱	۲۴/۳۰	۰/۰۰۱*	۰/۸۹	۰/۹۶	

* $p<0.001$

کنترل نمرات پیش‌آزمون متغیرها، میزان استرس لراکشله، خلق منفی و ادرارک درد در گروه آزمایش در پس‌آزمون و بعد از مداخله نسبت به گروه کنترل کاهش معناداری نشان داد و میزان نمرات خودکارآمدی افزایش یافت. بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده فرضیه این تحقیق مورد تأیید قرار گرفت. به عبارت دیگر کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی باعث کاهش استرس ادرارک شده، خلق منفی و ادرارک درد و افزایش خودکارآمدی

جدول ۷ تفاوت بین گروه آزمایش و کنترل را در استرس لراکشله، خلق منفی، خودکارآمدی و ادرارک درد در پس‌آزمون نشان می‌دهد. همان‌طور که مشاهده می‌شود بین دو گروه در نمرات پس‌آزمون استرس ادرارک شده ($F=20/78$, $p<0.001$) خلق منفی ($F=22/55$, $p<0.001$) و ادرارک خودکارآمدی ($F=29/09$, $p<0.001$) تفاوت معنی‌داری درد ($F=30/24$, $p<0.001$) وجود دارد. به عبارت دیگر، در اینجا نیز با وجود

پاکنهاد و صفاری‌نیا: اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر استرس ادراک‌شده، خلق منفی، خودکارآمدی و ...

اسکلروزیس، فیبرومیالژیا، دردهای مزمن عضلانی اسکلتی، دیابت، لوسیمی، اختلال ملال پیش از قاعده‌گی، فشار خون بالا، دردهای مزمن عضلانی اسکلتی، و افراد وابسته به مواد انجام شده‌اند، همخوان بود.

برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی در مطالعه حاضر کاهش دهنده استرس ادراک‌شده در بیماران مبتلا به آرتربیت روماتوئید بود. عموماً افرادی که ادراک منفی از استرس دارند، مسائل را به صورت منفی برداشت می‌کنند، لذا به تدریج محتوای این افکار و مفاهیم به واقعیت تبدیل می‌شوند؛ بنابراین آگاهی خود را نسبت به زمان از دست داده و همیشه در نگرانی و استرس به سر می‌برند. کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی با آموزش تکنیکهای شناختی نظری غیر قضاوتی بودن به افراد آموزش می‌دهد که افکار و احساس خود را بدون قضاوت قبول کنند؛ این نوع تفکر مانع از ایجاد افکار منفی می‌شود. مشاهده بدون قضاوت درباره افکار مرتبط با استرس ممکن است منجر به فهم و درک این نکته گردد که اینها فقط فکر هستند و نمایانگر حقیقت یا واقعیت نیستند و لزوماً نباید باعث فرار یا رفتار اجتنابی شوند. آموزش ذهن‌آگاهی یکی از درمان‌های کاهش استرس می‌باشد که در آن بازنمایی ذهنی اشیاء موجود در زندگی که از کنترل بلافضلله انسان خارج است، از طریق تنفس و فکر کردن آموزش داده می‌شود (کابات زین^۱، ۲۰۰۵). ذهن‌آگاهی نه تنها به وسیله تسهیل ارزیابی فرایند مثبت باعث کاهش نتایج زیان بار ناشی از شرایط استرس‌زا می‌شود بلکه همچنین

در بیماران مبتلا به آرتربیت روماتوئید شد.

نتیجه‌گیری و بحث

هدف از این مطالعه بررسی اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر استرس ادراک‌شده، خلق منفی، خودکارآمدی و ادراک درد در بیماران مبتلا به آرتربیت روماتوئید بود. نتایج این مطالعه نشان داد که درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی توانست باعث کاهش استرس لرکشله، خلق منفی و ادراک درد و همچنین افزایش خودکارآمدی در بیماران مبتلا به آرتربیت روماتوئید شود. نتایج این مطالعه با نتایج مطالعاتی که اثر بخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی درمان‌های کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی یا درمانهای ذهن‌آگاهانه را بر افزایش خودکارآمدی (یوسفی و کریمی‌پور، ۱۳۹۷؛ صنایعی و همکاران، ۱۳۹۶؛ صدری دمیرچی و همکاران، ۱۳۹۷)، کاهش استرس ادراک‌شده (حسروی و قربانی، ۱۳۹۵؛ سبحانی و همکاران، ۱۳۹۸؛ رضوی‌زاده تبادکان و همکاران، ۱۳۹۷؛ صنایعی و همکاران، ۱۳۹۶)، کاهش خلق منفی (میرزایی و شعیری، ۱۳۹۶؛ سبحانی و همکاران، ۱۳۹۸؛ فرهادی و پستدیده، ۱۳۹۶؛ دهستانی، ۱۳۹۴)، و کاهش شدت و ادراک درد (روزنزویگ و همکاران، ۲۰۱۰؛ پیرنیا و همکاران، ۱۳۹۶؛ داوودی و نسیمی‌فر، ۱۳۹۱؛ باقری و سجادیان، ۱۳۹۶؛ زارع و همکاران، ۱۳۹۳؛ نسیمی‌فر و همکاران، ۱۳۹۰؛ ترکش دوز و ثناگوی محرر، ۱۳۹۸) در دانش‌آموزان، دانشجویان، جانbazان، والدین دارای کودکان معلول جسمی- حرکتی، بیماران مبتلا به سرطان، مولتیپل

منفی در بیماران مبتلا به آرتربیت روماتوئید شود. در تبیین این یافته می‌توان گفت که در برنامه‌های کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی با افزایش آگاهی افراد نسبت به لحظه حال، از طریق فنونی مانند مراقبه‌ها نظری توجه به تنفس بدن و معطوف کردن آگاهی به اینجا و اکنون بر کنترل بدن و به تع آن کنترل ذهن و همین طور بر کاهش خلق منفی نظری استرس، اضطراب و افسردگی اثرگذار است. قضاوت و پیش داوری موجود در افراد با ذهن آگاهی پایین در بسیاری شرایط موجب ایجاد تنش، استرس و نارامی در افراد شده و این امر باعث افزایش هیجانات منفی و استرس در افراد می‌شود. در افراد ذهن آگاه، حالت‌های هیجانی صریح و ضمنی با یکدیگر تطابق بیشتری دارند و آگاهی افزایش یافته از عواطف، به نوبه خود افراد را قادر می‌سازد تا پاسخ خود را به محرکات منفی تعديل سازند (اورتنر، کیلنر و زلazo^۳). پژوهش‌ها نشان می‌دهد افراد ذهن آگاه، سطح پایینتری از عواطف ناخوشایند را هم از نظر شدت و هم از نظر فراوانی تجربه می‌کنند و در افرادی که در جلسات مداخلات مبتنی بر ذهن آگاهی شرکت کردن نسبت به افراد گروه کنترل، حالت و صفات اضطراب و احساس درماندگی روان شناختی کاهش یافته است (آرج و کراسک^۴. ذهن آگاهی با افزایش احساس پذیرش در بیماران، به آنها کمک می‌کند تجربه بیماری خود را همان گونه که هست، پذیرند و با وجود ابتلا به بیماری، همچنان عملکرد و کارایی خود را در بهترین وضعیت ممکن حفظ کنند

از طریق عادت زدایی استفاده از راهبردهای مقابله‌ای نامناسب باعث کاهش مشکلات مربوط به شرایط استرس‌زا می‌شود. ذهن آگاهی از طریق ترکیب سر زندگی و واضح دیدن تجربیات، می‌تواند تغییرات مثبتی را در شادکامی و بهزیستی ایجاد نماید (اسمیت، شلی، دلن، ویگینز، تولی و برنارد^۱). افزایش ذهن آگاهی منجر به کاهش معنادار آشفتگی‌های روان‌شناختی و استرس می‌شود (کارمودی و بائیر^۲). می‌توان گفت که استرس افراد مبتلا به آرتربیت روماتوئید بیشتر جنبه ذهنی و شناختی دارد. ولی در روش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی فرد بیمار می‌آموزد با تکنیک‌هایی که مربوط به تجربه کردن لحظه حال است، به طور موقت از نگرش و باورهای خود که ریشه در گذشته دارد و متأثر از ترس‌ها و نگرانی‌های آینده است، رها شود و همچنین به واسطه این درمان این نگرش در آنها به وجود می‌آید که به تمامی امور اعم از خوشایند و ناخوشایند، پذیرش بدون داوری و قضاوت داشته باشند و در نتیجه اتخاذ چنین تدبیری برای فرد مبتلا که احساسات دردناکی مانند نامیدی، درماندگی و غمگینی را تجربه می‌کند، سودمند است و در نتیجه استرس لراکسله وی کاهش می‌یابد. بنابران می‌توان گفت که استفاده از روش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی، با کاهش استرس ادراک شده و الگوی معیوب تفکر بیماران مبتلا به آرتربیت روماتوئید همراه است.

نتایج این مطالعه نشان داد که کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی توانست باعث کاهش خلق

3. Ortner, Kilner & Zelazo
4. Arch & Craske

1. Smith, Shelley, Dalen, Wiggins, Tooley & Bernard
2. Carmody & Baer

پاکنهاد و صفاری‌نیا: اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر استرس ادراک‌شده، خلق منفی، خودکارآمدی و ...

(۲۰۱۲). آموزش ذهن‌آگاهی بر افسردگی، اضطراب و ناسازگاری روان‌شناختی تأثیر دارد (بائز، ۲۰۰۳) و در کاهش فشار روانی، درد مزمن، پیشگیری از عود افسردگی و اضطراب فرآگیر اثرگذار است (Bohlmeijer, Prenger, Taal & Cuijpers^۷, ۲۰۱۰). مداخله کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی به افراد کمک می‌کند تا با مشاهده تجارب ناخوشایند به شیوه‌های غیر قضاوتی، عاطفه منفی خود را کنترل کنند (وینکی، پلتیر، شاه، کینساول، والدو، مک وی و کاپلند^۸, ۲۰۱۴).

در این مطالعه، برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی باعث افزایش خودکارآمدی در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید شد. در برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی توانایی دیدن افکار به عنوان افکار به صورت مستقل و بی‌طرفانه انجام می‌شود، اما آگاهی کلی از طریق تمرین منظم و مکرر در آموزش ذهن‌آگاهی کسب می‌شود که باعث افزایش خودکارآمدی در افراد می‌شود. در این روش، تمرکز بر تنفس که یکی از تکنیک‌های آن می‌باشد، می‌تواند به عنوان یک مرکز تکیه گاه عمل کند که برای بازگشت آگاهی به زمان حاضر آموزش داده می‌شود و محتواهای منحرف شدن در واقعیت را که از طریق جریانات فکری که ما اغلب در آنها غرق هستیم، کاهش می‌دهد. همچنین مشاهده فرآگیر افکار ما را قادر می‌سازد تا الگوهای مشابه فکری را به صورت افکار و نه اینکه ضرورتاً خود واقعیت‌اند، در نظر بگیریم. این موارد موجب می‌شود که بیماران، کنترل بیشتری بر افکار خود

(Kabat-Zinn, ۲۰۱۱). مطالعات مختلفی نشان داده‌اند ذهن‌آگاهی همچنین توانایی اشخاص برای کنار آمدن با استرس‌های زندگی روزمره را بهبود می‌بخشد (چنگ، پالش، کالدول، گلاسگو، آبراماسون و لاسکین^۹, ۲۰۰۴؛ شاپیرو^{۱۰}، براون و بیگل، ۲۰۰۷).

روش مداخله کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی از طریق تمرین‌های مراقبه منظم باعث بالا رفتن هوشیاری لحظه به لحظه فرد نسبت به احساسات و عواطف معطوف به جسم خود می‌شود و از این طریق آنها یاد می‌گیرند که با آگاهی و هوشیار شدن به افکار هیجانی منفی خود، این نوع افکار به صورت غیر قضاوتی پذیرا و همراه با آرامش بیان کنند. این روش در ایجاد، حفظ و ارتقای سبک‌های مقابله با بیماری، کاهش استرس، اختلال‌های خلقی و حتی بهبود عملکرد سیستم ایمنی بدن به بیماران کمک می‌کند (كارلسون^{۱۱}، اسپیکا، پاتل و گودی، ۲۰۰۳). از طریق ذهن‌آگاهی بیمار از احساس‌های اضطراب و استرس در بدن خود و علل بروز آنها آگاهی پیدا کرده و افکار مغشوش مرتبط با این احساسات را کشف و مجرماً می‌کند. همچنین او یاد می‌گیرد که چگونه به وسیله خودگویی با این مشکلات کنار بیاید (فالتون^{۱۲}، گرمر و سیگل، ۲۰۰۵). مراقبه ذهن‌آگاهی خلق را بهبود می‌بخشد و آموزش کوتاه‌مدت آن خستگی و اضطراب را کاهش می‌دهد (کرامر، لاچه و دبوس^{۱۳}،

1. Kabat-Zinn

2. Chang, Palesh, Caldwell, Glasgow, Abramson & Luskin,

3. Shapiro, Brown & Biegel

4. Carlson, Specia, Patel & Goodey

5. Fulton, Germer & Siegel

6. Cramer, Lauche, Paul & Dobos

7. Bohlmeijer, Prenger, Taal & Cuijpers

8. Vinci, Peltier, Shah, Kinsaul, Waldo, McVay & Copeland

حوادث استرس‌زا و افزایش توانایی آنها در کنترل زندگی، به افراد کمک می‌نمایند. شوتز، ریس، پریس و شوتز^۳ (۲۰۱۰) معتقدند که پایین‌بودن ذهن‌آگاهی در افراد باعث فاجعه آمیز کردن درد می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد که تمایل به درگیر شدن در فرایندهای پردازشی خودکار به جای فرایندهای مبتنی بر ذهن‌آگاهی به همراه توجه بدون انعطاف و عدم آگاهی نسبت به لحظه کنونی باعث می‌شود که افراد به طور فزاینده‌ای به درد فکر کرده و در مورد آن دست به نشخوار فکری بزنند و در نتیجه شدت خطر ناشی از آن را بیشتر ارزیابی می‌کنند. بنابراین ممکن است که حالت بدون قضاوت و بدون ارزیابی موجود در ذهن‌آگاهی بتواند از آغاز شدن فراینده ارزیابی کننده شدت درد جلوگیری کرده و با قطع و یا کاهش الگوهای ناکارآمد در مواجهه با تجربیات مختلف باعث کاهش شدت ادراک درد شود. بنابراین، برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی با استفاده از روش‌های ذهن‌آگاهانه می‌تواند باعث کاهش استرس و افزایش ذهن‌آگاهی در افراد مبتلا به آرتربیت روماتوئید و متعاقب آن کاهش ادراک در در بیماران گردد. کابات زین (۲۰۰۳) معتقد است که مشاهده خالی از قضاوت در ذهن‌آگاهی می‌تواند پاسخ‌های هیجانی را که به وسیله درد فراخوانی شده‌اند کاهش دهد. بنابراین تمرین مهارت ذهن‌آگاهی، توانایی مراجعت را برای تحمل حالت‌های هیجانی منفی افزایش داده و متعاقب آن شدت ادراک درد را کاهش می‌دهد.

این مطالعه با محدودیت‌هایی همراه است.

داشته و خودکارآمدی بیشتری داشته باشد (استافورد، توماس، فولی، جاد، گیسون، کامیتی و کیرا پولوس^۱، ۲۰۱۵). آموزش ذهن‌آگاهی باعث می‌شود که فرد از غوطه ورشدن در گذشته دست بردارد و کمتر به بیماری خود به صورت منفی فکر کند و از قضاوت منفی در مورد بیماری خود اجتناب نماید. ذهن‌آگاهی، ارزیابی افراد از واقع مختلف را تغییر می‌دهد و باعث می‌شود که آنان قضاوت‌های منفی در مورد خودشان و بیماریشان را کنار گذشته و بتوانند به طور مؤثر با افراد، رویدادها و شرایط استرس‌زا محیط مواجه شوند. کنارگذاشتن قضاوت‌های منفی در مورد بیماری خود و مواجهه مؤثر با مشکلات و افزایش خودکنترلی می‌تواند افزایش خودکارآمدی را در پی داشته باشد.

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی باعث کاهش ادراک درد در بیماران مبتلا به آرتربیت روماتوئید شد. اگرچه ممکن است عوامل رفتاری و روانشناختی در شروع درد نقش چندان بارزی نداشته باشند، اما این عوامل در استمرار درد و ناتوانی ناشی از آن نقش قاطعی ایفا می‌کنند (فوستر، توماس، بیشپ، دان و مین^۲، ۲۰۱۰). هسته برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی و کاربردهای آن عدم تمایل به همکاری در پژوهش و بیشتر از دو جلسه غیبت در جلسات آموزشی بر زندگی روزانه و مقابله با استرس، بیماری و درد مرکز است (روزنزویگ و همکاران، ۲۰۱۰). این درمان با تغییر ادراک افراد از

1. Stafford, Thomas, Foley, Judd, Gibson, Komiti & Kiropoulos

2. Foster, Thomas, Bishop, Dunn & Main

پاکنهاد و صفاری‌نیا: اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر استرس ادراک‌شده، خلق منفی، خودکارآمدی و ...

مبتنی بر ذهن‌آگاهی می‌تواند بر متغیرهای روانشناختی نظری کاهش استرس ادراک‌شده، خلق منفی و کاهش ادراک درد و همچنین افزایش خودکارآمدی مؤثر باشد و این درمان می‌تواند به عنوان درمان روانشناختی مؤثری در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید باشد.

سپاسگزاری

در پایان از تمامی شرکت‌کنندگان که وقت خود را در اختیار پژوهش قرار دادند، تقدیر و تشکر می‌گردد.

نخست این که استفاده از پرسشنامه‌های خود گزارش‌دهی می‌تواند باعث سوگیری پاسخ در شرکت‌کنندگان شود. دوم اینکه، نتایج این مطالعه فقط قابل تعمیم به افراد مبتلا به آرتریت روماتوئید می‌باشد و قابل تعمیم به دیگر گروه‌های مبتلا به دردهای مزمن عضلانی اسکلتی نمی‌باشد. سوم اینکه مطالعه حاضر به دلیل عدم دسترسی دوباره به بیماران، دارای دوره پیگیری نبود و در مورد ماندگاری تغییرات نمی‌توان نظر داد. بنابراین، مطالعات آینده باید یک دوره پیگیری را به مطالعه خود اضافه کنند. صرفنظر از این محدودیت‌ها، مطالعه حاضر نشان داد که برنامه کاهش استرس

ترکش دوز، شیرین؛ ثناگوی محرر، غلامرضا. (۱۳۹۸). اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر فاجعه پنداری و ادراک درد نوجوانان مبتلا به لوسومی. سلامت اجتماعی، ۶(۳): ۳۱۳-۳۰۵.

تكلوی، سمهیه؛ عظیمی صدیق، وحیده. (۱۳۹۷). مقایسه ادراک درد و ناگویی خلقی در بیماران آرتریت روماتوئید، تب فامیلی مدیرانه‌ای و افراد سالم. فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی، ۱۲(۲): ۵۲-۴۰.

حمزه‌پور حقیقی، طاهره؛ دوستی، یا رعلی؛ میرزائیان، بهرام؛ فخری، محمد کاظم. (۱۳۹۴). اثربخشی درمان شناختی رفتاری به شیوه گروهی بر ادراک بیماری و ادراک درد در بیماران مبتلای آرتریت روماتوئید. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، ۲۰: ۵۷-۴۵.

خسروی، الهه؛ قربانی، مریم. (۱۳۹۵). اثربخشی ذهن‌آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر استرس ادراک‌شده و فشار خون زنان مبتلای فشار خون بالا. فیض، ۲۰(۴): ۳۶۸-۳۶۱.

منابع

- اصغرنژاد، طاهره؛ احمدی ده قطب الدینی، محمد؛ فرزاد، ولی ا... و خدابنایی، محمدکریم. (۱۳۸۵). مطالعه ویژگیهای روانسنجی مقیاس خودکارآمدی عمومی شرر. مجله روانشناسی، ۱۰(۳): ۲۷۴-۲۶۲.

باقری، سودابه؛ سجادیان، ایلاناز. (۱۳۹۶). کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی و ادراک درد در دانشجویان مبتلای احتلال ملال پیش از قاعده‌گی. روانشناسی معاصر، ۱۲: ۲۹۷-۲۹۱.

پیرنیا، بیژن؛ تیموری، مریم؛ رحمانی، سهیلا. (۱۳۹۶). اثر بخشی برنامه درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر کاهش درد در بیماران مرد در حال بهبودی در فاز سم زدایی مورفین، یک کارآزمایی کنترل شده تصادفی. مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت، ۴(۲): ۷۱-۵۸.

صنایعی، هاله؛ موسوی، سید علی محمد؛ مردادی، علیرضا؛ پرهون، هادی؛ صنایعی، سولماز. (۱۳۹۶). اثر بخشی درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر خودکارآمدی، استرس ادراک شده و جهت‌گیری به زندگی زنان مبتلا به سلطان پستان. *اندیشه و رفتار*، ۱۱(۲۴): ۶۶-۵۷.

عیید رحمانی، آرام؛ قربان شیروانی، شهره؛ خلعتبری، جوده؛ حاجی عباسی، اصغر. (۱۳۹۱). بررسی افسردگی و اضطراب در بیماران دچار آرتریت روماتوئید. *مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان*، ۲۲(۸۵): ۲۲-۱۵.

فرهادی، مریم؛ پستدیده، محمد مهدی. (۱۳۹۶). اثر بخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش استرس، اضطراب و افسردگی و افزایش خودکارآمدی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس. *روانشناسی بالینی و شخصیت*، ۱۵(۲): ۱۵-۷.

میرزاچی، الهام؛ شعیری، محمدرضا. (۱۳۹۶). بررسی اثر بخشی الگوی درمانی کاهش استرس بر اساس ذهن آگاهی بر عواطف مثبت و منفی و نشانگان افسردگی. *مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد*، ۶۱(۱): ۸۷۶-۸۶۴.

نسیمی فر، نجمه؛ داودی، ایران؛ حیدری، علیرضا. (۱۳۹۰). اثر بخشی روش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود درد و راهبرد مقابله فاجعه‌آفرینی در زنان مبتلا به دردهای مزمن عضلانی اسکلتی. *روانشناسی سلامت*.

هرامی راد، مینو؛ راضی، زهره. (۱۳۹۷). پیش‌بینی پذیرش درد، بر اساس استرس‌لرکسله و راهبردهای مقابله‌ای در افراد مبتلا به بیماری آرتریت روماتوئید. *فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی سلامت*، ۷(۴): ۱۶۶-۱۵۱.

داودی، ایران؛ نسیمی فر، نجمه. (۱۳۹۱). اثربخشی روش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود درد و راهبرد مقابله فاجعه‌آفرینی در زنان مبتلا به دردهای مزمن عضلانی اسکلتی. *یافته‌های نو در روانشناسی*، ۷(۲۲): ۶۲-۴۵.

دهستانی، مهدی. (۱۳۹۴). اثر بخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر افسردگی، اضطراب و افسردگی دانش‌آموزان دختر. *اندیشه و رفتار*، ۹(۳۷): ۴۶-۳۷.

رضوی‌زاده تبادکان، بی‌بی زهره؛ جاجرمی، محمود؛ وکیلی، یعقوب. (۱۳۹۷). اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر استرس لرکسله، نشخوار فکری و دشواری تنظیم هیجانی زنان مبتلا به دیابت نوع ۲ (پیگیری ۳ ماهه). *مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران*، ۲۴(۴): ۳۸۳-۳۷۰.

زارع، حسین؛ محمدی، نرگس؛ متقی، پیمان؛ افشار، حمید؛ پور کاظم، لیلا. (۱۳۹۳). تأثیر درمان تعديل شده شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر فاجعه پنداری، پذیرش و شدت درد بیماران مبتلا به فیبرومیالژیا. *روانشناسی سلامت*، ۳(۴): ۱۱۵-۹۷.

سبحانی، الهه؛ باباخانی، نرگس؛ آل بویه، محمود رضا. (۱۳۹۸). اثر بخشی درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر افسردگی، اضطراب، استرس و ادراک کاهش درد در زنان مبتلا به کمردردهای مزمن پس از زایمان. *مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران*، ۲۵(۳): ۲۷۷-۲۶۶.

صدری دمیرچی، اسماعیل؛ محمدی، نسیم؛ بدل پور، زینب. (۱۳۹۷). اثر بخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر خودکارآمدی و رضایت از زندگی جانبازان. *فصلنامه روانشناسی نظامی*، ۸(۳۲): ۴۱-۳۱.

والدین کودکان معلول جسمی - حرکتی.
فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دانشگاه
علمی طباطبایی، ۳۰(۸): ۱۲۲-۱۱۳.

یوسفی، ناصر؛ کریمی‌پور، بنت الهدا. (۱۳۹۷).
اثربخشی آموزش برنامه کاهش استرس مبتنی
بر ذهن‌آگاهی بر خودکارآمدی و تحمل ناکامی

Arch, J. J., & Craske, M. G. (2006). Mechanisms of mindfulness: Emotion regulation following a focused breathing induction. *Behaviour research and therapy*, 44(12), 1849-1858.

Asghari, A., Saed, F., & Dibajnia, P. (2008). Psychometric properties of the Depression Anxiety Stress Scales-21 (DASS-21) in a non-clinical Iranian sample. *Int J psychol*, 2(2), 82-102.

Baer, R. A. (2003). Mindfulness training as a clinical intervention: A conceptual and empirical review. *Clinical psychology: Science and Practice*, 10(2), 125-143.

Baer, R. A., Smith, G. T., Hopkins, J., Krietemeyer, J., & Toney, L. (2006). Using self-report assessment methods to explore facets of mindfulness. *Assessment*, 13(1), 27-45.

Bohlmeijer, E., Prenger, R., Taal, E., & Cuijpers, P. (2010). The effects of mindfulness-based stress reduction therapy on mental health of adults with a chronic medical disease: a meta-analysis. *Journal of Psychosomatic Research*, 68(6), 539-544.

Carlson, L. E., Speca, M., Patel, K. D., & Goodey, E. (2003). Mindfulness-based stress reduction in relation to quality of life, mood, symptoms of stress, and immune parameters in breast and prostate cancer outpatients. *Psychosomatic Medicine*, 65(4), 571-581.

Carmody, J., & Baer, R. A. (2008). Relationships between mindfulness practice and levels of mindfulness, medical and psychological symptoms and well-being in a mindfulness-based stress reduction program. *Journal of Behavioral Medicine*, 31(1), 23-33.

Chang, V. Y., Palesh, O., Caldwell, R., Glasgow, N., Abramson, M., Luskin, F., ... & Koopman, C. (2004). The effects of a mindfulness based stress reduction program on stress, mindfulness self efficacy, and positive states of mind. *Stress and Health: Journal of the International Society for the Investigation of Stress*, 20(3), 141-147.

Cohen, S., Kamarck, T., & Mermelstein, R. (1983). A global measure of perceived stress. *Journal of health and social behavior*, 385-396.

Cramer, H., Lauche, R., Paul, A., & Dobos, G. (2012). Mindfulness-based stress reduction for breast cancer-a systematic review and meta-analysis. *Current Oncology*, 19(5), e343.

Dhanani, S., Quenneville, J., Perron, M., Abdolell, M., & Feldman, B. M. (2002). Minimal difference in pain associated with change in quality of life in children with rheumatic disease. *Arthritis Care & Research*, 47(5), 501-505.

Firestein, G. S., Budd, R., Gabriel, S. E., McInnes, I. B., & O'Dell, J. R. (2012). *Kelley's Textbook of Rheumatology* E-Book. Elsevier Health Sciences.

- Foster, N. E., Thomas, E., Bishop, A., Dunn, K. M., & Main, C. J. (2010). Distinctiveness of psychological obstacles to recovery in low back pain patients in primary care. *PAIN®*, 148(3), 398-406.
- Fulton, P., Germer, C., & Siegel, R. (2005). *Mindfulness and Psychotherapy*. New York: Guilford Press.
- Galhardo, A., Cunha, M., & Pinto Gouveia, J. (2013). Measuring self efficacy to deal with infertility: Psychometric properties and confirmatory factor analysis of the portuguese version of the infertility self efficacy scale. *Research in Nursing & Health*, 36(1), 65-74.
- Gill, N. P., Bos, E. H., Wit, E. C., & de Jonge, P. (2017). The association between positive and negative affect at the inter-and intra-individual level. *Personality and Individual Differences*, 105, 252-256.
- Kabat-Zinn J. (2005). *Coming to our senses: Healing ourselves and the world through mindfulness*. New York: Hyperion.
- Kabat-Zinn, J. (2011). Some reflections on the origins of MBSR, skillful means, and the trouble with maps. *Contemporary Buddhism*, 12(1), 281-306.
- Kabat-Zinn. (2003). Mindfulness-based interventions in context: Past, present, and future. *Clinical Psychology: Science and Practice*, 10, 144–156.
- Kang, Y. S., Choi, S. Y., & Ryu, E. (2009). The effectiveness of a stress coping program based on mindfulness meditation on the stress, anxiety, and depression experienced by nursing students in Korea. *Nurse Education Today*, 29(5), 538-543.
- Keng, S. L., Smoski, M. J., & Robins, C. J. (2011). Effects of mindfulness on psychological health: A review of empirical studies. *Clinical Psychology Review*, 31(6), 1041-1056.
- Kerns, R. D., Morley, S. J., & Vlaeyen, J. (2008). Psychological interventions for chronic pain.
- Lovibond, P. F., & Lovibond, S. H. (1995). The structure of negative emotional states: Comparison of the Depression Anxiety Stress Scales (DASS) with the Beck Depression and Anxiety Inventories. *Behaviour Research and Therapy*, 33(3), 335-343.
- Maroufizadeh, S., Zareiyan, A., & Sigari, N. (2014). Psychometric properties of the 14, 10 and 4-item “Perceived Stress Scale” among asthmatic patients in Iran. *Payesh (Health Monitor)*, 13(4), 457-465.
- Melzack, R. (1975). The McGill Pain Questionnaire: major properties and scoring methods. *Pain*, 1(3), 277-299.
- Melzack, R., & Wall, P. D. (2003). *Handbook of Pain Management: A Clinical Companion to Wall and Melzack's "Textbook of Pain"*. Churchill Livingstone.
- Ortner, C. N., Kilner, S. J., & Zelazo, P. D. (2007). Mindfulness meditation and reduced emotional interference on a cognitive task. *Motivation and Emotion*, 31(4), 271-283.
- Rezaei, F., Doost, H. T. N., Molavi, H., Abedi, M. R., & Karimifar, M. (2014). Depression and pain in patients with

- rheumatoid arthritis: Mediating role of illness perception. *The Egyptian Rheumatologist*, 36(2), 57-64.
- Rosenzweig, S., Greeson, J. M., Reibel, D. K., Green, J. S., Jasser, S. A., & Beasley, D. (2010). Mindfulness - based stress reduction for chronic pain conditions: Variation. *Journal of Psychosomatic Research* 68, 29–36.
- Schütze, R., Rees, C., Preece, M., & Schütze, M. (2010). Low mindfulness predicts pain catastrophizing in a fearavoidance model of chronic Pain.*PAIN*, 148, 120–127.
- Shapiro, S. L., Brown, K. W., & Biegel, G. M. (2007). Teaching self-care to caregivers: Effects of mindfulness-based stress reduction on the mental health of therapists in training. *Training and Education in Professional Psychology*, 1(2), 105.
- Sherer, M., Maddux, J. E., Mercandante, B., Prentice-Dunn, S., Jacobs, B., & Rogers, R.W. (1982). The Self Efficacy Scale: Construction and validation. *Psychological Reports*, 51, 663-671.
- Smith, B. W., Shelley, B. M., Dalen, J., Wiggins, K., Tooley, E., & Bernard, J. (2008). A pilot study comparing the effects of mindfulness-based and cognitive-behavioral stress reduction. *The Journal of Alternative and Complementary Medicine*, 14(3), 251-258.
- Stafford, L., Thomas, N., Foley, E., Judd, F., Gibson, P., Komiti, A. & Kiropoulos, L. (2015). Comparison of the acceptability and benefits of two mindfulness-based interventions in women with breast or gynecologic cancer: a pilot study. *Supportive Care in Cancer*, 23(4), 1063-1071.
- Tsay, S. L. (2003). Self efficacy training for patients with end stage renal disease. *Journal of Advanced Nursing*, 43(4), 370-375.
- Turk, D. C., & Gatchel, R. J. (2018). Psychological approaches to pain management: a practitioner's handbook. Guilford publications.
- Vinci, C., Peltier, M. R., Shah, S., Kinsaul, J., Waldo, K., McVay, M. A., & Copeland, A. L. (2014). Effects of a brief mindfulness intervention on negative affect and urge to drink among college student drinkers. *Behaviour Research and Therapy*, 59, 82-93.