

# بکارگیری مدل اعتقاد بهداشتی (Healthbelife Model) در اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان پستان در معلمین زن شهر بیرون جند و ارائه الگوی آموزشی مناسب

دکتر محمد رضامیری<sup>۱</sup>، میترا مودی<sup>۲</sup>، بی بی ندرگس معاشری<sup>۳</sup>، زهرا سورگی<sup>۴</sup>، جواد حامی<sup>۵</sup>

## چکیده

**مقدمه:** سرطان پستان شایع ترین سرطان زنان در اکثر کشورهای جهان محسوب می‌شود و مهمترین عامل مرگ‌ناشی از سرطان در زنان می‌باشد به طوری که از هر ۱۰۰ زن، ۶-۷ نفر به آن مبتلا می‌شوند. با توجه به اینکه یکی از بهترین مدل‌های مطالعه رفتار در آموزش بهداشت جهت پیشگیری و کنترل بیماری‌ها و بیوژه سرطان‌ها مدل اعتقاد بهداشتی (Health Belief Model) می‌باشد، لذا پژوهش حاضر با هدف بکارگیری مدل اعتقاد بهداشتی در اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان پستان در معلمین زن شهر بیرون جند در سال ۱۳۸۳ انجام گرفت.

**روش بررسی:** در این مطالعه مقطعی، ۲۸۰ معلم زن از ۴ مدرسه راهنمایی و ۴ دبیرستان دختران به طور تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه ساختاری براساس متغیرهای مدل اعتقاد بهداشتی (منافع درک شده، موافع درک شده، شدت درک شده، حساسیت درک شده، علایم برای عمل و رفتار) بود و نتایج توسط نرم افزار SPSS تحلیل گردید و از آزمون‌های  $\chi^2$  مستقل،  $X^2$  و ضربه همبستگی پیرسون استفاده گردید.

**یافته‌ها:** نتایج نشان می‌دهند که معلمین زن نسبت به سرطان پستان دارای حساسیت و شدت درک‌خوبی بوده و خود را در معرض خطر ابتلاء سرطان احساس می‌کنند. معلمین درخصوص علایم و عوارض سرطان پستان آگاهی متوسطی دارند و با افزایش سن از آگاهی معلمین نسبت به این مسئله کاسته شده است.

**نتیجه گیری:** دادن آموزش‌های لازم درخصوص خودآزمایی پستان به صورت آموزش‌های گروهی، برنامه‌های ضمن خدمت و بحث‌های گروهی به معلمین، علاوه بر بالا بردن اطلاعات آنها باعث آغاز سطح آگاهی، نگرش و توجه داشت آموزان دختر می‌گردد.

**کلید واژه‌ها:** سرطان پستان، مدل اعتقاد بهداشتی، معلمین زن

## مقدمه

امروره سرطان پستان یکی از شایع ترین علل مرگ و میر و مهم ترین عامل نگران کننده سلامتی زنان در جهان می‌باشد<sup>(۱)</sup>. این سرطان، شایع ترین سرطان شناخته شده در بین زنان آمریکایی

است و بعد از سرطان ریه دومین سرطانی است که باعث مرگ و میر در زنان می‌شود<sup>(۲،۳)</sup>. تخمین زده می‌شود که ۲۱۵۹۹۰ مورد جدید از سرطان مهاجم پستان و ۴۰۵۸۰ مورد مرگ ناشی از این سرطان در سال ۲۰۰۴ در این کشور اتفاق افتاده باشد<sup>(۳)</sup>.

۴- کارشناس بهداشت عمومی

۵- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرون جند

۱- استادیار دانشگاه علوم پزشکی بیرون جند

۲- کارشناس ارشد آموزش بهداشت

۳- عضو هیئت علمی دانشگاه بیرون جند

طرفی مطالعات نشان می دهد که آگاهی و نگرش، مهم ترین فاکتورها در پیش بینی و اتخاذ رفتار بهداشتی و موثر خود آزمایی پستان می باشد (۹،۱۰). بنابراین آنچه در مطالعات خود آزمایی پستان مهم است بررسی شخصیت افراد و فاکتورهای موثر در جهت اجرای این رفتار می باشد.


طرز تفکر و نگرش درباره یک بیماری عامل مهمی در انجام دادن و یا ندادن یک اقدام پیشگیرانه می باشد زیرا نگرش ها و تفکرات زیربنای رفتار و عمل می باشند (۱۱). بررسی آگاهی و نگرش آموزگاران زن در زمینه خودآزمایی پستان از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا که آنها قشری از زنان جامعه هستند که در ارتباط با تعلیم و تربیت جوانان و آینده سازان این مرز و بوم هستند و باید با آگاهی از روش های پیشگیری، در کمال سلامت به جامعه خود خدمت کنند و با نکات پیشگیری کننده آشنا باشند.

با توجه به اینکه سرطان پستان به عنوان یک مشکل بزرگ بهداشتی رویه افزایش است و با توجه به نقشی که خودآزمایی پستان در تشخیص زودرس این سرطان و مرگ و میر ناشی از آن دارد و از طرفی یکی از بهترین مدل هایی که در مطالعه رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان که کارایی خوبی دارد مدل اعتقاد بهداشتی می باشد (۱۲). پژوهش حاضر با هدف بکارگیری مدل اعتقاد بهداشتی در اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان پستان در معلمین شهر بیرجند انجام می گیرد.

این بیماری مهم ترین عامل مرگ و میر در بین زنان سنین ۳۵-۴۴ ساله است (۴) و با بالا رفتن سن این میزان افزایش می یابد. مطالعات انجام شده در ایالات متحده نشان داد که زنان ۵۰ ساله و مسن تر ۷۰٪ موارد جدید سرطان پستان و ۸۴٪ مرگ ناشی از سرطان پستان را از سال ۱۹۹۸ تا ۱۹۹۴ شامل می شوند (۵) که در سال ۲۰۰۴ میزان موارد تشخیص سرطان پستان در بین زنان ۵۰ ساله و مسن تر به ۷۵٪ رسیده است (۳).

بر اساس تحقیقات انجام شده اگر سرطان پستان در مراحل اولیه تشخیص داده شود، بقای ۵ ساله آن ۹۷٪ و در صورتی که به غدد لنفاوی و بافت های اطراف متابستاز دهد، این میزان به ۶۰٪ کاهش خواهد یافت (۶،۳).

بنابراین با توجه به برخی از ویژگی های سرطان پستان از قبیل رشد آهسته، قابل تشخیص بودن در مراحل اولیه و موثر بودن درمان در این مراحل، غربالگری سرطان پستان به عنوان یکی از روش های کنترل بیماری از اهمیت بسزایی برخوردار است و در میان روش های پذیرفته شده جهت غربالگری، انجام خود آزمایی پستان (breast self examination) به دلیل ارزان بودن و اجرای ساده آن در فواصل متعدد در منزل به عنوان یک شاخص بهداشتی می تواند در کشف زود رس، درمان و اجرای بهتر و کاهش مرگ و میر و ارتقاء سطح سلامتی در اختیار زنان قرار بگیرد (۸،۷) لذا با توجه به اهمیت موضوع بایستی کارکنان بهداشتی، زنان اقشار مختلف جامعه را به انجام خود آزمایی پستان همراه با معاینات پزشکی تشویق نمایند. از



مدل اعتقاد بهداشتی (۱۳) (Health Belief Model)

اکثریت همسران معلمنین زن مورد مطالعه دارای تحصیلات لیسانس با ۴۳٪ می‌باشد.

### بحث و نتیجه‌گیری

نتایج حاصله نشان داد از مجموع ۱۰ نمره آگاهی میانگین نمره کسب شده معلمنین  $5/78 \pm 2/19$  (۵۷٪) می‌باشد. این نتیجه نشان دهنده آگاهی متوسط آنها در زمینه سرطان پستان و خودآزمایی پستان می‌باشد. همچنین در بررسی که در سال ۱۳۷۸ توسط آذر دانش و دیگران در مورد آگاهی و نگرش و عملکرد معلمنین شهرکرد در مورد خودآزمایی پستان انجام شد، ۴۵٪ افراد دارای سطح آگاهی ضعیف بودند (۱۴). ضمناً در مطالعه‌ای که در کرمان انجام شد، از کل جامعه موربدپژوهش از آگاهی کامل برخوردار نبودند و ۶۷٪ از کل نمونه‌های مورد بررسی اصلاً خودآزمایی پستان را نجام نداده بودند (۱۵). در بررسی آگاهی و عملکرد پرسنل پرستاری و مامایی بیمارستان‌های شهریزد که توسط شهناز مجاهد و دیگران صورت گرفت، نشان داد که ۴۵٪ از افراد، دارای سطح آگاهی در حد متوسط بوده و بین میزان آگاهی بارشته تحصیلی و سابقه شرکت در دوره‌های بازآموزی ارتباط معنی داری وجود دارد. از نظر عملکرد ۵۴٪ نمونه‌ها، اصلاً خودآزمایی پستان انجام نداده‌اند (۱۶).

در بررسی میزان آگاهی و نگرش و مهارت دانشجویان مرکز تربیت معلم خواهران زنجان در زمینه سرطان پستان در سال ۷۸-۷۹ که توسط سوسن عزیز محمدی و همکارانش صورت گرفت، مشخص شد که ۹۴٪ افراد فاقد آگاهی صحیح

### روش بررسی

۲۸۰ زن معلم متاهل از مدارس شهر بیرونی به روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای (multi stage sampling) مورد بررسی قرار گرفتند. بدین صورت که با توجه به بافت فرهنگی و اجتماعی، ابتدا شهر بیرونی به سه منطقه شمال، جنوب و مرکزی تقسیم شد. سپس در هر منطقه ۲ استان، ۲ راهنمایی و ۲ دبیرستان به عنوان خوش‌انتخاب گردید (clustersampling) و سپس در این مدارس کلیه معلمنین زن مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه‌ای براساس متغیرهای مدل اعتقاد بهداشتی (منافع و موانع در کشیده، شدت در کشیده، حساسیت در کشیده) طراحی و جهت رواجی پرسشنامه توسط چند تن از اساتید مورد بازبینی و اصلاحات لازم در آن انجام گرفت.

جهت تجزیه و تحلیل داده‌های آزمون‌های آزمون‌های آنالیز واریانس یک طرفه (one-way)، ضربی همبستگی پیرسون استفاده گردید و  $P \leq 0.05$  به عنوان سطح معناداری در نظر گرفته شد.

### یافته‌ها

براساس اطلاعات بدست آمده از این پژوهش، میانگین سن، سن ازدواج، سن کوچکترین فرزند و سن شروع قاعدگی معلمنین مورد مطالعه به ترتیب  $2/2$ ،  $2/4/58$ ،  $37/27$  و  $14/02$  سال و تعداد حاملگی ۲۷ حاملگی می‌باشد. بیشترین میزان تحصیلات معلمنین مورد مطالعه لیسانس با فراوانی ۵۷٪ و

**جدول ۱- متغیرهای مورد مطالعه در مدل اعتقاد بهداشتی نسبت به خودآزمایی پستان در معلمنین مورد مطالعه**

متغیر	حداقل	حداکثر	میانگین	انحراف معیار
آگاهی	.	۱۰	۵/۸۷	۲/۱۹
شدت در کشیده	۷	۱۵	۱۲/۵۷	۱/۸۵
منافع در کشیده	۴	۱۲	۱۱/۵۵	۱/۰۷
موانع در کشیده	۶	۱۵	۱۲/۳۱	۲/۱۸
حساسیت در کشیده	۱۳	۲۶	۲۱/۱۴	۲/۳۸
نگرش	۳۹	۶۷	۵۷/۷۳	۴/۲۸

**جدول ۲- رابطه بین آگاهی و نگرش معلمین مورد مطالعه با برخی متغیرهای مورد مطالعه با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون**

نگرش	آگاهی	متغیر
R= ./.۵ P=.0...0	R=- ./.۰۲ P=.0/۷	شدت درک شده
R= ./.۵ P=.0...0	R= ./.۰۴ P=.0/۷	منافع درک شده
R= ./.۵ P=.0...0	R= ./.۰۲ P=.0...۰۳	موانع درک شده
R= ./.۶ P=.0...0	R= ./.۱۴ P=.0...۰۵	حساسیت درک شده
R= ./.۰۳ P=.0/۵۷	R= - ./.۱۸ P=.0...۰۱	سن
R= -.0/۱ P=.0/۰۵	R= - ./.۰۵ P=.0/۴۷	سن ازدواج
R= ./.۰۲ P=.0/۷	R= - ./.۰۲ P=.0...۰۱	تعداد فرزندان
R= ./.۰۰۶ P=.0/۹	R= ./.۰۰۹ P=.0/۹	سن شروع عادت ماهیانه

**جدول ۳- جدول ارتباط بین میزان تحصیلات با برخی متغیرها "شدت درک شده، منافع درک شده و موافع درک شده" در معلمین مورد مطالعه**

نوع آزمون	بالاتر از لیسانس		لیسانس		فوق دیپلم		دیپلم		سطح تحصیلات
	انحراف معیار	میانگین	انحراف معیار	میانگین	انحراف معیار	میانگین	انحراف معیار	میانگین	
P=.0/۴ NS	۱/۰۱	۱۳/۵۵	۱/۸۹	۱۲/۵۲	۱/۸۳	۱۲/۵۷	۱/۹۲	۱۲/۷۰	شدت درک شده
P=.0/۲ NS	.	۱۲	۱/۰۷	۱۱/۵۷	۱	۱۱/۵۷	۱/۴۷	۱۱/۲۰	منافع درک شده
P=.0/۱ NS	۲/۶۶	۱۲/۱۱	۲/۱۲	۱۲/۴۲	۲/۱۸	۱۲/۵۴	۲/۳۲	۱۱/۴۱	موافع درک شده
P=.0/۵ NS	۲/۴۵	۲۱/۴۴	۲/۱۸	۲۱/۰۳	۲/۷۵	۲۱/۵۵	۲/۳۶	۲۰/۹۵	حساسیت درک شده
P=.0/۱ NS	۴/۴۰	۵۹/۱۱	۳/۹۰	۵۷/۷۰	۴/۹۰	۵۸/۵۴	۴/۳۷	۵۶/۴۵	نگرش
P=.0...۰۱ معنی دار	۲/۳۹	۴	۱/۸۴	۶/۲۲	۲/۳۶	۶	۲/۵۸	۴/۴۵	آگاهی

گرفت نشان داده شد که ارتباط معناداری بین میزان آگاهی افراد مورد مطالعه و سطح تحصیلات آنها و نیز وضعیت تأهل آنها (به تفکیک) وجود دارد ( $P < 0.05$ ). همچنین بین دو متغیر میزان عملکرد و وضعیت تأهل واحدهای مورد مطالعه ارتباط معنا داری وجود داشت ( $P < 0.05$ ).

نتایج حاصله از پژوهش حاضر براساس آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین میانگین نمره آگاهی و نمره نگرش، همبستگی معناداری مشاهده گردید ( $P < 0.05$ ) همچنین بین نمره آگاهی و متغیر سن زنان همبستگی معنادار معکوسی مشاهده شد. بدین ترتیب که با افزایش سن از آگاهی زنان نسبت به سلطان پستان کاسته شده است.

در پایان باتوجه به یافته های پژوهش می توان چنین استنباط نمود که معلمین زن مورد مطالعه دارای آگاهی متوسط در زمینه سلطان پستان و خودآزمایی پستان می باشند، ولی نگرش آنها نسبتاً خوب است و با توجه به اینکه مهم ترین مرحله در پیشگیری و کنترل سلطان پستان، تشخیص زودرس و اقدامات غربالگری از جمله خودآزمایی پستان می باشد و از طرفی یکی از اهداف برنامه پیشگیری و کنترل سلطان پستان انجام غربالگری بخصوص در قشر معلمین می باشد، لذا پیشنهاد می شود که آموزش های لازم در زمینه سلطان پستان و انجام خودآزمایی پستان به صورت آموزش های گروهی با استفاده از آموزش مستقیم گروهی (سخنرانی و پرسش و پاسخ، بحث گروهی، نمایش اسلامی و فیلم ویدئویی) و آموزش غیر مستقیم (پوستر، پمفت و جزوای آموزشی) از طریق برنامه های ضمن خدمت و برگزاری کارگاه های آموزشی به معلمین آموزش داده شود. تحقیقات متعدد نشان داده است که ارتقاء سطح آگاهی، نگرش و طرز تفکر فرد نسبت به یک بیماری عامل مهمی در انجام دادن و یاندادن یک اقدام پیشگیرانه می باشد زیرا آگاهی، نگرش و تفکرات زیربنای رفتار و عمل می باشند. در این میان معلمین به دلیل اینکه قشری از افراد جامعه هستند که در ارتباط با تعلیم و تربیت جوانان و مادران آینده جامعه می باشند، می توانند اطلاعات بهداشتی در زمینه پیشگیری از سلطان پستان را به دختران دیبرستانی منتقل نمایند و از بروز مرگ و میر ناشی از سلطان پستان جلوگیری نمایند.

بودند. در رابطه با حیطه روانی حرکتی (مهارت) نیز هیچکدام از آنها قادر به انجام عمل خودآزمایی پستان به طور صحیح نبودند که علت این امر می تواند عدم ارایه برنامه های آموزش بهداشت مناسب و مؤثر علیرغم وجود نگرش و تمایل بسیار خوب در جامعه مورد مطالعه باشد ( $P < 0.05$ ).

در مطالعه حاضر  $75\%$  معلمین، سلطان پستان را قابل پیشگیری می دانستند و  $80\%$  آنها خودآزمایی پستان را برای تشخیص زودرس سلطان پستان ضروری می دانستند و  $47\%$  معلمین مورد مطالعه، سن شروع خودآزمایی پستان را سن بالای ۲۰ سال بیان نمودند.

در بررسی جزء دیگر مدل اعتقاد بهداشتی که میزان شدت درک شده می باشد، نتایج بدست آمده نشان داد که میانگین میزان شدت درک شده از مجموع  $15\pm 8.4$  ( $12.57\pm 7.85$ ) و میانگین نمره کسب شده معلمین در منافع درک شده از مجموع  $12\pm 7.07$  ( $11.55\pm 6.7$ ) می باشد. این نتیجه بیان گراین مطلب است که معلمین زن مورد مطالعه، نسبت به خطر ابتلاء به سلطان پستان دارای حساسیت و شدت درک شده خوبی هستند.

همچنین میانگین نمره کسب شده معلمین در متغیر موضع درک شده و حساسیت درک شده به ترتیب  $12.31\pm 7.33$  و  $21.14\pm 7.73$  از مجموع  $67\pm 8.6$  ( $57\pm 7.7$ ) بود. این نتیجه نیز بیان گراین مطلب است که معلمین زن معتقدند که سلطان پستان یک مشکل جدی و خاص بهداشتی برای زنان بوده و مستعد ابتلاء به این بیماری هستند و در صورت انجام اقدامات پیشگیری مؤثر نظیر خودآزمایی پستان می توان این بیماری را سریع تشخیص و از مرگ و میر ناشی از بیماری جلوگیری کرد. در پژوهشی که در شهر سنندج صورت گرفت بین میزان نگرش افراد تحت مطالعه با مشخصات فردی آنها با ضریب اطمینان  $95\%$  اختلاف معناداری وجود نداشت ( $P < 0.05$ ).

آزمون آماری و آنالیز واریانس اختلاف معنی داری بین میزان آگاهی و سطح تحصیلات معلمین نشان داد ( $P < 0.001$ ) به عبارتی با افزایش میزان تحصیلات میزان آگاهی آنها نیز افزایش می یابد.

در بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد زنان مراجعت کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان سنندج در مورد پیشگیری از سلطان پستان در سال ۷۶ که توسط عهدیه پرهیزگار صورت

## References

- 1- Lyon, IARC Press 2001. GLOBOCAN 2000, Cancer incidence, mortality and prevalence worldwide, Version 1. IARC Cancer Base, No.5, Available from: URL: <http://www.dep.iarc.fr/public/resourcescancerre/iarcpressglobocom.htm>.
- 2- Breast Cancer Epidemic. Breast cancer facts 2003.
- 3- American cancer society. Cancer Facts and Figures 2004. Available from: <http://www.cdc.gov/cancer>.
- 4- National center for health statistics 2002, National vital statistics reports, 50(15): 32.
- 5- American cancer society. Breast cancer facts & figures 2002.
- 6- قنبری، عاطفه. عطر کار روشن، زهراء. مقایسه آموزش با استفاده از لوح فشرده و بوکلت برآیندهای یادگیری دانشجویان پرستاری و مامایی در مورد خودآزمایی پستان. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گilan. زمستان ۱۳۸۲، سال ۱۲، شماره ۴۸، صفحه: ۳۴.
- 7- صدیقی، ژیلا. گشتاسبی، آزیتا. گرمارودی، غلامرضا. حاج سید عزیزی، پریسا. ارزیابی برنامه ادغام غربالگری سرطان پستان در سیستم مراقبت‌های اولیه بهداشتی کشور. فصلنامه پایش، بهار ۱۳۸۱، سال اول، شماره دوم، صفحه: ۳۶.
- 8- Flegg KM, Rowling YJ. Clinical breast examination: a contentious issue in screening for breast cancer. Aust Fam Physician, 2001; 30(4): 343-6.
- 9- رمضانی تهرانی، فهیمه. محمد، کاظم. رهگذر، مهدی. باروتی، عصمت. بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد زنان ۲۰-۴۹ ساله ایرانی در زمینه سرطان پستان. طب و تزکیه، پاییز ۱۳۸۰، شماره ۴۲، صفحات ۳۰-۳۵.
- 10- Coudhyry VK, Sovastava R, Fitch MI. Breast cancer detection of South Asia women: knowledge, attitude and beliefs. Oncol Nurs Forum, 1998; 25(10): 1697-701.
- 11- Thomas Butler J. Principles of Health Education and Health Promotion. 3rd ed. USA, 2000; 232, 242-4.
- 12- Stein JA. Mammography usage and the belief model. Health Education, 1992; 19(7): 448-9.
- 13- حیدرنیا، علیرضا. مباحثی در فرآیند آموزش بهداشت. چاپ اول، تهران: زمانی، ناصر، ۱۳۸۲، صفحات: ۸۸-۹۴.
- 14- دانش، آذر. امیری، مسعود. زمانی، احمد رضا. تذہبی، مهدی. گنجی، فروزان. بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد زنان شاغل در آموزش و پرورش شهر شهرکرد در مورد خودآزمایی پستان. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، تابستان ۱۳۸۱، دوره ۴، شماره ۲، صفحات: ۵۰-۵۲.
- 15- غضنفری، زهرا. عالمزاده، بدرالسادات. نیکیان، یدا... بررسی آگاهی و نگرش آموزگاران زن در مورد خودآزمایی پستان در شهر کرمان. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ۱۳۷۴، دوره دوم، شماره ۲، صفحات: ۷۶-۸۰.
- 16- مجاهد، شهناز. هفچانی فیروزآبادی، راضیه. دافعی، مریم. آگاهی و عملکرد پرستاری و مامایی بیمارستانهای شهر یزد در رابطه با نتایج خودآزمایی پستان. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، بهار ۱۳۸۰، دوره ۹، شماره ۱، صفحات: ۸۲-۸۸.
- 17- عزیز محمدی، سوسن. وکیلی، محمد مسعود. موسوی نسب، نورالدین. کیانی، کامبیز. وزیری، کتابیون. بررسی میزان آگاهی، نگرش و مهارت دانشجویان مرکز تربیت معلم خواهان زنجان در زمینه سرطان پستان ۱۳۷۸-۷۹. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان، بهار ۱۳۸۰، دوره ۹، شماره ۳۴، صفحات: ۱۵-۱۹.
- 18- پرهیزگار، عهدیه. بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد زنان مراجعت کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان سنتندج در مورد پیشگیری از سرطان پستان در سال ۱۳۷۶. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، پاییز ۱۳۷۷، دوره ۳، شماره ۹، صفحات: ۱۷-۲۰.

## A applied Health Belief Model (H.B.M) in Adopting Preventive Behaviors in Breast Cancer by Female Teachers of Birjand

Dr. Miri ( Ph.D)<sup>1</sup> , Moodi ( M.S)<sup>2</sup> , Moasher ( M.S)<sup>3</sup> , Sourgi Z.( B.Sc.)<sup>4</sup> , Hami J.(M.S)<sup>5</sup>

### Abstract

**Introduction:** Breast cancer is the most common type of female cancer in most countries, and also the most important of cause death among women in away that 6 to 7 woman out of 700 are inflicted by it . Considering that one of the best models used in studying the behavior in health education in the prevention and control of diseases , particularly Female cancer at is health belief model , the present study was conducted aiming to use the health belief model in adopting preventive behaviors for breast cancer among female teaches in Birjand in 1383.

**Methods:** In this cross - sectional study 280 female teachers from 4 guidance schools, and 4 girl high schools were surveyed randomly. Data colleting instrument was structure questionnaire based on variable of health belief model (comprehended interests, comprehended barriers comprehended intensity, comprehended sensitivity, and signs for action and conduct) . The results were analyzed by SPSS software T, X<sup>2</sup>, one way tests, and Pearson correlation coefficient were used.

**Findings:** The results show that female teachers have good sensitivity and intensity and feel themselves at risk of cancer. Teachers have mean knowledge about the sings and complications of breast cancer but as the age rases the teachers' knowledge about this case lowers.

**Results:** Providing needed education about breast self - examining in the form of group education , in - service programs and group discussions for teachers not only increases their knowledge , but will also promote girl students , level of knowledge , attitude of cancer.

**Key words:** *Breast Cancer, Health Belief Model, Female Teachers.*