

Predicting Relapse Propensity to Substance Use Based on Self-Harm, Self-Control, and Loneliness in People Undergoing Methadone Maintenance Treatment

Fatemeh Tavvafi¹, Qamar Kiani²

Received:2023/08/01 Accepted:2024/08/21

Abstract

Objective: The aim of the current study was to predict relapse to substance use based on self-harm, self-control, and loneliness in substance-dependent individuals undergoing methadone maintenance treatment in Zanjan city.

Method: The research employed a descriptive-correlational approach. A total of 217 substance-dependent patients receiving methadone treatment at addiction centers in Zanjan were selected through convenience sampling. The research tools included the temptation to use substances after quitting, the deliberate self-harm questionnaire, the loneliness scale, and the self-control scale. Data analysis involved Pearson correlation and stepwise regression. **Results:** The findings revealed a positive correlation between relapse to substance use and self-harm and loneliness, while a negative correlation was observed between relapse to substance use and self-control and its components. The regression analysis showed that inhibited self-control, loneliness, and self-harm collectively accounted for 50% of the variance in relapse to substance use. **Conclusion:** The study suggests that clinical psychologists should focus on reducing feelings of loneliness and self-harming behaviors, and enhancing self-control, as craving inhibitors, to mitigate substance addiction in substance-dependent individuals, thereby lowering the risk of relapse.

Keywords: Relapse to substance use, self-harm, Self-control, Loneliness, Substance-dependent individuals

1. Master of Clinical Psychology, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran.

2. Corresponding Author: Assistant Professor, Department of Psychology, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran. Email: t.my.20624@gmail.com

پیش‌بینی بازگشت به مصرف مواد بر اساس خود آسیب‌رسانی، خودکنترلی و احساس تنها‌یی در افراد وابسته به مواد مخدر تحت درمان نگهدارنده متادون

فاطمه طوفانی^۱، قمر کیانی^۲

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

تاریخ دریافت: ۱۴۰۲/۰۵/۱۰

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر پیش‌بینی بازگشت به مصرف مواد بر اساس خود آسیب‌رسانی، خودکنترلی و احساس تنها‌یی در افراد وابسته به مواد مخدر تحت درمان نگهدارنده متادون در شهر زنجان بود. **روش:** روش پژوهش توصیفی- همبستگی بود. از میان بیماران وابسته به مواد تحت درمان با متادون مراجعه‌کننده به مرکز ترک اعتیاد شهر زنجان ۲۱۷ نفر به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه و سوسه مصرف مواد پس از ترک، پرسشنامه خود آسیبی عمدى، مقیاس احساس تنها‌یی و مقیاس خودکنترلی بود. برای تحلیل داده‌ها از همبستگی پیرسون و رگرسیون گام‌به‌گام استفاده شد. **یافته‌ها:** نتایج نشان داد که بین بازگشت به مصرف مواد با خود آسیب‌رسانی و احساس تنها‌یی رابطه مثبت و بین بازگشت به مصرف مواد با خودکنترلی و ابعاد آن رابطه منفی وجود داشت. نتایج رگرسیون حاکی از آن بود که خودکنترلی منع شده، احساس تنها‌یی و خود آسیب‌رسانی روی هم ۵۰ درصد از واریانس بازگشت به مصرف مواد را تبیین کردند. **نتیجه‌گیری:** بر اساس یافته‌های به دست آمده در پژوهش حاضر پیشنهاد می‌گردد که روان‌شناسان بالینی در درمان افراد وابسته به مواد مخدر و کاهش خطر بازگشت به مصرف، بر کاهش احساس تنها‌یی و رفتار آسیب‌رسانی به خود و افزایش خودکنترلی به عنوان بازدارنده‌های ولع مصرف تأکید نمایند.

کلیدواژه‌ها: بازگشت به مصرف مواد، خود آسیب‌رسانی، خودکنترلی، احساس تنها‌یی، افراد وابسته به مواد مخدر

۱. کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.

۲. نویسنده مسئول: استادیار، گروه روانشناسی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران. پست الکترونیک: t.my.20624@gmail.com

مقدمه

اعتیاد^۱ و اختلال مصرف مواد^۲ اختلال مزمن و عودکننده و یک مشکل رایج و رو به افزایش در جهان است که با پیامدهای منفی و جبران ناپذیر همراه است (ساکر^۳ و همکاران، ۲۰۲۴؛ جونز و ویگو^۴، ۲۰۲۳). اعتیاد اختلالی با عود مزمن است که با رفتارهای تکانشگری جست وجوی مواد علی‌رغم پیامدهای منفی آن همراه می‌باشد (ویلسون^۵ و همکاران، ۲۰۱۸؛ سیسیلی^۶ و همکاران، ۲۰۲۲). اعتیاد یک بیماری مزمن است و مهم نیست که فرد چه مدت از مصرف مواد خودداری کرده است. پس از عود بیماری، بازگشت فرد به مسیر بهبودی دشوار خواهد بود. این افراد احتمالاً تمايل زیادی را برای ادامه استفاده از مواد، حتی فقط برای یک‌بار احساس خواهند کرد؛ درنتیجه، به دنبال عود، بازگشت مجدد افراد به درمان در اسرع وقت، برای سلامتی و بهبودی طولانی مدت آن‌ها بسیار مهم است (لی^۷ و همکاران، ۲۰۲۳).

گرچه ولع بازگشت به مصرف مواد^۸ تعاریف پیچیده‌ای دارد، اما می‌تواند میل شدید به اشتیاق داشتن، خواستن و استفاده از مواد تعریف شود و ممکن است حتی بعد از دوره تحمل پرهیز، از طریق مواجهه با موقعیت‌های پرخطر، داروها یا نشانه‌های محیطی که قبل از با مصرف مواد همراه بوده‌اند، برانگیخته شود. ولع بازگشت به مصرف مواد به عنوان تجربه ذهنی یک انگیزش یا میل به مصرف مواد تعریف می‌شود (بریسن و ورونا^۹، ۲۰۲۱؛ مریدی و همکاران، ۱۳۹۶؛ رهبر کنارسری و همکاران، ۱۴۰۲). پژوهش‌ها نشان داده‌اند که ولع بازگشت به مصرف مواد و تمايلات غیرقابل کنترل در طول درمان و بعد از آن به دلیل ماهیت بازگشت، خود عامل مهمی در عدم موفقیت درمان و مصرف مجدد می‌باشد (لاوسنس^{۱۰} و همکاران، ۲۰۲۲). متغیرهای مختلف روان‌شناسخی به عنوان عوامل آسیب‌پذیری، تداوم بخش، تشدید کننده ولع مصرف و عود در این اختلال شناسایی شده‌اند.

- 1.addiction
- 2. substance abuse disorder
- 3. Sahker
- 4. Jones & Vigo
- 5. Wilson

- 6. Ceceli
- 7. Liu
- 8. craving for r relapse to drug use
- 9. Bresin & Verona
- 10. Lauvsnes

(علی‌پور و همکاران، ۱۳۹۶). در پژوهش حاضر نقش متغیرهای خود آسیب‌رسانی^۱، خودکنترلی^۲ و احساس تنهایی^۳ در عود به مصرف مورد توجه قرار گرفته‌اند. خودآسیبی به عنوان هر رفتاری تعریف می‌شود که به منظور تحمیل صدمه به خود از جمله برش زدن، خراشیدن، سوختن، ضرب و شتم / ضربه زدن و مسموم کردن، بدون توجه به قصد خودکشی انجام می‌شود (داو-لان و فلوری^۴، ۲۰۲۳؛ سورنبرگر^۵ و همکاران، ۲۰۱۲). خود آسیب‌رسانی و مصرف مواد مخدر به‌طور گستردۀ در کنار هم مشاهده می‌شوند. برخی از تحقیقات نشان داده‌اند که خود آسیب‌رسانی می‌تواند به عنوان یک عامل پیش‌بینی کننده برای مصرف مواد مخدر در آینده عمل کند. به عنوان مثال، مطالعه ویتلائک^۶ و همکاران (۲۰۱۲) و تاتنل^۷ و همکاران (۲۰۱۴) نشان دادند در افرادی که رفتارهای خود آسیب‌رسان داشتند، مصرف مواد مخدر بیشتر بوده است. در مورد ارتباط خود آسیب‌رسانی و لعل مصرف مطالعه کیکن^۸ و همکاران (۲۰۱۳) نشان داد افرادی که خود آسیب‌رسانی می‌کردند، بیشتر از افرادی که خود آسیب‌رسانی نمی‌کردند، لعل وسوسه به مواد مخدر را تجربه کرده‌اند. یک توضیح ممکن برای این رابطه این است که لعل وسوسه ممکن است به دلیل بروز دردهای جسمی یا روانی در دوره ترک مصرف مواد به وجود آید و افراد ممکن است به دنبال کاهش این دردها به مواد مخدر روی آورند؛ با این حال، هرگونه رابطه بین لعل وسوسه و خود آسیب‌رسانی و مصرف مواد نیاز به پژوهش دارد.

مسئله بعدی ارتباط احساس تنهایی با اعتیاد است. تنهایی احتمال بروز افسردگی و اعتماد به نفس پایین را افزایش می‌دهد، احتمال اینکه این افراد تصمیم بگیرند به روش‌های ناسالم با این حالت مقابله کنند زیاد است. احساس تنهایی و اعتیاد در بسیاری از کسانی که دچار اختلال مصرف مواد هستند ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند (ژو^۹ و همکاران، ۲۰۲۳). احساس تنهایی حالت ناراحت‌کننده‌ای است و زمانی به وجود می‌آید که بین روابط بین فردی دلخواه فرد و روابط بین فرد در زمان حال فاصله وجود دارد.

1. self-harm
2. self-control
3. loneliness
4. Dawe-Lane & Flouri
5. Sornberger

6. Whitlock
7. Tatnell
8. Kiekens
9. Xu

(وانپاکران^۱ و همکاران، ۲۰۲۰). احساس تنهایی تجربه‌ای همگانی است و همه افراد صرف نظر از جنس، سن، استعداد، نژاد، مذهب و پایگاه اجتماعی، اقتصادی در دوره‌ای از زندگی خود آن را تجربه می‌کنند. این احساس ممکن است در موارد گوناگون از جمله از دست دادن یک رابطه صمیمانه، ورود به دانشگاه، سفر به یک کشور غریب، در مدرسه یا محل کار ایجاد شود (ماوانا و تنتاما^۲، ۲۰۲۰). پژوهش‌های منتشر شده، نشان می‌دهد که تنهایی مستقیماً با سلامت روانی و جسمی ضعیف‌تر مرتبط است. به عنوان مثال، افراد تنهایی، نرخ بالاتری از افسردگی و اضطراب، کناره‌گیری اجتماعی، افکار و تلاش برای خودکشی، شکایات روان تنی (به عنوان مثال، سردرد، حالت تهوع، وغیره) گزارش می‌کنند و سلامت عمومی کلی ضعیف‌تری دارند و گرایش به مصرف مواد مخدر در آن‌ها بیشتر است (بارلو^۳ و همکاران، ۲۰۱۲؛ جعفری سیاوشانی و همکاران، ۱۳۹۷).

سازه دیگری که می‌تواند در کاهش ولع مصرف مواد مخدر نقش مهمی داشته باشد، خودکنترلی است. خودکنترلی نوعی مدیریت بر خویشنست است. خودکنترلی پایین از طریق ویژگی‌های فردی از قبیل ناتوانی در به تعویق انداختن لذت‌ها، عدم تحمل محرومیت یا کمبودها و تمایل به اتخاذ رفتارهای مخاطره‌آمیز مشهود است (فرایز و هومن^۴، ۲۰۱۹).

خودکنترلی به توانایی مدیریت، نظارت، ارزیابی و تغییر شناخت‌ها، احساسات، توجه و رفتارها اشاره دارد. این توانایی برای کنترل رفتارهای خود به منظور رفتار به همراه اهداف بلندمدت با استفاده از سرکوب، تغییر یا نه گفتن به نیازها، تمایلات، آرزوها و یا پاسخ‌های عادی به کار می‌رود. چالش‌های خود تنظیمی وقتی پیش می‌آیند که افراد با تجربه و سوسمه‌های کوتاه‌مدتی مواجه می‌شوند که با اهداف بلندمدت‌شان در تضاد هستند (اینزلیکت^۵ و همکاران، ۲۰۲۱؛ لادز^۶ و همکاران، ۲۰۲۲؛ دیری، ۱۴۰۱). در مطالعه چن^۷ و همکاران (۲۰۱۹) به بررسی نقش خودکنترلی در مقابله با ولع مصرف مواد در بین افرادی که درمان متادون دریافت می‌کنند، پرداخته شد و مشخص شد که خودکنترلی،

1. Wongpakaran
2. Muawanah & Tentama
3. Barlow
4. Friese & Hofmann

5. Inzlicht
6. Lades
7. Chen

ارتباط معناداری با کاهش ولع مصرف مواد داشته و افزایش خودکنترلی می‌تواند به عنوان یک راهکار مؤثر در پیشگیری از بازگشت به مصرف مواد مخدر در بین افرادی که درمان متادون دریافت می‌کنند، مورد استفاده بگیرد. در مطالعه سافرن^۱ و همکاران (۲۰۲۰) مشخص شد که خودکنترلی، ارتباط معناداری با کاهش مصرف مواد داشته و این ارتباط توسط عواملی مانند اعتماد به نفس و پشتیبانی اجتماعی تقویت می‌شود. مطالعه باندی^۲ و همکاران (۲۰۲۱) نشان داد که خودکنترلی، ارتباط معناداری با کاهش ولع مصرف مواد دارد و در واقع، توانایی خودکنترلی می‌تواند به عنوان یک عامل مهم در پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر و همچنین در درمان آن مورد استفاده قرار گیرد.

با وجود پیشرفت‌هایی که در درمان اعتیاد انجام گرفته، بازگشت دوره‌های سنگین و غیرقابل کنترل مصرف، همچنان به عنوان یک مشکل رایج باقی است. فهم پدیده ولع بازگشت به مصرف و پیشگیری از آن از بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که متخصصان حوزه درمان اعتیاد با آن مواجه‌اند و مطالعه در این زمینه اهمیت دارد. اغلب پژوهش‌های انجام شده تاکنون به بررسی ارتباط ویژگی‌های روان‌شناختی از جمله تاب‌آوری و ذهن آگاهی در ولع بازگشت به مصرف مواد مخدر پرداخته‌اند. برخی از پژوهش‌ها نیز رابطه وسوسه و مصرف مواد (رحمانیان و همکاران، ۱۳۸۵)، تاب‌آوری وسوسه (حسینیان سراجه‌لو، ۱۳۸۹؛ محمدزاده و گل‌گلی، ۱۳۹۳) و ذهن آگاهی و عود به مصرف (سواری، ۱۳۹۱؛ اردمنه، ۱۳۹۲؛ جلیلی نیکو، ۱۳۹۴) را بررسی و مورد تائید قرار داده‌اند و پژوهش‌هایی که بر روی متغیرهای خود آسیب‌رسانی، احساس تنها و خودکنترلی به عنوان متغیرهای پیش‌بین تمرکز کرده باشند، بسیار اندک هستند. بنابراین پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا خود آسیب‌رسانی، احساس تنها و خودکنترلی می‌توانند ولع بازگشت به مصرف مواد را در افراد تحت درمان نگهدارنده متادون پیش‌بینی کنند؟

۱۱۴

114

۱۴۰: جلدی، نامه‌نگاری، ۷۲، سالنامه، ۲۰۲۴
Vol. 140, Journal, No. 72, Sannayari, 2024

روش

جامعه، نمونه و روش نمونه‌گيري

روش پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی بیماران وابسته به مواد تحت درمان با متادون مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهر زنجان در سال ۱۴۰۱ بود. با توجه به حجم جامعه آماری (۵۰۰ نفر)، بر اساس فرمول کرجسی و مورگان^۱ (۱۹۷۰) و همچنین اطمینان بالای یافته‌ها و تعییم دهی بهتر، نمونه‌ای برابر با ۲۱۷ نفر، به روش دردسترس انتخاب شدند. ملاک‌های ورود عبارت بود از: قرار گرفتن تحت درمان با متادون، شرکت داوطلبانه در پژوهش و ملاک خروج از پژوهش، تکمیل ناقص پرسشنامه‌ها بود. پس از مراجعه به مراکز ترک اعتیاد شهر زنجان، پرسشنامه پژوهش در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت و امکان انصراف از ادامه همکاری در همه مراحل پژوهش وجود داشت. در این مطالعه، اصول اخلاقی پژوهش شامل رازداری و حفظ حریم خصوصی اشخاص رعایت شد. داده‌ها با استفاده از همبستگی پرسون و رگرسیون چندگانه با روش گام به گام در نرم‌افزار SPSS نسخه ۲۶ تحلیل شدند.

ابزار

- پرسشنامه وسوسه مصرف مواد پس از ترک^۲: این پرسشنامه توسط صالحی فدری و همکاران (۱۳۸۹) ساخته شد و دارای ۲۰ گویه بهمنظور سنجش میزان افکار و خیالات مربوط به مواد وسوسه مصرف به کار می‌رود. نمره گذاری پرسشنامه به صورت طیف لیکرت شش درجه‌ای (کاملاً درست است=۵ تا اصلاً درست نیست=۰) است. کمینه نمره صفر و بیشینه نمره ۱۰۰ هست که نمرات بالاتر نشان‌دهنده وسوسه بیشتر بازگشت به مصرف مواد است. در مطالعه صالحی فدری و همکاران (۱۳۸۹) روایی واگرای این پرسشنامه با پرسشنامه عواطف منفی (۵۵٪) و روایی واگرای آن با پرسشنامه عواطف مثبت (۳۲٪) تأیید شد. همسانی درونی این پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ صالحی فدری و همکاران (۰/۹۴) و در پژوهش حاضر ۰/۸۴ محاسبه شد.

1. Krejcie & Morgan

2. the temptation to use drugs after quitting

۲- پرسشنامه خود آسیبی عمدی^۱: این پرسشنامه توسط سانسون^۲ و همکاران (۱۹۹۸) طراحی شده است و ۲۲ گویه دارد. نمره گذاری به صورت بلی/خیر است و دامنه نمرات صفر تا ۲۲ است که نمره بالا نشان‌دهنده شدت و فراوانی بیشتر رفتارهای خود آسیب‌رسانی است. مطالعات مختلف از روابی و پایابی این ابزار حمایت کرده‌اند. در چندین پژوهش تاکنون از این ابزار برای اندازه‌گیری خود آسیب‌رسانی مستقیم و غیرمستقیم استفاده شده و شواهد درباره ویژگی‌های روان‌سنجی آن قابل قبول بوده است (کریمی و همکاران، ۱۳۹۹). آلفای کرونباخ پرسشنامه حاضر در پژوهش طاهbaz حسن‌زاده و همکاران (۱۳۹۰)، ۰/۷۴ و در پژوهش حاضر ۰/۸۱ محاسبه شده است.

۳- مقیاس احساس تنها^۳: این مقیاس توسط راسل^۴ و همکاران (۱۹۷۸) ساخته شد. علیرغم اعتبار و پایابی مناسبی که برای این مقیاس گزارش شده بود، برای رفع برخی نواقص، راسل و همکاران در سال ۱۹۸۰، نسخه تجدیدنظر شده‌ای از فرم اولیه را ارائه دادند. این مقیاس، بار دیگر توسط راسل در سال ۱۹۹۸ مورد تجدیدنظر قرار گرفت. این مقیاس شامل ۲۰ سؤال است که در طیف لیکرت ۴ درجه‌ای (هر گز تا همیشه) پاسخ داده می‌شود. دامنه نمرات این پرسشنامه بین ۲۰ تا ۸۰ قرار دارد (نادری و همکاران، ۱۳۹۵). روابی محتوى و صورى در پژوهش نادری و همکاران (۱۳۹۵)، مورد تائید قرار گرفت. حسن‌زاده و همکاران (۱۳۹۶) پایابی این ابزار را با روش همبستگی درونی با ضربی آلفای کرونباخ ۰/۷۸ بر روی ۲۷۸ نفر از دانش‌آموزان مقطع دوره دوم دبیرستان در استان گلستان مورد تائید قرار دادند. در پژوهش حاضر همسانی درونی این پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ ۰/۷۴ محاسبه شد.

۴- مقیاس خودکنترلی^۵: این مقیاس توسط تانجی^۶ و همکاران (۲۰۰۴) طراحی شده است و داری ۱۳ گویه است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت ۵ درجه‌ای بوده که از نمره ۱ = هر گز تا نمره ۵ = بسیار نمره گذاری می‌شود. حداقل نمره مقیاس خودکنترلی ۱۳ و حداقل ۶۵ است و نمره بالاتر از ۳۳ بیانگر خودکنترلی بالای فرد است. در پژوهش تانجی

1. self-harm questionnaire
2. Sansone
3. loneliness scale

4. Russell
5. self-control questionnaire (SCS)
6. Tangey

و همکاران (۲۰۰۴) روایی این مقیاس با ارزیابی همبستگی آن با مقیاس عاطفه خودآگاه ۷۷/۰ گزارش شده است. همچنین پایایی آن بر روی دو نمونه آماری با استفاده از روش آلفای کرونباخ ۸۳/۰ و ۸۵/۰ به دست آورده شد. در پژوهش محمدی بنمار و همکاران (۱۴۰۲) پایایی این مقیاس با روش آلفای کرونباخ ۸۱/۰ و در پژوهش حاضر ۸۲/۰ به دست آمد.

یافته‌ها

دامنه سنی افراد مورد مطالعه ۲۸ تا ۶۶ سال و میانگین سنی آن‌ها ۴۶/۹۳ با انحراف استاندارد ۸/۸۳ بود. از بین آن‌ها ۶ نفر (۲/۸ درصد) دارای تحصیلات ابتدایی، ۶۲ نفر (۲۹/۱ درصد) راهنمایی، ۸۳ نفر (۳۸/۹ درصد) دیپلم، ۴۶ نفر (۲۱/۵ درصد) فوق دیپلم و ۱۶ نفر (۷/۵ درصد) لیسانس بودند. ۱۷۵ نفر (۸۲/۲ درصد) متاهل و ۳۸ نفر (۱۷/۸ درصد) مجرد بودند. از بین آن‌ها ۲۰۴ نفر (۹۵/۸ درصد) شاغل و ۹ نفر (۴/۲ درصد) بیکار بودند. آماره‌های توصیفی متغیرهای مورد مطالعه در جدول ۱ ارائه شده است.

جدول ۱: آماره‌های توصیفی متغیرهای پژوهش

متغیرها	زیر مقیاس	میانگین	انحراف استاندارد	۱۱۷
خود آسیب‌رسانی	-	۱۱/۷۵	۳/۹۴	۱۱۷
خودکترلی منع کننده	۱۴/۵	۱۴/۵	۴/۷	۱۱۷
خودکترلی اولیه	۹/۴	۹/۴	۳/۲۳	۱۱۷
خودکترلی کل	۳۱/۰۲	۳۱/۰۲	۹/۷۸	۱۱۷
احساس تنها	۴۹/۰۴	۴۹/۰۴	۶/۲	۱۱۷
ولع بازگشت به مصرف مواد	۶۶/۲۴	۶۶/۲۴	۲۱/۸۶	۱۱۷

در جدول فوق میانگین و انحراف استاندارد نمرات مربوط به متغیرهای پژوهش ارائه شده است. جهت بررسی هدف پژوهش ضرایب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون چندگانه به روش گام به گام اجرا شد و چند مفروضه اصلی آزمون رگرسیون شامل داده‌های گمشده^۱، نرمال بودن^۲ و هم خطی چندگانه^۳ بررسی شد. در پژوهش حاضر از

1. missing
2. normality

3. multicollinearity

روش جایگزینی^۱ داده‌های گمشده با میانگین استفاده شد و جهت بررسی نرمال بودن متغیرها از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف^۲ استفاده شد که نتایج حاکی از آن بود که نمرات متغیرهای پژوهش دارای توزیع نرمال بودند ($p < 0.05$). هم خطی چندگانه متغیرهای پیش‌بین نیز با استفاده از آماره اغماض یا تحمل^۳ و عامل تورم واریانس^۴ بررسی شد. نتایج نشان داد که مقادیر ارزش‌های تحمل به دست آمده برای متغیرها بالای ۰/۱۰ بود که نشان‌دهنده نبود هم خطی چندگانه بین متغیرهای پیش‌بین است. همچنین مقدار عامل تورم واریانس به دست آمده برای متغیرها کوچک‌تر از ۰/۱۰ بود که بیانگر نبود هم خطی چندگانه بین متغیرهای پیش‌بین است. به منظور آزمون استقلال خطاهای در بین متغیرهای پیش‌بین، ارزش شاخص دورین-واتسون^۵ مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به ارزش شاخص دورین واتسون محاسبه شده، می‌توان گفت مفروضه استقلال خطاهای و پیش‌فرض استفاده از تحلیل رگرسیون برقرار است. از جمله مفروضات مهم دیگر در تحلیل رگرسیون عدم وجود همخطی چندگانه^۶ می‌باشد. در صورتی می‌توان گفت که پیش‌فرض عدم وجود همخطی چندگانه رعایت شده است که همبستگی بین متغیرهای مستقل یا پیش‌بین کمتر از ۰/۹۰ باشد. با توجه به نتایج همبستگی پیرسون که در جدول ۲ در ادامه ارائه شده است، همبستگی بین متغیرهای مستقل (پیش‌بین) کمتر از ۰/۹۰ می‌باشد.

جدول ۲: ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش

متغیر	۶	۵	۴	۳	۲	۱	۱
خودآسیب‌رسانی							۱
خودکترلی منع کننده						۰/۰۳۵	۱
خودکترلی اولیه					۰/۰۶	۰/۸۸**	۱
خودکترلی کل					۰/۰۶	۰/۹۷**	۰/۹۵**
احساس تنهایی					۰/۰۲۵	۰/۰۱۰	-۰/۰۶
ولع بازگشت به مصرف مواد					۰/۱۳*	۰/۰۵۸**	-۰/۰۵۳**
	۱	۰/۴۴***	-۰/۰۵۷**	-۰/۰۵۳**	-۰/۰۵۸**	-۰/۰۱۰	-۰/۰۵

**p<0.01 *p<0.05

1. replacement
2. Kolmogoro-Smirnov test
3. tolerance

4. Variance Inflation Factor (VIF)
5. Durbin-Watson
6. multicollinearity

نتایج ضریب همبستگی پیرسون در جدول ۲ نشان می‌دهد که بین ولع بازگشت به مصرف مواد با خود آسیب‌رسانی و احساس تنها‌یی رابطه مثبت و بین ولع بازگشت به مصرف مواد با خودکنترلی و ابعاد آن رابطه منفی وجود دارد. در جدول ۳ جداول ضرایب رگرسیونی پیش‌بینی ولع بازگشت به مصرف مواد بر اساس خودآسیب‌رسانی، خودکنترلی و احساس تنها‌یی در افراد وابسته به مواد مخدر تحت درمان نگهدارنده متادون ارائه شده است.

جدول ۳: ضرایب رگرسیونی پیش‌بینی ولع بازگشت به مصرف مواد بر اساس خودآسیب‌رسانی، خودکنترلی و احساس تنها‌یی

گامها	متغیرهای پیش‌بین	B	ضریب استاندارد	R2 اصلاح شده	F	R2 سطح معنی‌داری	گام اول
خودکنترلی منع کننده	-۲/۷۱	۱۰۵/۴۸	-۰/۵۸	۰/۳۳	۱۰۷/۷۲	***/۰/۰۱	
مقدار ثابت	۳۵/۵۳	-۰/۵۴	-۰/۵۴	۰/۳۴	۹۹/۹۴	***/۰/۰۱	گام دوم
خودکنترلی منع کننده	-۲/۵۲	۱/۳۷	-۰/۳۹	۰/۴۸	۱۰۷/۷۲	***/۰/۰۱	
احساس تنها‌یی	۱/۳۶	-۰/۵۴	-۰/۵۴	۰/۳۳	۹۹/۹۴	***/۰/۰۱	گام سوم
مقدار ثابت	۲۷/۴	-۰/۵۴	-۰/۵۴	۰/۴۹	۷۱/۷۹	***/۰/۰۱	
خودکنترلی منع کننده	-۲/۵۴	۰/۷۸	-۰/۱۴	۰/۵۱	۰/۵۰	**p<۰/۰۱	
احساس تنها‌یی	۱/۳۶	-۰/۳۸	-۰/۳۸	۰/۴۸	۹۹/۹۴	***/۰/۰۱	
آسیب به خود	۰/۷۸	-۰/۱۴	-۰/۱۴	۰/۴۹	۱۰۷/۷۲	***/۰/۰۱	

نتایج نشان داد که در گام اول خودکنترلی منع شده ($Beta = -0/58$, $p < 0/001$) وارد معادله شد و ۳۳ درصد ولع بازگشت به مصرف مواد را پیش‌بینی کرد. در گام دوم احساس تنها‌یی ($Beta = 0/39$, $p < 0/001$) به معادله رگرسیون اضافه شد و درصد پیش‌بینی به ۴۸ توانستد را پیش‌بینی کرد. در گام سوم خودآسیب‌رسانی ($Beta = 0/14$, $p < 0/001$) وارد معادله درصد افزایش یافت. در گام اول خودکنترلی منع شده ($Beta = -0/58$, $p < 0/001$) وارد معادله رگرسیون شد و ۵۰ درصد ولع بازگشت به مصرف مواد را پیش‌بینی کرد. در کل متغیرهای خودکنترلی منع کننده، احساس تنها‌یی و آسیب به خود توانستند روی هم درصد از واریانس ولع بازگشت به مصرف مواد را پیش‌بینی کنند.

بحث و نتیجه‌گیری

پژوهش حاضر باهدف پیش‌بینی ولع بازگشت به مصرف مواد بر اساس خودآسیب‌رسانی، خودکنترلی و احساس تنهایی در افراد وابسته به مواد مخدر تحت درمان نگهدارنده متادون انجام شد. نتایج نشان داد که بین ولع بازگشت به مصرف مواد با خودآسیب‌رسانی و احساس تنهایی رابطه مثبت و بین ولع بازگشت به مصرف مواد با خودکنترلی رابطه منفی وجود دارد. این نتیجه با یافته‌های پژوهش‌های لاذ و همکاران (۲۰۲۲)، باندی و همکاران (۲۰۱۴)، چن و همکاران (۲۰۱۹)، تاتنل و همکاران (۲۰۱۴)، بارلو همکاران (۲۰۲۱)، کیکتر و همکاران (۲۰۱۳)، ویتلارک و همکاران (۲۰۱۲) و جعفری سیاوشانی و همکاران (۱۳۹۷) همسو است. نتایج رگرسیون نشان داد که احساس تنهایی، آسیب به خود و خودکنترلی توانستند ولع بازگشت به مصرف مواد را پیش‌بینی کنند و در این بین توان آسیب به خود در پیش‌بینی ولع بازگشت به مصرف مواد، کمتر از احساس تنهایی و خودکنترلی بود.

در تبیین □ پیش‌بینی ولع مصرف براساس خودآسیب‌رسانی می‌توان گفت هنگامی که افراد خودآسیب‌رسانی می‌کنند، احتمالاً دلایل مختلفی برای این رفتار از جمله کاهش درد و تنفس، افزایش احساس کنترل، بیشتر شدن احساس خودآگاهی و غیره دارند. این دلایل می‌توانند نشان‌دهنده وجود چالش‌های روانی و اجتماعی در این افراد باشند. از طرفی، مصرف مواد نیز می‌تواند به عنوان یک راه برای کاهش درد و تنفس استفاده شود. به عبارت دیگر، افرادی که به دنبال کاهش درد و تنفس هستند، ممکن است به وسیله مصرف مواد، احساس تحرک و آرامش کنند. بنابراین، وجود چالش‌های روانی و اجتماعی در افرادی که خودآسیب‌رسانی می‌کنند، می‌تواند به عنوان یک عامل مشترک بین خودآسیب‌رسانی ولع مصرف مواد عمل کند. به عبارت دیگر، هر دو رفتار ممکن است به دنبال کاهش درد و تنفس باشند و در برخی افراد، خودآسیب‌رسانی می‌تواند به عنوان یک پیش‌بینی کننده برای ولع مصرف مواد عمل کند (آنستیز و جونیر^۱؛ ۲۰۱۱؛ بروچ^۲ و همکاران، ۲۰۱۹). در کل، وجود چالش‌های روانی و اجتماعی در افرادی که خود

۱۲۰

120

۱۴۰: جلد: ۱۸، نو: ۷۲، سال: ۱۴۰۰، پیاپی: ۲۰۲۴
[DOI: 10.61186/etiadpajohi.18.72.5]

آسیب‌رسانی می‌کنند، می‌تواند به عنوان یک عامل مشترک بین خود آسیب‌رسانی و لع مصرف مواد کند و خود آسیب‌رسانی می‌تواند به عنوان یک پیش‌بینی کننده برای لع مصرف مواد در افراد، مورد استفاده قرار گیرد.

خودکنترلی یا عدم توانایی در کنترل عواطف و احساسات می‌تواند باعث شود که فرد به دنبال راههایی برای کاهش درد و تنفس خود باشد. این راه‌ها ممکن است شامل مصرف مواد مخدر باشد که به عنوان یک راه برای کاهش احساس ناراحتی و استرس استفاده می‌شوند. در واقع، مصرف مواد می‌تواند به عنوان یک راه برای کنترل عواطف و احساسات به نظر برسد. به عنوان مثال، فردی که ناتوان در کنترل عواطف خود است ممکن است به دنبال استفاده از مواد مخدر باشد تا بتواند احساس آرامش و رضایت را تجربه کند و به عنوان یک راه برای کنترل عواطف خود برای مدتی از احساس ناراحتی و استرس فرار کند (هاسانگ^۱ و همکاران، ۲۰۱۱؛ وارسپان^۲ و همکاران، ۲۰۱۶) □ به طور کلی، مشکلات روانی و رفتاری مانند عدم توانایی در کنترل عواطف و احساسات می‌توانند به عنوان یک پیش‌بینی کننده برای لع مصرف مواد عمل کنند. به عنوان مثال، مطالعات نشان داده‌اند که افرادی که به مشکلات روانی و رفتاری مانند افسردگی، اضطراب و عدم توانایی در کنترل عواطف و احساسات دچار هستند، بیشترین ریسک برای لع مصرف مواد دارند.

وجود احساس تنها‌یی ممکن است باعث شود که فرد به دنبال راههایی برای کاهش این احساس باشد. در برخی موارد، فرد ممکن است به دنبال راههایی برای برطرف کردن این احساس باشد، از جمله مصرف مواد مخدر که به عنوان یک راه برای کاهش احساس تنها‌یی و افزایش احساس آرامش استفاده می‌شود (هتز و هاسکین، ۲۰۱۹). علاوه بر این، فردی که احساس تنها‌یی دارد، ممکن است به دنبال پذیرش و الگوی رفتاری یا ارتباطاتی نامناسب باشد که می‌تواند به لع مصرف مواد منجر شود. به عنوان مثال، فرد ممکن است به دنبال پذیرش از دیگران باشد و از طریق مصرف مواد، به علاقه‌مندی و تائید دیگران برای خود برسد. به طور کلی، وجود مشکلات روانی و رفتاری مانند احساس تنها‌یی می‌تواند

1. Hussong
2. Vorspan

3. Heinze & Hasking

به عنوان یک پیش‌بینی کننده برای ولع مصرف مواد عمل کند. به عنوان مثال، مطالعات نشان داده‌اند افرادی که احساس تنهایی دارند، بیشترین ریسک برای ولع مصرف مواد دارند. بنابراین، داشتن روابط اجتماعی مناسب و پشتیبانی اجتماعی می‌تواند به عنوان یک راه برای پیشگیری از ولع مصرف مواد در افراد با مشکلات روانی و رفتاری مانند احساس تنهایی عمل کند.

مطالعه حاضر بر روی افراد وابسته به مواد مخدر مرد تحت درمان نگهدارنده متادون شهر زنجان انجام شد، بنابراین تعییم نتایج به سایر گروه‌ها و فرهنگ‌ها باحتیاط همراه است. پژوهشگران در این پژوهش برای ورود به مراکز درمان اعتیاد و جلب رضایت آگاهانه افراد وابسته به مواد مخدر برای شرکت در پژوهش، با محدودیت‌هایی مواجه بودند. همان‌طور که نتایج پژوهش نشان داد احساس تنهایی، آسیب به خود و خودکتری و توانستند ولع بازگشت به مصرف مواد را تبیین کنند و در این بین نقش خودکتری و احساس تنهایی در پیش‌بینی ولع بازگشت به مصرف مواد بالا بود، بنابراین پیشنهاد می‌گردد که روان‌شناسان اعتیاد و بالینی در کار با افراد وابسته به مواد مخدر و کاهش خطر و سوسه بازگشت به مصرف، این متغیرها را مورد توجه قرار دهند. انجام پژوهش با نمونه بیشتر و تنوع فرهنگی و جنسیتی در پژوهش‌های آتی پیشنهاد می‌شود.

۱۲۲

122

۱۴۰۷، ۱۸، No. ۷۲، سالنامه، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

منابع

اردمه، علی (۱۳۹۲). بررسی اثربخشی گروه درمانی پیشگیری از عود مبتئی بر ذهن آگاهی بر ولع مصرف و ذهن آگاهی در افراد وابسته به مواد مخدر تحت درمان داروی نگهدارنده متادون شهر اهواز. پایان‌نامه کارشناسی روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز.

جعفری سیاوشانی، فائزه؛ بر جعلی، احمد و کیامنش، علیرضا (۱۳۹۷). نقش سبک‌های دل‌بستگی و مشکلات هیجانی مادران در احساس تنهایی با واسطه گری سبک‌های هویت در دختران نوجوان دبیرستانی. *فصلنامه فرهنگی تربیتی زنان و خانواده*، ۱۳(۴۳)، ۱۵۴-۱۳۳.

جلیلی نیکو، سعید (۱۳۹۴). نقش تاب‌آوری خانواده و ذهن آگاهی در آمادگی اعتیاد دانشجویان. *ارمندان دانش*، ۲(۴)، ۳۶۸-۳۵۷.

حسن زاده، فاطمه؛ سبزی، زهراء؛ احسانیان، الهام و حجتی، حمید (۱۳۹۶). همبستگی اعتیاد به اینترنت با احساس تنهایی نوجوانان استان گلستان. *فصلنامه مدیریت ارتباطی سلامت*، ۶(۶)، ۱۴-۸.

حسینیان سراجه لو، فرج (۱۳۸۹). رابطه کمال گرایی، تاب آوری و تکانشگری در معتقدین به مواد مخدر شهر تهران جهت تبیین مدل ولع مصرف مواد در آن‌ها. پایان‌نامه کارشناسی روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی.

دیبری، سولماز (۱۴۰۱). نقش خودکتری، عواطف و شفقت به خود در پیش‌بینی آمادگی به اعتیاد. *فصلنامه علمی اعتیادپژوهی*، ۱۶(۶۵)، ۳۳۲-۳۱۱.

رحمانیان، مهدیه؛ میر جعفری، احمد و حسنی، جعفر (۱۳۸۵). رابطه وسوسه مصرف مواد و سوگیری توجه: مقایسه افراد وابسته. *مجله روان‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران*، ۱۲(۳)، ۲۲۲-۲۱۶.

رهبر کنارسری، زینب؛ رنجبر نوشی، فرزانه و برادران، مجید (۱۴۰۲). نقش واسطه‌ای خودمهارگری در رابطه بین تجارت آسیب‌زای دوران کودکی و ولع مصرف مواد در بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون. *فصلنامه علمی اعتیادپژوهی*، ۱۷(۷۰)، ۵۴-۳۱.

سواری، علی (۱۳۹۱). مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری و ذهن آگاهی بر پیشگیری از عود و سلامت روان مصرف کنندگان کراک. پایان‌نامه کارشناسی روان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی.

صالحی فدری، جواد؛ بر عرفان، زرین و امین یزدی، امیر (۱۳۸۹). اثربخشی کنترل توجه بر کاهش تورش توجه به مواد و بهبود شاخص‌های درمانی افراد وابسته به مواد مخدر تحت درمان سه‌مازی. *مطالعات تربیتی و روان‌شناسی*، ۱۱(۲)، ۵۶-۲۹.

طاهیاز حسن‌زاده، سحر؛ قربانی، نیما و نبوی، مسعود (۱۳۹۹). مقایسه گرایش شخصیتی خودتخریبی و خودشناسی انسجامی در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروز و افراد سالم. *مجله روان‌شناسی معاصر*، ۶(۲)، ۴۴-۳۵.

علی پور، فرشید؛ حسنی، جعفر؛ سعید پور، صابر و بداقی، الهه (۱۳۹۶). خصوصیات روان‌سنجی فرم فارسی ابزار سنجش هم‌وابستگی. *فصلنامه علمی اعتیادپژوهی*، ۱۱(۴۲)، ۲۶۸-۲۴۹.

کریمی، سیروان؛ پیرمرادی، محمد رضا؛ عاشوری، احمد و عاقبتی، اسماعیل (۱۳۹۹). ارتباط میان صفات سرشت و منش، مؤلفه‌های تنظیم هیجان و فرزند پروری ادراک‌شده با رفتار خودآسیبی در نوجوانان: رویکرد مدل‌یابی معادلات ساختاری. *مجله روان‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران*، ۲۶(۴)، ۴۶۳-۴۴۸.

محمدزاده، جهانشاه و گل‌گلی، فرشته (۱۳۹۳). مقایسه‌ی تاب‌آوری و ذهن‌آگاهی در افراد دارای سوء‌صرف مواد و افراد بهنجار. *فصلنامه دانش انتظامی ایلام*، ۱۱(۳)، ۷-۱۶.

محمدی بنمار، علی؛ کاکاوند، علیرضا؛ زارعی، فهیمه و احمدی، مهدی (۱۴۰۲). رابطه میان استرس ادراک شده و اعتیاد به تلفن همراه در دوران همه‌گیری کووید-۱۹: نقش نشخوار فکری و خودکنترلی. *مطالعات روان‌شناسی*، ۱۹(۱)، ۹۳-۱۰۷.

مریدی، مینو؛ خوش‌روش، سحر؛ نوری، رقیه و پاشایی، طاهره (۱۳۹۶). سبک‌های عود در میان صرف کنندگان مواد مخدر و محرک‌ها. *مجله علمی پژوهان*، ۱۵(۳)، ۱۰-۱۵.

نادری، حبیب‌الله؛ فیروز زاده پاشا، نرگس و کارگر، فاطمه (۱۳۹۵). رابطه بین سبک دلبستگی، خود پنداره و احساس تنها‌یی در میان دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم. *مجله روان‌شناسی و روان‌پژوهشی شناخت*، ۳(۲)، ۱-۱۰.

References

- Anestis, M. D., & Joiner, T. E. (2011). Examining the role of emotion in suicidality: Negative urgency as an amplifier of the relationship between components of the interpersonal-psychological theory of suicidal behavior and lifetime number of suicide attempts. *Journal of affective disorders*, 129(1-3), 261-269.
- Barlow, D. H., Ellard, K. K., Sauer-Zavala, S., Bullis, J. R., & Carl, J. R. (2014). The origins of neuroticism. *Perspectives on psychological science*, 9(5), 481-496.
- Brausch, A. M., Decker, K. M., & Hadley, A. G. (2019). Nonsuicidal self-injury and substance use: A review. *Journal of the society for social work and research*, 10(3), 447-473.
- Bresin, K., & Verona, E. (2021). Craving and substance use: Examining psychophysiological and behavioral moderators. *International journal of psychophysiology*, 163(11), 92-103.
- Budney, A. J., Stanger, C., & Thostenson, J. (2021). The importance of self-control as a protective factor against addiction. *Current opinion in psychology*, 38(9), 31-35.
- Ceceli, A. O., Bradberry, C. W., & Goldstein, R. Z. (2022). The neurobiology of drug addiction: cross-species insights into the dysfunction and recovery of the prefrontal cortex. *Neuropsychopharmacology*, 47(1), 276-291.
- Chen, Y. Y., Huang, W. L., Lu, C. H., & Wang, L. J. (2019). The effect of self-control on craving and relapse in opioid-dependent patients receiving methadone maintenance treatment. *Frontiers in psychiatry*, 10(3), 753-770.
- Dawe-Lane, E., & Flouri, E. (2023). Parenting in the early years and self-harm in adolescence: The role of control and reward systems in childhood. *Journal of affective disorders*, 339(46), 788-798.

- Friess, M., & Hofmann, W. (2019). Control me or I will control you: Impulses, trait self-control, and the guidance of behavior. *Research in personality*, 43(5), 795-805.
- Heinze, G., & Hasking, P. (2019). An exploration of the relationship between loneliness and alcohol use. *Alcohol research: current reviews*, 40(1), 1-6.
- Hussong, A. M., Jones, D. J., Stein, G. L., Baucom, D. H., & Boeding, S. (2011). An internalizing pathway to alcohol use and disorder. *Psychology of addictive behaviors*, 25(3), 390-404.
- Inzlicht, M., Werner, K. M., Briskin, J. L., & Roberts, B. W. (2021). Integrating models of self-regulation. *Annual review of psychology*, 72(13), 319-345.
- Jones, L., & Vigo, D. (2023). Mental health and substance abuse. In *Global Health Essentials* (pp. 197-201). Cham: Springer International Publishing.
- Kiekens, G., Hasking, P., Claes, L., & Boyes, M. (2013). Non-suicidal self-injury and coping strategies in emerging adulthood: the moderating roles of gender and sexual orientation. *Journal of youth and adolescence*, 42(10), 1553-1563.
- Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. *Educational and psychological measurement*, 30(3), 607-610.
- Lades, L. K., Barbett, L., Daly, M., & Dombrowski, S. U. (2022). Self-control, goal interference, and the binge-watching experience: An event reconstruction study. *Computers in human behavior reports*, 7(3), 100-120.
- Lauvsnes, A. D. F., Gråwe, R. W., & Langaas, M. (2022). Predicting relapse in substance use: prospective modeling based on intensive longitudinal data on mental health, cognition, and craving. *Brain sciences*, 12(7), 957-970.
- Liu, X., Yuan, K., Lu, T., Lin, X., Zheng, W., Xue, Y., & Han, Y. (2023). Preventing incubation of drug craving to treat drug relapse: from bench to bedside. *Molecular psychiatry*, 1(2), 1-15.
- Muawanah, A., & Tentama, F. (2020). Analysis construct validity and reliability of loneliness scale. *International journal of scientific and technology research*, 9(2), 3969-3974.
- Russell, D., Peplau, L. A., & Cutrona, C. E. (1980). The revised UCLA Loneliness Scale: concurrent and discriminant validity evidence. *Journal of personality and social psychology*, 39(3), 472.
- Russell, D., Peplau, L. A., & Ferguson, M. L. (1978). Developing a measure of loneliness. *Journal of personality assessment*, 42(3), 290-294.
- Russell, D., Peplau, L. A., & Ferguson, M. L. (1978). Developing a measure of loneliness. *Journal of personality assessment*, 42(3), 290-294.

۱۲۵
۱۲۵

سال میجهد، شماره ۷۲، تابستان ۹۴،
Vol. 18, No. 72, Summer 2024

- Safren, S. A., Blashill, A. J., & O'Cleirigh, C. (2020). Self-control and substance use among college students: A cross-sectional study. *Substance use & misuse*, 55(7), 1106-1112.
- Sahker, E., Pro, G., Poudyal, H., & Furukawa, T. A. (2024). Evaluating the substance use disorder treatment gap in the United States, 2016– 2019: A population health observational study. *The American journal on addictions*, 33(1), 36-47.
- Sansone, R. A., Gage, M. D., & Wiederman, M. W. (1998). Investigation of borderline personality disorder among nonpsychotic, involuntarily hospitalized clients. *Journal of mental health counseling*, 20(2), 133-150.
- Sornberger, M. J., Heath, N. L., Toste, J. R., & McLouth, R. (2012). Nonsuicidal self-injury and gender: Patterns of prevalence, methods, and locations among adolescents. *Suicide and life-threatening behavior*, 42(3), 266-278.
- Tangney, J. P., Baumeister, R., & Boone, A. L. (2004). High self-control predicts good adjustment, less pathology, better grades and interpersonal success. *Journal of personality*, 72(2), 271-324.
- Tatnell, R., Kelada, L., Hasking, P., & Martin, G. (2014). Longitudinal analysis of adolescent NSSI: the role of intrapersonal and interpersonal factors. *Journal of abnormal child psychology*, 42(6), 885-896.
- Vorspan, F., Mehtelli, W., Dupuy, G., Bloch, V., Lépine, J. P., & Bellivier, F. (2016). Anxiety and substance use disorders: Co-occurrence and clinical issues. *Journal of affective disorders*, 206(17), 251-257.
- Whitlock, J., Muehlenkamp, J., Eckenrode, J., Purington, A., Abrams, G., Barreira, P., & Kress, V. (2012). Nonsuicidal self-injury as a gateway to suicide in young adults. *Journal of adolescent health*, 52(4), 486-492.
- Wilson, L., Szigeti, A., Kearney, A., Clarke, M. (2018). Clinical characteristics of primary psychotic disorders with concurrent substance abuse and substance-induced psychotic disorders: A systematic review. *Schizophrenia research*, 197(19), 78-86.
- Wongpakaran, N., Wongpakaran, T., Pinyopornpanish, M., Simcharoen, S., Suradom, C., Varnado, P., & Kuntawong, P. (2020). Development and validation of a 6-item Revised UCLA Loneliness Scale (RULS-6) using Rasch analysis. *British journal of health psychology*, 25(2), 233-256.
- Xu, L., Chang, R., Chen, Y., Xia, D., Xu, C., Yu, X., & Cai, Y. (2023). Perceived stress predicts drug use in transgender women: the mediating role of loneliness. *Transgender health*, 8(3), 123-145.

۱۲۶
۱۲۶

۱۴۰۷:۱۸، نو ۷۲، سالنامه، پژوهشی