

تأثیر آموزش آرمیدگی عضلانی در کاهش علایم سندرم پیش از قاعدگی

دکتر فرح لطفی کاشانی^۱، خدیجه سرافراز^۲ و دکتر حسن پاشا شریفی^۳

هدف پژوهش حاضر، تعیین تأثیر آموزش آرمیدگی عضلانی در کاهش علایم سندرم پیش از قاعدگی است. برای این منظور ۴۲ نفر دانشجوی دختر مستقر در خوابگاه‌های دانشگاه علامه طباطبائی تهران که مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی بودند به روش نمونه‌گیری داوطلبانه انتخاب و بعد به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم و مورد آزمون قرار گرفتند. در این فرایند به گروه آزمایش، ۶ جلسه ریکسیشن (به روش جکوبسون) آموزش داده شد و در مدت دو سیکل قاعدگی، تمرین روزانه ریکسیشن را همراه با لوح فشرده یا کاست که با صدای پژوهشگر پر شده بود ادامه دادند. یافته‌های پژوهش نشان داد که آموزش آرمیدگی عضلانی می‌تواند علایم سندرم پیش از قاعدگی را به طور معنی داری کاهش دهد.

واژه‌های کلیدی: سندرم پیش از قاعدگی، آرمیدگی عضلانی

مقدمه

سندرم پیش از قاعدگی^۴ (PMS) یک اختلال نسبتاً شایع در میان زنان در سنین باروری است (هالبریچ^۵، ۲۰۰۴). این سندرم که از نظر تاریخی تنش پیش قاعدگی^۶ نامیده می‌شود (آپوتك^۷ ۲۰۰۶) نامیده می‌شود مجموعه‌ای از نشانه‌های بدنی، روان‌شناختی و هیجانی است که با تغیرات دوره‌ای مربوط به سیکل قاعدگی در خلق، احساس کلی، رفاه جسمی و روانی زنان مشخص می‌شود. به طور معمول علایم به فاصله‌ای کوتاه پس از تخمک گذاری شروع می‌شود، به تدریج شدت می‌یابد و در حدود ۵ روز قبل از شروع عادت ماهانه به حداقل می‌رسد. رخداد این نشانه‌های چرخشی، در دوران بارداری و یايسگی ناپدید می‌شود و این

۱- استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

۲- کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

۳- دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

4- Premenstrual Syndrome

5- Halbreich

6- Premenstrual Tention

7- Apotek

موضوع، به دلیل توقف دوره ای هورمونهای جنسی است به طوری که درمان جانشین سازی هورمونها در بعد از یاپسگی پدید آیی مجدد نشانه ها را در یک زن دارای سابقه PMS، ایجاد می کند (استرین^۱، ۲۰۰۰). عواملی از جمله عوامل روانی، اجتماعی و زیستی در بیماری زایی این سندروم موثر است و حتی برخی پژوهش ها این اختلال را برآیند اجتماع میدانند (اریکسون^۲ و همکاران، ۲۰۰۶).

در حالی که بیش از ۲۰۰ نشانه در این اختلال معرفی شده است (مايوکلینیک^۳، ۲۰۰۶؛ آلویز^۴ ۲۰۰۷؛ جانسون^۵، ۲۰۰۷ و امی^۶، ۲۰۰۸)، سه نشانه‌ی ناپایداری، تنش و ناشادمانی علایم محوری این اختلال به شمار می آیند (لوری^۷ و همکاران، ۲۰۰۳). در سبب شناسی این سندروم اهمیت خاصی برای تغییرات سطح استروژن، پروژتروژن، آندروجن و پرولاکتین قابل شده اند و بنظر می رسد که ساخت و کار سروتونین در مغز نقشی محوری در این اختلال داشته باشد (ام پی^۸، ۲۰۰۵؛ ان اچ اس دایرکت^۹، ۲۰۰۵، سی پی ام اس^{۱۰}، ۲۰۰۷).

سندروم پیش از قاعدگی، پس از اولين عادت ماهانه و حتی پس از برداشتن رحم نیز به شرط اینکه تخدمانها سالم باقی بمانند، دیده می شود (کاپلان و سادوک،^{۱۱} ۱۳۷۹) و به طور کلی یک اختلال پایدار به حساب می آید (روکا^{۱۲} و همکاران، ۱۹۹۹). نشانه های سندروم پیش از قاعدگی به صورت تحریک پذیری، تنش، بی قراری و نا استواری هیجانی و خلقی ظاهر می شوند که به طور جدی در سبک زندگی و ارتباطات اجتماعی زنان اختلال ایجاد می کند. هفتاد تا نواد درصد زنان در سنین باروری علایمی از این سندروم گزارش میکنند (کاپلان و سادوک،^{۱۱} ۱۳۷۹). بیش از بیست درصد زنان شدت نشانه هایشان در حدی است که میتوان برای آنها تشخیص گذاشت و نیاز به درمان دارند (هالبریج، ۲۰۰۴).

اخیرا گفته شده است که مواجهه با پیتیدهای افیونی درونزا و قطع ناگهانی آنها که تحت تاثیر استروپید های مربوط به غدد جنسی نوسان می یابند، ممکن است در بروز سندروم پیش از قاعدگی

- 1- Sterin
- 2- Eriksson
- 3- MayoClinic
- 4- Always
- 5- Johanson
- 6- Amy

- 7- Lori
- 8- Merck Manual Profession
- 9- NSH Direkt
- 10- Causes of PMS
- 11- Kaplan & Sadok
- 12- Roca

موثر باشد. اوکی هیالام^۱ (۲۰۰۴) عقیده دارد نمونه‌های متعدد ناهمگون از PMS وجود دارند که همگی با تنش مفرط آغاز می‌شوند اما هنوز توافقی در سبب شناسی این سندرم وجود ندارد. افزایش میزان ترشح پروستاگلاندین مترشحه از عضله‌ی رحم نیز با درد همراه با این سندرم، ربط داده شده است.

با توجه به اینکه امروزه، اکثر زنان در زمینه‌های مختلف اجتماعی فعالیت دارند چنانچه درمانی در مورد این افراد صورت نگیرد، عوارض بسیاری را متحمل خواهیم شد (کمالی، ۱۳۷۹). البته برای درمان یا پیشگیری از سندرم پیش از قاعده‌گی هنوز داروی اختصاصی وجود ندارد (مورتولا، ۱۹۹۴، نقل از بابایان زاد اهری، ۱۳۷۸). بعضی از داروها علایم جسمانی را به خوبی کاهش میدهند ولی تاثیر چندانی بر علایم روانی ندارند. از طرف دیگر، داروهای روان درمانی اگر چه باعث رفع علایم روانی می‌شوند، کارآیی چندانی در تسکین علایم جسمانی ندارند (سوزیک و شنالت، ۱۹۹۷ نقل از بابایان زاد اهری، ۱۳۷۸). نظر به اینکه امروزه، درمان با مواد شیمیایی دیگر به عنوان بهترین درمان تلقی نمی‌شود باید به دنبال روش‌های درمانی نوین، عملی و کم زیان تر نظری فنون آرامسازی^۲ بود (کمالی، ۱۳۷۹).

با توجه به اینکه تعداد زیادی از زنان در عصر حاضر، در حیطه‌های شغلی، تحصیلی، خانوادگی و سایر مسؤولیتها مشارکت دارند و استرس ناشی از این مسؤولیتها با مسایل بهداشتی همچون سندرم پیش از قاعده‌گی ارتباط پیدا می‌کند (سعادتی، ۱۳۷۳)، تغیر شیوه‌ی زندگی، عضویت در گروه‌های حمایتی، به کارگیری روش‌های کنترل استرس همراه با مکمل دارویی و ویتامینی ممکن است به تخفیف نشانه‌های بیماری منجر شود ولی اطلاعات موجود در مورد درمان کامل این بیماری در حال حاضر بسیار محدود است.

آرمیدگی نوعی یادگیری و یکی از روش‌های مقابله با واکنش‌های جسمی استرس است. اگر یاد بگیریم تنش یا کشیدگی ماهیچه هایمان را به کمک آرمیدگی کاهش دهیم، خواهیم توانست استرس را کنترل کنیم (گنجی، ۱۳۷۹) و با کنترل استرس، بسیاری از مشکلات بهداشتی را بر طرف می‌سازیم.

1- Okeahialam

2- Relaxation

در تحقیق حاضر نیز سعی شده به بررسی تاثیر آموزش آرمیدگی بر کنترل علایم جسمانی و روانی PMS پرداخته شود.

روش

جامعه‌ی آماری، نمونه و روش نمونه گیری

جامعه‌ی مورد مطالعه، شامل کلیه‌ی دانشجویان دختر خوابگاههای دانشگاه علامه طباطبائی در تهران است که از سندرم پیش از قاعدگی رنج می‌برند. از این تعداد ۴۲ نفر به صورت نمونه گیری داوطلبانه انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه آزمایشی و کنترل تقسیم شدند. به گروه آزمایشی، آموزش ریلکسیشن داده شد و به گروه کنترل هیچگونه آموزشی داده نشد.

ابزار

در پژوهش حاضر، از پرسشنامه و برگه‌ی ثبت موارد محقق ساخته، جهت جمع آوری داده‌ها استفاده شد. فرم پرسشنامه شامل ۳ بخش است. بخش اول که با توضیحی در مورد علایم پیش از قاعدگی شروع می‌شود و وجود و شدت سندرم پیش از قاعدگی را براساس علایم ۳ ماه گذشته تعیین می‌کند (این قسمت برگرفته از پرسشنامه‌ی علامت شناسی آبراهام و تیلور (۱۹۹۰) به نقل از بابایان زاد اهری است). این پرسشنامه شامل ۱۷ علامت است (۱۱ علامت رفتاری و ۶ علامت جسمانی). در مقابل علایم، ستونی جهت ثبت شدت علایم در نظر گرفته شده است. شدت هریک از علایم، به چهار درجه تقسیم شده است که امتیاز صفر تا سه به آن تعلق می‌گیرد. (ندارم (۰)، خفیف (۱)، متوسط (۲)، شدید (۳)). بخش دوم پرسشنامه شامل ۸ سوال در مورد معیارهای انتخابی نمونه جهت تحقیق مورد نظر است مانند: سن آزمودنی، سن شروع قاعدگی، طول مدت قاعدگی، فاصله بین دو قاعدگی، وجود بیماری جسمانی یا روانی در آزمودنی، مصرف داروی خاص، وقوع حادثی از قبیل (فوت نزدیکان، ازدواج، عمل جراحی و...) . بخش سوم پرسشنامه جهت ثبت موارد قاعدگی‌ها در طی انجام پژوهش و آزمایش است که چهار نسخه از آن در طی تحقیق به هر آزمودنی ارایه شد که بر روی هر صفحه‌ی یک تقویم روزانه قاعدگی به مدت ۳۱ روز جهت ثبت علایم روزانه و در کنار آن یک ستون شامل (۱۱ علامت رفتاری و ۶ علامت جسمی) مانند بخش اول پرسشنامه است. در انتهای این فرم نیز ۳ سوال در مورد معیارهای حذف نمونه داده شده است.

در پژوهش حاضر، پس از انجام دادن مصاحبه با دانشجویان و ارایه ی پرسشنامه از آزمودنیها خواسته شد که علایم خود را با اعداد مشخص شده در پرسشنامه ، معین کنند سپس از دانشجویانی که دارای علایم باشدت ۲ و ۳ بودند و بیماری خاص و یا دارو درمانی نداشتند و اخیراً حوادثی (از قبیل ازدواج ، فوت نزدیکان ، جراحی وغیره) برای آنها رخ نداده بود دعوت کردیم تا در پژوهش ما شرکت نمایند. با فراهم آمدن گروه داوطلبین، آنها را به صورت تصادفی به دو گروه آزمایشی و کنترل تقسیم کردیم. بعد، از هر گروه در طی دو سیکل قاعده‌گی تست گرفته شد . در طی این مدت، پژوهشگر هر هفته با همه ی آزمودنیها جلسات ملاقات داشت و اگر اشکالی داشتند آنها را راهنمایی می کرد . سپس به مدت یک ماه در ۶ جلسه، به گروه آزمایشی آموزش ریلکسیشن داده شد . لازم به ذکر است که به گروه کنترل هیچ‌گونه آموزشی داده نشد . سپس از آزمودنی ها خواسته شد که این تمرینات را در طی دو ماه آینده بر طبق دفترچه‌ی راهنمای و بوسیله‌ی لوح فشرده یا کاست که در اختیار شان قرار گرفت انجام دهند، سپس در طی دو ماه مجدداً کلیه‌ی آزمودنی های دو گروه مورد آزمون قرار گرفتند.

یافته ها

در جدول شماره ۱ میانگین و انحراف معیار نمرات آزمودنی ها در دو گروه آزمایشی و گواه ارایه شده است. همانگونه که در این جدول مشاهده می شود. کاربرد آموزش آرمیدگی عضلانی در دو بعد علایم روانی و جسمانی موجب تغییرات قابل توجهی در گروه کنترل شده است. برای بررسی معناداری میزان تغییرات بدست آمده، از طریق آزمون تحلیل کوواریانس بین گروهی میانگین های پس آزمون را پس از تعدیل کردن نمره های پیش آزمون مورد مقایسه قرار داده ایم (جدول ۲ و ۳).

جدول ۱: مولفه های آماری نمرات علایم روانی و جسمانی، پیش و پس از اجرای آرمیدگی

نشاره های جسمانی	نشاره های روانی	نشاره های جسمانی	نشاره های روانی	پیش آزمون	پس آزمون	آماره	گروهها
میانگین	میانگین	میانگین	میانگین	میانگین	میانگین	میانگین	میانگین
۱۹/۵۵	۳۴/۱۸	۴۹/۵۸	۱۳۰/۳	میانگین	میانگین	میانگین	میانگین
۹/۰۵	۱۸/۶۳	۲۴/۱۱	۴۸/۱۶۳	انحراف معیار	انحراف معیار	انحراف معیار	انحراف معیار
۴۴/۱۱	۱۳۶/۲۷	۴۱/۸۲	۱۴۲/۲	گروه گواه	گروه گواه	گروه گواه	گروه گواه
۲۲/۹	۴۶/۸۰	۵۰/۴۴۳	۲۳/۷۰	انحراف معیار	انحراف معیار	انحراف معیار	انحراف معیار

همانطور که جدول ۲ و ۳ نشان می‌دهد، آموزش آرمیدگی عضلانی تاثیر معنی داری بر کاهش علایم روانی و جسمانی سندروم پیش از قاعده‌گی دارد. اندازه‌ی اثر کل اصلاح شده برای علایم روانی ۰/۸۳۳ و برای علایم جسمانی ۰/۹۶۶ استاین میزان‌ها طبق ملاکهای کو亨 برای علایم روانی در حد زیاد و برای علایم جسمانی در حد متوسط است. به این ترتیب می‌توان نتیجه‌گرفت که آموزش آرمیدگی عضلانی، علایم روانی و جسمانی سندروم پیش از قاعده‌گی را کاهش می‌دهد.

جدول ۲: تحلیل کوواریانس اثرات بین گروهی کاهش علایم روانی سندروم پیش از قاعده‌گی

اندازه		میانگین			منبع تغییرات	
اثر	معناداری	F	مجذورات	df	Ss	
۰/۸۴۵	۰/۰۰۰	۶۹/۱۵۳	۴۵۵۸۴/۲۴۷	۳	۱۳۶۷۵۲/۱۴۰	Corrected Model
۰/۰۲۷	۰/۳۱۵	۱/۰۳۶	۱۸۷۶۰/۴۸۰	۱	۶۸۳/۰۶۹	Intercept
۰/۴۲۸	۰/۰۰۰	۲۸/۴۶۱	۴۶/۳۴۳	۱	۱۸۷۶۰/۴۸۰	پیش آزمون علایم روانی
۰/۰۰۲	۰/۷۹۲	۰/۰۷۰	۸۹۲۳۵/۵۴	۱	۴۶/۳۴۳	پیش آزمون علایم جسمانی
۰/۰۷۸۱	۰/۰۰۰	۱۳۵/۳۷۵	۶۵۹/۱۷۴	۳۸	۸۹۲۳۵/۵۴۰	گروه
				۴۲	۴۸۴۵۰/۱۷۵۰	خطا
				۴۱	۱۶۱۸۰۰/۷۴۴	کل

جدول ۳: تحلیل کوواریانس اثرات بین گروهی کاهش علایم جسمانی سندروم پیش از قاعده‌گی

اندازه		میانگین			منبع تغییرات	
اثر	معناداری	F	مجذورات	df	Ss	
۰/۹۰۸	۰/۰۰۰	۷۳/۲۳۵	۱۱۴۴۷/۹۰۵	۵	۱۳۰۳۲/۲۵۰(a)	Corrected Model
۰/۰۱۱	۰/۰۵۱۷	۰/۴۲۷	۶۶/۸۱۲	۱	۲۰۶/۴۴۹	Intercept
۰/۰۳	۰/۲۹۱	۱/۱۴۶	۱۷۹/۲	۱	۰/۸۸۳	پیش آزمون علایم روانی
۰/۰۱۲	۰/۰۵۰۲	۰/۴۶	۷۱/۹۸۲	۱	۴۷۵۲/۹۴۵	پیش آزمون علایم جسمانی
۰/۰۵۴۶	۰/۰۰۰	۲۲/۲۲۴	۳۴۷۳/۹۸۶	۲	۷۹۱۵/۱۶۱	گروه
			۱۵۶/۳۱۷	۳۷	۵۸۵۵/۷۰۹	خطا
				۴۲	۶۳۰۲۳/۲۵۰	کل

بحث و نتیجه‌گیری

بطور کلی نتایج پژوهش حاضر، نشانگر این است که آموزش آرمیدگی می‌تواند به طور موثری علایم سندروم پیش از قاعدگی را کاهش دهد. بسیاری از پژوهش‌های انجام شده نیز از یافته‌های این پژوهش حمایت می‌کنند.

فریمن و ریکلز^۱ در (۱۹۹۹) نیز پلاسیو را جهت درمان سندروم پیش از قاعدگی بکار برداشت و در بیماران بهبود مشاهده کردند بطوریکه در حدود ۵۰ درصد نمرات نشانه‌های پیش از قاعدگی نسبت به قبل از این درمان، کاهش یافت و به این ترتیب آنها نتیجه گرفتند که درمان غیر دارویی در مراقبتها کلینیکی درمان PMS دارای اهمیت و اعتبار است. بایز و سوزان بایز^۲ در ۱۹۸۷ نیز تحقیقی در رابطه با اثر دوره‌های کوتاه مدت درمان شناختی – رفتاری برای درمان سندروم پیش از قاعدگی در زنان پرداختند و نتایج تحقیق، کاهش معنی داری را در سطح افسردگی و نگرش بدکارکردی آزمودنیها نشان داد.

لارسن و همکاران (۱۳۷۹) نیز نقل می‌کنند که اغلب زنانی که از سندروم پیش از قاعدگی رنج می‌برند، پیوسته زیر فشار کار، مشکلات خانوادگی یا تغییرات عمدۀ مانند جدایی، طلاق، تغییر مکان و گاهی هم مرگ عزیزانشان هستند و با استفاده از ویتامین اضافی، پیوستن به کلاس‌های ورزشی، آموزش ریلکسیشن و برنامه‌هایی مانند تمدد اعصاب یا کلاس‌های یوگا می‌توانند وضع مزاجی سندروم خود را تسکین دهند. کمالی نیز در سال ۱۳۷۹ به بررسی تاثیر فنون آرامسازی بر قاعدگی در دنناک اولیه در دختران دانشجوی علوم پزشکی تبریز پرداخت و نتیجه گرفت که بکارگیری آرامسازی، شدت علایم قاعدگی، طول مدت استراحت و میزان مصرف داروهای مسکن در دوره‌های قاعدگی بعد از درمان، نسبت به دوره‌ی قبل از درمان و نیز نسبت به گروه شاهد، به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است.

فقهی (۱۳۷۳) به بررسی نقش آرامسازی عضلانی در کاهش علایم روانی در بیماران قلبی پرداخت و نتایج نشان داد که آرامسازی عضلانی در کاهش میزان اضطراب در گروه آزمایشی و مقایسه با گروه گواه، بیشترین تاثیر را داشته است.

هویت (۱۳۸۵) نیز می‌گوید معالجه‌ی آرامش، روی صدھا بیمار انجام شد و تقریباً همه‌ی آنها

به این درمان پاسخ مثبت دادند. او می‌گوید ایجاد آرامش، سلامت شخص سالم را حفظ و از آن در مقابل بیماری محافظت می‌کند و با آزاد سازی نیروهای شفا بخش که در داخل بدن وجود دارد در جهت طبیعی شدن فرآیندهای جسمانی بیمار عمل می‌کند. آرامش، هم از عواقب و عارضه‌های روان - تئی پیشگیری می‌کند و هم موجب بهبودی و رفع عارضه‌ها می‌شود همچنین تمام غدد را به کار کرد طبیعی خود می‌رساند و هورمونهای مورد نیاز بدن را به مقدار مناسب تولید می‌کند. غشای گیرنده‌گی سلولها نیز حالت تعادل و آرامش پذیری بهتری خواهد داشت گردش خون و ریتم تنفسی منظم و تنفس عمیق‌تر خواهد شد، دستگاه جهاز هاضمه تنظیم و اشتها بهتر خواهد شد. از طریق روش‌هایی مانند تمرین جسارت و قاطعیت و پرداختن به فعالیتهای هنری و تمرین‌های آرمیدگی و یوگا می‌توان به کنترل سندروم پیش از قاعدگی پرداخت. اثرات ایجاد آرامش در ذهن نیز موجب افزایش بازده‌ی مفید مغز می‌شود و تشتن فکر کاهش می‌یابد، روان تحت کنترل بیشتری قرار می‌گیرد و فرد بر حالاتی مانند بی قراری، خشم و عصبانیت کنترل پیدا می‌کند (فتحی، ۱۳۷۸؛ نیکخو ۱۳۸۴).

باتیا و باتیا^۱ (۲۰۰۲) نیز طی تحقیقات خود نتیجه گرفتند که مداخله‌های ناوابسته به دارو از قبیل آموزش درباره اختلال، تغییر سبک زندگی و رژیم غذایی و درمانهای حمایتی برای بیمارانی که نشانه‌های خفیف و متوسط سندروم پیش از قاعدگی دارند، می‌توانند مفید و موثر باشد. سیلور^۲ نیز طی تحقیقی که در ۱۹۸۱ انجام داد، تفاوتی بین ریلکسیشن درمانی و شناخت درمانی در درمان سر دردهای میگرنی نمی‌بیند. باورز^۳ نیز طی تحقیق خود در (۱۹۷۸) ریلکسیشن درمانی همراه با دارو درمانی را برای درمان بیماران افسرده موثر و مفید دانست. ویر^۴ (۲۰۰۴) افت استروژون را دلیل کاهش سطح آندروفین و کاته‌کول استروژون و افزایش ترخیص نور اپی نفرین دانست که در دوران یايسگی منجر به گرگرفتگی می‌شود و روش آرمیدگی عضلانی را جهت گرگرفتگی، موثر دانست و به کار برد. برنسین و بورکووکس^۵ (۱۳۸۰) نیز مطرح می‌کنند که آموزش آرامسازی عضلانی، چه بخش تکمیلی از یک برنامه درمانی باشد و چه نباشد قادر است در فرآیند روان درمانی نقش کاتالیزور را ایفا می‌کند. تحقیقات دیویس و همکارانش (۱۳۸۰) نشان می-

1- Bhatia & Bhatia

2- Silver

3- Bowers

4- Weir

5- Bernstein & Bokovex

دهند که آرامیدگی عضلاتی پیشرونده (روشی که در این پژوهش بکار رفته است) در از بین بردن تنفس و انقباض عضلات ، تعداد زیادی از علایم و نشانه های بیماری های مانند اضطراب بی خوابی افسردگی ، احساس خستگی ، التهاب کولون ، اسپاسمها عضلاتی در دنک در گردن ستون مهره های کمری، افزایش فشار خون ، فوییا ها و لکنت زبان موثر است.

کوت و تنبام^۱ در سال ۱۹۹۸ طی مطالعه ای به بررسی نقش ریلکسیشن بر پرخاشگری پرداختند و نتیجه ی تحقیق نشان داد که تصویر سازی ذهنی آرامش، به طور سودمندی در تحمل فشار موثر واقع می شود . در سال ۲۰۰۶ واتاناب ، فوکودا ، هارا ، میدا^۲ پژوهشی درباره تصویر سازی ذهنی ریلکسیشن بر سلامت افراد جامعه انجام دادند و نتیجه گرفتند که هرچه توانایی تصویر سازی ذهنی آرامیدگی، با موفقیت بیشتری انجام گیرد و استرس به سمت آرامش جهت داده شود تاثیر بهتری دارد . در سال (۲۰۰۶) والدز^۳ تحقیقی در مورد تاثیر ریلکسیشن درمانی بر کاهش علایم روانی - جسمانی استرس در مادران مشاغل تخصصی انجام داد و نتایج کاهش معنی داری از سطح استرس و میزان تنش عضلاتی را نشان داد. گالتز^۴ (۱۹۹۶) می گوید تحقیقات بالینی و سلامت روان ، سودمندی ریلکسیشن درمانی را برای بسیاری از مشکلات اثبات کرده است .

منابع

- اشتاينر ، ماير و يونگرر ، كيمبرلي . (۱۳۸۳) . افسردگی در زنان . ترجمه بهادران ، پروين .
كاوسيان ، جواد . عريفى ، حميدرضا .
بابيان زاد اهرى ، شهناز . (۱۳۷۸) . بررسی تاثیر پریلدوکسین (ویتامین B6) بر شدت سندرم پیش از قاعده گی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ايران . پایان نامه کارشناسی ارشد مامایی .
دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ايران
برنستین ، داگلاس . بورکووک ، تامس . (۱۳۸۰) . راهنمای آموزش آرامسازی روانی .
. ترجمه صاحبى ، على . انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد . (Relaxation)

1- Coote & Tanenbaum

2- Watanabe; Fukuda; Hara & Maeda

3 -Valdez

4- Golletz

تمجیدی ، اکرم . (۱۳۷۴) . بررسی شیوع و شدت علایم سندروم پیش از قاعده‌گی در زنان ۴۵-۱۵ سال شهر تهران . پایان نامه کارشناسی ارشد مامایی ، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی .

دیویس ، مارتا . رونیز ، البیابت . مک کی ، ماتیو . (۱۳۸۰) . ۹ طریقت اسرارآمیز (و آرامش بخش) . ترجمه جمالیان ، رضا . ظهیرالدین ، علیرضا . انتشارات تهران : عطایی .

سعادتی ، نسرین . (۱۳۷۳) . رابطه بین نگرش نسبت به قاعده‌گی با شیوع سندروم پیش از قاعده‌گی در دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران . پایان نامه کارشناسی ارشد مامایی . دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران .

سرمد ، زهره . بازرگان ، عباس . حجازی ، الهه . (۱۳۸۳) . روش‌های تحقیق در علوم رفتاری . انتشارات آگاه .

فتحی ، رسول . (۱۳۷۸) . ریلاکس تراپی اعجازگر رهایی و بهبودی از هیجانات ، تنشها و عارضه‌های روان - تنی ، فواید و فنون . انتشارات شهرآب .

فقهی ، محمد . (۱۳۷۳) . بررسی نقش روش آرامسانی عضلانی در کاهش نشانه‌های روانی در بیماران قلبی . پایان نامه کاپلان ، هارولد و سادوک ، بنیامین . خلاصه روانپزشکی - روانپزشکی بالینی (جلد دوم) .

ترجمه پورافکاری ، نصرت الله . (۳۷۹) . انتشارات شهرآب - آغاز .

کمالی ، صدیقه . (۱۳۷۹) . بررسی تاثیر فنون آرامسانی بر قاعده‌گی دردناک اولیه (اسپاسمودیک و احتقانی) در دختران دانشجوی علوم پزشکی تبریز . پایان نامه کارشناسی ارشد .

گنجی حمزه (۱۳۷۹) . بهداشت روانی . انتشارات ، تهران : ارسباران لارسن ، نیلز . استوکین ، آیلین . (۱۳۷۹) . انتشارات ، تهران : ارسباران میلانی ، مهین . انتشارات درسا

نیکخو محمدرضا . (۱۳۸۴) . اختلالهای قاعده‌گی (تشخیص و درمان به زبان ساده) . انتشارات : نشر سخن

هویت ، جیمز . (۱۳۸۵) . آرمش . ترجمه شادان ، منوچهر . انتشارات تهران : ققنوس

- Amy Scholten, MPH. What are the risk factors for premenstrual syndrome?. *Premenstrual Syndrome (PMS)*. Harvard Medical school. <http://healthgate.partners.org/browsing/browseContent.asp>. Retrieved on 2008-01-10.
- Apotek1.(2007). PMS. Retrieved on 2007-02-02. <http://www.apotek1.no/helsecenter/kvinner/underliv/menstruasjon/pms>
- Bernstein ' D.A ' and Bokovex T. D. (1973). *Progressive Relaxion Training* Champing IL : Researchpress .
- Bhatia SC ' Bhatia SK . (2002) . *American Family Physician* [NLM-MEDLINE]. Oct 1. VOI.66' Iss .7' Pg.1239.Diagnosis and treatment of premenstrual- dysphoric disorder.
- Bowers' Wane A. ph. D. (1987) . The university of Lowa ' 142 pages' AAT 8810124. *A comparison With inpatients: Cognitive therapy plus medication + relaxation therapy plus medication + medication alone*
- Byers' Susan BIBLER 'ph.D. (1987). California School of Psychology – Fresno ' 166 Pages ' AAT 8802520 . *Acomparsion of the Efficacy of education Alone or combin With Cognitive therapy in the trement of premenstrual syndrome (pms)* .
- Causes of PMS (2007). <http://www.always.com/period/pmscauses.jsp>. Retrieved on 2007-02-11.
- Coote D Tenenbaum G . (1998) . PMS. *Journal of Sports Medicine and Physical Fitness* [NLM – MEDLINE] . Vol . 38 T Iss . 4 . pg. 344 .
- Erica Weir . (2004) . *Canadaion Medical Association . Journal. Ottawa* , Jan 6 ' Vol ' 170 ' Iss . 1 ' pg . 39 . Hotflashes .. in January.
- Eriksson O, Wall A, Marteinsdottir I, et al (2006). "Mood changes correlate to changes in brain serotonin precursor trapping in women with premenstrual dysphoria". *Psychiatry Res* **146** (2): 107–16. doi:10.1016/j.psychresns.2005.02.012. PMID 16515859.
- Freeman EW ' Rickels K . (1999) . characteriscs of placebo responses in medical treatment of premenstrual syndrome *American Journal of psychiatry* [NLMMEDLINE]. vol . 156 ' Iss . 9 ' pg. 1403
- Golletz' Daniel victor ' Ph . D . 1996 . university of Washington ' 124 pages ' AAT 9704500 . *Use of nature stimuli in relaxation therapy for anxy and anger* .
- Halbreich U. 2004 . *Gynecolgical Endocrinology* [NLM-MEDLINE]. Vol. Ig ' Iss . 6 ' pg. 320
- Johnson S. . Premenstrual Syndrome (Premenstrual Tension). *Menstrual Abnormalities and Abnormal Uterine Bleeding*. Armenian Health Network, <http://www.health.am/gyneco/more/premenstrual-syndromapremenstrual-tension/>. Retrieved on 2008-01-10.

- Lori M. Dickerson, Pharm. D., Pamela J. Mazyck, Pharm. D., and Melissa H. Hunter. (2003). Premenstrual Syndrome. *Premenstrual Syndrome. American Academy of Family Physicians*. Retrieved on 2008-01-10.
- MayoClinic.com. (2006). *Premenstrual syndrome syndrome (PMS): Signs and symptoms* (2006-10-27). <http://www.mayoclinic.com/health/premenstrual> Retrieved on 2007-02-02.
- Merck Manual Professional - Menstrual Abnormalities (2005-11). <http://www.merck.com/mmpe/sec18/ch244/ch244g.html>. Retrieved on 2007-02-02.
- NHS Direct: Premenstrual syndrome - Causes (2005-11-09). <http://www.nhsdirect.nhs.uk/encyclopaedia/a-z/index.aspx>. Retrieved on 2007-02-02.
- Okeahialam BN. 2004. Refractory hypertension in Women Controlled After Identifying and Addressing Premenstrual Syndrome. *Journal of the National Medical Association* [NLM- MEDLINR] . . VOI. 96 , Iss . 11, pg. 1422 .
- Roca CA, Schmidt PJ, Rubinow DR (1999). "A follow-up study of premenstrual syndrome". *Journal of Clinical Psychiatry* **60** (11): 763–6. PMID 10584765.
- Silver, Bernard Victor , Ph. D. (1981) . *Cognitive and relaxation Therapies in the treatment of Migraine Headaches*. Memphis state university , , 53 pages, AAT 8208412 ..
- Sterin Meir. 2000 . *The Lancet* . London , sep 30 , VOI . 356, Iss . 2236 , pg. 1126 , Recognition of premenstrual dysphoric disorder and its treatment .
- Valdez , Diana Carol , Ph , D. (2006). *Efeect of biofeedback assisted relaxation therapy on the psychophysiological measures of stressed-out working professional mothers* .University of North Texas, 68 Pages , AAT 3214501 .
- Watanabe E , Fukuda S , Hara H , Maeda Y , et al. (2006) . Differences in Relaxation by means of guided imagery in healthy community sample. *Alternative Therapies in Health and Medicine* [NLM- MEDLINE] . Mar-Apr . VoI . 12 Iss . 2 , pg. 60.